

DANIELIS 41418

SENNERTI,

D. ET MEDICINÆ

IN ACADEMIA

VVITTEBERGENSI

Professoris publici,

PRACTICÆ MEDICINÆ

LIBER SECVNDVS.

*Olim in Germania, nunc verò de nouo Typis excusa, multisque  
quibus scatebat erroribus repurgata.*

*Ex libris  
Doctor.*



*Ruinierij  
medic.*



LVGDVNI,

Sumptibus PETRI RAVAUD, in vico  
Mercuriali, ad insigne S. Petri.

M. D C. XXX.

CVM PERMISSV SVPERIORVM.

THE LIBRARY OF THE

CONGRESS OF THE UNITED STATES

OF THE DISTRICT OF COLUMBIA

WASHINGTON, D. C.

1864

LIBRARY OF THE DISTRICT OF COLUMBIA

WASHINGTON, D. C.

1864

Printed by

W. H. R.



JAN 1 1864

RECEIVED BY THE DISTRICT OF COLUMBIA

WASHINGTON, D. C.



*Illustr. ac Celsissimo Principi, ac Domino,*

**D. GEORGIO,  
LANDGRAVIO**

**HASSIÆ, COMITI**

**Cattimeliboci, Deciæ,**

**Zygenhaynæ, &**

**Niddæ, &c.**

**DOMINO MEO CLEMENTISSIMO,**

*Salutem & Felicitatem perpetuam. P.*



**C**OR vitæ principium & caloris  
innati fontem esse, idémque pri-  
mum viuere, postremúmque mo-  
ri, & reliquas corporis partes ex  
eo vitam haurire, nec actiones  
suas obire, nisi vitali calore & spiritu per ar-  
terias ab eo transmissio perfundantur, in scho-  
lis Philosophorum & Medicorum notissi-  
mum est. Nam, vt Hippocrates, *lib. de corde*,  
elegantè scribit, αὐτὴ πηγὴ φύσις ἀνδράων,  
καὶ οἱ ποταμοὶ ἐν ταῦτα ἀνὰ τὸ σῶμα, τοῖσιν ἀρδε-

## EPISTOLA

ται τὸ σκῆν<sup>ον</sup>, ἔτσι δὲ καὶ ζῶν φέρουσιν τῷ ἀνθρώ-  
 πῳ κῆν ἀναπνέουσιν ἀπέθανεν ἄνθρωπ<sup>ος</sup>. *Hi sunt*  
*natura humana fontes, hincque flumina excurrunt,*  
*quibus corporis nostri tabernaculum irrigatur. Atque*  
*hæc vitam homini conferunt, & si exsiccata fuerint,*  
*homo perit.* Et Galen. 6. de usu part. c. 7. ἡ καρδία τῆς  
 ἐμφύτης θερμασίας, καὶ ἡ διοικοῖ τὸ ζῶον, οἷον ἐστὶ  
 τῆς ἐστὶ καὶ πηγὴ. *Cor caloris nativi, quo animal regi-*  
*tur, quasi fons quidam & focus est.* Nimirum  
 quod Sol est in maiore mundo, id cor est in  
 minore. Vt enim Sol lumine suo vniuersum  
 mundum illustrat atque exhilarat, & calore  
 suo omnia viuificat, ac fouet: ita Cor calore  
 suo & vitali spiritu totum corpus viuum &  
 vegetum reddit, idque fouet, conseruat, spi-  
 ritusq; vitales, tanquam radij quidam æthe-  
 rei & viuifici, à corde in vniuersum corpus  
 dimanant. Et, vt Aristot. 3. de part. animal. cap. 7.  
 scribit: *Cor est οἷον ἐστὶα, ἐν ᾗ κείσεται τῆς φύσεως*  
*τὸ ζωοποιεῖν, quasi focus, quo natura fomites & pri-*  
*mordia ignis nativi continentur.* Ac propterea  
 etiam, vt, eodem in loco, Aristot. scriptum re-  
 liquit, locum suum ὥσπερ ἀκρόπολιν τῷ σώμα-  
 τ<sup>τι</sup>, *veluti arcem corporis* occupat. Conditor  
 enim rerum sapientissimus ipsi in thorace,  
 mediâ corporis regione, qui maxima ex par-  
 te osseus est, locum dedit, atque antè ster-  
 num, à tergo spinam dorsi quasi munimenti  
 loco constituit, quibus ex latere utroque co-  
 stas.



# DEDICATORIA.

stas securitatis gratia adiunxit. Imò in dorso  
 omoplatas seu scapulas, quas Celsus scopu-  
 la operta nominat, quasi scuta cordis, appo-  
 suit. Intus verò cor totum pulmonibus cin-  
 xit, quibus non solùm tanquam puluino in-  
 cumbit, (vnde etiam Auicennas pulmones  
 cordis culcitram vocauit) sed qui etiam re-  
 spirationis organa sunt, quo calidum, quod  
 in corde est, conseruatur. Atque si hæ omnes  
 corporis partes saluæ sunt, œconomia etiam  
 corporis rectè administratur, & sicut in re-  
 gno, cuius Princeps, cum iis, qui à secretis  
 ipsi sunt consiliis & primariis administratio-  
 nibus, valet & floret, omnia rectè atque or-  
 dine fiunt & administrantur: ita etiam, dum  
 Cor in sua regione bene sese habet, calorem  
 viuificum in omnia membra diffundit, eaque  
 fouet, τέθηλε πάντα, καὶ λάμπει χαρίτων ἑαυρ,  
*omnia florent, & fulget ver Gratiarum*, vt est in  
 antiquo Aripbronis Sicyonij hymno; nisi  
 pars aliqua priuato vitio teneatur: quod  
 ipsum tamen faciliùs toleratur, si Cor hilari-  
 tatis auram adspiret. Contra verò, sicut, dum  
 Rex ægrotat & de salute periclitatur, omnes  
 subditi in mœrorem & squalorem coniiciun-  
 tur: ita etiam, Corde malè affecto, totius cor-  
 poris salus simul in discrimen coniicitur; id  
 quod non solùm in lipothymia & syncope,  
 sed & in respiratione læsa accidit, atque vbi

## E P I S T O L A

illa caloris in corde ventilatio necessaria cessat, aëre, quem spiritu ducimus, denegato, homo in præsentissimum vitæ discrimen conicitur, vt in iis, qui angina laborant, vel quibus à re aliqua in orificium asperæ arteriæ illapsa spiritus intercluditur, aut qui laqueo strangulantur, vel aqua aut carbonum fumo suffocantur, manifestum est.

Cùm ergo libro primo Practicæ, quem anno superiore edidi, Capitis præter naturam affectiones complexus sim, secundo hoc libro morbos ac symptomata Cordis, & reliquarum thoracis partium, quæ gratiâ cordis inprimis factæ sunt, complecti libet.

Vt verò Illustrissimo nomini tuo, *Princeps Celsissime*, hoc quicquid est operis inscriberem, causas, vt opinor, non leues habui. Primò enim satis superque notus est Illustriss. Celsit. T. erga bonas literas amor, & earum cultores incredibilis beneuolentia, quam cùm alia manifesta faciunt, tum id, quod insigni & Principe digna benignitate ac liberalitate Academiam Marpurgensem, bonarum literarum, virtutis & pietatis officinam Illustr. alit, fouet ac tuetur. Eum ergo Illustr. T. Celsitudinis in bonas literas affectum etiam hâc qualicunque Dedicatione posteris notum facere & commendare volui. Deinde quia scripta mea omnia iure quodam Illustrissimæ

# DEDICATORIA.

strissimæ Domui Saxonicæ, utpote in Electo-  
rali Saxonica Academia nata, debentur; cum  
ea verò Illustrissimæ Domui Hassiacæ à mul-  
tis annis fœderis sanctione contracta necessi-  
tudo, & Illustriss. T. Celsit. inprimis arcta  
intercedit cognatio & affinitas: hoc opus iu-  
re Illustriss. T. Celsitud. deberi existimo.

Accipe ergo, *Princeps Illustrissime*, hoc quic-  
quid est operis Medici, vultu beneuolo &  
fronte serena, atque eo affectu, quo aliàs bo-  
narum literarum cultores, & qui quocunque  
modo ad Illustrissimam Domum Saxonicam  
spectant, complecti soles, & meis conatibus  
faue. Deus t̄r. Opt. Max. Illustriss. T. Cels.  
Saluam, incolumem, & omni ex parte bea-  
tam, felicemque præstet, ac tueatur. VVitte-  
bergæ, Cal. Augusti, Anno Christi 1629.

*Illustriss. Tue Celsitud.*

Subiectissimus

DANIEL SENNERTVS, D. Sereniss.  
Elect. Saxon. Medicus, & Facultatis  
Medicæ ibid. Professor ac Senior.

---

A P P R O B A T I O.

**D**ANIELIS SENNERTI Medici Doctoris, *Practica Medicina librum secundum* typis mandari sumptibus Petri Rauaud, Bibliopolæ Lugdunensis, ego Regis Consiliarius, & Procurator in Lugdunensi Præfectura non impedio. Die 12. Martij, 1630.

PVGET.

---

A P P R O B A T I O.


**L**I BR V M qui inscribitur, *Practica Medicina liber secundus*, Authore DANIELE SENNERTO, D. Medico, à Petro Rauaud Bibliopola Lugdunensi, typis mandari permitimus, ac simul ne quis citrà datam ei facultatem denuò excudat interdicimus. Datum Lugduni die 13. Martij, anno 1630.

DECHAPONAY.



# INDEX CAPITVM LIBRI SECVNDI PARTIS PRIMÆ.

*De Oris ac Faucium, & partium in his  
contentarum ægritudinibus.*

Cap. I.	 E labiorum rumoribus.	
	pag.	3
II.	De labiorum fissuris.	5
III.	De labiorum vlceribus.	8
IV.	De labiis vulneratis, leporinis, & curtis.	10
V.	De tremore & peruersione labiorum, sanguinis fluxu ex iis, & labiis liuidis.	12
VI.	De oris apertione læsa.	14
VII.	De oscitatione.	15
VIII.	De oris distortione.	17
IX.	De ptyalismo seu crebra sputatione, & salivæ defectu.	24
X.	De dentium morbis.	29
XI.	De dentium dolore.	43
XII.	De dentium stupore & algore.	54
XIII.	De dentium stridore.	56
XIV.	De dentibus nigris malè coloratis & fordidis, vt & de sanguinis è dentibus fluxu.	57

XV.	De dente aureo pueri Silesij.	60
XVI.	De gingivarum affectionibus.	62
XVII.	De morbis & symptomatibus maxillarum.	70
XVIII.	De oris vitiis & primò de eius inflammationibus & vlceribus.	74
XIX.	De fœtore oris.	86
XX.	De gurgulionis laxatione.	89
XXI.	De gurgulionis inflammatione & exulceratione.	93
XXII.	De tonsillarum inflammatione & vlceribus.	100
XXIII.	De iis, quæ in guttur vel gulam inciderunt, eximendis.	107
XXIV.	De angina.	111
XXV.	De strumis in collo, & bronchocele ac hydrope gutturis.	155

---

## LIBRI SECVNDI

### PARTIS SECVNDÆ.

*De asperæ arteriæ, pulmonis, mediastini, diaphragmatis, thoracis præter naturam affectionibus.*

I. Cap.	<b>D</b> E asperæ arteriæ morbis.	Pag. 170
II.	De Pulmonis intemperie.	178
III.	De pulmonis inflammatione, siue peripneumonia.	184
IV.	De vasorum pulmonis & primò de asperarum arteriarum angustia.	201

V.	De læuium pulmonis arteriarum angustia.	
	211	
VI.	De apertione vasorum pulmonis.	216
VII.	De grandine , calculo & vermibus in pul- mone genitis.	230
VIII.	De tuberculis pulmonis.	232
IX.	De hydropē & hydatidibus pulmonis.	236
X.	De pulmonum cum latere coalitu.	237
XI.	De pulmonis vulneribus.	240
XII.	De vlceribus pulmonum & phthisi.	245
XIII.	De mediastini inflammatione.	270
XIV.	De diaphragmatis tumoribus , & primò de inflammatione.	272
XV.	De vulneribus diaphragmatis.	295
XVI.	De pleuritide, seu inflammatione pleuræ, & muscutorum thoracis.	297
XVII.	De thoracis vulneribus.	340
XVIII.	De fistulis thoracis.	346
XIX.	De empyemate.	347
XX.	De hydropē pectoris.	359
XXI.	De vertebrarum dorsī luxatione & gibbo- sitate.	364
XXII.	De fractura spinæ & vulneribus spinalis medullæ.	371
XXIII.	De tabe dorsali.	372
XXIV.	De vermibus dorsī.	376
XXV.	De luxatione & fractura costarum.	378
XXVI.	De mucronatæ cartilaginis prolapsu.	382

---

# LIBRI SECVNDI

## PARTIS TERTIÆ.

*De symptomatibus, quæ pulmonibus & thoraci accidunt.*

Cap. I.	<b>D</b> E respiratione læsa in genere.	Pag. 393
II.	De asthma, & orthopnœa.	400
III.	De suffocatione seu strangulatione.	432
IV.	De vitiis vocis & sermonis.	435
V.	De tussi.	447
VI.	De dolore pectoris.	467
VII.	De sputo sanguinis.	472

---

# LIBRI SECVNDI

## PARTIS QVARTÆ.


*De Morbis ac symptomatibus cordis.*

Cap. I.	<b>D</b> E morbis pericardij.	Pag. 483
II.	De cordis intemperiebus.	486
III.	De reliquis cordis morbis.	495
IV.	De cordis palpitatione.	497
V.	De virium imbecillitate.	511
VI.	De lipothymia & syncope.	517





## *Index Questionum.*

- I.  N saliva conglutinationem  
vulnerum labiorum remo-  
retur? pag. 8
- II. An tortura oris & spasmus cy-  
nicus differant? 17
- III. An spasmus cynicus sit morbus vel sym-  
ptoma? 23
- IV. An cera dentibus cariosis commodè inda-  
tur? 32
- V. An cauteria tutò in dentibus cariosis ad-  
hibenda? 33
- VI. An dens lupi gestatus in dentitione pue-  
rorum aliquid præstet? 54
- VII. An in tonsillarum inflammatione repel-  
lentia solùm intus applicanda? 105
- VIII. An angina à cibis & medicamentis pecu-  
liari vi agentibus induci possit? 116
- IX. An cacochymia primam occasionem præ-  
beat anginæ? 132
- X. An in angina rectè à Chymicis vomitoria  
& antimonialia exhibeantur? 133
- XI. An pilulæ in angina exhibendæ commo-  
dè dissolvantur? ibid.
- XII. Quâ formâ repellentia in angina exhiben-  
da? 134
- XIII. An omnis angina sit ab inflammatione? 151
- XIV. An humor anginam excitans à cerebro &  
capite defluere possit? 152
- XV. An

- XV.** An vera angina sit , quæ ab esu fungorum  
& similibus venenatis rebus oriri dici-  
tur ? 153
- XVI.** An nidus hirundinis aliquem in angina  
curanda vsum habeat ? ibid.
- XVII.** An laryngotomia tuta & utilis sit. 154
- XVIII.** An bronchocele & struma in gutture sit  
idem morbus ? 156
- XIX.** An strumæ & scrophulæ differant ? 137
- XX.** An strumæ à Mercurio seu aquis ex mon-  
tibus metallorum feracibus scaturien-  
tibus & Mercuriū in se continentibus  
oriantur ? 139
- XXI.** An vlcera asperæ arteriæ sint sanabilia.  
178
- XXII.** An in peripneumonia hæmorrhagia na-  
rium utilis sit ? 200
- XXIII.** An dulcia in peripneumonia conue-  
niant ? ibid.
- XXIV.** Quænam sit causa hydropis, quæ læuium  
arteriarum obstructione laborantibus  
superuenire solet ? 215
- XXV.** Medicamenta grumos sanguinis in thora-  
ce dissoluentia quo tempore sint exhi-  
benda ? 223
- XXVI.** Qualis aër in apertione vasorum pulmo-  
nis ab aëre frigido conueniat ? 229
- XXVII.** An vlcera pulmonis sint sanabilia ? 267
- XXVIII.** An in phthisi cochleæ utiles sint ? 269
- XXIX.** Quæ pars afficiatur in pleuritide ? 277
- XXX.** An bilis , pituita vel melancholia sola  
pleuritidem generet ? 278
- XXXI.** Quales febres sint pleuriticoꝝ ? 280
- XXXII.** Quæ vena in pleuritide & quo in latere  
aperien

aperienda.

295

XXXIII. An in pleuritide ex vna vena aperta simul  
reuulsio & deriuatio fieri possit? 298

XXXIV. Mulieribus mensium suppressione labo-  
rantibus, quænam vena sit secanda in  
pleuritide? 302

XXXV. Quando secanda sit vena in pleuritide?  
303

XXXVI. Quantum sanguinis sit mittendum? ibid.

XXXVII. An in omni pleuritide detur inflammatio  
pleuræ? 316

XXXVIII. An in pleuritide sola pleura, an verò simul  
pulmo inflammetur? 317

XXXIX. Per quas vias materia in pleuritide ad as-  
peram arteriam perueniat, & inde tussi  
eiiciatur? 319

XL. Quæ vena in pleuritidis initio aperienda  
sit. 320

XLI. Per quas vias è thorace materia ad aluum  
& vesicam peruenire, & hinc euacuari  
possit? 336

XLII. Qualisnam sit febris, quæ empyemati con-  
iungitur? 356

XLIII. Quo in loco sectio thoracis in empyicis  
instituenda sit? 357

XLIV. An humor asthmatis causa hæreat etiam  
quandóque extra bronchia pulmonum?  
422

XLV. An asthma frequentius à catarrho, an ve-  
rò ab humore crudo è venis in pulmo-  
nes effuso excitetur? 423

XLVI. An asthma semper sit sine febre? 425

XLVII. An purgantia in paroxysmo asthmatico  
conueniant? 426

An

**XLVIII.** An ius galli decrepiti asthmaticis conueniat? 427

**XLIX.** An arsenicum suffimigiis in asthmaticis curandis rectè admisceatur. 429

**L.** An victus attenuans simulque tenuis asthmaticis conueniat? 430.

**LI.** An tussis sit solùm ab angustia tracheæ arteriæ? 464

**LII.** An aliquid in pulmonem ex ore delabatur? 465

**LIII.** An in sputo cruento sanguis semper è brachio, an verò etiam è talo & cruribus, præcipuè in fœminis mittendus sit? 481

**LIV.** An lunatica passio dicta puerorum & infantium ex vermibus in pericardio ortis accidat? 484

**F I N I S.**



# LIBER SECVNDVS.

## PARS PRIMA,

### DE ORIS AC FAUCIVM ET PARTIVM IN IIS CONTENTARVM ÆGRITVDINIBVS.

#### *Proœmium.*



N T R A Cranium, & pectus os, fauces, & collum interiacent. Os, Græcis *Στόμα*, dicitur tota illa cauitas, inter labia, & buccas, ac initium gulæ, & asperæ arteriæ contenta. Et proinde ad os pertinent Labia, Lingua, Dentes, Gingivæ, Maxillæ, Columella, Tonsillæ, Fauces, quæ sunt illa oris extrema pars, vnde gula, & aspera arteria incipiunt. Itaque postquam morbos, & Symptomata, quæ capiti, & cerebro, ac sensuum exteriorum organis accidunt, explicauimus, antequam ad ægritudines Pectoris accedamus, ordo postulare videtur, vt de harum partium vitiis agamus.

Dicendum ergo de Labiorum tumoribus, fissuris,

& vlceribus , de labiis malè conformatis , & cuttis,  
de oscitatione , de Labiorum tremore , de eorum-  
dem conuulsione , seu spasmo Cynico , de Ptyalis-  
mo ; de Linguae asperitate , magnitudine nimiâ , in-  
flammatione , & tumore , de Linguae fissuris , vul-  
neribus , combustione , de Ranula sub Lingua , de  
Linguae motu læso ; de Dentium corrosione & ca-  
rie , vacillatione , ordine , & numero vitiato ; de  
dolore Dentium , de stupore , de colore eorumdem  
vitiato ; DeGinguiarum inflammatione , exscreſcen-  
tiâ , cruentatione , putredine , carnis diminutio-  
ne , vlceribus ; de Maxillarum vitiis ; de Oris vl-  
ceribus ; de Oris fœtore ; de Columellæ laxitate ; de  
inflammatione eiusdem ; de vlceribus Columellæ ;  
de absorptione & erosione eiusdem ; de Tonsilla-  
rum tumoribus & inflammatione ; de earumdem  
vlceribus ; de iis quæ faucibus , & gutturi præter  
naturam inhærent , extrahendis ; de Angina &  
colli vitiis.

C A

## CAPVT PRIMVM.

### *De Labiorum tumoribus.*



LABIORVM vsus multiplex est. Primò *Labio-*  
enim os claudunt, vt per nares solùm, ni- *rum v-*  
si aliud necessitas postulet, fiat respiratio, *sus.*  
ac ne, si illud perpetuò, vbi semel propter  
cibum, vel potum sumendum, vel respira-

tionem aperire necesse est, hians ad dilata-  
tum maneret, omnis generis corpuscula, muscas, paleas,  
puluerem admittat, atque etiam dentes & gingiuarum fri-  
gore, ventisque lædantur. Præterea ad formandum ser-  
monem sunt vtilia, præcipuè ad efferendas litteras labia-  
les, ita dictas, quod ad earum prolationem labia maxi-  
mè sunt necessaria. Seruiunt etiam ad potus faciliorem  
assumptionem, neque sine iis potus commodè assumi  
posset. Vtilia quoque sunt ad cibum in ore continendum  
iis, qui molaribus dentibus destituti, incisoriis tantum  
masticare coguntur. Faciunt etiam labia, ad saliuam ex  
ore eiiciendam, vt & in ore detinendam, ne illa conti-  
nuò ex ore proflueret, & insignem turpitudinem pareret.  
Vtilia sunt, & ad sonos variandos tubicinibus: infanti-  
bus item ad sugendum. Tandem per se ad ornatum mul-  
tum faciunt. Monstruosus enim omnino esset homo, si de-  
truncatis labiis rictum irati canis ostenderet. Contra ho-  
mo si labia lenia, rubicunda, magnitudine moderata, os  
debito modo claudentia obtineat, insignis inde gratia, &  
ornamentum ipsi conciliatur.

Atque hæc omnia præstant labia, si naturalem suam  
conformationem habeant: præstare verò non possunt,  
si eam amittant, & vitia aliqua contrahant, de quibus  
iam dicendum.

Et quidem primò de Labiorum tumoribus, & magnitu- *Labio-*  
dine auctâ dicemus. Nam prima nonnunquam labia ni- *rum Tu-*  
mis *mor.*

Natiuus.

mis crassa, & magna sunt. Et quidem in quibusdam labrum superius est magnum, & crassum, & duplo sæpè maius, vnde non tantum deformitas oritur, verum etiam vox, & sermo aliquantum vitatur, aerisque efflatio quodantenus impeditur. Quibusdam verò labium inferius est nimis crassum, & quasi pendulum. Verum hæc vitia cum naturalia sint, corrigi non possunt.

A venenis.

Deinde interdum labia præter naturam intumescunt, quod fit ab apium, vesparum, muscarum venenatarum ictibus. Et tum decocto althææ cum aceto, vel lacte fouenda, aut succus plantaginis imponendus, vel etiam ratione veneni theriaca illinenda. Interdum etiam intumescunt post hausta venena, & tum cura ad venenum dirigenda. Refert etiam Guiliel. Fabric. cent. 4. obs. 36. cuidam Doctori, cum fungos manibus tractasset, & iis illotis postea labia attigisset, ea supra modum intumuisse, sed aqua Stapediana, quæ in tract. nostro de febribus, capite de Peste, descripta existat, apposita conualuisse. Ex quo patet in simili casu, & alia alexipharmaca adhiberi posse.

Labiorum inflammatio.

Tertiò, interdum etiam inflammantur ex iisdem causis, à quibus aliæ partes, ex contusione, & humorum affluxu. Et curatio etiam vt in aliis partibus instituenda. Talia tamen medicamenta vsurpanda, quæ in oris inflammatione adhiberi possunt.

Labiorum tumor durus.

Quartò, vidi etiam tumorem durum, ad modum steatomatis in labio inferiore cuiusdam nobilis, qui cum discuti, nec ad suppurationem duci posset, sectione feliciter curatus est.

Labiorum cancer.

Quintò, quandoque & Cancer labia occupat. Qui, quas causas habeat, & quomodo curetur, è doctrina de Cancro in genere petendum.

Labiorum tumor ex lue venerea.

Sextò, iuuenem quemdam, qui ex Lue Venerea labia ulcerata, inflata, subnigra, tumida carcinomatis instar habuit, Forestus lib. 14. obs. 2. curauit vniuersalibus ad morbum venereum, & hoc decocto, panno eo imbuto labiis apposito.

℞. Ligni Guaiaci, P. ij. Bulliant in Aq. solani, deinde colentur. Add. aluminis, ʒ. j. iterumque semel ebulliant, & colentur

Septimò,



Septimò, interdum etiam tumores aridi labia occupant. Ita in Oeniadis Phœnici, & Andræa fratribus mala altera intumuit, & labium, quod ex anteriore parte malæ, & oculo respondet, neque quicquam intro spectanti comparebat, neque foris ullam puris significationem edebat, sed arida putredine intumescens marcescebat, & mortuus est. Eadem quoque alteri contigerunt. Mortuus autem est, & hic die septimo, neque epotum medicamentum quicquam profuit. Phœnici verò putredo in circulum excitata est, & vlcus ante mortem magna ex parte repurgatum fuit. Sed, & hic mortuus cum diu vitam traxisset. Hippocrates, 5. Epid. sect. 4. in codice Fœsij. Tumores autem isti vbi exulcerantur, ad caput de vlceribus pertinent.

Labiorum tumores aridi.

C A P V T II.

De Labiorum Fissuris.

**V** T I S carni in labris connexa est tanta tenuitate, & tanta subtilitate, ac teneritate, vt nisi labiis lacertis, cutem ab iis separare non possimus. Ac proinde labia cum sint tam tenera, mollia, ac subtilia, facile à causis externis, ventis, frigore, vt & internis humoribus, & vaporibus vitiantur, finduntur, & scinduntur, vt interdum etiam sanguinem fundant. Et quidem nonnullis sæpissimè finditur labium inferius in medio, vbi dux musculorum extremitates desinunt. Græci hoc vitium *ρυσίδας*, Latini fissuras, & scissuras labiorum nominant. Partis enim affectæ nomē commodè additur. Aliàs enim vocabulum hoc commune est, & non tantum labiis compedit, sed & cæti, ano, vtero. Estque morbus in soluta continuitate Labiorum.

Fissura labiorum.

Causæ.

Causa proxima est siccitas nimia, atque ita scissura labiorum est continuitas eorum soluta à nimia siccitate, & tensione.

Causæ.

Siccitatem autem hanc inducunt vel causæ externæ,

frigus videlicet & calor, & præcipuè ventorum, imprimisque Boreæ flatus; venena item, vt cantharides, ephemerum, colchicum, vt habet Nicander. Pertinet huc, & lac calidius, quod infantes fugunt. Vel internæ, vapores calidi, & ficci, falsi ac acres per œsophagum, vel asperam arteriam ex partibus inferioribus ascendentes, vel humores à capite ad labia destillantes. Vapores autem illi nunc ex Ventriculo, nunc ex intestinis, nunc ex pulmonibus, nunc ex epate, & venis, nunc ex corde ascendunt; imò & ex vtero: & solet ista ex vaporibus labiorum, præcipuè inferioris, fissura foeminis salacioribus ob vteri ficitatem esse familiaris. Vt enim Linguae valdè resiccantur ex atra fuligine & vtero, vt habet Hippocrates, 6. Epid. Sect. 5. t. 14. ita, & labia ob eandem causam propter communem tunicam. Tandem etiam infantibus labia interdum finduntur, ob mammarum, quas sugunt, duritiem.

#### *Differentia.*

*Differentia.*

Scissuræ labiorum differunt nunc ratione quantitatis, & aliæ sunt maiores, aliæ minores, aliæ plures numero, aliæ pauciores, nunc ratione subiecti, quod aliæ solum vnum, aliæ vtrumque labium occupant.

#### *Signa Diagnostica.*

*Signa.*

Affectus ipse per se oculis patet. Causæ verò signis cognoscendæ. Si externæ illæ sunt, id ex ægri relatione cognoscitur: quæ si abfuerint, causarum internarum id indicium est.

Et quidem si à vapore fissuræ accendant, sine pruritu, (neque enim vapores ita inhærent, vt humores) sine ardore, sine multa duritie sunt, neque adeò frequentes, neque profundæ. Quæ verò ex humoribus calidis est fissura, cum pruritu est, & profundior. Et si humor à Capite ad labia fluat, id etiam sensibus manifestum est.

#### *Prognostica.*

*Prognostica.*

1. Labiorum fissuræ non planè negligendæ. Nam & turpitudinem quandam pariunt, & si diu durent, in vlcera crustosa, callosa, & difficulter curabilia degenerant.
2. Rhagades à natiuitate cōtractæ non curantur: reliquæ non ita difficulter; nisi ad cancrösam materiã degenerent.

*Indica*

## Indicationes.

Siccitas nimia corrigenda est humectantibus, & labiorum soluta unitas vnienda. Causse verò, à quibus ex-  
pendent, tollendæ. Causse igitur externæ, si adhuc adsint, amouendæ. Si vitiosi humores adsint, euacuandi. Si vapores causa sint, illi quoque tollendi, & epati, vtero, vel etiam toti corpori, vnde illi profueniunt, succurrendum.

Indica-  
tiones:

## Curatio.

Si ergo à frigore externo sit fissura, solo vnguento Pomato albo labia inungere sufficit: vel paretur tale linimentum:

Curatio  
fissuræ à  
frigore:

℞. Pinguet. gallin. ʒ. ij. Cere alba, ʒ. ij. Abluantur sæpè aqua rosarum. F. Linimentum. Utile est & oleum cere, ac thuris.

Auicennas pinguedines, adipēs, ac medullas cum oleo rosaceo, & cera miscet, & adhibet. Sint tamen pinguedines recentes. Si enim sint vetustæ, ac rancidæ, atque acridinem acquisuerint, potius nocent, quàm profunt. Idem pelliculas ouorum, & arundinum applicat.

Si à causa calida, & sicca sint fissuræ, lintea tenera succo semperuini, & solani madida imponantur. Vel ℞. amyli. Sacch. penid. Canariensis. Conf. ros. an. ʒ. β. Misc. Vtilis est etiam mucilago gummi ceraforum, cum aq. ros. extracta.

à causa  
calida:

Si verò fissuræ altius penetrent, adeps anserinus, & caponis, aut medulla crurum bubulorum cum semperuino, & terebinthinâ adhibeatur.

Vel ℞. mucilag. sem. cydon. Ol. mastich. an. ʒ. j. adipis gallinæ, medulla pedum vituli, an. ʒ. β. vini albi subdulcis parum, Cum cera fiat vnguentum, vel ceratum molle. Vel ℞. Puluer. anib. rosar. q. v. Cum mucilag. tragacanth. F. linimentum. Vel ℞. Sacch. penid. mucilag. tragacanth. Aquâ rosar. extracta. q. s. Misc. Potest, & aliquid amyli addi. Vel ℞. Terebinth. butiri sine sale, an. q. v. Pulueris macis parum. Misc. Vel ℞. Olmacis destillat. ʒ. j. pulv. nuc. mosch. ʒ. β. Mell. rosar. ʒ. β. Misc.

Utilis est, & tragacantha aquâ rosar. dissolutâ, amyloque mista, & illita: vel cum cera virginea, melle, &

oleo communi fiat vnguentum. Vel *℞. Ol. rosac. 3. ℞. amygd. dulc. 3. ij. Butyri sine sale, aqua ros. loti 3. iij. terebinth. 3. ij. pingued. capon. 3. j. ℞. mellis 3. iij. succini 3. j. ceruss. 3. ij. cera alba. q. s. F. Vnguentum.*

In omni causa utile est labium introuertere, & lingua humectare, maximè si mastiche, & alia idonea medicamenta prius masticata fuerint.

De seminis hyoscyami fumo vide caput sequens in fine, vt & Aëtium, *tetrab. 2. serm. 4. cap. 18.*

~~~~~

### C A P V T I I I.

#### De Labiorum Vlceribus.

*Vlcera  
labio-  
rum.*

*Causa.*

**N**onnunquam & vlcera labia occupant crustosa, sæpè etiam manantia, quæ ortum habent ab humoribus siue tales sint naturâ sua, quales sunt biliosi, & serosi, siue ex adustione, & putredine, vel acris humoris admissione, quomodo, & humores pituitosi, & melancholici, & sanguis acres fieri possunt.

Atque talia vlcera sæpè per modum criseos in febribus tertianis, & acutis, & malignis contingunt, & febris solutionem indicant. Sæpè etiam absque crisi ab humoribus vitiosis ex reliquo corpore eò protrusis ortum habent. Sæpè quoque in morbo Gallico proueniunt. Ita & in peste nonnullis labia exulcerantur. 3. *Epid. sect. 3.* Causa etiam esse potest contritio, & contusio musculi labij. Pertinent huc & venena, vt arsenicum, & similia vrentia, quæ etiam labia exulcerant.

*S*

*igna.*

#### Signa Diagnostica.

Et quidem talia vlcera oculis obuia sunt: Causæ verò signis inuestigandæ. Si per crisin accidunt, febris adest. Si à morbo Gallico, is etiam suis signis se prodit. Si & febris, & morbi Gallici signa absunt, è latente in corpore cacochymia proueniunt.

#### Prognostica.

*Prognostica.*

1. Vlcera labiorum, quæ in febribus accidunt, plerumque bonum signum sunt, & febris vel perfectam solutionem,

lutionem, vel imminutionem significant, & per se facile sanantur, si scilicet cum signis coctionis appareant. Hippocrat. 6. Epid. sect. 8. t. 41. Alioquin si cum viribus debilibus, & aliis malis signis os, & labra exulcerentur, lethale, vt in Hermoptolemi vxore, 7. epid. sect. 15.

2. Difficiliora curatu sunt; & peiora, quæ à morbo Gallico proueniunt.

## Curatio.

Quæ in febribus fiunt vlcerà labiorum, facile per se sanantur, quæ à lue venerea ortum habent, quomodo curanda sint, è curatione morbi Gallici patet, & talium vlcera curatorum exemplum habetur apud Forestum l. 14. obseru. 2. Si sine febre, & morbo Gallico talia vlcerà oriantur, vniuersalibus præmissis tale adhibeatur vnguentum.

Curatio.

℞. Lithargyri rament. plumbi, hyoscyami albi, an. q. s. ol. rosac. ceræ, an. q. s. Misce in mortario plumbeo. Fiat Linimentum. Vel ℞. Vnguenti rosati Mesuæ, 3. j. Linimenti ex litharg. 3. s. M. Vel ℞. Rosar. rubrar. mastich. an. 3. j. plumbi vssii 3. s. F. puluis. Adde resina, terebintb. mellis, an. q. s. Fiat Linimentum.

Applicantur autem medicamenta commodissimè somni tempore. Ita enim rectius retinentur.

Ioh. Baptista Porta semina hyoscyami prunis iniicit, & fumum per infundibulum papyraceum excipere iubet. Illicò enim euanescere tumorem scribit, & glutinari fissuras numquam amplius rediversas.

## Diata.

Vitet æger cibos salios, acres, aromata, sermonem Diata. multum.

## Cancer.

Pertinet huc & cancer labiorum, cuius generatio, & Curatio. curatio è generali de Cancro doctrina patet. Paræus tamen, lib. 6. cap. 29. peculiarem curandi rationem tradit. Cancrum suis vtrinq; sursum, ac deorsum labiis acufilum ducente transigere iubet, vt fili beneficio cancrum tãquam in manu sinistra regere, & tenere liceat, totù manu

tra vossellis vnico ictu amputare possis; ita tamen, vt labri ipsius interior quædam, quæ dentes cōtingit, restet substantia (modò non ad intima vsque cancer radices agat) quæ regenerandæ mox carni, & implendæ cavitati, pro fundamento, & basi esse queat. Hinc sanguine sufficienter effuso vulneris oræ, dextra, & sinistra, interna, & externa parte, scarificatu profundiore erunt nouacula pertundendæ, vt cùm mox futura ex acu filum ducente, rostris leporinis propria in vnum nodo ducere vulneris oras ipsas, & margines voluerimus, ipsam labri carnem magis sequacem, & trahenti acui, filoque obsequentiorē habeamus. Reliquum curationis eodem plane modo prosequendum, quo in rostris leporinis.

## CAPVT IV.

*De Labiis vulneratis, Leporinis, & curtis.*

Vulnera  
labio-  
rum.

**V**ulnera labiorum ob sermonem, & locutionem, quæ partes vulneratæ coniunctæ dirimuntur, & saliuam (de qua postea in quæstione) qua humectantur, tardius curantur.

Labia si vulnerentur absque carnis amissione, suenda, si opus, vel aliàs, & diligenter coniungenda sunt, vt deformitas omnis vitetur, & medicamenta glutinantia extra imponenda. Ab interna verò parte mel rosaceum, & syrupus de rosis siccis sæpè illinendus.

Si autem carnis aliquid amissum sit, digerendo, detergendo, carne replendo, & tandem consolidando, vt aliarum partium vulnera, labiorum vulnera curantur.

## QVÆSTIO.

An salina con-  
glutinationem  
vulneri  
labiorum  
remore-

*An salina conglutinationem vulnerum labiorum remoretur?*

Plerique Practici id statuunt. Nicol. Glandorpius verò, in speculo Chirurg. obs. 17. id saltem concedit in homine male temperato, vel lue Gallica affecto, vel aliquo morbo falso laborante: in sano verò id negat, in quo potius abstergat, & mundificet vulnus saliuam.

Cui etiam libenter assentimur, cùm videamus scabiem, ferpi

serpigines, & similia mala ieiuni hominis salua sanari, & proinde eam abstergendi, & mundificandi vim habere. Hoc tamen cauendum, ne nimium vlcus salua humectetur. Quæ enim glutinari debent, non humida, sed sicca esse debent.

*Labia Leporina.*

Si autem labia ob vitiosam conformationem non cohercant, labia Leporina, nonnullis rostra leporina, German. *Hasenschart* nominatur, habentque causam plerumque imaginationem matris, quæ vel leporem, vel alium hoc malo laborantem adspexit. Aliam tamen etiam huius rei causam refert, Olaus Magnus, dum lib. 18. cap. 12. scribit, vnam infelicitatem plerumque mulieres Aquilonares vterum gerendo incurrere, vt vel esu, vel saltu super caput leporis facto, pariant infantulos oris leporini inter os, & nares diuisa labra perpetuò retinentes, nisi statim à principio assuant particulam pectoris tenerissimi pulli adhuc sanguinolenti. Verum ex opinione vulgi hoc scripum puto.

*Labia leporina.*

Præcipua verò curandi ratio à cheirurgia pendet. Perficitur autem illa 1. diffitorum, & hiantium labiorum excoriatione. 2. Labiorum iam excoriorum coniunctione, & futura, quæ vbi facta sunt, reliqua naturæ, vt in aliis vulneribus, committenda: ita tamen vt aliàs fieri solet, vt vnguents, & emplastris ad vulnera conglutinanda idoneis naturæ succurratur.

*Labia curta.*

Curta verò labia, qua ratione curanda sint, in *Instit. lib. 5. p. 1. f. 2. c. 14.* dictum, quibus tamen, vt quædam addamus. Duplex curandi curta labia ratio est; vna fucata, altera vera. Fucatam descripsit Ioh. Thom. Minadous, de *humani corporis turpitudinibus*, lib. 3. cap. 40. is dum Damasci in Syria esset, Mercatorem quendam pannorum fægorum vidit, qui labrum superius factitium habebat, quod dum domi esset, vel edere, vel bibere vellet, deponere, & domi cum turpitudine ista viuere solebat, foris autem librum factitium adaptabat hoc modo. Foramina ille carni sub naso reliquæ obducta iam dura cicatrice si-

*Labia curta curandi ratio duplex.*

bi parari curauerat, qualia nonnulli in auribus ad annulos gestandos fieri curant, quibus crebris vinculis portionem larvæ ad labri deficientis magnitudinem, & figuram conformatam adaptabat, cui ex humanæ barbæ pilis, misticem gummi tragacanthæ agglutinauerat.

Veram autem curandi curta labia rationem Galenus, lib. 14. M. M. cap. 16. & 17. tradit, & post eum Paulus Ægineta, lib. 6. cap. 26. Cornelius Celsus, lib. 7. cap. 9. Diligentius tamen eam recentiores, & imprimis Caspar Taliacotius, in libello de curtorum cheirurgia, tradiderunt. Veteres equidem non aliunde propaginem in curta inferendam petebant, sed à proximis curti partibus cute excisa & carne aucta. At Taliacotius non solum è vicinis, sed & remotis partibus propaginem petit, qui allegato loco videatur.

## C A P V T V.

*De Tremore, & Perversione labiorum, sanguinis fluxu ex iis, & labiis lividis.*

**P**Ræter enumeratos iam morbos etiam quædam symptomata labiis, & ori accidunt; labiis quidem tremor, & perversio, color eorum mutatus, & sanguinis ex iis fluxus; ori verò apertio læsa, tortura, & Ptyalismus, seu crebra sputatio; de quibus iam dicemus.

*Labio-  
rum tre-  
mor.*

Et primò quidem tremunt interdum labia: die quod accidit in ira, & metu, interdum etiam ex nervorum debilitatione, sicut Francisco Viario Veneto labium semper dum loqueretur, tremuisse scribit Alex. Benedictus, lib. 1. c. 18. Tremunt, & in nausea labium inferius, vel ex humore mordaci, vel ex oris stomachi nimia agitatione ob consensum, qui hisce partibus per communionem membranarum intercedit.

Itaque cum labium inferius tremunt, nisi ab ira, vel metu sit, vomitum plerumque præfagit, teste Galeno, 3. de Crisib. cap. 13.

Interdum etiam in cerebri aliquâ magnâ affectione labiorum



biorum tremor accidit. Ibi tenuior victus prodest; hic quæ cerebro, & occipiti alias in neruorum affectibus adhibentur, conferunt.

Tremunt interdum etiam labia in summo frigore cum dentium stridore. Item à vermibus, vt seni illis. 9. epid. cui furiosum quiddam latens inerat.

Videtur interdum etiam motus quidam quasi conuulsivus adesse vt in Cydis filio, 7. epid. sect. 7. de quo Hippocrates, sine conatu raro semiperfecta loquebatur, & os solum, & maxillas, ac labia semper in motu erant, quasi qui loqui cuperēt.

Pertinent huc & labiorum peruersio, de qua Hippocrates, 4. aph. 49. In febribus non intermittentibus si labium, aut palpebra, aut supercilium, aut oculus, aut nasus peruertatur, si non videat, si non audiat, debili iam existente corpore, quicquid horum acciderit, mors in propinquo est. Idem aphorismus habetur, 1. Prognost. 12.

Causa proxima huius symptomatis est affectio neruorum tertiæ coniugationis. Fit verò ista cerebro grauiter affecto, & propterea malum hoc in febribus continuis, & vbi ex peculiari organorum vitio accidit, viribusque iam debilibus, lethale signum est. Si verò virtus valida existat, eadem symptomata interdum sine periculo apparent, in criticis scilicet perturbationibus, per *metastasis* materiæ ad caput: Vnde & 2. Coac. habetur labium contractum alui biliosæ eruptionem significare.

Interdum & sanguis è labiis effluit, quod in scorbuticis quandoque euenit, cum humores acres, serosi, & falsi labia erodunt, & naturam ad excretionem stimulant. Idem interdum in fissuris labiorum accidit.

Tandem etiam labiorum color mutatur, & liuida plerumque fiunt, quod accidit in elephantiasi, morbo Gallico, qui color curato illo morbo cessat. Interdum etiam in febribus continuis fiunt labra liuida; quod signum lethale est, 2. Coac. & caloris natiui extinctionem significat.

*Labiorum peruersio.*

*Causa.*

*Fluxus sanguinis è labiis.*

*Labia liuida.*

\*\*\*

## CAPUT VI.

## De Oris apertione lasa.

Oris a-  
pertio la-  
sa.

**A**Tque hi sunt morbi, & symptomata, quæ labiis so-  
lis accidunt. Sunt verò & alia quædam vitia, quæ iis  
quidem etiam contingunt, non tamen soliis, sed simul af-  
fectis vicinis partibus, imprimis musculis maxillarum, &  
faciei. Qualia sunt oris apertio, vel ablata, vel imminuta,  
oscitatio, oris tortura, ptyalismus: quæ propterea etiam  
subiungemus.

Causæ.

Et primò quidem oris clausuram seu apertionem dene-  
gatam quod attinet, aperire homines os nequeunt ob di-  
stentionem ceruicis ex vulnere neruorum, quia maxilla  
veluti ossa rigescunt. Hippocrates, *lib. de diebus indicato-  
riis*. Ita Phoenici apud Hippocratem, *lib. 4. epid.* postero-  
rum colli vertebrarum contentio aderat, ac circum den-  
tes durities, quos distentus diducere conabatur. De eo-  
dem 7. *epid.* inquit: Quod si caput commouere, aut den-  
tes aperire conaretur, non poterat, vtpote admodum di-  
stentus.

2. Quando oris cardo, in quo gena vertitur, obriges-  
cit, atque os strictius conniuet, quò minus in rictu queat  
expandi, squalido terrenoque humore in iuncturam illam,  
& huius vincula altius imbibito. Id quod scorbuticis inter-  
dum accidit, *vt de scorbuto, cap. 5. dictum.*

3. Propter maxillam inferiorem adnatam capiti. Id  
quod rarius est, quod tamen Columbus, *cap. 15. de re anat.*  
refert, dum scribit, in summi Pontificis peni esse caput  
gigantis, in quo maxilla inferior capiti adeò adnata, &  
coniuncta est, vt omni motu prorsus careat, atque in vi-  
uente eo carere non potuerit.

4. Propter tumores circa iuncturam maxillarum: id  
quod sæpè in inflammationibus maxillæ, & tonsillarum  
accidit, ob quas os diduci non potest.

Signa, &  
curatio.

Signa causarum, vt & curatio patet ex signis, & curatio-  
ne morborum modò enumeratorum, ob quos os aperiri  
non potest.

Contra interdum os nimium hiat. Id quod sæpè fit in febribus ardentibus, ob vapores calidissimos ex inferioribus adscendentes. Idem fit ob luxationem maxillæ inferioris, de qua postea dicitur. In lethargo etiam ob læsam memoriam os claudere ægri obliuiscuntur. Si nares etiam obstructæ sunt, os apertum ægri seruant, quò copiosorem aërem attrahant. Idem fit in tumoribus faucium internis & angina. Nonnulli & ex mala consuetudine os hians perpetuò seruant.

Affectus autem iste per se patet. Causæ verò è signis, quæ è suis locis petenda, cognoscuntur.

Prognostica etiam inde petenda. In febribus autem acutis faucium sine tumore dolores, & pusilli, & strangulantes, & cùm os hiat, nec promptè adduci, & claudi potest, mentis amotionem portendi oportet. i. *Prorb. II.*

Curatio pendet à causarum, à quibus hoc vitium provenit, remotione.

## CAPUT VII.

## De Oscitatione.

**E**cularis verò oris præter naturam apertionis species est oscitatio, Gellio *lib. 4. cap. 20.* oscedo. Est autem oscitatio vehemens oris diductio ab halituosis vaporibus in spatiis musculorum maxillæ inferioris, & buccarum collectis, vel infra ascendentibus, & copiâ potius, quàm acrimonia naturam ad excretionem stimulantibus, operantibus simul, & concurrentibus musculis thoracis, vnde pandiculationes sæpius comites. Hinc & Hippocrat. *de Priscin. Medicin.* scribit, si pransi fuerint, quibus prandere non conducit, illi continuò graues totòque corpore, & mente segnes euadunt, cum oscitatione, somnolentia, multaque siti. Cùm autem per istam vehementem diductionem auris meatus nonnihil comprimatur, vt aërem non satis admittat, hinc oscitantes minus distinctè audiunt: quamuis forsan, & propter neruorum compressionem id fieri possit. Videtur tamen adhuc aliud esse oscitationis

tionis modus, cum nimirum aperto, admodumque diducto ore aer primò affatim hauritur, rursùmque efflatur cum sono quodam, de quo Hippocràtes in libro de flatibus, scribit, quod oscitationes febres prædicant, cum magna copia coaceruatus aer fuerit, confertimque ad superiora rumpens, tanquam machinatione aliqua os diducit, quò hac ei facilius exitus pateat. Accidit interdum etiam oscitatio ab imaginatione, si quis alios oscitantes videat. Facilius tamen id accidit pigris, & quibus vapores aliqui in musculis illis hærent, quàm aliis. Oscitatio etiam crebra est in lethargo, ita ut os claudere ægri obliuiscantur.

*Signa Diagnostica.*

*Signa.* Affectus ipse per se patet, & causæ eius quoque facile innotescunt.

*Prognostica.*

*Prognostica.*

1. Oscitatio si citra occasionem sit frequentior, præfigit morbos, & febrium incipientium præludium est. Citra verò morbos pigritiæ signum est, vel ex imaginatione proficiscitur. Vnde puniebatur olim, si quis in iudicio clarè nimium, & sonore oscitaret, tanquam illud indicium vagi animi foret, & allucinantis; ac fluxæ, atque apertæ securitatis. Gellius lib. 4. Noct. Attic. cap. ult.

2. Ex nimia oscitatione maxilla inferior luxari potest.

3. Oscitatio in nixu lethale est, sicut sternuisse à coitu abortiuum. Gellius, lib. 3. Noct. Attic. cap. 16.

*Curatio.*

*Curatio.* Itaque cum oscitatio nihil noceat, nisi forsan ex nimia oris diductione luxatio maxillæ accadat, sed potius iuuat, ipsa per se nullam curationem requirit, sed potius ut morbo, quem præfigit, occurratur, admonet. Quia tamen ex nimia oscitatione, & oris diductione maxilla inferior luxari potest, reprimenda est nimia oris diductio, quæ aliàs etiam inciuilis habetur. Idque fit, si vinum cum pari portione aquæ exhibeatur, quod materiam importunè euaporantem discutit, modò corpus sit purum, & sine febre, ut est apud Hippocr. 5. aph. 56. & 3. epid. sect. 7. Assiduorum etiam oscitationum longam spirationem medellam esse scribit Hippocr. 6. Epid. sect. 2. aph. 9. Auicennas etiam masticationem acori commendat.

## CAPVT VIII.

## De Oris Distortione.

**C**ynicus spasmus Græcis à distortionis figura, quæ ri- *Oris di-*  
 etum iratorum canum exprimit, appellationem ha- *stortio.*  
 bet Celso, *lib. 4. cap. 2.* Oris distortio, vulgò Tortura  
 oris dicitur, & quidem rectius. Neque enim semper à  
 spasmō est ista oris distortio. Interdum & risus Sardoni-  
 nominatur, ab herba Sardoā, quæ est species Ranunculi  
 in Sardinia proueniens, & Apium risus dicitur, quæ ves-  
 centibus ora similiter rictu diducit, vt ridentium facie  
 intereant.

Causas istius affectionis Aëtius in Paralyfin musculo- *Causæ.*  
 rum *μωσθηρίων* siue mandibularum refert, & Galenus 4. *de*  
*loc. affect. cap. 2.* à Paralysi neruorum, & musculorum fa-  
 ciei hoc malum existere affirmat. In 3. *de loc. affect. c. 6.* e-  
 tiam conuulsionis meminit, dum labra sæpenumero con-  
 nelli scribit, item oculos, frontis cutem, totas mandibu-  
 las, & linguæ radicem, quod in Tortura oris etiam acci-  
 dere solet.

Itaque Spasmus Cynicus, vel potius oris Tortura, est  
 deprauata oris & faciei figura, orta, vel à conuulsione,  
 vel à resolutione musculorum faciei, vnde in obliquum  
 distorquetur os, nasus, vel oculus; & in summa dimidia  
 plerumque faciei pars afficitur in hoc malo, vel dextra, vel  
 sinistra, aliquibus verò omnibus sui partibus. Etsi verò  
 aliquando tota facies distorta apparet: dicitur tamen oris  
 distortio, quoniam manifestius deprauatio, illa figuræ in  
 ea faciei parte deprehenditur, quæ labiorum ambitu est  
 circumscripta. Si tamen accuratè rem æstimare velimus,  
 distinguendum esse videtur inter oris torturam, & spas-  
 mum Cynicum. Hinc Platerus oris torturam appellat,  
 quando oris parte deorsum tendente, vel sursum tractâ os  
 obliquum, & intortum, vt in plorantibus apparere solet,  
 redditur, siue id fiat ex paralyfi, siue conuulsione. Quod  
 si verò in utroque latere labia cum buccis simul contra-

hantur, tum os transuersum diductum veluti in ridentibus hominibus, vel in canibus, cum irati ringuntur, & hiant, conspici, idque spasmodum Cynicum vocari scribit, Petrus Salius Diuersus, in *Annotationibus in Altimarum* c. 15. inter Torturam oris, & Spasmodum Cynicum etiam differentiam facit, Torturamque oris generalius accipi statuit pro omni figuræ oris deprauatione, eamque à duplici causa prouenire, quarum altera est Paralysis, altera conuulsio. Spasmodum verò Cynicum, ut ipsa vox, si propriè sumatur, indicat, solum ex conuulsione fieri statuit.

Verum si has duas sententias coniungamus, differentia inter torturam oris, & Spasmodum Cynicum rectè constitui potest. Tortura oris est vel à paralyfi, vel à conuulsione. Conuulsio vel vnum tantum latus occupat, vel vtrumque. Si vnum tantum, conuulsio oris simpliciter, vel etiam nomine generis Tortura oris appellatur. Si vtrumque propriè Spasmodus Cynicus dicitur. Hæc enim conuulsio exactè irati canis rictum exprimit. Non verò quæuis conuulsio oris rictum iratorum canum exprimit. Vnde etiam vocatur risus Sardonicus. At ridentes non vnum tantum latus diducunt, sed vtrumque. Quæ verò à paralyfi prouenit oris Tortura; Spasmodus Cynicus appellari non potest, cum Paralysis non possit esse conuulsio.

Vtius tamen obtinuit, ut vocabulum spasmi non semper hic propriè accipiatur, sed sæpè oris Tortura, & spasmodus Cynicus confundatur.

Quia verò musculi faciei, qui maxillas inferiores, pinnas narium, & labia, ac buccas mouent, nervos maxima ex parte à tertia coniugatione cerebri accipiant; musculosa verò latitudo illa, siue *μυῶδες πλάσμα*, cuius Galenus, 4. de loc. aff. c. 2. in fine, mentionem facit, quodque mandibulas, & narium pinnas, & buccam vtramque mouet, non à tertia coniugatione cerebri, sed à primis cervicalibus vertebra nervos accipiat, & nonnullos etiam à quinta coniugatione cerebri: fons huius mali præcipuè quærendus est, vel in nervis à tertia coniugatione, vel in musculosa illa latitudine.

Causæ verò remotæ Torturæ oris eadem sunt, quæ Paralyseos, & conuulsionis, cum ab alterutra hæc affectio oriri possit.

*Tortura oris causæ remota.*

Auicennæ tamen frequentius fit à conuulsione. Quando igitur Tortura oris à conuulsione existit, musculis faciei versus sua principia contractis, tunc pars sana ad læsam siue conuulsam trahitur, & latus, in quo distortio cernitur, locus affectus est, & muscoli dextræ partis conuulsi versus sua principia trahuntur, ac sinistræ partis musculos sanos ad se trahunt, affectioque dextram ipsam partem occupat.

In Tortura verò oris ex Paralyfi, pars faciei distorta est sana; quoniam muscoli sani actione sua fungentes trahunt, resolutas partes ad se.

Quod tamen *lib. 1. part. 2. cap. 28.* monuimus, Paralyfin & conuulsionem interdum iungi, vt per vices, & alternatim affligant, ita vt pars modò conuellatur, modò resoluitur: id etiam hîc quâdoque accidere potest. Cuius generis affectus videtur fuisse, quem describit Anton. Beniuuenius, *de abditis morbor. causis, & curat. cap. 101.* Cum enim imperitus quidam Medicus cuidam mulierculæ è gena dextra tuberculum furunculo simile scalpello abscidisset, non habita ratione neruorum, ac venularum, illicò subsecuta est inflammatio, & dolor; quo mulier in *κυνὸν σπασμὸν* incidit, quo temerario motu peruertebatur, os, & facies modò in dexteriolem, modò in sinisteriolem partem. Cum enim facies modò in dextram, modò in sinistram partem distorqueretur, videtur fuisse mixtus affectus ex paralyfi, & conuulsione, vt scilicet alternatim os modò conuelleretur, modò resolveretur.

*Paralyfis & conuulsio iunguntur interdum.*

Resolutio neruorum: & inde secuta oris peruersio videatur apud Hippocrat. 2. *Epid. sect. 2. propè finem.*

*Resolutio neruorum.*

Præter Paralyfin tamen, & conuulsionem alia adhuc videtur dari causâ oris torturæ, cuius mentio fit ab Hippocrate *lib. de articulis*, malè scilicet curata maxillæ fractura. Si rectè quidem, inquit, coaptata fuerit, & vt debet quiesuerit maxilla, breuî conualefcet, ac dentes integri manent. Sin secus longiore quidem tempore curatio accidit, eâque di-

*Maxillæ fracturæ oris torturæ causâ.*

*storta, & dentes laduntur, ac inutiles existunt.*

*Signa Diagnostica.*

*Signa.* Tortura oris visui patet, quando os ægri ad alterum latus distorquetur, ut labiorum concinnus contactus, aut aliarum partium in facie consensus pereat. Præterea oculus alter ritè claudi nequit. Ac denique æger exsufflare, vel exspuere iussus, ex altero tantum oris latere id præstare potest, & sponte etiam salivæ oris profluit. Nonnunquam fit tortura oris non apparentibus in facie signis, neque spasmi, neque Paralysis. Atque tunc ægrum iubebis ridere, aut pronunciare O, literam. Hic animadvertetur, alteram oris partem liberè moveri non posse.

Quod ad causarum signa attinet, si malum hoc à convulsione existit, pars affecta dura, & tensa trahit sanam, & plerumque dolor partis adest. Si verò hoc malum à resolutione oriatur, pars affecta laxa, & mollis trahitur ad sanam, & sensus in parte affecta obtusus est, & palpebra oculi inferior ea parte decedit.

Traditur, & hoc signum ex convulsione malum esse, si pars distorta ad naturalem situm, & figuram restituatur per extensionem manibus factam; ex resolutione verò, si per retractionem.

In Paralyfi etiam facies est extensa sine rugis, & inclinatio faciei continua est ad inferiora: in convulsione rugosa est cutis in parte una, & extensio eius in parte altera. Paucitas sputi & salivæ est, præcesseruntque, vel adsunt causæ convulsionis.

Cæterum si causa Torturæ oris hæreat in musculo faciei, vitiosa figura solum partem faciei, quæ ab illo musculo regitur occupabit.

Sin in nervo, & quidem secundum eius principium, ita ut cerebrum altero latere sit affectum, dimidium etiam cum faciei, tum totius corporis simul afficietur.

Si secundum progressum, & noxa sit in tertio pari nervorum cerebri, vitiosa figura occupabit dimidium faciei secundum omnes partes.

Vbi scilicet ramus aliquis maior afficitur. Aliàs enim tortura tantum aliquas partes occupat. Si etiam tertia coniu



coniugatio afficiatur; magis laborat oculus: quia tertia coniugatio aliqua sui parte cum motoris nervis oculorum per eadem foramina prominet.

Si qui in quinto pari, levis erit noxa buccarum: quæ deniq; insignis erit, si in primis ceruicis vertebra, illarumq; nervis: causa mali sedem habebit, & minus tum laborabit oculus, nisi simul musculus temporalis affectus sit, in quem quinta coniugatio ramulum mittit. Tunc etenim per consensum laborat simul oculus: quia iuxta Columbum in quibusdam etiam secunda coniugatio, quæ oculos mouet, eò ramulum quendam mittit, vnde consensus musculi temporalis & oculi. Minimè laborat oculus, si nervi ceruicis afficiantur.

#### Prognostica.

1. Tortura oris superueniens spasmodum aut Paralyfin re- *Prognostica.*  
liqui corporis, Apoplexiam vel Epilepsiam portendit.

2. Si Tortura oris fortis aduenit per spasmodum præcipuè, inter quatuor dies interficit, materia in cerebrum translata. Valefcus de Taranta tamè vidit morientem die duodecimo.

3. Tortura oris, quæ ultra sex menses producit, aut nunquam, aut difficulter curatur, teste Auicenna.

4. Quæ per Spasmodum fit Tortura oris in febribus ardentibus, perniciofa phrenitide & morbis aliis acutis, lethalis est, teste Rhase.

5. In febre non intermittente, si labrum, aut supercilia, aut oculus, aut nasus peruertatur, imbecillo iam corpore, in propinquo mors est, 4. aph. 47.

6. Oris peruerfiones, quæ nulli corporis parti consentiunt, celeriter aut sua sponte, aut ex necessitate sedantur. Hippocrates, lib. 2. prædict.

#### Curatio.

Sicut Tortura oris aut à Spasmo est, aut à Paralyfi: ita *Curatio.*  
etiam curationem requirit diuersam. Ab vtra enim dispositione malum ortum habeat, ante omnia videndum est. Quod si ergo sanguinis copia adsit, vena secetur primum cubiti, si sanguis in toto abundet, postea & quæ sub lingua Aut cucurbitulæ cum scarificatione primis vertebra, vel quod tutius est, scapulis affigantur. Nam sæpius appositæ

cervi tremores corporis afferunt, teste Auicenna, 1. *Canon. fen. 4. cap. 21. de ventosis.*

Auicennas, Paulus Aëtius, ligaturam probant, qua tanquam capistro facies ad figuram naturalem reducatur; quod in tortura oris ex Paralyfi locum habet.

Alij tamen etiam vtuntur ligaturis in conuulsione, ita vt primò tendatur cutis frontis ad inferiora, deinde ligetur cum fascia; donec tortura cessauerit omnino.

Probantur & frictiones extremorum ad diuertendum, factæ manu sicca, vel intincta in aqua lauendulæ. In inueterato hoc malo, si alia non profint, Auicennas cauterium applicat supra venam, quæ ponè autem est lateris affecti; quod & in ceruice fieri potest.

Non tamen vbi conuulsio est in nervis ceruicis. Ita enim augeretur malum. Nisi fortè applicetur inter primam & secundam vertebra. Nerui enim, qui in faciem distribuuntur, à tertia, quarta, & quinta vertebra originem habent.

Alij Sinapismo, & Phoenigmo, vel Dropace contenti sunt.

Medicamenta quod attinet, Auicennas vetat pergere ad fortia purgantia, vel digerentia ante quartum, vel septimum diem, propter cruditatem materiæ, nisi merus sit ab imminente Epilepsia, vel Apoplexia.

Post vniuersalem euacuationem profunt 1. Errhina, 2. Apophlegmatismi, & Gargarismi, & si sint masticatoria, masticatio magis fiat in parte affecta. A principio autem & ante Errhina Gargarismis Auicennas non vtitur, ne materia partis affectæ in faciem trahatur.

Idem crebro masticare iubet calamum aromaticum, nucem moschatam, & pyrethrum. Et de nuce moschata in ore tenenda Rhases quoque præcipit. Alij & castoreum sub lingua tenere iubent: quæ omnia vim habent materiam resoluendi. Nux moschata etiam nervos, & cerebrum roborandi: ideo etiam nux mosch. cum spec. diapliris exhiberi potest.

Vel fiat Gargarismus ex ruta, lauendula, saluia, primula veris, & locus affectus inungatur vnguento Martiato.

Fiant inunctiones partis affectæ cum oleo lumbricor. de castoreo, terebinth. & aliis, quæ paralyfi, & spasmo conueniunt.

Vapores etiam è fomentis conuenientibus in faciem recipiantur. Vel etiam capitis inunctiones, lotiones caput exsiccantes fiant in tortura oris ex Paralyfi. Ex gr.

℥. Lixiuum è cineribus vitis, in eo bulliant stæcas Arabica, salvia, fol. lauri, ruta, salvia, &c. Vel applicetur hoc cataplasma Bertrucij. ℥. Radic. raphani contusas, & addito oleo laurino, rutaceo, de lateribus, & modico aceti, ac fursuris s.g. F. Cataplasma.

Auicennas ex Indorum Medicorum sententia commendat carnes animalium siluestrium, vt leporis, vulpis, cerui, hirci siluestris, asini siluestris, quas elixatas parti affectæ, & capiti applicat.

Possunt & interna medicamenta, quæ ad Paralyfin, & conulsionem descripta sunt, *supra libro primo*, exhiberi, inter quas sunt aquæ duæ à Langio, lib. 3. epist. 1. pag. 864. 865. descriptæ.

#### Dieta.

Dieta sit qualis in paralyfi, & spasmo. Auicennas, & Rhazes ægrum iubent poni in loco obscuro, ne humores lucis præsentia agitati & fusi, ad nervos concurrant: Et solent ipsi ægri lucem & conspectum hominum fugere, vt deformitatem oris ab aliis tegant. Auicennas etiam vult ægrum assiduè intueri in speculum ex chalybe factum, vt animaduersa oris deformitate faciem totis viribus in pristinam naturalem figuram perducere nitatur. Valescus de Taranta tibiam inflare iubet.

Dieta.

#### Q V A E S T I O.

An Spasmus Cynicus sit morbus, vel symptoma?

Morbum esse negat Ant. Donat. ab alto mari, de medend. hum. corp. mal. cap. 15. Etsi enim ad eam sequatur morbus, figura scilicet vitiata: tamen ipsum spasmus non esse morbum, sed symptoma facultatis motricis læsæ, ad quam sequatur morbus figuræ.

Spasmus Cynicus an sit morbus, vel symptoma?

Verum potius de nomine, quam de re lis est. Spasmus enim

enim Cynicus si consideratur ut altera torturæ oris differentia seu species, omninò morbus, vitiosa scilicet figura: si verò consideratur ut causa huius morbi, & motus vitiatum, seu convulsio, symptoma est.

~~~~~

## C A P V T I X.

*De Ptyalismò, seu crebra sputatione, & salivæ defectu.*

**Ptyalis-** **P**tyalismus, & πτυελισμός Hippocrati & Galeno, est **mus.** immoderata, & frequens salivæ exsputio. Est enim inter excrementa corporis nostri etiam id, quod Græci σάλιον, & σίελον, & πτύεalon & πτύεμα etiam nominant, Latini salivam, & sputum: Vnde σαλόχοι Hippocrati dicuntur, 2. Epid. qui multam salivam ore effundunt.

**Diffe-**  
**rentia**  
**salivæ,**  
**& sputi.**

Distingunt nonnulli inter σάλιον, & πτύεμα, seu salivam & sputum, & σίεalon, seu salivam appellant saltem id oris excrementum, quod sine tussi, & excreatione reiicitur. Sputum verò quod cum excreatione ex thorace plerumque reiicitur, seu ut Etymologicum Græcum habet; πτύεμα est, quod πτυεαίρειν, exspuitur: σίεalon verò, quod ἀντιμέτω, fluit, ut ita affectio, de qua agimus, potius salivatio, quàm crebra sputatio dicenda esset. Verùm quia salivæ propriè dictæ sæpè sputum ita in specie etiam dictum permiscetur id, quod ore reiicitur, ab auctoribus & sputi, & salivæ nomine appellatur: Vnde etiam Auctores voces has non semper distinguunt.

Quid autem saliva sit, notissimum est, quomodo autem generetur, & qui eius sit usus, explicandum est. Salivam equidem excrementum esse, & ex ore tanquam inutile reiici, extra dubium est, & quidem aquea ista humiditas, qua lingua irroratur, & mandentibus præsto est, natura sua ἀποιος est, neque sapore, neque colore, neque visciditate excedit, quantitate etiam moderata est.

Cæterùm cum omne excrementum coctionem aliquam præsupponat, materiam quidem huic excremento suppeditat partim coctio prima, quæ fit in ventriculo, partim  
tertia,

tertia, quæ fit in cerebro: elaboratur verò in glandulis linguæ utrimque assistentibus, quas tonsillas vocant: unde Galenus, in com. in 1. prorrhæti. ἀδνας σιαλόχους nominat.) Vbi substantiæ modum, ac naturam suam, & nomen etiam accipit, consentientibus tamen, & concurrentibus etiam linguæ, & partium in ore calore. Etsi verò ex ore, & alia excrementa pituitosa reiiiciuntur, & sæpè saliuæ permisceantur: tamen saliuæ propriè tantum illud est, quod in tonsillis gignitur. Quod verò à thorace eiicitur, πτύσμα, seu sputum est, sicut quod à cerebro defluit, μύξα & βλέννα, seu mucus appellatur.

Quamquam verò saliuæ excrementum est: natura tamen id etiam ad certos vsus destinavit. Primò enim ad cibi in ore masticationem, & ad primæ coctionis præparationem utilis est, quæ commodè non perficeretur, si os saliuæ destitueretur, sicuti in febribus sæpè apparet, cum os siccum est, neque cibus saliuæ conspergitur. Imò in ipso ventriculo coctio difficilior fieret, si absque saliuæ esset, si is panem & reliquos cibos aridos ab ore acciperet. Deinde locutio perfici non posset, si lingua ac labra saliuâ non conspergerentur, quod quilibet, si lingua & labiâ saliuæ destituuntur, experitur. Tertiò etiam ad gustatum conducit saliuæ, & saporum quasi vehiculum est, & si lingua saliuâ destituatur, nullum vel obscurum admodum saporem percipit.

Verùm hæc omnia præstat saliuæ, si naturalem qualitatem, saporem, colorem, quantitatem obtineat. Sæpè verò à naturali constitutione deflectit, & pro insipida fit salsa, vel amara, vel dulcis, vel acida; color pro albo croceus; pro aquea, & crassa & spumea, & tandem pro moderata in copia, copiosa, ut opus sit, hoc excrementum continuò ore reici, quod Græcis πτυελισμός, Latinis, crebra sputatio, vel saliuatio appellatur. Est videlicet Ptyalismus crebra & inuoluntaria sine tussi & sreatu expuitio à nimia saliuæ copiâ proueniens.

Etsi enim etiam ex mala consuetudine quasi nonnulli hanc expuitionem familiarem sibi reddant, dura inter loquendum & perorandum toties, quoties sententiam ab-

soluerunt, exspuunt; & ex medicamentorum sputum prouocantium usu, etiam hoc prouenire possit: tamen de ea hic non est sermo, sed de præter naturali, cum obiectum præter naturam, seu saliuæ copiosior ad exspuendum inuitat.

*Causæ.*

*Causæ.*

Fit autem saliuæ, seu sputum copiosius, dum pituitosus humor à capite ad os & fauces defluens saliuæ se commiscet, cùmque auget, atque tunc Ptyalismus, & catarrhi eadem generatio & causæ est, & solet Ptyalismus, ut catarrhus, nonnunquam Epidemius esse, id quod An. 1565. accidisse refert Forestus, *lib. 14. obseru. 13.*

Eadem de causâ cum columellæ luxatione plerumque sputatio multa coniuncta est. Accidit eadem etiam in inflammatione & vlcerebus oris.

Deinde dum ex ventriculo humidior & pituita abundante ea sursum in os exsudat & exsurgit, sputoque se miscet, quod manè, seu ieiuno ventriculo accidere solet, idque sæpè post morbos chronicos accidit, ventriculo debilitato & non rectè concoquente. Neque tamen semper primariò è ventriculo aquosa illa pituita in os confluit, sed nonnunquam ex intestinis, ut in vermibus accidit, nonnunquam ex liene, vnde lienosi & scorbutici sputatores & saliuatores sunt, de qua re in *Tr. de scorbut. cap. 5. No. 38.* dictum.

In pectoris quoque & pulmonis affectibus excrementa illic congesta si in os propellantur, sputum augere solent. Tandem etiam ex hydrargyri inunctione molesta & continuæ sputi ex ore reiectio & saliuatio excitari potest. Interdum etiam infantibus saliuatio ob humores viciosos in vtero cumulosos familiaris est. De quo Hollerius, *com. ad aph. 29. sect. 3.* Nostri, inquit, pueris raro accidunt aphthæ, quia Gallicanarum matrum & nutricum frigidus est lac & humidius: sed aphtharum loco pustulans habent & vlcera serpentia per totam faciem, per caput, post aures, & multam præterea saluationem.

*Signa Diagnostica.*

*Signa.*

Malum per se notum est, & qui hoc laborant, coguntur sine tussi, & exscreatione ob saliuam copiosius ad labia fluentem

fluentem exspuere. Quanam verò copiosæ salivæ causa sit, ex morbis qui præcesserunt, vel præsentis sunt, cognoscitur.

Post cibum si copiosa saliva excernatur, indicat ventriculus malè affici, vel ob propriam illius imbecillitatem, vel ob ciborum qualitatem, aut quantitatem. Indicat enim cibum corrumpi. Atque hæc salivæ exspuitio à Gale-  
no, 4. de loc. aff. c. 10. è Diocle inter affectionis Hypochondriacæ symptomata recensetur. De sputatione, quæ etiam scorbuticis familiaris est, videatur tract. de scorbuto, cap. 5. num. 38.

#### Prognostica.

1. Malum, prout morbus, à quo saliva copiosa provenit, se habet, nunc gravius, nunc levius est, & facilius, vel difficilius curatur. Prognostica.

2. Ptyalismus interdum à magnis morbis præservat, imò magnos morbos tollit, & acuta febre laborantes tandem Ptyalismo, & copiosa salivæ reiectione sanatos fuisse observatum est, cuius rei historiam habet Forestus, lib. 14. obs. 24.

#### Curatio.

Et si Ptyalismus à salivæ copia proveniat, & proinde ipsa absumenda, & quæ resiccare, & partes illas salivam suppeditantes, tonsillas puta, roborare possunt, exhibenda sint: tamen cum causæ sint plures, à quibus copiosa saliva provenit, ut scopo huic rectius satisfacere possimus, istæ prius tollendæ sunt. Curatio.

Itaque si à catarrho à capite labente, & salivam augentem est Ptyalismus, curatio ad catarrhum dirigenda. Si à ventriculi vitio suppeditatur, tum generatio pituitæ ventriculi impedienda, genitaque expurganda, & ventriculus exsiccandus; quam ad rem imprimis aloë, & hiera picra, & aloëticorum medicamentorum usus facit. Utile est & thus ac mastiche, cum vino sumpta, & sinapi cibus admixta. Item diagalanga, diatrion pipereon. Utiles etiam est vomitus. Ager famem toleret.

Si Lienis vitio proveniat saliva copiosior, illi succurrendum. Eodem modo & pulmonum affectus, si salivam au-  
geant,

geant, curandi. Si ab hydrargyri inunctione proueniat Ptyalismus, illi succurrendum, vt de curatione luis Venereæ dicetur: Et exemplum talis Ptyalismi curati habet Forestus, lib. 14. obseru. 24.

Quibus pro varietate caussarum expeditis, & præmissis, tandem & ad os madidum exsicccandum, & tonsillas roborandas veniendum: decocta nimirum paranda ex fol. myrti, plantaginis, rosæ rubris, saluia, nucibus cupressi, balauistiis, acacia, hypocistide, mastiche, ligno aloës, alumine: quæ decocta in ore solùm sunt detinenda, non verò gargarismi modò vsurpanda, ne plus pituitæ ad os atrahatur. Potest & spongiæ particula in ore detineri, quæ copiosiore saliuam imbibat. Si tamen critica sit euacuatio, fluxus ille impediendus non est.

*Salivæ defectus.*

*Salivæ defectus.* Causa est materiæ defectus. Deficit autem materia, quia vel non generatur, vel generata absumitur. Non generatur ob siccitatem cerebri, ventriculi, linguæ & tonsillarum. Generata absumitur in febribus ardentibus, vt Pherecidæ, 7. Epid. oris inflammationibus, vigiliis, nimis exercitiis, siti, longis sermonibus, à cibis calidis, & exsiccantibus, fumis metallicis, & similibus.


*Signa.* *Signa Diagnostica* hic affectus non requirit, sed per se patet. *Signa* etiam caussarum è præcedentibus, & præsentibus, & iis, quæ de linguæ siccitate, lib. 1. part. 3. sect. 5. c. 1. dicta sunt, manifesta sunt.

*Prognostica.* *Prognostica* etiam inde petenda, & desumenda sunt.

*Curatio.* *Curatio* vt rectè fiat, causæ à quibus pendent tollendæ sunt, & exsiccationi humectantibus resistendum. Quod fit remediis, quæ ibidem habentur.

*Lingua vitia.* *Lingua* ipsa etiam ore continetur, verùm quæ de eius morbis & symptomatibus dici possunt, supra lib. 1. part. 3. sect. 5. proposita sunt.





## De Dentium affectibus.

## CAPVT X.

## De Dentium morbis.

**D**entes soli ex ossibus quadam sui parte extra φάρυγιν, seu alueolos suos prominent, vt masticationi ciborum, quod ipsorum, munus est, inferuiant. Secundariò verò sermoni & pronuntiationi verborum suam operam præstant. Idèd & in masticatione atteruntur, attriti verò incrementum denuò accipiunt, & cùm toti exciderint in infantia, nonnunquam & aliis ætatibus, septenariis potissimum annorum, noui gignuntur, ita vt quibusdam septuagesimo, octuagesimo anno dentes renatos fuisse compertum sit. Præses enim est vsque ad mortè in maxillis vis πλάστικη, seu formatrix dentium, quæ ipsos producere potest ex idonea materia, peculiaribus in maxilla finibus recepta, quæ in osseam quandam duritiem excrescit. In ipsis etiam dentibus parte internâ semper aliquid humidæ molitiei inest, qua nutriuntur, & fluxionibus opportuni sunt. Eius rei exemplum occurrit nuper Reichenbachij, in Silesia. Scripsit enim ad me Dn. D. Georgius Titschardus viuere ibi honestam matronam ferè septagenariam, viduam, quæ ante quadriennium, postquam scilicet climactericum magnum 63. annum superasset, omnibus dentibus ab ortu primo amissis, coepit dolere caput & gingiuas tam atrociter, vt moritura putaretur, & præ doloris immanitate insaniam metueret, eousque, donec elapsis aliquot diebus dentes, perinde vt in ætate infantili fieri consuevit, primores protruderet, ac tum dolores mitigari, meliusque habere & viuere coeperit. Numerati autem sunt 20. Verùm iam olim etiam talia accidisse, patet ex Aristotele, de histor. animal. l. 2. c. 4. Plin. lib. 11. c. 17. Cardano, de rer. variet. lib. 8. c. 43. Alexandro Benedicto, de curandis morb. lib. 6. cap. 1.

Dentes verò considerantur quatenus vel gignuntur, vel geniti sunt. Etsi dentes in ipso vtero materno fomentur, vt  
in

in dissectionibus abortuum sæpè obseruatum : tamen sapientissimus rerum Creator extra alueolos eos statim eminare noluit , ne papilla matris iis læderetur , sed gingiuis obducti latent vique ad quintum vel sextum mensem , vel etiam vltra , ac tùm in infantibus cum dolore plerumque erumpunt : dum geniti sunt , variis morbis & symptomatibus affici possunt.

Morbos dentium quod attinet , Primò magnitudo perit, siue à violentia externa, siue à defectu alimenti , dum corroduntur & perforantur : Deinde interdum longiores, quàm par est, fiunt. Sæpe mobiles fiunt, & vacillant; interdum excidunt & deficiunt. Contrà sæpè plures numero sunt, quàm par est. Nonnunquam situs & ordo eorum non rectè se habet : Interdum tophis obducuntur , de quibus iam ordine dicemus.

*De Dentium Corrosione & Crie.*

*Dentium  
corrosio  
& caries,*

Primò sæpè dentes corrumpuntur & corroduntur ab acribus humoris ad ipsos defluëtibus: à quibus etiam plerumq; dolor excitatur; vnde post frequentem dentiũ dolo-rem tandem eorũ corrosio & caries sequitur, ita vt frangatur & frustillatim excidat. Faciunt tamè etiam ad dentiũ corrosione, aut certè eam augent cibi , vt Hippocrates, *lib. de Affectionib.* docet, præsertim si dètes iam antea caui sint, vt cibi in iis retineantur. Imprimis hoc præstant dulcia, & præcipuè saccharum , vnde qui saccharũ sæpè gustant, plerumque corruptos dentes habent. Corrumpunt etiam dentes nimium calida assumta. Vnde vulgatus versiculus :

*Pultes feruentes faciunt corrumpere dentes.*

Frigida contra idem præstant, & præsertim post nimis calida paruo interuallo assumta. Vnde qui circa aquas gelidas habitant, corruptos dentes habent.

Dentes etiam lædunt fuci mulierum ex hydrargyro, vnde rarò mulieres, quæ fucis eiusmodi vtuntur, albos dentes habent.

Fistulæ etiam nonnunquã in dentibus oriuntur, è quibus humor corruptus, & sanies sensim exstillat. Et quidem hæc sanies nonnunquã in os cum foetore defluit, cuius rei exépla duo habet Forestus, *l. 14. obs. 2.* Nonnunquam verò per dentium radices, & maxillæ illa foramina, per quæ vasâ in eas subeunt

fubeunt, ſenſim extrâ effluit, & tubercula in malâ vel mento excitat, quæ nullo modo curantur, niſi dens extrahatur. Eſſi enim, vt aliquoties obſeruauî, rumpatur illud tuberculum, & pus collectum effluat, & tuberculû inde ſubſideat, & probe curatû videatur: tamen poſt aliquod temporis interuallum, ex ſanie è dente carioſo ad eundem locû affluente, aliud tuberculum excitatur, iterûmque rumpitur, & pus effunditur: idque toties accidit, donec dens carioſus extractus ſit. Eo enim exempto tuberculum ſponte euaneſcit.

Interdum etiam vlcus ſemper manet apertum, & continuo ſaniem ſtillat, nequîtque claudi, donec dens carioſus extrahatur. Exſtillat autem iſta ſanies, vt dictum, non per eroſam maxillam, ſed per foramina, quæ ſunt in exteriori ſuperficie maxillæ parte anteriore, per quæ vaſa ad muſculos, labium, & cutim eò loci deferuntur. Obſeruaciones hæc de re vide apud Anton. Beniuen. *de abd. morb. & ſanat. cauſſ. c. 22.* Guil. Fabrit. *cent. 3. obſ. 23. & 33.* Tandem nonnunquam vermes in dentibus generantur, qui ipſos erodunt.

*Curatio.*

Illud quidem, quod corroſum & carie abſumtum eſt, in dentibus reſarciri, & reponi non poteſt: ne verò malum longius ſerpat, influens humor omni ſtudio exſiccandus eſt, ac dum paucus eſt iſte humor, topica ſufficiunt: ſin multus, capitis etiam prius ratio habeatur & totius.

*Curatio.*

Poſtea humiditas putrida abſumatur, & ne ab ea amplius dentes corrumpantur, detur opera: quod præſtat decoctum Radic. cappar. pentaphylli, cyperi, tithymali, ſol. ſaluiæ, menthæ, roriſmar. ſem. nigell. baccar. lauri in vino vel aceto. Aut Gallia moſchata vel ſola, vel cum cypero, & maſtiche mixta, in cauum dentis indatur ad prohibendam putrefactionem. Aëtius ſulphur viuum lycio exceptum intrudit in cavitatem dentis, aut ſemen nigellæ torrefactum, & aceto acri affuſo tritum.

Vel ſequenti decocto os ſæpius colluatur:

*℞. Cort. rad. cappar. 3. vj. rad. peuced. 3. iij. pyrethri, 3. ij. zing. 3. j. Sem. Nigell. 3. j. ꝑ. Myrrh. rub. 3. ꝑ. ꝑ. roſ. rub. P. ij. Dec. in aceti vini. q. ſ. ad tert. Col. ℞. 3. ix. Admiſc. Syr. de roſ. ſic. 3. j. M.*

Mizaldus commendat aquam rad. pyr. cum vino deſtillatam

tam

tam, qua os collui iubet. Nonnulli dentes erosos & cariosos camphorâ replent; alij radice peucedani, zingib. & pyrethri. Alij easdem radices in aceto macerant, deinde coquunt & exsiccant, & eodem modo adhibent. Marcellus cauos dentes sanat imponendo iis cinerem muscerdæ, quo ossa cariosa restitui perhibet. Sunt qui sequentem aquam stillatitiam parant, qua dentem erosum sæpius fricant:

*℞. Alumin. sacch. ℥b. ℞. Sal. ammoniac. gemmæ, an. ℥b. j. Puluerisfata indantur retortæ lutatæ, & f. a. destillantur.*

Arcet quoque corruſionem & cariem dentium sequens linimentum:

*℞. Pulv. myrrh. ℥. ij. Gummi iuniperi ℥. j. alumin. ℥. ℞. cum mellis q. s. F. linimentum, quo quotidie dentes putres & erosi fricentur. Vel ℞. Radic. filic. quinque fol. oxylapath. an. ℥. j. Coqu. in aceto vel vino austero ad tertiæ partis consumptionem.*

Colaturâ os, qua parte dens cariosus est, colluatur; postea hoc pulvere, quem Galenus, *5. de comp. med. sec. loc.* describit, dens impleatur, qui eius putrefactionem prohibet.

*℞. Melant. ℥. j. nitri ℥. ℞.*

Simul torrefiant, & in aceto acerrimo extinguantur, terantur, & cauernæ dentis imponantur. Rondeletius aquam fortem in cauitatem dentis immittit: quod tamen vix tutum puto: cum ab ea & vicinæ partes, & neruus dēti insertus facile lædi possit.

Fricentur etiam dentes iis, quæ postea de dentium denigratione proponuntur.

Et ne dentes cariosi amplius corrumpantur, vtile est, post cibum eos à cibis in iis retentis mundare; deinde os vino colluere, & denti mastichen, thus, cyperum imponere.

Nonnulli ceram indunt. Sed monet de ea Rondeletius, ne sola dentibus indatur: cum habeat vim emolliendi, neruos præsertim. Ideoque suadet, si ea vti velimus, vt admisceamus alumen, vel aliud quod siccat, & adstringit, vel ceram viridem, quæ vehementer siccat ob æruginem.

Cauteria

Cauteria etiam admittit Hollerius, *in perioche. 5. in librum de compos. medic. sec. loca.* Verum vix eorum tutus est usus propter exquisitum sensum neruorum, metuendumque ne partes aliæ & cerebrum ipsum in consensum trahatur. Granum etiam thuris vel myrrhæ denti inferere utile est.

Sylua huiusmodi medicamentorum reperitur apud Galenum, *5. Compos. medicam. sec. loc.* Aëtium *tetrabibl. 2. serm. 4. cap. 33.* Paulum Æginetam, Trallianum.

Si foetor dentium simul adsit, aliquid de myrrha, aut de folio Indo, aut radic. ireos medicamentis misceatur. Vt *℥. Myrrh. mastich. corall. rubr. rorismarini, ireos, an. 3. j. Cere q. s. pro incorporatione.* Fiat Massa, de qua aliquid in dentem cauum immittatur. Vel *℥. Pulv. mastich. 3. β. corallior. rubr. 3. j. myrrh. rubr. 3. β. F. Pulvis,* quo cavitas dentium repleatur. Vel *℥. Flor. rosar. rubr. M. j. mastich. 3. ij. radic. ireos 3. j. ligni cupress. 3. β.* Fiat decoctio in sufficiente vini quantitate. Collaturæ *℥. tb. j. Oxymel. scyllit. 3. iij.* Misc. & decocto dentes eluantur; deinde repleatur cavitas mastiche cum cera mistâ. Dentes etiam mundat & à putredine præseruat Sp. Vitrioli.

Si vermibus dentes erodantur, necare illos scribunt excerptum per infundibulum fumum de sem. hyosciami. Falsissimum tamen hoc putat Hollerius, *lib. 5. perioch. in lib. Galen. de comp. medic. sec. loca,* scribitque aliquid vermiculorum semper de accenso illo fumo erumpere, omni tempore in aëre etiam, quando ad dentes corruptos non pertingit. Alij fumum ex fructu Halicacabi cum cera misto, & ferro cādenti iniecto ore excipere iubent; Alij fumum adhibent de trochiscis ex semine hyosciami albi, succo cepæ vel porri & nitro cum seuo hircino formati, aut fiat collutio auris ex decocto radicum chelidon. Crato commendat decoctum radicum fraxini vel vrticæ. Succus item foliorum centaurij minoris & persicæ arboris, aloë, mirrha, C. C. & alia, quæ contra vermes vsurpantur, vtilia sunt. Quidam os spiritu vini colluere iubent. Si dens maxima ex parte cariosus sit, & dolorem pariat, aut fistula inde facta sit, vel tuberculum, aut vlcus in maxilla, de quo antea dictum, extrahatur. In extrahendo ta-

men dente cautio adhibeatur, & non extrahatur, nisi vacillet, vt sine vi extrahi possit; aut si nerui subiecti, ne inflammatio & inde periculum immineat. Erasistratus, qui dentes temerè non extrahendos putauit, eius rei testimonium hoc adduxit, quod in templo Apollinis Ὀδοντοχρῆς, seu forceps dentarius plumbeus suspenderetur, quo innuebatur, non esse extrahendos dentes, nisi vacillarent, vt plumbeo forcipe & sine vlla vi extrahi possint. Si enim magna vi extrahuntur dentes, sæpe maiores dolores, & sanguinis fluxus sequi solet, vel maxillæ pars auulsa simul extrahi, aut alia pericula excitari possunt. Ita memini hic puero incautè dentem extractum, & procul dubio in extrahendo neruum læsum fuisse, vnde postea fungus enatus fuit, qui totum os repleuit, ac quamuis abscinderetur, breuissimo tamen temporis spatio iterum succreuit; maiusque semper incrementum sumpsit, ac ægro tandem mortem attulit.

Vt autem dentes sine violentia euelli possint, quædam medicamenta adhibenda, quæ passim in Medicorum libris occurrunt. Vt, Ranarum viridium in arboribus degentium pinguedo & puluis, si dentibus affricetur; tithymalli succus denti inditus, aut si ex eo & sale armoniaco globuli formentur & cavitati dentis indantur, gummi hederæ impositum, radix cucumeris agrestis per triduum in aceto macerata, semen hyoscyami, & radix eiusdem assata radici dentis calida applicata. Alij hoc commendant.

℥. *Vrina canis, thuris, dentis canis*, an. q. s. Pulueriscentur subtilissimè & cum vrina permisceantur, & imponantur denti eximendo. Tabernæmontanus hoc laudat.

℥. *Gummi ammoniacum dissolutum & cum sem. hyoscyami*, Misce. F. vnguentum.

Monet tamen de hisce medicamentis Valescus de Taranta. 1. vt vicini dentes benè muniantur, ne & ipsi à medicamento tangantur. 2. vt os apertum seruetur, & saliuæ effluere permittatur. 3. Ne quid deglutiatur.

Ne etiam dentes carioli sub forcipe frangantur, ante extractionem tenui filamento replendus est dens cariosus.

Valescus de Taranta, cap. 72. non facilè admittit dentium

tium extractionem; primò propter masticationem, secundò quia dente vno euulso sequatur fluxio ad alterum, & sic continuò dentes extrahendos esse, donec tandem homo ad solas offas & pulmenta redigatur. Verùm etsi hoc suo modo concedi possit in dolore dentium à fluxione, & vbi per per vasa pluribus dentibus communia materia affluit: tamen in dentibus corruptis, & præcipuè vbi sanies ex iis exesit emanans in maxillâ tubercula vel vlcus excitas, nulla alia curandi ratio est, quàm si dens extrahatur. Neque tum metus est; ne vicinus dens corrumpatur, cùm talis corrosio non sit à fluxione recenti, sed quæ iam diu sæpè præterit.

## De Dentium imminutione.

Non solùm dentes imminuuntur, dum intus corro-  
duntur, sed etiam cùm breuiores fiunt. Fit autem hoc 1. ob  
externas iniurias, casum scilicet, percussionem vbi pars  
aliqua dentis perditur. 2. Vbi nonnunquam in dentium  
putredine ij non solùm intus excauantur, sed etiam pars  
aliqua decedit. In adultis vix curabile malum est. In  
pueris quibus adhuc spes est dentes rursus renasci posse,  
sanationis spes est.

## De Dentium elongatione.

Dentes nonnunquam etiam iusto longiores & promi-  
nentiores fiunt, præcipuè anteriores. Id quod accidit 1. his  
vacillantibus, vel eorum radicibus laxatis, vel ex percus-  
sione aut casu, atque externa violentiâ, vt in attentatâ, sed  
non perfectâ dentis extractione. Deinde etiam citra laxi-  
tatem & mobilitatem, quando nimirum augentur & lon-  
giores fiunt. Id quod plerumque fit, si dens oppositus deest,  
teste Columbo, lib. 1. cap. 10.

Si à laxitate & vacillatione dentium fiat eorum elon-  
gatio, dentes iterùm firmandi sunt, vt postea dicetur; aut  
si hoc non iuuat, limâ atterendi; quod etiam faciendum, si  
ex incremento longiores sint. De qua re vide Aëtium,  
tetrabibl. 2. serm. 4. cap. 3.

## De Dentium mobilitate &amp; vacillatione.

Sæpè etiam accidit, vt dentes vacillent: & imprimis in-  
cisorij mobiles fiunt; quia vnâ saltem radice nituntur.

Dentium  
imminu-  
tio.Dentium  
elonga-  
tio.Dentium  
vacilla-  
tio &  
mobili-  
tas.

Vacillatio dentium fit vel à caussa externa & euidente, vel interna.

Causa Externa est ictus vel casus.

*A caussa  
interna.*

Internæ sunt defectus alimenti, vt in senibus, interdum etiam conualescentibus; vnde alueoli dentium ampliores redduntur; nimia humiditas laxans radices dentium, præsertim si peculiaris aliqua prauitas accedat, id quod in scorbuto, & in lue venerea ab inunctione hydrargyri accidit; Diminutio gingiuarum ab erodente succo prauo, quod & in lue venerea sæpe vsu venit. Mobiles etiam sunt dentes erosâ eorum radice.

*A caussa  
violēta.*

Si ergo à casu aut percussione dentes mobiles sint rediti, astringentibus & firmantibus vtendum. Vt ℥. Rad. pentaphyll. bistort. an. ʒ. j. cyperi ʒ. ij. flor. rosar. rubr. M. ℞. sumach. ʒ. ℞. Coqu. in aqua ferratâ. Collat. adde Alum. ʒ. ij. F. Oris collutio. Vel ℥. Corall. rubr. C. C. vñi præpar. rad. bistort. pentaphyll. mastich. rad. cyperi, an. ʒ. j. F. Puluis, qui dentibus affricetur, vel cum Syrupo de rosis siccis in linimenti formam redigatur & dentibus illinatur.

℥. Succu nasturt. aquat. express. ʒ. iij. syr. ex rosar. siccis ʒ. j. ℞. Coqu. f. a. ad spissitud. Add. rad. symphyti ʒ. j. nuc. mosch. cupress. C. C. vñi pulu. vel præp. sang. dracon. an. ʒ. j. alum. vñi ʒ. ℞. F. l. a. Linimentum.

Si verò malum sit à defectu alimēti, dentiū equidem tenuitati & exsiccationi nullum remedium adhiberi potest. Dentium tamen relaxationi opitulantur adstringentia medicamenta, & quæ gingiuas roborant.

Si à nimia humiditate, exsiccantibus & adstringentibus opus est. Vbi tamen seligenda ea, quæ dentes non denigrant, & quæ odorem gratum conciliant. Ea enim, quæ dentes denigrant, omittenda, vt cortices granatorum, balauftior. gallæ, vitriolum & calcitis.

Fiat nimirum decoctum ex rad. filicis maris, pentaphyll. bistort. lapathi, tormentillæ, cappar. fol. myrthi, lentisci, mespil. flor. rosar. rubrar. cupulis glandium in aqua vel vino austero, quibus si alumen, vel decocto si ol. ☉ vel ☿ guttæ aliquot addantur, efficacius decoctum redditur. Ad humiditatem simul educendam radix py-

rethri



rethri addi potest, & ob odorem suauem rosmarinus, salvia, cinamomum.

Pulvere etiam dentes in eundem usum affricentur, quales postea de gingiuis laxis proponentur. Vt ℞. *Aluminis, mastiches*, an. 3. ℞. *coral. rubr. C. C. vsti, eboris, sanguinis draconis, boli armeni, salis communis tosti*, an. 3. ij. *thuris, balaustior.* an. 3. j. *radic. ireos, bistortæ, rad. cupressi*, an. 3. iij. *piperis, pirethri*, an. 3. j. *testarum sępię, pumicis*, an. 3. j. ℞. F. Puluis. Vel ℞. *Corrallior. utriusque* an. 3. ij. *mastiches, tragacanthi, gummi arabici*, an. 3. j. F. Puluis.

Vel ℞. *Farinę hordei* 3. cxx. *folior. parietarię viridis* 9. s. Contunde folia in mortario & cum farina Misce, ut fiat massa, quę vratur in olla igne patente hor. 24. Massam exime & adde *mastich.* 3. ij. *rad. ireos* 3. j. *spicę Indicę, folij*, an. 3. ℞. F. Puluis. Vel ℞. *Off. dactylor. oliuarum combustar. oculor. cancri vstor.* an. 3. ij. *sang. dracon. alum. vsti*, an. 3. j. F. Puluis. Vel ℞. *Flor. rosar. rubr. sumach. granor. myrt. cupul. glandium*, an. 3. j. ℞. *cort. rad. mori* 3. iij. *cort. rad. cappar.* 3. j. ℞. *radic. ireos, thuris*, an. 3. j. Coquant. in vino astringenti pro collusione oris. Vel ℞. *Rors. rubr. M. j. C. C. vsti* 3. j. *serpentarię* 3. j. *radic. tormentill.* 3. ij. *alum. vsti* 3. ℞. *nuc. moschat. D. ij. cortic. cass. lignę* 3. j. Coqu. in tb. j. ℞. *aq. Plantag.* Vel ℞. *Herb. auriculę muris, serpentarię, tormentillę*, an. q. v. Coqu. in aqua ferrata ad consumptionem tertię partis pro oris collusione. Vel ℞. *Rad. pentaphyll. bistortę*, an. 3. ℞. *flor. ros. rubr. cupular. glandium* 3. ij. *spongicę marin.* 3. j. Coqu. in aquę communis chalybeat. & rosar. part. æqual. ad tertias & colentur. Vel ℞. *Fol. myrtillor. sorbor.* an. m. ℞. *fl. balaustior. sarcocoll. aluminis*, an. 3. j. *aceti scillit.* 3. ij. *aquę Plantag.* 3. v. Bulliant ad tertias & colentur. Colaturę admisce. syr. myrt. 3. j. ℞. Misc. Efficax est & hoc.

℞. *Gland.* 3. j. *alumin. vsti* 3. j. *acatię.* 3. ℞. *flor. rosar. rub. m. s.* Coqu. in vini rubri tb. ij. ad tertię partis consumptionem: decocto os sæpe colluatur. Vtilis quoque est sequens aqua distillata.

℞. *Fol. saluię, rosmarini*, an. m. iij. *menthę, chamępith.* an. m. ij. *schęnābi, m. j. cort. citri* 3. j. *ligni aloës, cyperi rot.* an. 3. ij.

Concisis affunde, *aq. fl. prunell. periclymeni, rosar. an. q. f. vini cidonior. tb. β. Stent per triduum in infus. deinde distillentur in MB. In fine adde, moschi ℥. β. Possunt & tali linimento dentes mobiles fricari.*

℥. *Diamori ℥. β. dianuc. 3. ij. alum. vsti 3. β. Misce. Vel*  
 ℥. *Pulu. gummi iunip. 3. β. alum. crudi 3. j. origani 3. β. mellis 3. vj. Cum aceto scillitico Misce. Aqua pro firmandis dentibus, quæ & in dolore dentium vsurpari potest.*

℥. *Herb. salu. vrtic. rorismarin. tormentill. rad. nuc. iugland. bene lotar. & contus. an. m. iij. flor. salu. rorismar. rosar. rubr. fol. prunell. plantag. summit. rubi, marrub. an. m. ij. sem. myrtill. tb. j. hypocist. ℥. iij. coriand. præp. cort. nitri, an. 3. ij. cinamomi ℥. iij. nuc. cupress. num. x. boli armeni, mastich an. 3. ij. Incisa & contusa infund. in l. q. vini nigri austeri, stent per triduum in macerat. Postea exprimantur fortiter. Expressum indatur cucurb. vitreæ. Destillentur lento igne. In destillato ebulliant vase bene cooperto, Aluminis ℥. ij. Percolentur. Seruentur vsui. Alia.*

℥. *Rad. tormentil. serpent. an. ℥. ij. plantag. ℥. j. prunell. cort. nuc. iugland. ana. ℥. j. β. ligni guaiac. contus. ℥. iij. sem. coriandri. præp. ℥. β. portulac. 3. vj. myrtill. 3. ij. fol. rayrtill. m. j. herb. plantag. marrub. vrtic. min. prunell. an. m. j. β. rorismar. salu. min. an. m. ij. flor. rosar. rubr. m. j. β. santali rubr. cort. citri, cass. lign. an. 3. β. nuc. cupress. nuc. mosch. an. 3. iij. pinæ. rec. num. iij. boli armeni, mastich. an. 3. ij. cinamomi, myrrhæ, an. 3. j. β. rasur. C. C. ℥. j. β. Præparata l. a. misc. & superfund. vini rubri antiq. tb. xij. Stent per aliquot dies, postea per cucurb. vitr. destillentur.*

*Ab im-* Si ab imminutis & erosis gingiuis sit dentium mobili-  
*minutio-* tas, illæ instaurentur, vt suo loco dicetur. Vt ℥. *Alumin.*  
*ne gingi-* scissil. vsti. flor. rosar. rubr. sumach. an. 3. j. β. ligni aloës, radic.  
*parum.* cyper. an. 3. j. F. Puluis, qui gingiuas roborat & astringit.  
 Vel ℥. *Corall. rubr. præpar. 3. j. β. mastich. radic. cyper. an. 3. β.*  
*aristoloch. rotund. cass. lign. an. ℥. j. F. Puluis.*

In lue venerea materia putrida & maligna prius abstergatur oxymel. scilit. in quo maceratum sit guaiacum cum succo plantaginis, vel ol. ☿ris aut ☽li, postea adspargatur puluis ex adstringentibus: tandem post deterfionem  
 dentes

dentes frequenter abluantur decocto ligni guaiaci parato cum vino, mastiche, plantagin.

Si à Scorbuto fit dentium mobilitas, cura ad scorbutum dirigatur, & adhibeantur ea, quæ postea de gingivis laxis & corruptis proponentur.

Ementitur structuram firmam dentium alligatio cum filo aureo: Quia verò interdum hanc alligationem sequitur inflammatio, illa cautè instituenda.

Quibus dentes mobiles sunt, non multum loquantur, nec dentes digitis vel lingua moueant, nec aërem frigidum admittant, nec res duras mastificent, sed iuscula fumant, oua forbilia, vel alios cibos, in quibus forti masticatione non opus est.

*De Dentium casu & munere edeficiente.*

Dentes etiam sæpenumero deficiunt: quod accidit, cum vel violenter excutuntur, vel spontè excidunt, quod malum dentium casus appellatur, id quod frequenter in infantibus accidit, & sæpè in iis dentes à nouis, qui emergunt, extruduntur, sed sine damno aliquo, cum paulò post renascantur. Molarium tamen appendix non decedit frequenter: quia ita cum dentibus committitur atque cohæret, ut ipsorum pars esse videatur, nec facile demi possit. Columbus *lib. 1. cap. 10.* Molares proximos caninis nunquàm decidere vult Plinius; caninos elapsos nunquàm renasci. *lib. 1. cap. 37.* Negat tamen hoc Fallopius in *librum Galeni de ossibus*, qui maxillares dentes à se in puero euulsos renatos vidit. Atque omnes maxillares dentes excidunt & renascuntur, præter genuinos, qui si exciderunt, nunquàm regenerantur. Adultis verò quando id euenit, rarò renascuntur: aliquando tamen id accidisse obseruatum est, ut historiæ à Schenkio *lib. 1. obseru. 48.* allegatæ testantur.

*Causæ.*

Et ferè causas easdem habet hoc malum, quas vacillatio & mobilitas dentium, de qua antea diximus, sed grauiores. Quia enim dentes alueolis suis affiguntur, atque alueoli dentibus aptitudine respondent, præterea gingivarum carni dentes adhærescunt: Si alueoli dentibus

non respondeant, sed ampliores fiant, aut gingivarum carni non firmiter adhærescant, mobiles primò fiunt, & deinde planè excidunt, siue id fiat ob inopiam alimenti, ob quam & alueoli & dentes ipsi exsiccantur, siue ob humiditatem nimiam radices dentium laxantem, siue ob humorum prauitatem, quod in Scorbuto & Lue venerea & vlceribus exedentibus, cuius rei exemplum est in puero apud Hippocratem, 4. *epid. sect. vlt.* & inunctione cum hydrargyro euenit, siue ob gingivarum carnem imminutam & absumptam.

*Signa Diagnostica.*

Signa caussarum quod attinet (vitiū enim ipsum per se patet) ex alimenti inopia vix vnquā alicui dentes excidunt, præterquam senibus, & dentium casus ex hac causa senectuti proprius & familiaris est. Si ex alimēto vitioso & humoribus prauis id accadat, ex viuendi ratione, morbis, qui præcesserunt, ex destillationibus acribus, dentium dolore cognoscitur.

Si ex humiditate nimia, os saliuā abundat, gingiæ sunt humidæ; Lues venera Scorbutus & vlcera etiam suis signis cognoscitur.

*Prognostica.*

1. Malum hoc non contemnendum est. Nam quia dentes masticationi inserviunt, si dētes desint, masticatio non rectè perficitur, atq; ita etiam coctio in ventriculo non rectè fit. Deinde & turpitudinem aliquam pariunt, quæ in loquentibus, videntibus & oscitantibus apparet; imò sæpe inde sermo vitiatur.

2. Dentium ab alimenti inopia vacillatio curari nequit, id quod senibus accidit. Quæ verò affectio phlegmonæ similis est, ex alimenti redundantia, ea iuuenes magis corripit. Galenus 5. *de comp. medic. sec. loca. cap. 8.*

3. Dentes in infantibus siue spontè siue ob violentiā aliquam excidunt, modò radices remaneant, spontè renascuntur. Quamobrem cauendum, ne cum pueris dentes casu atque aliquo ictu effringuntur; quæ reliqua est portio eruatur, sed accuratissimè radix ipsa, quoad eius fieri potest, seruari debet. In ea enim, veluti in semine quodam, ipsius dentis regenerandi spes residet, eaque radicitus euulsa

euulsa dentes non amplius, vel rarissimè renascuntur. Columbus *lib. I. c. 10.* In adultis verò etsi hoc aliquando accidat : tamen plerumque vbi radices seu appendices exactè coaluerint, si ita cum radice excidant, non regenerantur.

*Curatio.*

Quæ dentium mobilitas ex humiditate nimia, vel humoribus prauis accidit, eodem modo curatur, vt dentium vacillatio, & mobilitas; cùm easdem causas habeant. Dentes verò, qui ex alimenti defectu exciderunt, etsi reparari nequeunt : tamen quia deformitas aliqua inde oritur, præsertim in anteriore oris parte, vel qui exciderunt, modò non sint cariosi, dentes arte fabrefacti ex ebore, & in amissorum locum arte inserti, deficientium numerum supplere possunt. Cautè tamen hoc præstandum, ne ex compressione gingivarum, vel neruorum inde inflammatio gignatur, quod interdum accidisse obseruatum est. Obseruatum etiam est, quosdam loco dentium multorum vnum os continuum habuisse, vt historix à Schenckio, *lib. I. obs. annotatæ* testantur.

*De Dentium numero , & situ vitiato.*

Præterea numerus dentium præter naturam augetur, & plures, quàm secundùm naturam, dentes reperiuntur. Quosdam enim dentium loco vnicum os habuisse refert Plin. *lib. 7. c. 16.* Plutarchus, in *Pyrrho*, & alij, quos citat Schenckius, *lib. 3. obseru. de dentibus.*

Ita obseruatum est, quosdam duplicem, vel triplicem ordinem dentium habuisse, quod incommodi aliquid, vel deformitatis ferè non habet, si situm saltem ordinarium obseruent. Cuius rei historias collegit Schenckius, *lib. I. obs. 413.*

Interdum etiam dentium numerus imminuitur, & pauciores quidam, quàm vulgò homines solent, dentes habent, vt Valescus Taranta de seipso testatur.

Nonnunquàm verò dentes, siue numerum iustum obseruent, siue eum excedant, situm rectum non obseruant, sed extra ordinem prominent, & ita quidem, vt interdum labia diducant, deformitatèmq; pariant, ac in masticatione

tionem impedimento sint. Et imprimis dentes incisores non raro duplices sunt.

Quibusdam etiam dentes in palato enati sunt, cuius rei historia habetur apud Schenck. *lib. I. obseru.* 415.

Verum cum ista mala omnia à conformatione vitiosa dependeant, emendari arte non possunt.

*De connexione Dentium.*

*Dentium  
connexio.* Non verò tantum in numero & situ, sed etiam in connexionem sunt dentium vitia. Connexio præter naturam dentium fit, vel ob eorum inter se, vel cum maxilla.

Inter se connexi dentes interdum sibi cohærent, sicut in Persa illo, de quo Herodotus, *lib. 9.* Post pugnam enim ad Plateas, in qua multi Persæ ceciderunt, cum cadauera comportarentur, inuenta est maxilla habens quidem distinctos dentes, verum ex vno ossè. Cuius rei historiarum plures videantur apud Schenckium, *lib. I. obser.*

Connexio autem cum maxilla est, quando dentes maxillæ non inserti tantum, se planè adnati sunt, & cohærent, ita ut euelli non possint, nisi maxillæ ossis frustum simul auellatur, quod obseruauit Columbus, *lib. 15.*

*De sordibus ac topis dentibus accretis.*

*Dentium  
sordes.* Tandem etiam dentibus sordes & lapides seu topi, quos Græci *πώρες*, appellant, annascuntur, atque obseruatum est, in quibusdam ita incrementum sumpsisse, & dentes ista lapidea materia ita obductos fuisse, ut nulla dentium distinctio amplius appareret, sed vnius tantum ossis speciem præ se ferrent.

Generantur autem isti topi ex lentis, & viscidis cibis, præcipuè caseo dentibus adhærente, & in iis, ut reliqui lapides in corpore, in hanc duritiem coagulatis. Topi illi iam geniti scalpellis vel aliis instrumentis è ferro aut potius argento paratis à dentibus separandi sunt. Ne autem iterum generentur, dentes post cibum diligenter mundandi sunt, idque faciendum non ferro, & acie cultri, cum dentes inde lædantur, sed dentiscalpiis ligneis vel ossè firmo, ac flexili, ideoque in hunc usum commodum lignum lent. cup. iunip. & huius generis alia; spinæ item pisciæ aliquæ item ossicula, & tendines ossi gallinarum. Postea

os abluatur, vel aqua, vel vino, & dentes à fordibus diligenter abstergantur; id quod fit commodissimè dentifriciis, & pulneribus ad dentes mundandos idoneis, qui postea de nigredine dentium curanda proponuntur.

## CAPUT XI.

## De Dentium dolore.

**S**ymptoma hi sunt morbi, qui dentibus accidere solent. Symptomata dentium alia in actione læsa consistunt, ut quando dolore, stupore, vel algore afficiuntur; alia in qualitate mutata, dum stridorem excitant, & dum nigrescunt, & fordido lentore obducuntur, de quibus iam dicendum.

*Dentium dolor.*

Et primò *ἡ ἰδιότης*: Quæ appellatio à parte affecta, & à symptomate sumpta est, ut docet Galenus, 2. m. m. c. 2. Dolent autem dentes, & quidem maximè molares (incisores verò rarò vel nunquam) etsi ossa sint, quia sensu non planè destituti, ut alia ossa. Nam ut Galenus, 16. de usu p. c. 2. docet, dentes mollium cerebri nervorum participes sunt, quod extrinsecus occurrentibus calidis, frigidis, duris, aliisque nudi sunt expositi. Nervulus autem ille ad radicem dentis implantatur membranulæ cavitatem dentis intus succingentis; & quidem ex tertia & sexta nervorum propagine, nervi qui dentibus implantantur originem habent.

Galeno tamen, 5. de comp. med. f. loc. etiam corpus dentis sentit ac dolet, ex affectione scilicet phlegmonæ simili in substantiam dentis, ubi dolorem ex hac causa ortum discernit, à dolore inflammati nervi, qui radici dentis substratus est, & à dolore inflammatarum gingivarum, quæ omnia suo experimento Galenus *ibid.* confirmat.

## Causæ.

Causa proxima doloris cum sit solutio continui in parte sentiente, etiam hinc dentium dolor excitabitur, quatenus & ipsi nervum participant, huiusque membranæ dentibus inseruntur. Solutionem autem continui hinc parit, vel intemperies, vel humor, ut vulgò docetur.

*Causa.*

Verum vix sola intemperies dolorem ciet, nisi forsà alior sit, de quo postea, sed semper humor coniungitur: & intemperies

temperies illa , si quæ adest , humori inest.

Humor autem is est , vel frigidus & pituitosus , vel calidus, vel serofus , falsus & acris , id quod frequentissimè accidit:& qui dolores dentium à vapore à multis fieri docentur , eos potius ab humore seroso prouenire verissimile est. Interdum etiã illa materia in dentibus putret, & corrumpitur, vnde vermes geniti doloris in dētibus causa sunt.

Confluit autem illa materia , vel in membranas maxillarum & alueolorum dentium, vel ad neruulum in radice dentis & membranam huius internam nerueam , vel in ipsum corpus dentis è capite. Et quidem in superiorem maxillam per angulum oculi maiorem , in inferiorem per venas temporum. Et principium huius fluxionis plerumque est è capite , nonnunquam tamen & ex inferiore corpore materia affluit, ex epate , liene , vtero. Cùm enim vitiosi aliqui humores, præcipue serosi , in parte aliqua geniti in venis cumulantur, natura iis sese liberare cupiens, eos cùm ad alias partes , tum ad dentes protrudit : præcipuè si sint debiles. Id quod maximè accidit , cùm dentes sunt erosi.

Externæ causæ, quæ seu humores commouent, seu vt facilius recipiantur , faciunt, sunt ictus & casus , vsus ciborum nimis frigidorum aut calidorum , maximè si mutuo mox se consequantur. Acrum item, acerborum ac dulcium frequens vsus : contactus creber , qui fit ferro.

#### *Signa Diagnostica.*

*Signa.*

Primò vt certi simus , an dolor sit in dente, vel gingiua, ante omnia inspicienda est gingiua , vtrum inflammata sit, tumida, corrosio seu putrefactio in ea appareat. Si nihil horum cernatur , causa doloris erit in dente ipso , vel eius neruo. In dente quidem , si dolor non ita profundus est, & secundùm latitudinem dentis extendatur , mutatio etiam quædam doloris in dente animaduertatur. Et fortassis dens tum cariosus est à verme intus obsessus: vbi etiam dolor interpolatus est ad motum ipsius vermis. In neruulo verò si dolor sit , profundior, & vehementior est, qui dente exempto nonnihil leuatur, quòd ob viam patefactam materia iam melius dissipatur : dolor etiam secundùm gingiuas se extendit in latitudine, & ad aurem pertingit.

*Signa*



Signa caussarum sic discernuntur. Humor, qui doloris causa est, suis signis se prodit, ex doloris specie, ex sapore & habitu corporis. Sanguis cognoscitur, ex dolore pulsante, sapore subdulci: pituita dolore distendente, sapore falso aut insipido: bilis dolore punctorio, sapore amaro: humor melancholicus, dolore profundo, & sapore acido: à sero dolor non est ita fixus, sed sæpè mutatur. Ac generatim à calido humore dolor est acerbior, à frigido remissior. Habent hic & locum signa, quæ supra *lib. 1. de Intemperie Capitis* cum materia sunt exposita.

## Prognostica.

1. Dolor dentium maximis tormentis annumerari potest, teste Celso, *lib. 6. cap. 9.* Et ut Galenus scribit, 2. *de comp. med. sec. loc. cap. 1.* nonnullis tantus fuit, ut mortem sibi impatientia conscuerint. Ita dolor dentium periculosior videtur esse, quàm dolor capitis, symptomatis scilicet ipsius ratione, non causarum: cum causa dolorem capitis produciens propior sit cerebro, & proinde grauius symptomata, ut cæcitatem, apoplexiam, & similia afferre possit. Prognostica.

2. Dolor dentium pro causarum & loci affecti diuersitate facilius aut difficilius curatur. Ex sanguinis affluxu citius tollitur. Quanquam si inflammationem pariat, multum sæuiat.

3. Atrociorem dolorem excitat humor tenuis, acris, falsus & serosus, sed citius desinit, ob materiæ illius mutationes subitas. Mitior dolor est à frigido, & pituitoso humore etsi diuturnior.

4. Si affectus fuerit in gingiuis, dolor non remouebitur dentis euulsione: si in neruo, dolor exempto dente interdum cessat, tum materia antea conclusa exitum iam habet, tensioque remittit, aliquando remanet, quando materia nimis crassa, & lenta neruo adhæret. Auicenn. *tert. Can. sen. 7. tract. 3. cap. 5.*

5. In vehementi dentis dolore, si nullo prius affectio, nis vestigio in gingiuis apparente, tumor iam in iisdem aut in malis oboritur, bonum est. Significatur enim materiam ab interna dentis cavitare ad externa verti ac deri-

uari siue naturæ robore, siue virtute medicamenti.

6. Dentium dolor cum eorundem stridore, & febre ardente lethalis est, quod si iis accidit, quibus antea dentes stridere non consueuerunt commotionem mentis, maniam, epilepsiam aut conuulsionem portendit. Cum enim stridor fiat ob conuulsos temporum musculos, argumentum est, cerebrum affectum esse, cui si delirium coniungatur, mali confirmati est indicium, atque inde mors sequitur, vt Galenus, *ibidem in comm.* docet.

7. Quibus in dentium dolore de supercilio tenuia discedunt, his à pipere probè africato postridie crassiora discedunt, si stupefaciens prius adhibitum dolorem non sedauit, sed potius auxit, vt Ægesippi exemplo docet Hippocrates, 6. *Epid. sect. 6.* Piper enim impactum à narcotico succum soluit, vnde dissipato eo mitigatio doloris sequitur.

8. Dolore dentium cessante interdum aures pus colligunt. Sic Athenæo puero sinistra parte dens inferior, dextrâ superior doluit. Huius auris dextra pus collegit, cum non amplius doleret. Hippocrat. 4. *Epid. sect. vlt.*

#### Indicationes.

*Indicationes.*

Medicus in dolore dentium curando, vel ad dolorem ipsum, vel ad causam respicit. Dolor equidem, qui maxime vrget, indicat anodynâ: ea verum parum proficiunt, nisi fluxio sit ablata. Ideò imprimis causa doloris remouenda, humor scilicet ad dentes confluens reuellendus, euacuandus, repellendus; qui verò iam influxit, discutiendus & euacuandus: Si tamen dolor valde vrgeat, narcotica adhibenda.

#### Curatio.

*Curatio.*

Itaque si plethora adsit, & dolor dentium, vel gingiuarum sit cum inflammatione, vena cephalica eiusdem lateris reuulsionis causa, si materia à capite mittatur: vel Basilica aut Saphena aperiat, si ab inferioribus, aut cucurbitulæ cum scarificatione scapulis apponantur. Deriuationis gratia venæ sub lingua incidantur. Quidam etiam post aurem & in aurium meatu superiore parte aperiunt. Nonnulli quoque aurium scarificationes adhibent. Nec aliæ reuulsio

reuulfiones omittantur, vt & deriuationes, per frictiones, ligaturas extremorum, lotiones crurum, vesicatoria brachiis & ceruici, vel post aures imposita. Vulgus carpo etiam flammulam vel ranunculum flammeum imponit eius manus, quæ est è regione, & latere doloris. Exempla in Institutionibus, & alibi etiam sunt proposita.

Si verò alij humores peccent, ij conueniente modo euacuentur, prout humoris dolorem parientis natura & conditio id requirit.

Vniuersalibus præmissis si materia adhuc in fluxu sit, adstringentia fronti, & temporibus applicentur; ac intus vsurpentur, quæ os ventriculi adstringunt ac roborant, si ab inferioribus etiam aliquid sursum mittatur.

Quin & Errhina naribus immitti possunt. Imò etiam reuulsionis gratiâ brachiis & ceruici vesicatoria applicare licet.

Temporibus quoque applicare vtile est emplastrum ex gummi tacamaca, mastiche, myrrha, gummi elemi. Quæ etiam dentibus ipsis Topica applicantur, repellentia sint quamdiu aliquid influxerit.

Cautione tamen in repellentibus adhibendis opus est, præcipuè si maxillis applicentur. Nam licet si materia in ipsum dentem saltem fluat, repellentes oris collutiones sine periculo applicentur: tamen si materia sit copiosior, ita vt etiam maxillam occupet, repellentia, præcipuè maxillis, non tutò applicantur; cùm materiam intrò ad fauces repellere, & ægrum suffocare possint. Ita refert Valescus de Taranta, quendam bonum & peritum Medicum, cùm aliquando dolorem haberet dentium molarium cum inflatione maxillæ, apposuisse maxillæ oleum rosaceum cum aceto cùm ad lectum iret, vnde factus fuit fluxus materiæ ad guttur, & ægrum angina correptum, & mortuum fuisse.

Fluxione cessante discutientibus vtendum, quibus tamen semper aliquid adstringentium commisceatur. Ad stupeficientia non nisi magna necessitate vrgente veniendum.

In materia igitur calida pro repulsione laudatur collutio oris cum aceto, in quo decocta sint fol. myrth. flor. rosar. rubrar. radix oxilapathi, filicis, rad. & fol. halicacali.

sem.

sem. hyoscyami. Vel detineatur in ore aqua rosarum cum tertia parte aceti, vel succus plantaginis, semperuiui, vel decoctum è rosis, lactuca, plantagin. acetos. salic.

℥℥. Flor. ros. rub. fol. malu. minor. an. m̄. j. Coq. in vino austero ad tertias. Colat. ℥℥. 3. viij. Quibus admisce ol. sulphuris acidi ʒ. ss. croci ʒ. j. M. Vel ℥℥. Fol. quercus, plantag. an. m̄. j. hedera arbor. m̄. ss. Rad. tormentil. 3. ij. urtica, 3. iij. Coq. in vini Rhenani q. s. ad tertias, & colentur.

Rulandus aqua solani cum oleo vitrioli mixtâ vtitur. Vbi verò gingiuæ simul sunt affectæ, acetum, monente Aëtio tanquam hostilis gladius vitandum est, ob mordacitatem, quâ gingiuas erodit. Alioquin in dolore dentium, citra gingiuarum inflammationem, siue corpus ipsum dentis doleat, siue neruulus eidem substratus, Galenus in aceto medicamenta præparare iubet, tam repellentia, quàm discutientia. 5. de comp. med. sec. loc. c. 9.

Etsi enim acetum per se dentibus nocet: tamen repellentibus rectè admiscetur: quoniam penetrando illorum vim auget: discutientibus etiam, quia præterquam quod penetrationem adiuuat, ipsum quoque incisoria vi suâ nonnihil ad discutiendum conducit.

Vel ℥℥. Sem. Papau. albi. hyoscyami an. 3. ij. Rad. albae, 3. ss. Flor. chamem. rosar. rubr. an. P. j. Coq. in aquæ, & aceti s. q. ad consumptionem tertiæ partis.

Vel radices oxylapath. Coq. in vino austero, & decoctum in ore detineatur.

Vel radices oxilapath. aceto maceratæ denti dolenti & cauernofo indantur. Efficax est & medicamentum decoctum radic. prunorum syluestrium ablato cortice exteriori. Vel ℥℥. Limaturæ ligni guaiaci 3. ij. cortic. interior. virid. quercus. Radic. Prunell. an. 3. ij. Coq. ad remanentiam ʒ. j.

Extra inungatur maxilla vnguento Alabastrino. Monet tamen Langius, vt vnguentum Alabastrinum in materia calida misceatur cum frigidis, sicut in frigida cum calidis. Vel ℥℥. Pomor. dulc. 3. ij. Adde fursuris 3. iij. croci ʒ. j. olei rosati 3. j. M. Fiat cataplasma extrà loco dolenti apponendum. Vel ℥℥. Medullæ pomor. assat. 3. ij. ss. stercor. gallin. 3. j. ss. Ol. ros. omph. 3. vj. M. exactè & fiat cataplasma.

In materia frigida Auicennas alumen vſtum aceto extinctū cum ſalis pari portione miſcet, eoque dentes fricat, & poſtea cum vino abluit. Reſoluit ſimul vinum, in quo hyſſopus & thymus coctus eſt. Vtilis eſt & collutio ex decocto origani, ſerpilli, ſem. ſtaphidis agriæ, rad. pyrethri, acori, ligni ſancti, & ſimilibus. Vt ℞. *Origani* m. j. *hyſſopi* m. ſ. *Cort. aurantior.* ʒ. ſ. *Coqu.* lb. j. ad conſumpt. tertiæ partis, & colentur. Vel ℞. *Fol. Betonic. ſaly. maioran. roriſmar. ana* m. ſ. *Flor. ſtæchad. arab. P. ij. ſem. nigellæ. Rad. pyrethri, an.* ʒ. ij. *Coq.* in vino albo & aceto pari portione pro collutione oris. Vel ℞. *Origan. roriſmar. ſaluie ana* m. ſ. *roſar. rubr. P. j. Rad. pyrethr. ʒ. iiij. Coq.* in lb. ij. aqu. ad dimidium. Colaturæ adde *aceti roſacæi* q. ſ. ad gratam aciditatem. Vel ℞. *Limatur. ligni guaiaci* ʒ. j. *Cort. inter virid. lign. querc. Rad. pyrethri, filicis, an.* ʒ. ſ. *Coq.* in aquæ puræ lb. j. ſ. ad lb. j. remanentiam. Vel ℞. *Rad. pyrethri ʒ. ij. ſarſæ parillæ ʒ. iiij. raſuræ ligni guaiaci ʒ. ſ. pini ʒ. iiij. fl. roſ. rubr. ſerpilli, origani, an. P. j. gran. iunip. ʒ. ſ. ſem. carui ʒ. iiij. Inciſa & contuſa coq.* in aq. & vini Rhenani ʒ. xij. Ad tertiās, Colentur. Colaturæ ℞. ʒ. vj. In quibus diſſolue *camph. ʒ. v. M.* Vtile etiam eſt decoctum gummi iuniperi cum vino paratum.

℞. *Gummi iuniperi ʒ. ſ. vini Rhenani ʒ. viij. Coqu. & colentur. Colaturā calidā in ore detineatur.*

Alij Camphoræ ʒ. ſ. in ſpiritus vini ʒ. ij. diſſoluunt, & eodem modo vtuntur. Iuuat & ſequens gargarismus.

℞. *Rad. vrtic. ardent. m. j. Lauetur ter in aqua; poſtea ex vino; terantur optimè in mortariō cum Rad. pyreth. zingib. an. ʒ. j. Bulliant in vini alb. opt. lb. iiij. ad tertiās pro gargarismo, qui ſæpius adhibeatur. Commendatur etiam ſequens liquor odontalgicus.*

℞. *Cortic. ligni guaiaci lb. ij. maſtich. ʒ. j. vini bis deſtillati lb. ij.*

Digerantur in Sole per menſem benè agitando, donec rubefcant, poſtea colentur & clarificentur. Huius eſſentiæ ʒ. vj. vel vij. in ore detineantur.

Tedarum quoque & Pinearum decoctum prodeſt pro collutione oris.

Ipsi etiam denti dolenti applicentur Rad. oxylapath. aceto maceratæ, vt antea dictum; Vel spongia madida decocto staphydis agriæ, mirrhæ, cortic. radic. cappar. Vel ℥. Rad. *belenij, oxylapath. pyrethr. filicis, aluminis* vsti partes æquales. Contunduntur in puluerem & cum melle. Fiant pillulæ dentibus imponendæ. Vel ℥. Rad. *pyreth. 3. j. serpentar. filicis, oxylapath. alumin. vsti* an. 3. ℔. mellis q. s. Fiant pillulæ dentibus imponendæ. Trochisci de Pyrethro.

℥. Rad. *pyrethri 3. j. bistort. hyosciami, ana 3. ℔. alumin. tragacanth. ana 3. ij. aceti vini acerr. q. s.* F. l. a. trochisci.

Aut olei destillati cariophyllor. gutta vna vel altera cum gossypio denti imponantur, cuius 3. ℔. aliq. camphoræ ḡ. admisceri possunt. Idem præstant olea destillata spicæ, thymi, nuc. mosch. cinam. ligni iuniperi, ligni guaia-ci, & similia.

Suffitus etiam per tubulos conuenientes ore excipi possunt ex radic. bryon. pyrethri, cortic. radic. cappar. myrrha, thure in aceto & vino coctis.

Hodie fumum Nicotianæ ore excipere vulgatum est.

Vsu sæpe à me compertum, & efficax in dolore dentium à quacunque ferè causâ est remedium hæc oris collutio.

℥. Rad. *Filicis, pentaphyll. ana 3. iiij. bistort. 3. ij. Fol. rutæ, salu. betonic. Flor. rosar. rubrar. an. m. ℔.* Coqu. in vini rubri & astringentis & aquæ communis, an. q. s. ad consumptionem tertiæ partis, pro collutione oris. Extra applicetur hoc cataplasma.

℥. Rad. *Maluæ N. xij.* Coqu. ad mollitiem. Adde *farinæ fenugraci. Sem. lini, Pulu. anethi, Fl. chamæmeli, ana 3. j. farine bordei 3. iiij.* Incorporentur omnia simul & in fine addatur *ol. chamæmel, vel aneth.* F. cataplasma.

Si ob doloris vehementiam aliquod periculum metuum sit, narcotica vsurpentur.

E. G. Fiat oris collutio cum decocto rad. & fol. hyoscyami, vt & sem. eiusdem, ac sem. lactucæ & papau. cum aceto parato, cum ʒ. ℔. opij. Vel fiat collutio oris ex aceto, in quo opij grana aliquot sint dissoluta. Possunt & opij ḡ. ij.

℞. ij. cum æquali parte croci vel castorie bombace excepta in dentis cauernulam indi, si erosus sit: sin minus, opium & crocus in pauxillo lactis vel aq. papau. aut hyosciami dilui, & dentis dolentis radix eo fricari potest. Vel ℞. Fl. Chamem. anethi, ana P. j. Cort. rad. mandrag. 3. j. Sem. bioscy. papau. ana ℞. ij. Coqu. in aq. solani, plantag. rosar. an. 3. iij. Colentur. Colaturæ admisce, aceti rosar. 3. j. laudani opiatii 3. iij. M. Vel indatur deti pilula de laudano opiato, vel pilula de eynoglossa. Vel ℞. Laudani opiatii 3. iij. Sp. vitr. gut. j. M. F. Pilul. & dentibus vna indatur. Vel Theriaca recens aut Mithridatium vel philonium romanum, aut sotirella parua in dispensatorio Augustano descripta, denti illinatur. Vel ℞. Styrac. calamit. piper. albi, Cost. opij. Sem. hyoscyam. an. ℞. 3. F. Cum vino. F. Pilulæ dentibus indendæ. Vel indatur pilula vna de seqq.

℞. Sem. apij, hyoscyami, ana 3. iij. opij 3. iij. Cum syr. de papau. fiant pilulæ iij. vel v. Vel ℞. Philon. Romani 3. j. spir. ligni guaiaci ℞. j. M. Vel ℞. Rad. pyrethri, Sem. apij, an. 3. ij. hyoscyami, opij, an. 3. j. Cum syr. papau. fiant pilulæ N. v.

Aut admoueat cum gossypio oleum hyoscyami. Vel aliquid de sequenti mixtura cum bombace denti dolenti applicetur.

℞. Philon. Rom. 3. j. opij 3. vj. ol. vitrioli 3. v. M.

Balsamum ad dolorem dentium.

℞. Opij Thebaic. Spec. diamb. an. ℞. j. campb. 3. iij. ol. nuc. mosch. expr. ℞. ij. caryoph. gut. vij. vel q. s. F. balsamum.

#### Decoctum Langij.

℞. Opij Thebaici ℞. ij. succi hyoscyami ℞. iv. cortic. mandragoræ ℞. v. fl. chamemel. 3. j. 3. pyrethri ℞. v. croci integr. ℞. j. Infunde in vini tb. j. aq. rosar. 3. iv. & aceti opt. 3. vij.

Bulliant in vase duplici ad tertie partis consumptionem, & cum panno intincto dentibus colatura applicetur.

Cautio tamen in narcoticorum exhibitione adhibenda. Refert n. Alexand. Benedict. de cur. morb. l. 6. cap. 13. Iacobum Iustinianum, patritium Venetum, in dentis do-

lore oleo opiato imposito, Patauij sopore perpetuo extinctum fuisse.

Dolore sopito post opiatorum vsum os illicò abluatur decocto saluæ, roris marini, maioranæ, hyssopi, vt noxa ab opio impressa, tollatur.

A proprietate etiam valere dicuntur sequentia: Suffusus ex canis mortui dente, aut vstus ille in fornace cum posca misceatur & imponatur; Senectæ serpentis in aceto cocta, aut vsta eadem & trita, atque eum melle vel oleo ad mellis spissitudinem subacta, imposita. Dictamni quoque radix, & radix chelidonij, præsertim si vermes sint in dentibus.

Plinius plantaginis radicem in aceto coquere iubet. Decoctum etiam foliorum lappæ maioris cum sale in aceto commendatur. De Pastinacæ etiam marinæ radio scribit Plinius, lib. 32. cap. 7. si eo gingivæ scarificentur, dolorem dentium sedare.

A recentioribus etiam, consentiente experientia, plurimum commendatur oleum ligni heraclei per retortam destillatum, si gutta vna cum gossypio denti imponatur.

Nonnulla tamen horum ad manifestas qualitates reduci possunt, cum vel repellant, vel discutiant, vel dolorem sedent.

Si his nihil proficitur, dens corrosus extrahatur. Preparatur autem ad extractionem vt supra etiam dictum imponendo in foramen lac tithymali, vel solum, vel cum pulvere radic. mori aut cappar. mixtum. Aut, quo Galenus vtitur, rad. pyrethri 40. diebus in aceto macerata ac trita denti imponentur.

De pastinacæ etiam marinæ radio scribit Plinius, si tritus cum helleboro albo illinatur, dentes sine vexatione extrahi.

Facile quoque cadit dens, si cum aqua ex sale armoniaco destillata tangatur.

#### Dieta.

*Dieta.*

Dieta pro causarum diuersitate variat, & medicamentis respondeat. Imprimis tamen danda opera, vt dentes à corruptione præseruentur. Ideoque ratio imprimis ventriculi



culi & capitis habeatur, ne crapulâ & cruditate infestentur. Lactis item & dulcium, vt ficuum, mellis, faccari vsus frequentior cauendus. Raphanus quoque & masticatione & euaporatione nocet, sicut & porrum, quod à proprietate dentibus nocere author est Auicennas. Vitentur quoque acerbâ valde & acidâ : præterea solida & dura inimica sunt dentibus, ac stupefacientia, ac gelida, sicut & cæteris ossibus. Actû quoque vehementer calida præcipuè si frigida mox subsequantur. A cibo dentes diligenter mündentur, & *ἡμετέριον* est, vt dentes semper à cibo sale fricentur, & os vino eluatur.

Quod ad remedia præseruantia, commendatur sal theriacale, Galen. in lib. de theriac. ad Pisonem, c. 8. teste. A dolore dentium etiam præseruant collutiones oris ex iis, quæ astringunt; imprimis si medius cortex fruticis berberis aqua maceretur, & aqua mane os colluatur. Lauentur etiam dentes bis singulis mensibus vino, in quo tithymali radix cocta sit; eodem Galeno docente, l. de Euporist. cap. 10. & 2. cap. 16. Quibus locis plurima huius generis medicamenta reperiuntur. Prodest etiam pro collutione oris aqua saluix, vel vinum decoctionis origani, & mentastri. Dentifricia etiam adhibeantur frequenter, de quibus postea cap. 13. dicitur.

*De Doloze Puerorum Dentitionum.*

Et si, vt supra dictum, infantes iam dum in lucem eduntur, dentibus præditi sint: tamen gingiuis tum teguntur, Dolor infantium dentitionum. & postea demum erumpunt. Infantes autem, cùm dentes erumpunt, sæpè maximus dolor affligit. Et si enim, & alia symptomata dentitioni infantium coniungantur: tamen de iis omnibus agere huius loci non est, sed dicendum de eo de morbis infantium, vbi de dentitione in genere agendum erit.

Adest autem dolor maximus, cùm canini erumpunt, vnde etiam vulgatum est; Parentibus non esse gaudendum de liberis, donec hi dentes eruperint.

Cum verò dolor ille ferè à densitate & duritie gingiuarum existat, hæ rarefaciendæ & emolliendæ sunt. Oblinantur itaque lacte canino aut cerebro leporino, quod

nonnulli crudum assumunt, mellique permiscunt. Sed Galenus, in 11. de simp. med. fac. & Auicennas cocto vtuntur, toto scilicet capite elixo.


Valent & cerebella pullorum & auium. Aut gingiuarum pinguedine gallina aut anatis recent. inungantur, aut butyro recenti non salito, eoque vel solo, vel cum melle, vel cum decocto lactucæ permisto.

Commendatur etiam succus è cancri viuis contusus cum aqua flor. cyani extractus, si eo gingiue abluantur.

Si dolor vehementior sit, Auicennas succum solani cum oleo rosarum calefacit & illinit. Alij malagmate vtuntur ex semine lini & althææ, & aliqui pinguedine, vel si febris adsit, ex semine lactucæ. Vel ʒ. sacchari & butyri s. sale, succi althææ, an. ʒ. j. vitell. oui dimid.

M. Ambrosius Paræus, lib. 23. cap. 67. suadet, vt, si infantes ob gingiuarum duritiem de vita periclitentur, scalpello gingiuarum aperiantur, atque eius rei periculum cum felici successu in aliquot suis liberis se fecisse scribit.


Nonnulli & quædam periapta commendant. Aëtius radic. colocynthidos syluestris laudat, si canali argenteo includatur, & collo pueri appendatur. Alij dentem viperæ masculinæ appensum, iaspidem item viridem & dentem lupi dextrum, de quo Plinius, lib. 11. cap. 37. Dens dexter caninus lupi in magnis habetur operibus. Quæri tamen hic posset, an dens lupi id, quod præstat, gestatus præstet, an verò potius, quoddum eum infantes sugunt, & gingiuis admovent, eas hoc modo rarefaciat.



## C A P V T XII.

### De Dentium stupore & algore.

Dentium  
stupor.

 **D**entium stupor, Græcis ἀνωδία, est molestia & dolor quidam dentibus accidens ab acidis & acerbis præcipuè rebus, qui sensu rectius percipitur, quàm verbis describitur. Id malum ita occupat dentes exteriores, vt non solum mandantes ex eo intoleranter doleant: verum etiam ipsimet dentes digitis suis attingere præ dolore vix

re vix sustineant. Quapropter non satis commodè stupor affectus ille appellatur, qui est abolitio sensus : sed pertius ad dolorem pertinet, vnde rectè Capiuaccius, l. 1. *Pract. Medic. cap. 53.* hæmodiam dolorem dentibus proprium esse asserit.

Causa est sapor acidus, temperiem dentium immutans. *Causa.* Id quod accidit à cibis quibusdam huiusmodi sapore præditis. Idem euenit ab humoribus acidis & atra bile vomitu reiectis ; id quod multis affectione hypocondriaca laborantibus accidisse memini, qui tam acida vomitu reiecerunt, vt dentibus stupidi iis ita inde euaserint, vt per integrum diem vix aliquid comedere potuerint. Quod quandoque etiam præstant vapores acidi è ventriculo ad dentes elati. De quo etiam Hippocrates, lib. 2. *de morbis sub morbo nigro.* Aliquando & ipsis dentibus huiusmodi materia alieno sapore infecta innascitur, vel ad eos confluit.

Contingit etiam, vt ab imaginatione stupor eiusmodi inducatur, quando alium res acerbis masticantem videmus, aut strepitum limarum ; vel similium rerum audimus. Nam imaginatio occulto modo mouet humores in corpore, atque eos præcipuè, qui cum re, quam imaginamur, analogiam aliquam habent.

Fracastorius tamen, & probabiliter, *de sympath. & antipath. cap. 14.* ad auditus organum affectum causam refert, dum scribit : *Similiter & si acutus valde sit sonus stridulus, applicatio vim patitur, quasi in angusto facta, tum & membrana auditus quasi icta offenditur, vnde contrahitur repente, ac cum ea simul & neruuli quidam vsque ad radicem dentium, in quem locum subito incidens nouus aer horrorem quendam circa dentes facit.*

Medetur huic affectioni portulaca masticata, cuius succus lentore suo dentibus adhærens affinitate quadam, humiditatem acidam & acerbam è dentibus extrahit, vt disputat Aristoteles, 1. *problem. 38.* Et si hoc alij ad proprietatem substantiæ referunt, quâ & in apostematibus lienis portulaca prodest, & affriktione verrucas tollat. Rhafes & amygdalas amaras atque ceram masticatam commendat,


*Curatio.*

quæ temperatâ sua qualitate, ac vinctuositate illam quasi congelationem remittunt. Salem item affricare iubet, qui materiam liquefaciendo acorem è dentibus extrudit. Alij panem calentem, vt è furno extrahitur, masticandum exhibent, aut radices vel succum glycirrizæ aut pineas, auellenas, iuglandes. Alij caseum recentem commansum, & calidum oui vitellum commendant. Ægineta omphacium inunctum, vt & amurcam vetustam in æneo vase coctam ad mellis crassitudinem inunctam laudat. Confert & frequens oris collutio cum vino calido.

Collutio quoque oris commoda est ex aqua saluiz calente, vel decocto radic. aristolochiæ & baccar. lauri.

Cognatum stupori malum est, cuius Rhases meminit, cap. 44. quando dentes frigidi tactu imprimis offenduntur, quod malum Auicennæ est Ebet dentium; ac dentes tum ita afficiuntur, vt neque frigidum neque calidum, neque durum quid tolerant.

Causa est debilitas dentium ex intemperie siue frigida siue calida, & eorundem debilitas, seu vt alijs placet, nimia sensibilitas cum raritate texturæ. Plerumque verò ab intemperie est frigida. Ideo Rhases oleum excalesfactum ore tenere iubet, & vitelli oui assatum calidum masticare, aut calentem panem. Auicennas Hierâ simpl. aut Theriaca dentes fricat, vel masticentur lauri baccæ, aristoloch. anethum. In calida materia Auicennas fricat dentes cum oleo rosaceo tepesfacto, cui camphora & santali sint admixti: aut mucilaginem sem. psyllij, vel sem. portulacæ masticare iubet.



## C A P V T XII.

### *De Dentium stridore.*

*Dentium  
stridor.*

**D**entes naturâ etsi moueantur, dum voci formandæ & masticationi inseruiunt; tamen motus ille fit sine sono. Interdum verò p. n. sonitus accidit, qui stridor dentium appellatur.

*Causa.*

Causa eius est imbecillitas muscutorum maxillæ à frigore

gore, aut potius rigor quidam in ea accidens à frigore; vermes etiam per consensum cerebro affecto, vaporum multitudo, vt in paroxysmorum principiis.

*Prognostica.*

1. Stridor dentium, minatur apoplexiam vel epilepsiam, *Prognostica.*  
Valescus de Taranta,

2. In febribus dentibus stridere, quibus à puero minime est consuetum, insaniam & mortem significat. Quod si iam deliranti id accadat, admodum id exitiale est. Hippocrates *in coacis*. Potest tamen delirium cum dentium stridore dupliciter coniungi. Aut enim præcessit stridor, & secutum est delirium, vel contra. Si præcessit stridor, maniam, & mortem prædicere potest Medicus; quia cerebrum simul afficitur. Si verò antecedit delirium, & sequatur stridor, non semper exitiale malum denotat; quia prouenire potest à facultate imbecilla, non semper cerebro affecto.

3. Stridorem dentium etiam inter conceptionis signa refert Hippocrates *de superfatatione*.

Curatio ad ipsum stridorem dirigenda non est, sed ad *Curatio.*  
causas.

C A P V T XIV.

*De Dentibus nigris, malè coloratis & sordidis, & sanguinis è dentibus fluxu.*

**D**E N T E S natura sua albi sunt, quæ res vt naturalem *Dentes*  
dentium constitutionem indicat, ita ad decorem & *sordidi.*  
pulchritudinem hominis etiam facit.

Qui color si mutetur, quod sæpè accidit, dum dentes à naturali suo candore ad flauum, liuidum, nigrum colorem defleunt, vitium in qualitate mutata oritur, quod sæpè in dentium corruptionem, & grauiora vitia degenerat.

Accidit autem ista dentium foeditas ab humoribus vitiosis in superficie illorum hærentibus, à vaporibus sursum exhalantibus, à frequenti dulcium esu, à masticatione fructuum nigrorum, vt myrtilorum, mororum, à cibis

in vasis cupreis aut æneis asseruatis, ab inunctione argenti viui in lue venerea, vel ab eadem in fucis & pigmentis faciei adhibitis, vnde fœminæ, quæ ad faciem pingendam fucis ex Mercurio vtuntur, plerumque dentes malè coloratos habent. Interdum tamen etiam ab humoribus vitiosis & alimento prauo dentibus sese insinuante color eorum mutatur.

Ad dentium autem sordes tollendas & colorem vitiosum emendandum, vsitatissima sunt Dentifricia, parata ex iis, quæ sordes abstergere possunt; vt ossibus *sepiæ pumice*, præcipuè si igniatur & vino albo bis extinguatur, ac tertia vice ignitus spontè refrigerari sinatur, & puluerisetur; *Cornu cerui*, *corall. margarit. ocul. cancri*, *lapid. spongiæ*, *alabastr. cochl. testis combustis*, *radic. aristol. testis ouorum*, *mandibul. lucij*, *silicibus combustis*, *arena alba*, *masliche*, *sale*, *gummi iuniperi*, *tartaro*, *alumine*. Quibus ad suauem anhelitum conciliandum addi potest, *Cinamomum*, *lignum aloës*. *Radic. ireos*, *rosmarinus*, *flor. lauendulæ*, *rosarum*, *moschus*.

Vt ℥. *Alabastr. pumic.* an. 3. ij. *salis* 3. j. F. puluis. Vel ℥. *Oss. sepiæ* 3. ij. *test. ouor.* 3. j. ℞. *rad. ireos corallior. albor.* an. 3. j. *alum. roch. 3.* ℞. *maslich. rosar. rubr. an.* ʒ. v. *mosch. ʒ.* j. *Silic. alb. combust. vel aren. albiss. subtiliss.* ad pondus omnium F. pulu. Vel ℥. *Mandib. lucij. C.C. vsti præp. cor. præp.* an. 3. ℞. *aluminis vsti, radic. ireos.* an. 3. ij. *sal. gemmei.* 3. j. F. puluis. Vel ℥. *Oss. sepiæ, corall. albor. margarit. præpar.* an. 3. j. C. C. vsti 3. j. ℞. *pulu. rad. ireos, gummi iuniperi* an. 3. ℞. *aristol. rot. 3.* j. *lig. aloes.* 3. ℞. *mosch. ʒ.* ij. F. puluis. Vel ℥. C. C. vsti præpar. cor. alb. an. 3. ℞. *margarit. præpar. 3.* j. *maslich. ireos,* an. 3. j. *mosch. ʒ.* iv. F. puluis.

℥. *Corall. albor. rubr. an.* 3. ij. *lapid. spong. oss. sepiæ,* an. 3. j. C. C. vsti præpar. rasur. *eboris,* an. 3. ij. *maslich. 3.* iij. *gummi iuniperi 3.* j. ℞. *sal. torrefact. 3.* ij. *mosc. 3.* ℞. F. puluis. Vel ℥. *Pulu. crystalli 3.* ij. *corall. rubr. scobis C.C. albiss. & subtiliss.* an. 3. j. F. puluis. Vel ℥. *Pulu. ossis sepiæ, lapid. silicis vsti, pumicis vsti,* an. 3. j. ℞. *calaminar. 3.* ℞. *rad. ireos,* 3. ℞. F. puluis.

Ansh. Boëtius puluerem osteocollæ commendat. Potest & pulueribus saccharum, mel, vel oximel admisceri, & mixtura

mixtura Electuarij instar parari, qua dentes fricentur.

Vt ℥. Pulu. Corall. rubr. lap. crystalli, an. 3. j. off. sepia, lap. calaminar. myrrhæ, an. 3. j. alum. vsti, salis tost. C. C. vsti, lap. pumicis, an. 3. β. rad. ireos, calami odor. nuc. mosch. an. 3. β. panis albi tost. 3. iij. oxymel. scillit. q. s. M.

Hac mixtura dentes alternatim fricentur, postea lauentur oxycrato, vel aq. aluminosa cum aq. communi vel rosarum.

Alij solò melle rosato cum oleo vel spiritu vitrioli mixto vtuntur h. m.

℥. Mellis rosati col. 3. j. spir. vitrioli 3. β. M.

Secreti loco nonnulli commendant carbones & cineres stipitum rorismarini: quibus neoterici præferunt, & pro certissimo experimento habent cinerem nicotianæ.

Cardanus aq. & succum limonum ac citri commendat.

Vel ℥. Summit. myrthi, lentisci, oleastri, saluæ, rorismarini, an. m. j. corall. rubr. eboris, dent. equorum, an. 3. iv.

In fictili vase simul vrantur, addendo salis communis, p. j. donec omnia dealbata sint, & reducantur in puluerem, cui adde: Caryophyll. cinamomi, rorismarini, an. 3. iij. moschi 3. j. F. puluis. qui etiam excipi potest oxymel. scillitico, vel mucilagine gummi tragacanthi, aut Arabici, & inde styli formari.

Loco puluerum etiam styli ad dentes mundandos fieri possunt.

℥. Corall. rubr. prepar. pumic. prepar. an. 3. j. β. galliæ mosch. 3. j. sanguin. dracon. caryophyll. cinamomi, mastich. an. 3. j. mosch. ambr. an. 3. ij. Cum tragacanth. in aqua Rosar. dissol. F. Styli. Vel ℥. Lapid. pumic. 3. β. corall. rub. alb. C. C. prepar. an. 3. β. sanguin. dracon. 3. ij. gummi Arabici in aqua rosar. dissolut. & albumin. ouor. q. s. F. Styli.

In summa ne dentes malè colorati euadant, & corrumpantur, dentes à sordibus & cibis mundandi, verum non acumine cultri, cum dentes inde lædantur, sed dentiscalpiis ligneis, vel ex osse firmo ac flexili paratis, è spinis piseium aliquorum, osciculis, & tendinibus osseis gallinarum, item ligno lentisci, myrthi, lauri, iuniperi, cupressi. Os verò post cibum colluatur aqua falsa imprimis, vel vino.

vino. Commendatur ad dentes mundandos & hæc aqua:

℥. Sacchar. lb. ℞. sal. ℥. iij. alum. roch. ℥. j. ℞. Destillentur per alembicum. In aqua intingatur gossipium, & eo dentes fricentur: Vel ℥. Salis ammoniaci gemmei, an. ℥. j. alum. ℥. j. ℞. aq. rosar. q. s. Destillentur. Laudatur & sequens aqua.


℥. Sacchari lb. ij. alum. rochæ lb. j. vini albi generosi, lb. j. ℞. Destillentur s. a.

Destillato liquore dentes sæpius fricentur & mundificentur. Chymici oleum sulphuris commendant, vt & aquam fortem cum aqua communi temperatam, cum penicillo denti appositam. In ea nonnulli folia saluæ macerant, eisq; dentes fricant, qui postea vt glabri rursus fiant, melle rosato & sanguine draconis inungendi, osque eluendum. Sic enim statim dealbantur.

*De sanguinis è dentibus fluxu.*

*Sanguinis fluxus è dentibus.*


Nec prætereundum hoc loco, quod Balduinus Rouffetus, lib. de hominis primordiis & hystericiis affectionibus refert. Nos, inquit, quod supra communem hominum fidem est, Furnis municipio Flandriæ mulierem nouimus, cui forte fortuna, cum elisus esset dens molaris, soliti alioqui menses supprimerentur natura noxium illum, seculentumque sanguinem propellente, singulis mensibus ex elisi dentis vulnuscule sanguineus quidem gurgis, proportionè purgationi respondens, efflueret. Scribit etiam Hollerius, comm. 2. in sect. 2. lib. 2. aph. 18. Coacar. prædictiorum, se vidisse è loculo dentis longo tempore sanguinem profluxisse, qui nullis remediis cessit, ægrumque tandem sustulit.



## C A P V T X V.

*De Dente aureo Pueri Silesij.*


*Dens aureus pueri Silesij.*

 C loco vbi de colore dentium mutato agitur, non videtur omittenda quæstio, de aureo dente pueri Silesij. Anno enim Christi 1593. circa F. paschatos rumor innotuit, puerum quendam annorum septem, Cristophorum Mullern, in pago Vveigelsdorff in Silesia, cum ipsi dentes exci



excidiſſent, vltimi molaris loco dentem aureum ſucce-  
 uiſſe; cuius rei hiftoriam poſt anno Chriſti 1595. deſcri-  
 pſit, & publicè edidit D. Iacobus Horſtius, Medicinæ  
 Profeſſor in academia Helmſtadiana, qui ipſum partim  
 pro naturali, partim pro prodigioſo habet ſolatij loco  
 Chriſtianis à Turca tum afflictiſ exhibituſe ſtatuit. Eo-  
 dem anno 1595. eiufdem aurei dentis hiftoriam edidit Mar-  
 tinus Rulandus, cui ſeſe oppoſuit Ioh. Ingolſteterus anno  
 1597. contra quem ſuum iudiciuſ eodem anno defendit  
 Martinus Rulandus. De eodem aureo dente ſcribit etiam  
 Andr. Libaviuſ *part. 2. Singular. Diſſertat. 7.* qui diſputa-  
 tiones illas, in partem vtramque habitas, recenſet; quas  
 vt huc afferam, operæ pretiuſ eſſe non puto. Non entis  
 enim nullæ ſunt affectiones, & dens ille aureuſ nulluſ  
 fuit, ſed fucuſ meruſ, qui Vratiſſlaviæ demuſ detectuſ  
 fuit. Eiuſ rei hiftoriam ad me perſcripſit Dn. D. Michael  
 Doringiuſ, ſicut illam ex Dn. Dánielſ Bucretiſ Phyſici  
 quondam Vratiſſlavienſiſ relatione accepit, quæ talis eſt.  
 Puer ille cū Vratiſſlaviam deductuſ fuiſſet, & omneſ  
 nouitatis iſtiuſ miraculoſæ, (vt putabatur) cōgnoſcendæ ac  
 viſendæ deſiderio tenerentur, factuſ eſt, vt in Doctōrum  
 virorum conuentuſ ac concionem cui inter alioſ plureſ  
 Cl. D. Chriſtophoruſ Rhumbaumiſ p. m. etiam interfu-  
 it, vocaretur. Acciti & admiſſi dentem ſedulo contemplati  
 ſunt, qui ſplendore aurum Rhenanuſ repræſentauit. Ad-  
 fuiſt ſimul aurifaber. Iſ iuſſuſ frictione lapidiſ Lydiſ den-  
 tē examinauit. Linea affriccione inducta exiſtimabatur re-  
 uera eſſe aurum Rhenanuſ. Aurifaber igitur, rei veritatē  
 penitiuſ exploraturuſ, ipſi illeuiſ pigmentuſ aureuſ  
 Et ecce linea illa abſumta diſparuit. Protinuſ ergo de frau-  
 de ſuſpicio concipitur. D. verò Rhumbaumiſ, vt erat  
 ingenioſuſ & cauſuſ, inſpectionem repetit, atque ſupernè  
 dentem non integruſ ſed foraminulo pertuſuſ conſpica-  
 tur. Spatula igitur ferrea admota numquid lamina aliqua  
 orichalcea ſolū denti eſſe inducta explorat. Rem ita ſe  
 habere certiffimè inuenit, & reliquiſ ſpectatoribuſ oſten-  
 dit. Lamina enim illa per ſpatulam mouebatur, nihilquē  
 erat aliud, quàm medietas ( & forſan inaurata ) globuli,  
 qua

quales crumenis & marsupiis olim à foeminis in Silesia gestari solitis appendi consueuerunt. Detraxisset prorsus à dente laminam istam D. Rhumbaumius, ni deceptor restitisset, & se cum puero subduxisset. Fraudis enim hæc detectio pessimè habuit pueri istius circumductore, utpote qui nummos corrodendi occasionem sibi ereptam esse videbat: atque ita cum aureo isto dente euanuit ac disparuit. Quæ historia omnes Naturæ scrutatores meritò monere debet, ne causas rei, & τὸ αἶτιον, prius quærant, quàm τὸ ὄν, sit manifestum, & de re ipsa planè constet. In qua re tamen non rarò peccatur, dum de non Entis affectionibus & causis sæpè acriter & magno conatu disputatur.



## CAPVT XVI.

*De Gingiuarum affectionibus.*

*Gingivarum affectiones.*

**G**INGIVARVM etiam affectiones p. n. variæ sunt: nimirum luxuries ipsarum, dum præter naturam augentur, ut dentes propemodum integant: deinde flacciditas, dum caro earum mollis euadit, & faciliè sanguinem fundit; quod vitium scorbuto familiare est: contra eorundem corrosio & absumptio: Inflammatio ad radicem dentis, quæ παρυσίς, Celso παρὰ τοῦ ὀδόντος, (nisi mendum in textu est) abscessus παρυσίς ὀδού, sequens, qui si malè curetur, caruncula innascitur, ad intimos præcipuè molares, quæ ἰπυλὶς, dicitur, & aliquando cum aduerso buccarum musculo coalescit. Nonnunquam abscessus in vlcera, cancrum & fistulas, degenerat; interdum & gangræna gingiuas corripit, de quibus iam dicemus.

*De gingiuis excrecentibus, laxis, flaccidis, sanguinem fundentibus.*

*Gingiuarum excrecentes & laxæ.*

Gingiuarum caro ita sæpè luxuriat & incrementum sumit, ut dentes, præsertim molares obtegat, quod vitium παρὰ φύσιν ἔλα, gingiuarum luxuries, excrecentia, & dentium superincarnatio nominatur. Plerumque illa caro laxa sordida & flaccida est, & cruorem, si paulatim attingatur, de se fundit, & graueolet; id quod scorbuticis familiare est.

Atque accidit hoc vitium à sanguine seroso, vitioso, corrupto, copiosius ad gingiuas confluente; ad quam rem imprimis facit caro gingiuarum sua natura laxa, quæ humores affluentes faciliè suscipit.

Vt enim in vlceribus & vulneribus, vbi caro cute non tegitur, faciliè luxuriat: ita etiam gingiuarum caro, quæ cute crassa non tegitur, faciliè luxuriat.

Si luxuries ista carnis sit levis, & sine putredine, faciliè reprimendum & adstringentium usu comperitur, vt collutione oris cum aqua aluminosa, cum decocto balauft. gallar. fol. pruni, cortic. mori, & aspersione puluer. ex balauft. radic. bistortæ, corall. rubr. & pauco alumine.

Si verò gingiux putridæ sint, & grauem odorem spirent, fortiora requiruntur.

Commendatur hic peculiariter Aquilegia, & vnguentum ex Aquilegia paratum in hoc malo vtile est. Imprimis verò efficax esse sequens linimentum, multo usu comperitum est.

℞. Pulv. fol. aquileg. saluix, menth. crisp. nuc. mosch. an. ʒ. ʒ. ʒ.

Nonnulli etiam rutæ, & myrrhæ tantundem addunt, aluminis vsti ʒ. j. mellis puriss. ʒ. iv. vel. q. s. Mel leni igne despumetur. Despumato & calenti pulueres inspergantur. ℞. linimentum, quo gingiux inungantur. Vel ℞. mellis opt. ʒ. ij. aceti vini ʒ. j. fl. aris ʒ. j. alum. ʒ. j. Bulliant, donec rubefiant, adde, pulv. sabinae, nuc. mosch. an. ʒ. ʒ. C. C. præp. ʒ. ʒ. ℞. linimentum.

Præstantissimum quoque hic est decoctum summitatum rubi Idæi: Vtile est, etiam gingiuas cruentas & defluxione tentatas sæpius attingere, sale vsto. Idem præstat pulvis corallij rubri crudi, vt & antheræ rosarum, nec non collutiones ex vitriolo, alumine, myrrha, mastiche, & aceteto scillitico paratæ.

Vtilis est & oris collutio cum aqua saluix, plantag. prunell. & nasturt. aquat. Vel ℞. Radic. tormentillæ, cort. rad. prunor. sylvestr. hyperici, saluix acutæ, an. m. j.

Incisa coq. in vini lb. ii. ad consumptionem tertiæ partis. Colatura os colluatur.

Efficax est & hæc aqua, & in omnibus vlceribus sordidis gingiuarum, tonsillarum, palati, faucium, narium, & ozæmis utilis.

*℞. Mellis rosati, ℥. ij. sulfuris vini, aluminis crudi, an. ℥. j. alb. Græc. cimar sabin. an. ℥. ℞. spong. sambuc. 3. j. Fol. hyperic. vorismar. plantag. rutæ, saluiæ. puleg. an. m. ℞.*

Coq. in vino & aquæ lb. ij. ad consumptionem quartæ partis. Sub finem adde æruginis æris ℥. j. stent donec sponte refrigerint, postea colentur.

In colatura penicillum lana vel gossipio inuolutum intingatur, & locus affectus tangatur, vel gossypium aut stupa loco affecto imponatur.

Aëtius sumit alumin. vsti, thuris, myrrhæ, an. p. æ. quæ cum melle miscet & illinit, & postea os vino colluere iubet.

Eiusdem est quod efficaciter carnem corruptam gingiuarum absumit, & putredinem sistit.

*℞. Chalcitid. crudæ 3. iij. cadmiæ 3. j.*

Cadmia in aceto ad æstium Solem aliquot diebus conteritur, deinde adiicitur chalcitis, & similiter cum ea teritur affuso sæpè aceto. Postea ambobus exsiccatis, tritis, & cribratis vtere siccis, sed cum cautione, ne quid ex pharmaco in os deglutiatur.

Vel *℞. Alumin. scissil. flor. rosar. rubr. an. 3. j. sal. fossil. 3. ij. Croci 3. ℞.* Vtere sicco aut cum melle cocto.

Mel etiam rosatum, si vnciæ vni ol. vitrioli guttæ ij. addantur, vlceribus gingiuarum, & oris vtile est.

Vel *℞. Nuc. mosch. N. j. alumin. crudi 3. ℞. alb. Græc. suc. rut. millefol. chærefol. an. 3. ij. mellis 3.* Misce.

Vtilissimum est, si ante & post cibum os colluatur aqua, è qua sal excoquitur.

*De fluxu sanguinis è gingiuis.*

*Fluxus sanguinis è gingiuis.*

Interdum non solum laxæ fiunt gingiue, sed etiam sanguis ex his fluit. De quo Hippocrates, in Coacis lib. 2. comm. 1. sect. 2. aphor. 14. sec. distinct. Hollerij. Τὰ δὲ ἔλιν αἷμα-  
τα ἐπὶ κοιλίᾳ ὑπερβολικῶς. Sanguis de gingiuis, ab aluo liquidus lethale. Significat enim virtutis debilitatem in epate & venoso genere & in ipso sanguine vitium, vbi scilicet is est acris

acris & ~~hæmorrhoidis~~ : qualis in scorbuticis colligitur. Si ergo is per gingivas effluit, & alius symptomaticè solvatur, malum signum est.

Cui malo si curatio adhibenda sit, medicamenta, quæ ad gingivas laxas conueniunt, vsurpanda. Interdum tamen eiusmodi fluxus criticus est, & non statim sistendus. Ita apud Dodonæum, *obs.* 14. Latomo ecchymatis laboranti sanguis è gingivis erupit, quo represso ad vrinarios meatus delatus, ac cruenta vrina subsecuta est, quæ cum reprimentibus talis esse desisset, iterum ad gingivas se contulit, nec fluxus cessauit, donec æger sanitati restitutus est.

Ita refert Amatus Lusitanus, *cent. 5. curat. 5.* quibusdam hominibus sanguinem è gingivis effluxisse, qui, si fluxus non solito responderet modo in capitis dolorem inciderint, vt eum reuocare necesse habuerint. Et Iulius Alexandrinus, in *annot. ad cap. 11. lib. 2. method. med. Galeni* scribit, socrui suæ per intervalla quædam sanguinem è gingiua fluxisse, quasi venula aliqua inibi ex ~~avæ~~ *avæ* ~~aperta~~ *aperta*.

*De Gingivis carne denudatis, seu carnis gingivarum*

*consumptione.*

Vt gingivarum caro aliquando luxuriat : ita contra *Gingiua* nonnunquam imminuitur, & absimitur, vt dentes nudi *carne de-* conspiciantur & laxentur, ac vacillent; quod accidit ex hu- *nudata* more prauo & acri ad gingivas confluyente, easque erodente.

Danda igitur opera est, vt caro regeneretur.

Ergo *℞. Thuris, mastich. sarcocoll. sanguin. dracon. an. 3. j. F.* Pulvis, qui gingivis aspergatur. Avicennas sumit *thuris, mastich. aristolochiæ rotund. sang. dracon. farin. orob. rad. ireos,* an. 3. j. Pulverisata cum melle & aceto scillit. subigit, & eo gingivas fricat.

Possunt tali etiam linimento inungi.

*℞. syr. myrtbini, mellis ros. col. ana 3. s. diamori, dianuc. an. 3. 2. pulv. mandibul. lucij pisc. rad. bistort. nuc. moschat. an. 3. j. Misc. Vel 4. Mel. ros. col. 3. j. pulv. mastich. mirrh. thuris, nuc. mosch. an. 3. j. Misc. Vel 4. rad. Cyperi 3. ij. arist. rotund. sarcocoll. an. 3. j. s. mirrh. 3. j. rad. ireos, terræ sigillatæ, rasuræ C.C. an.*

3.℞.fol.myrti, flor.rosar. rubrar. an. P.j. santal.albor.rubr.an.  
3.j.℞.alumin. vsti, balaust.an. 3.ij. F.Pulvis, de quo aliquid  
in aqua fol.quercus ebulliat, & decocto os colluatur.

24. Cancros vinos N.vj. Radic.lappæ maioris 3.j. Contun-  
dantur in mortario ad pultis consistentiam. Diluantur cum  
aq. flor.cyani 3.xvj. Exprimantur per pannum linteum, la-  
uentur eo dentes & gingiæ.

De Gingivarum inflammatione, seu parulide, epulide, ulcere,  
cancro, fistula.

Gingi-  
varum in-  
flamma-  
tio,

Præterea etiam gingiæ quandoque inflammatione  
cum dolore corripuntur, apostema patiuntur, quæ in  
ulcera interdum cancrum, fistulas, gangrænam desinunt.  
Inflammatione, quæ Græcis *παρλι* dicitur, gingiæ cor-  
ripuntur à sanguine tenui, siue puro, siue cum aliis hu-  
moribus mixto, qui è capitis vasis in easdem defluit. Fa-  
miliaria etiam sunt ulcera gingivarum scorbuticis, de qui-  
bus in tractatu de scorbutico dictum.

Signa diagnostica.

Signa.

Malum ipsum per se visui patet. Et quidem, si mate-  
ria sit calidior & acrior, gingiæ magis rubent & calent,  
dolorque & punctio vehementius affligit. Si verò sanguis  
sit frigidior, rubor, calor & dolor est remissior.

Prognostica.

Prognos-  
tica,

Prognostica.

1. Inflammationes hæc, nisi statim reprimantur, in apo-  
stemata abeunt, quæ nunc citius, nunc tardius rumpuntur,  
pro tumoris magnitudine & humoris natura.

2. Non contemnendum est hoc malum, cum nisi matu-  
ris præfidiis ipsi succurratur, in apostema & ulcera diutur-  
na nonnunquam & in fistulam abeat. Sæpe & in cancrum  
incurabilem, ubi materia melancholica sicca, & adusta  
fuerit, quandoque & in gangrænam abit.

3. Si gingivarum inflammatio in gangrænam mutetur,  
insanabile plerumque malum est, ut aliquot exemplis de-  
monstrat Guillelmus Fabritius, cent. I. obs. 30.

Curatio,

4. Æstâtè in aurium inflammationibus quinto die eru-  
ptiones fiunt: est etiam ubi longius perdurant: sic & quæ  
circa gingivas & nares suppurationes contingunt. Hippo-  
crates, 6. epid. sect. 6. l. 24.

Curatio

## Cyratio.

Vniuersalia quod attinet, eadem methodo curanda hæc inflammatio, quâ aliæ inflammationes. Vena nimirum aperiatur in brachio. Ita Melisandro apud Hippocratem, 7. epid. sect. ultima, cum magno gingiuarum dolore corripereetur, & valde intumesceret, vena in brachio secta est. Potest & postea vena sub lingua aperiiri; & cucurbitulæ collo admoueri. Nec Topica multum discrepant; nisi quod gingiuarum, cum carne sint præditæ molli ac raræ, fortia medicamenta non tolerant. Ideoque dum nondum putrescunt nec corrosæ sunt, conueniunt medicamenta, quæ asperitatis & mordacitatis sunt expertia. Nam acria insigniter nocent, & proinde in gingiuarum dolore ab aceto abstinendum. Et primum quidem phlegmones generatio impedienda est, & reprimenda institutis oris collutionibus & gargarismis ex decocto fol. quercus, nucû cupressi, balustior. ros. rubr. aqua plantaginis, prunellæ, saniculæ, portulacæ, veronicæ, fragor. fol. quercus, cum succo vel roborum mororum in iis dissoluto, vel roborum nucum, ribes, berberum fragorum, syrupo granato cum violarum, rosarum ficcarum, myrtino, oxyfaccharo simpl. melle rosato. E. g.

℥. Aq. plantag. prunellæ, an. ʒ. iij. rosar. rubr. ʒ. j. ʒ. diamori ʒ. vj. mellis rosati col. ʒ. iij. salis nitri præp. ʒ. ʒ. Misce. Vel ℥. Aq. semperuiui, plantag. centinod. min. an. ʒ. iij. ʒ. mellis rosati ʒ. j. nitri præ. ʒ. ʒ. M. Vel paretur tale decoctum.

℥. Herb. prunell. plantag. an. m. j. fol. ros. rubr. P. iij. balustior. ʒ. ʒ. rad. glycyrrh. ʒ. j. cerasor. exsiccat. ʒ. ij. Concisa & contusa coq. in aq. bord. simpl. pro ʒ. ix. In quibus dissolue robor. fragor. ʒ. vj. syr. violæ. ʒ. iij. nitri præp. ʒ. j. ʒ. M.

Galenus, 5. de comp. med. sec. loc. c. 9. scribit; gingiuis ex inflammatione dolentibus optimum remedium esse ol. lentiscin. temperatè calefactum in ore retentum, idque recens. Nam oleum quod vetustius, eò calidius. Habet illud oleum vim moderatè reprimendi & discutiendi. Aëtius prisana gingiuas colluere iubet. In causâ frigida aliquid de resoluentibus calidis admisceatur, vt de alum. vsto vel sale. Aut decoctû fiat ex sem. lini, fol. agrimô. cû exiguo alumine, pro collutione oris. Vel paretur tale decoctum.

℥. Hord. integri m.j. fl. malu. arbor. P. iij. rosar. rubr. P. ij. rad. glycyrrh. 3. iij. iuiubar. N. vij. caricar. ping. N. iij. Coqu. in f. q. aq. fluuiatil. ad tertias. Colentur, colaturæ ℥. 3. viij. In quibus dissolue oxymel. simpl. mell. rosati collat. an. 3. j. diamori 3. 8. lap. prunellæ 3. ij. M. pro gargarismo. Alumen etiam vstum & tritum parotidas comprimit, teste Aëtio.

Si apostema ad maturationem tendat, gingiux butyro inungantur. Deinde apostema aperiatur decocto caricarum lini, fænugræci, & similium. Vel caricæ per medium discissæ imponantur. Si abscessus sponte non aperiatur, scalpello aperiri potest. Apertus abscessus hydromelite, collutionis & gargarismi instar adhibito, mundetur. Tandem vlcus exsicceetur & claudatur.

Interdum verò apostema in vlcus desinit, & quidem nunc vlcus simplex est sine corrosione & putrefactione, nunc verò corrodendo serpere incipit, vt non tantum & ~~rosar~~ gingiuarum fiat; quod accidit cum humores falsi, acres aut prauī affluunt. Curantes autem talia vlcera, si sint simplicia, exsiccantibus & adstringentibus medicamentis, collutione scilicet oris cum decocto agrimonix, rosar. balaustior. cupul. gland. aceto scillit. alum. myrrh. Vt ℥. Agri- mon. m. j. balaust. rosar. rad. aristoloch. rotund. an. 3. ij. Coquantur in vino. Colaturæ

℥. 8. j. acet. scillit. 3. ij. M. Vel ℥. Rad. aristoloch. rotund. balaust. flor. rosar. rubr. an. 3. 8. myrrh. alumin. an. 3. ij. cinamom. spic. an. 3. j. F. Puluis, qui diuidatur in duas partes; vna cum melle redigatur in formam linimenti, quo dentes inungantur, puluis verò aspergatur vel affricetur.

Si vlcus in fistulam transeat, fortioribus vtendum, vt: ℥. Gallar. cupul. gland. flor. rosar. balaust. cortic. granator. an. 3. j. Coqu. in vino pro collutione oris. Iphis verò gingiuis hic puluis inspergatur.

℥. Gallar. sumach. gran. myrrh. cupul. glandium, semp. plantag. ana 3. j. vitrioli albi, alum. scissil. an. 3. iv. anther. rosar. 3. ij. F. Puluis. Vel ℥. Mastich. gummi iuniperi, acaciæ; hypocistil. an. 3. 8. tutiæ præpar. 3. 8. vitrioli albi 3. ij. F. Puluis.

Vtilissima verò & efficacissima est hic aqua viridis, suprà de gingiuarum excreſcentia & laxitate proposita.



Si in cancrum degeneret vlcus, Gordonius hoc vtitur.

*℞. Rad. bellebor. aristoloch. long. ℞i, aluminis vsti, gallar. balaust. p. a. & cum succo fol. oliuar. vel agrimon. & melle. F. vnguentum, quo gingiuar. cariosæ illinantur.*

Si verò post inflammationem gingiuarum carnis ex-  
crescentia quædam emergat, iuxta dentes molares, quam Epulida vocant, quod accidit aliquando cum febre & vehementi dolore internæ mandibulæ, vtitur Aëtius medicamentis, quæ inflammationem solvunt, atque os colluere hidromelite, ptisana, decoct. semin. lini iubet, totam item mandibulam contegere cataplasmate, ex hydromelite & semin. lini. Postea ad ipsam carunculam siccantia medicamenta admonet, quale est pulvis alumin. vsti aspersus, aut qui Recipit *℞iis viui, piper. alumin. scissil. p. a.* Efficax hic est & vitriolum. Vel *℞. Pulu. gallar. ʒ. j. B. alumin. 3. j. F. Pulvis.*

Vbi verò tardius consumitur, exedens apponit, quale est ærugo per se, vel cum æquali parte gallarum. Æger autem in æruginis usu monendus, ne saliuam deglutiat. Exeditur etiam interdum aqua forti, aqua regis, & oleo vitrioli.

Utilis est hîc aqua viridis, cuius antea facta mentio. Si nec his tollitur epulis, forcipe correptam ferro excindit, & vlcus, vt par est, curat. Debétque os post sectionem illam cum decocto myrrhæ & pauco sale collui.

## C A P V T X V I I.

### De Maxillarum morbis, & Symptomatibus.

#### Fungi maxillarum.

**M**axillæ etiam suos morbos patiuntur. Inter eos autem primò sunt fungi dicti, qui etiam interdum è cerebro nascuntur, vt supra, lib. i. part. i. cap. 25. dictum est, læsa proculdubio aliqua fibra neruea, aut membrana. Ita memini cuidam puero dentem ore extractum, & proculdubio

Maxil-  
larum  
fungi.

dubio neruum vel membranam nerueam substratam læsam esse, è quâ fungus postea enatus est, qui penè totum os repleuit, & puero etiam mortem attulit.

*Syderatio maxillarum.*

*Maxil-  
larũ sy-  
deratio.*

Syderantur etiam nonnunquam maxillæ post dentium dolorem. Ita 5. *Epidem.* Metrodori puero ex dentis dolore syderatio & supercrescens in gingiuis caro, ac moderata suppuratio contigit, & tum molares, tum maxilla ipsa deciderunt.

*Maxillæ cum Capite connexio.*

*Maxilla  
cum ca-  
pite con-  
nexio.*

Maxillæ inferior pars capiti per articulationem coniungitur, vt liberè moueri possit. Contrarium tamen exemplum, vbi maxilla inferior capiti planè connata & coniuncta fuit, supra è Columbo, *anatomie lib. 15.* retulimus.

*De maxillæ inferioris iunctura soluta.*

*Maxilla  
inferioris  
iunctura  
soluta.*

Aliis plerisque animalibus maxilla inferior ex ossibus duobus per symphyfin iunctis constat, & in homine, etiam in infantibus bifida est, & cartilagine copiosa in medio mento iungitur: in adultis tamen ita coalescit, vt ne coctione quidem separari queat. Violentia tamen magna interdum hæc coniunctura solui, & ossa hæc separari possunt.

*Prognos-  
tica.*

Malum periculosum est, si in partem posteriorem os recedat. De qua Hippocrates, *in coaccis.* In neruorum distentionibus & in iis, quæ in posteriorem partem sunt, dissoluta maxilla mortem afferunt.

*Curatio.*

Quapropter curationem etiam tradit Hippocrates, *in lib. de articulis com. 2. t. 33.* Si compago, inquit, maxillæ ad mentum dissideat, reponere os cuiuslibet hominis est. Quod enim eminet, admotis digitis ab exteriori parte introrsum propellendum: quod intra inclinatur, iniectis digitis repellendum extrorsum est. Id autem distentione prius adhibita sic vt ossa distent, faciendum. Reposita maxilla postea, vt ibidem docet, deliganda est.

*Maxil-  
larũ lu-  
xatio.*

*De maxillarum luxatione.*

Luxationem etiam patitur maxilla inferior. Quod quidem non faciliè accidit, cum ob articulationis naturam, quæ

quæ vndique ossibus, circumuallata est, tum ob musculorum robur, quos plures & validos obtinet. Si tamen luxetur, tantum in priorem partem propellitur & luxatur, vt Galenus, *comm. 2. in lib. de articul.* & Celsus, *lib. 8. cap. 12.* docent, & ex anatome patet. Ad posteriora enim luxationem os impedit; ad dexteram finistram maxillæ caput; ad finistram dextrum caput. Et quidem luxatur vel altera tantum parte, vel vtraque. Vt autem luxetur maxilla, necesse est, vt processus rostro similis, acutus etiam dictus, qui sub iugali osse inseritur, ipso osse iugali humilior fiat, & extra os iugale feratur. Fit hoc non nisi maximæ oris apertione, vt in nimia oris in oscitando dilatatione, vel si aliquid magnæ molis ore apprehendatur.

*Signa diagnostica.*

Si maxilla luxata sit, os claudi nequit, masticatio tollitur, locutio deprauatur, saliuæ ore ægro inuito profluit. Et quidem si maxilla ex parte vtrâque sit luxata, os magis hiat, nec lingua ad loquendum liberè moueri potest, vnde fit babuties, & maxilla inferior cum superiore non potest committi, sed maxilla inferior tota magis prominet, etsi ordo dentium inferiorum & superiorum respondeat, & canini sint sub caninis, molares sub molaribus. Processus etiam ossis rostrum referentis extra malas vtrinque eminentes apparet, & temporales musculi rigidi ac duri sunt. Si verò ex vna parte tantum luxatio facta sit, à parte illâ in anteriorem maxilla magis prominet, & in aduersum ipsa & mentum inclinatur, & os distorquetur, nec ordo dentium inferiorum & superiorum sibi respondet, sed incisoriis sunt canini.

*Signa.*

*Prognostica.*

1. Periculo non vacat maxillæ luxatio, & propterea quamprimum reponenda est, priusquam musculi affecti cerebrum in consensum trahant propter neruorum ramos, qui à secundo & quinto cerebri pari orti in musculos maxillam mouentes inferuntur.

*Prognostica.*

2. Si maxilla luxata suo loco non restituitur, periculum mortis imminet, & quidem plerumque circa diem 10. & febris continua excitatur, & dormiendi inexpressibilis

gnabilis necessitas, & bilis sincera per aluum & vomitum reiiicitur.

3. Si ex vtraque parte maxillâ luxata sit, difficilius restituitur, quàm si ex vna tantum; & propterea luxatio ex vtraque parte periculosior est, & omnia symptomata sunt vehementiora. Nam omnes quatuor muscoli maxillam sursum trahentes, afficiuntur, & cum iis nervi inserti, unde dolor exoritur, & ex dolore inflammatio & febris acuta, & per consensum nervorum etiam os ventriculi afficitur.

4. Si post maxillæ restitutionem duodecim dies elapsi sint, periculum relapsus non ita faciliè amplius metuendum.

*Curatio.*

*Curatio.* Danda ergò opera, vt quamprimum maxilla restituantur, antequam dolor & inflammatio accedat. Si verò iam spatium aliquod temporis à factâ luxatione elapsum sit, vtendum prius medicamentis emollientibus & laxantibus, antequam restitutio tentetur.

Videndum verò primò, an ex vna, an verò ex parte vtraque facta sit luxatio. Si ab vnâ saltem parte, æger vel in sedili collocetur, vel resupinetur in puluinari, & caput eius immobile à ministro teneatur. Postea Chirurgus pollices lineis vel linteis vel fasciis subtilibus inuolutas in eius os immitat, & molaribus dentibus imponat, reliquâ manu extra maxillam ad mentum apprehendat, eamque deorsum trahat, deinde retrò versus guttur compellat, postea ad oppositum latus agitet, & simul rursus impellat, ægròque imperet, vt os claudat. Atque hæc omnia vno ferè momento fieri debent, vt Celsus inquit.

Si verò ex parte vtraque sit luxata maxilla, eodem modo restituenda est, præterquam quod ad latera non est agitanda maxilla, ideòque primò maxilla deorsum trahenda ob musculos, qui processum acutum rostro similem trahunt, qui infra ossis iuguli processum trahi debet. Secundò retrò æqualiter propellenda, quia luxatio in partem anteriorem facta. Tertiò sursum & in locum suum

compellenda. Maxilla in suum locum restituta, danda opera, ut in eo retineatur, & non iterum excidat. Itaque medicamenta ex oui albuminibus, & pulueribus adstringentibus apponi debent; ac si dolor adsit, muscoli oleo rosaceo inungendi. Fascia quoque mento apponatur. Hinc ad aures adducatur, & tandem in capitis vertice colligatur, ut maxilla restituta in suo loco retineatur. Videatur Hippocrates, 2. de articul. & Galeni in eum commentar.

## De Maxilla fractura.

Tandem Maxilla aliquando frangi potest ictu, casu duodecim & similibus causis. Aliquando etiam in dentium extrusione pars auelli potest. Quod malum per se facile patet.

Consolidantur autem ossa maxillae facile, & quidem 21. diebus, & celeriter callus increscit; cum sint medullosa, & laxa: quod si non recte reponantur, dentes vitiantur, atque inutiles redduntur.

Si verò quid de maxilla auulsum sit, id restitui non potest. Quomodo autem maxilla fracta componenda sit, docet Hippocrat. 2 de artic. qui ibi videatur.

## De Maxilla inferioris immobilitate.

Symptoma etiam quoddam occurrit circa maxillam inferiorem. Cum enim facta sit mobilis propter sermonem & masticationem: cum illa mobilitas tollitur, præter naturam sese habet. Fit autem hoc in tumoribus circa articulum, cum destillationes in articulum circa auriculæ radicem fiunt, & ibi tumores atque inflammationes accidunt. Idem accidit in fracturis, luxatione, maxillae cum capite coalitu. Pertinet huc & rigiditas illa genarum scorbutica, cuius in tract. de Scorbuto, cap. 5. facta est mentio. Non absimilis videtur illa maxillarum rigiditas, cuius meminit Hippocrates, 5. epid. num. 23. in eod. Foessy, in Eumelo Larisseo, cui crura, manus, maxillae rigeabant.

Signa & Curatio patent è morbis, à quibus immobilitas ista pendet.

## DE ORIS VITIIS.

## CAPVT XVIII.

*De Oris inflammationibus, & ulceribus.*

**E**QV VNTVR iam oris vitia. E morbis sunt, Oris inflammatio & vlcera. E symptomatibus; Oris foetor, de quibus ordine dicendum.

Et primò quidem oris Inflammationem quod attinet, nonnunquam ex sanguine & calidis ac biliosis humoribus partes oris internæ, Palatum scilicet & fauces inflamman-  
tur. Interdum inflammationem excitanti sanguini etiã humores maligni coniunguntur, vti in Thaso accidit, apud Hippocr. 1. epid. sect. 1. statu I. Inflammationi etiã causam præbent inunctiones ex hydrargyro, è quibus sæpè inflammatio, gangræna & sphacelus excitatur, vt aliquot exemplis docet Guil. Fabric. cent. 2. obseru. 92.

*Signa.*

Malum per se visui patet. Humoris etiã eam excitandis natura è suis signis cognoscitur.

Est autem inflammatio nunc periculosior, nunc minus periculosa, pro humoris peccantis natura. Etenim inflammationes oris, quæ ex solo fiunt sanguine, sunt mitiores; difficiliore, quæ ex sanguine cum bile misto generantur. Perniciosiores etiã sunt oris inflammationes, quæ cum febre fiunt, quàm quæ sine ea sunt.

*Curatio.*

Vt in aliis inflammationibus; ita etiã hîc, si non in vniuerso corpore abundet sanguis, vena primum aperienda; si alij vitiosi humores, purgatione vtendum. Hinc ad Topica veniendum.

Quod si neutrum horum affuerit, statim ad Topica accedendum. Requiritur autem in principio quæ refrigerant, & repellunt atque adstringunt; In incremento &

statu

statu post aliquid discutientium addendum.

Colluendum ergo os sero lactis, in quo flores rosarum, summitates rubi vel vitis cocta sint; aut decocto plantaginis, prunellæ vel aquis inde destillatis, quibus diamorum dianucum, syrupus violarum, & similia addenda. Ad discutiendum flores chamæmeli addi possunt.

Si tumor discuti non possit, sed suppuratio expectanda sit, adiuuanda ea & maturanda. Cui rei seruiunt caricæ appositæ. Vel coq. furfur in aqua, dum lentescat (commodum est etiam ficus addere) Colaturæ mel adde.

Eligenda autem semper sunt talia medicamenta quæ neque sapore ingrata sunt, neque aliquam prauam aut venenatam qualitatem obtinent, qualia medicamenta Græci *συνγνῆς*, appellauerunt, & apud Galen. 6. *de compos. med. sec. loca.* describuntur.

Reliqua ex iis, quæ iam de oris ulceribus dicentur, patebunt.

*De Aphthæ, & Oris ulceribus.*

*Ἀφθῆ*, equidem dicuntur in specie superficialia oris vlcera quæ infantibus præcipuè accidunt. Interdum tamen etiam latius hoc nomen ab autoribus extenditur, & aliarum etiam partium vlcerebus tribuitur. Ita Hippocrates, l. *de natura mulieb.* & *de morb. mulier.* *ἀφθῆν τὰ αἰδήνα*, scribit, & *de Coacis prænot.* *ἀφθῆδία ἐδύμην*, in orificio vteri nominat. Et 2. *de morbis*, fistulam pulmonis aphtha, id est, vlcere feruido laborare dicit; & Galenus, 9. *de comp. med. sec. loca.* *διδύμης ἀφθῆρμος*, nominat. Verùm, vt dixi, propriè aphthæ sunt exulcerationes quædam in summa oris superficie, igneæ quippiam caliditatis habentes, vt definit Galenus, 6. *de compos. medic. sec. loc. c. 4.* Hærent enim in summa cute, & serpunt in palatum, gingiuas, linguæ latera, eiusque radicem. Interdum profundius sese demittunt, & palatum carnemque linguæ exedunt, cuiusmodi Gallicæ oris pustulæ esse solent, præsertim ab inunctione cum argento viuo. Galenus tamè, quæ putrescunt & exulcerantur, aphthas non amplius nominandas censet, sed erosiones potius, & oris vlcera, quæ & remedia planè peculiaria postulant.

Itaque

Itaque etiam de oris vlceribus postea seorsim agemus. Ita Auicennas Alcolas vocat, quæ oris vlcera esse dicit cum expansione & dilatatione, seu vt vulgus appellat, vlcera oris ambulantiæ. Mitius verò malum eidem est. Bothor in ore, quæ pustulæ sunt non serpentes, sed tales, quæ faciliè suppurantur, & delentur, etsi nonnunquam leuiter eas suppurare contingat. Estque Bothor generalis appellatio etiam pustularum faciei, pulmonis, & aliarum partium, & variolæ ac morbilli etiam Bothor ab Arabibus nominantur.

Affectio ipsa, cùm exulceratio quædam oris sit, ad solutam vnitatem pertinet cum intemperie. Pars affecta est os interna & summa sui superficie, ita vt malum etiam gingiuas, linguam & nonnunquam gurgulionem comprehendat.

*Causæ.*

Gignuntur aphthæ interdum primario in ore, dum ibi prauī humores collecti sunt, quos natura foras expellit; plerumque verò secundario per consensum siue totius, siue alicuius partis. Totius, vt in febribus acutis, & præcipuè malignis, vbi acres & feruentes halitus, per fauces, venas, arterias, & occultos corporis meatus ad os eleuantur. Vnde etiam febribus malignis malum hoc familiare est, atque in iis vlcera hæc potissimum fauces occupant, & sæpè tam sæua sunt, vt depascentia fiant, simulque cum faucibus etiam asperam arteriam & gulam attingant. Partis, vt quando vel à capite acres: feruidi & erodentes humores in os defluunt, præsertim biliosi, pituitosi & falsi; Vel à ventriculo, vt postea de infantibus dicetur, pulmone, epate, liene, vtero, eiusmodi halitus sursum mittuntur, à quibus primò pustulæ in ore excitantur, quæ sæpè postea in vlcera desinunt, pro corruptionis & materiæ in hac diuersitate. Cùm enim summæ oris partes carne consistant molli & tenera, quàm cuticula tenuis inuestit, faciliè ab occursu acrium lædi possunt.

Non solùm verò ab internis hisce causis aphthæ oris existunt, sed etiam ab externis, vt ab acredine eorum, quæ comeduntur aut bibuntur, aut alio modo assumuntur.



lāt. Ita in lactētibus infātibus aphtharum caussa est aut lac nutricis nimis serosum, acri sua absterfione summas, easque molles admodum in ætate illa partes exulcerans, teste Galeno, 3. *aph.* 24. aut, vt in 6. *de compos. med. sec. loc.* addit, lactens ipse, si lac haustum non probè concoquat, vnde euaporatio acris vel putrida sursum è ventriculo attollitur: nam lac in ventriculis intemperatis faciliè corrumpitur, vt biliosum, acidum, vel aliter deprauatum euadat.

In vtrisque, in adultis scilicet & infantibus adiuuant hanc malam affectionem constitutio aëris calida & humida, pluuiosa, humores putridos gignens, ita vt Epidemium nonnunquam hoc malum fiat. Hinc etiam in regionibus calidioribus, vt in Syria & Ægypto frequentiora sunt ista vlcera, inde etiam Ægyptiaca & Syriaca antiquitus appellata, teste Aretæo. Cibi in ventriculo corrupti, esus fungorum & aliorum, quæ faciliè corrumpuntur, ac malignitatem acquirunt.

#### Differentiæ.

Quod ad differentias aphtharum, ex ex Galeno, 6. *de compos. sec. loca cap. ult.* & ex 3. *Epidem. comment. 3. aph. 12.* sic discerni possunt.

*Differentia.*

1. Tempore. Aphthæ enim aliæ incipientes sunt, aliæ vigentes, aliæ inueteratæ; atque ita quædam leuiiores, quædam deteriores.

2. Corporibus Subiectis. Nam alia mollia infantium & puerorum corpora occupant, alia duriora adultorum.

3. Materiâ, eiûsque prauitate. Quædam enim inflammatæ sunt, eæque calidæ & rubicundiores ex sanguine; quædam igneæ, & flauiores ex bile; quædam non inflammatæ, minûsque feruidæ, ex pituita putrescentes; quædam denique ex inueteratis atræ bilis malignitatem exurentem acquirunt. Vnde constat, aphthas ratione materiæ alias mitiores esse, alias vt Galenus, 3. *Epidem.* nominat, *κακονδεις*, quæ ex putridis & malignis humoribus ortum habent.

4. A parte affecta, quæ sumitur distinctio est quod Aphthæ vel in palato hærent, vel in lingua, vel in gingiuis,

uis, vel in labiis, vel in faucibus & gurgulione. Quas partes vel superficie tenus vlcérant, vel profundius erodunt, late serpendo pro malignitatis gradibus.

Postremò ratione accidentium & symptomatum, quædam, cum vehementi dolore sunt coniuncta, quædam absque eo sunt; aliæ cum febre sunt; aliæ febre carent: Alia sunt munda, alia fordida; alia sine crusta, alia cum crusta, & crusta aliquando alba, aliquando flaua, aliquando liuida, aliquando nigra.

*Signa Diagnostica.*

*Signa.*

Aphthæ faciliè cognoscuntur. Partes enim oris calidiores deprehenduntur, & hinc inde vlcuscula seu tubercula quædam conspiciuntur. Et pustulæ rubicundiores sanguinem præualere ostendunt; flauiores, atram bilem, albescentes, pituitam; liuescentes & nigrescentes, atræ bilis succum: quæ serpunt & vicina depascuntur, iis acridinem inesse significatur, & quidem malignitatis non expertem, si ad nigredinem tendant; si foeteant, putredo adest. Causæ externæ, vt eorum, quæ edantur & bibuntur acrimonia, atque alia ex ægri & astantium relatione cognoscuntur.

*Prognostica.*

*Prognostica.*

1. Aphthæ recentes, præsertim in mollioribus infantium corporibus faciliè curantur moderatè adstringentibus; quoniam ex mitiore materia oriuntur: ægrè sanantur, quæ diuturnæ sunt, & progressu temporis putredinosum quid acquirunt, quæ generis vocabula *νεκρά*, à Græcis dicuntur. Galen. 6. de compos. med. sec. loca cap. 4.

2. Aphthæ antiquæ & exulceratæ longè periculosissimæ sunt in infantibus. Hos enim consumunt. In adultis verò idem periculum non est. Pueris enim, præsertim lactentibus, imperari remedium aliquod (ad gargarisandum imprimis) nequit, quemadmodum adultioribus. Celsus, lib. 6. cap. 11. Loquitur igitur Celsus de Aphthis infantium non recentibus & mitioribus, sed de inueteratis & malignis, quæ à gingiuis incipiunt, & deinde serpendo palatum totumque os occupant, & ad gurgulionem faucesque descendunt. Hæ cum validiora remedia postulent, quæ

quæ mollia puerorum corpora non ferunt, iisque ut ipsi per facultatis animalis in illa ætate imbecillitatem nequeant, malum ob has causas ita inualescere necesse est, ut ægri infantes tandem ab eo consumantur.

3. Aphthæ ex pituita minus infestant; quàm ex sanguine aut bile; quæ verò ex bile atra ortum habent, ut malignitatis, ita nec periculi sunt expertes.

4. Aphthæ, præsertim inueteratæ, ideo quoque difficulter curantur; quoniam medicamenta vel ritè applicata, tamen à saliva facilè eluuntur, præterea malum breui inualescit ob loci naturam calidam, & humidam, unde putredo sequitur & vlcus *edrophov*, Pars quoque cum valdè sensibilis sit, facilè ab acris medicamentis, quibus tamen ut interdum cogimur, irritatur. Ac denique metus est, ne quid cum periculo de medicamentis acrioribus in fauces delabatur. Galenus, 6. de compos. med. sec. loca.

5. Quæ Aphthæ in pueris nigrae sunt, & veluti crustæ, pessimæ & mox lethales sunt. Paulus, lib. 1. c. 10.

6. Quando Aphthæ adhibitis conuenientibus remediis non cedunt, sed putrescunt, & corrodingo profundè descendunt, malignæ sunt, & fortioribus medicamentis opus habent. Si autem mala symptomata alia coniungantur, & æger debilis, mortem nunciant.

7. Quando pustulæ nigrae per febres acutas & pestilentes in ore & lingua apparent, mortem breui secuturam significant; teste Auicenna, ob materiæ malignitatem, & virtutis infirmitatem. Et Hippocrates inquit, 3. prognost. aph. 15. Fauces exulceratæ cum febre difficiles sunt, quia ut Galenus explicat, malitiam erodentis humoris indicat.

#### Indicationes.

Aphthæ ipsæ, quatenus vlcuscula sunt, in principio *Indicationes.* adstringentia & repellentia requirunt. In progressu morbi addantur ea, quæ adstringunt, & simul discutunt. Si ad suppurationem tendant, maturantibus illa adiuuanda.

Sordidæ Aphthæ, extergendæ, & si putrescere, vel etiam serpere iucipiant, fortius adstringentia; & quæ escharotica sunt, adhibenda. Et quia in ore sapores percipiuntur, ingrata sapore medicamenta, quantum fieri potest,

test, vitanda sunt. Deinde qui os ventriculo & pulmoni co-  
hæret, vtendum iis, quæ sine periculo (si forte ita contin-  
gat) deglutiantur, non cathæreticis aut septicis; aut si  
his vti necesse est, prouideatur ne per gulam ab ægro de-  
mittantur. In corporibus etiam, quæ duriora & sicciora  
sunt, medicamenta valentiora conueniunt, molliora ve-  
rò mollioribus, vt puerorum, & foëminarum corporibus.

*Curatio.**I N I N F A N T I B V S.*

*Curatio  
in infan-  
tibus.*

Si Aphthæ sint ex vitioso nutricis lacte, id corrigatur  
iis, quæ acrimoniam vel falsedinem eius tollunt, bonum-  
que sanguinem gignunt. Sin infans lac malè concoquat,  
parcius lactetur, & bona in ipso concoctio procuretur.  
Quando verò infans simul lacte nutritur & alio cibo uti-  
tur, Galenus, 6. de comp. med. sec. loc. Cap. ult. nutrice-  
lentes præbet cum modico pane & medulla cerui aut vi-  
tuli, quæ nutrix mansa, vel semimansa infanti exhibeat,  
vt ore ab ipso circumuoluta vlcuscula contingant.

Aliis quoque cibis à nutrice infanti masticatis, admiscet  
cydonia, pyra, forba, mespila, corna. Quandoque &  
lactuca, portulacæ, folani aliquid addit, si aphthæ in-  
flammatæ ferueant.

Quod si infans mandere nondum possit, nutricem eius-  
modi victu alit, eique simul de bona concoctione prospici-  
cit. Ipsi verò infanti linctus exhibeatur ex diamoro cum  
melle rosato, aut si opus videatur, cum oxymelite. Aëtius  
ex Asclepiade gallas contusas aqua decoquit, & cum de-  
cocto percolato parem portionem mellis permiscet, rur-  
sumque decoquit, ad mellis crassioris spissitudinem, id-  
que vt maximum remedium aphthis puerorum illinit afri-  
cando, aut tomento lanæ purpureæ digito circumuoluto  
aphthis apprimendo.

Imprimis autem in medicatione considerandus est co-  
lor aphtharum, vt stomatica hæc dicta medicamenta pro  
varietate humoris, à quo aphthæ generantur, rectè admi-  
nistrari queant. Nam si subrubeant, primò moderatè ad-  
stringentibus; deinde citra morsum discutientibus, vt en-  
dum

dum est. Qualia sunt syrup. è rosis ficcis, de portulaca, de agresta, de succo granator. acetos. citri, diamorum, pulu. ex farina lentium, sumach, rosis. Collutiones ex decocto lentif. viol. rubi, vitis, rosar. plantag. balauft. santal. sumach. acaciæ, admisto diamoro, rob ribes, rob nucum succ. malor. punic. vel vuæ acerb. cum melle.

Si subflauæ fuerint, iisdem vtendum, & magis etiam refrigerantibus, vt succo vel decocto folani, portulacæ, acetosæ, semperuii.

Pituitosis astringentia cum quadam caliditate & discutientia conueniunt, vt thus, manna thuris, mastich. mentha, nux cupressi, erui farina, rad. irid. Illyr. rad. aristol. quæ plura simul, vel pauciora cum decocto fol. myrthi, misceantur, iisque aphthæ illinantur.

Si denique liuidæ aut fuscæ fuerint, fortiora discutientia adhibeantur, illinendo passulas exacinas & anisum tritum cum melle, aut puluere ex flor. chamæmeli, meliloti, anethi, fanigræci, cum melle, aut melle rosato mixtum; aut cum vino eadem coquantur, adiectis semper nonnullis adstringentibus, vt syrupo myrtino, aut diamoro. Vel ℥. Rob nucum 3. vj. diamori, mellis rosati, an. 3. ij. aquæ plantag. 3. ℞. M.

Tanquam expertum commendatur in aphthis puerorum præsertim malignis, & epidemiis, ranulam viuam ad-mouere ori pueri, quæ sugendo malignitatem attrahat, quâ lassatâ & mortua alia apponatur, atque iterum alia, donec virus omne sit extractum. Sed, vtrum foedum ac abominandum hoc remedium rectè admoueri possit, non immeritò quis dubitauerit.

#### In adultis.

In aphthis adultorum eiusdem generis remedia conue-niunt, paululum tamen fortiora, pro natura corporû. Ante-quam igitur ad topica veniamus, si sanguinis copia ad-fit, vena secetur cephalica in cubito, aut cucurbitulæ sca-rificatæ affigantur collo vel scapulis. Auicennas etiam sanguinem mittit è venis sub mento & extremitatibus la-biorum. Pro euacuatione materiæ proximæ in partibus oris venæ sub lingua tandem aperiantur. Si vitiosus hu-

In adul-  
tis.

mor aliquis in toto abundat, is conuenienti modo euacuetur.

Vniuersalibus præmissis ad topica veniendum. Quamquam in mollibus corporibus & in aliis, dum malum recens est, etiam ante vniuersi euacuationem iis uti licet ad prohibendū mali incrementū. Sint autē topica & *συσπόμενα* illa medicamenta, in principio moderatē astringentia & ficcantia, cuiusmodi sunt, quæ parantur ex rosis, sumach, myrth. foliis, cortic. granator. fol. vitis, rubi, pro collutione oris, in aqua vel vino astringēte coctis, addito syrupo granat. acetos. vel diamoro. Fortiora sunt collutio oris ex succis vel aquis rosarum, lactucæ, plantagin. portulacæ, virgæ pastoris, solani cum pauco aceto; item decoct. gallar. maturarum, balaustior. santalorum, acaciæ, cum rob pyrorum, cornorum, sorbor. de ribes. Vt *℞. Flor. ros. rubr. balaust. an. P. j. fol. plantag. portulac. solan. prunell. an. m. j. sem. cydon. 3. j. sumach, cortic. granat. an. 3. ij. Coqu. in vini rubri astringentis & aquæ part. æqual. pro tñ. j. Colaturæ adde diamor. 3. j. Succ. malor. punic. acid. 3. ij. Misce pro collutione oris.*

Cortex etiam aurantiorum cum melle & alumine mixtus utilis est. Vel *℞. Radic. tormentill. 3. β. fol. plantag. m. β. Coqu. in aqu. plantag. ad remanentiam tñ. j. β. Colaturæ adde boli Armeni ʒ. j. alum. roch. ʒ. xv. Misce. Vel. ℞. Prunell. plantag. caud. equin. salu. an. m. j. rad. tormentill. acor. lut. an. 3. iij. stipit. vuular. N. iij. flor. maluæ arborese. rosar. an. m. β. Coqu. in vino rubro & aqua ad remanent. tñ. j. β. Colatura os colluatur. Vel *℞. nucum viridum seminaturarū cum cortice contusarum q. v. adsperge aceto, destilla in balneo Aqua feliciter aphthas sanat, si in eā spongiola madefiat, quā aphthæ illinantur, & aqua simplici, cui pars quarta vini admista sit, abluantur.**

In progressu ea misceantur, quæ astringendo simul discutiunt, ut cyperus, nux cupressi, folia oliuæ sicca, myrrha.

In fine addatur cortex nuc. mosch. cariophil. gallia moschat.

Spiritus etiam viirioli, si eius gutt. ij. mellis. 3. j. misceant

miscantur utilis est. Vel ℞. *Vuarum immaturarum* lb. ij. *β. cortic. mali granat. balauſtior. ſumach. an.* lb. j.

Macerentur in aceto, & deſtillentur. Deſtillato adde *aluminis* lb. β. *vitriol.* ʒ. j. β. Iterum deſtillentur, & aqua iſta locus affectus illinatur.

Si aphthæ ad ſuppurationem tendant, iuuetur illa deſtento in ore lacte, præcipuè aſinino, vel mucilagine, ſem. *althæi. lin. cydon.* vel horum, aut paſſularum decocto.

Sordidæ Aphthæ abluantur aqu. ſaccharata, aut ſyrup. acetoso.

Vtile etiam eſt decoctum hordei cum melle roſato mixtum. Vel ℞. *Nuc. moſch.* ʒ. j. β. *caryophyl.* ʒ. j. *radic. cypri* ʒ. β. *ircos, corallor. rubr. an.* ʒ. j. *bol. armen. caud. equin. an.* ʒ. ij. *mell. roſat. q. ſ.* F. linimentum.

Fortius extergunt mel cum tartaro aut alumine mixtum, ſi ſpongia leniter affricentur.

Vel oliuæ muria conditæ maſticatæ.

Si putreſcere incipiant, vt Aphthæ amplius appellare oris vlceris non mereantur, ſed in cruſtas & vlcera degenerent, fortiora requiruntur, & curatio, vt vlcerum iam inſtituenda.

Vbi tamen monendum, oris vlcera non ſemper aphthas ſequi, ſed etiam poſt inflammationes & per ſe, vt in aliis partibus, ex affluxu vitioſorum humorum fieri, vt & in Gallico morbo excitari. In quibus vt dictum, Stomaticis vtendum, quæ astringant, ſiccant & roborent, quæ pro vlceris natura ſint mitiora vel fortiora, & curatio horum vlcerum ex iis, quæ poſtea de columellæ ac tonſillarum inflammationibus, vt & angina & hinc ſequentibus vlceribus dicentur, patebit. Prodeſt ex Aëtio centaurij minor. uſti cinis illitus cum melle. Item nuc. cupreſſ. uſtæ.

Ad fordida oris vlcera utilis eſt etiâ aqua viſidis Plateri.

℞. *Ærug. æris* ʒ. j. *alumin.* ʒ. β. *vitrioli, minij, ana* ʒ. j. Coq. in *vini albi* ʒ. iv. *aquæ vitæ* ʒ. j. & cum penicillo loca in faucibus tangantur, cauendo, ne quid deglutiat. Poſtea lacte caprino, in quo calx ignitus extinctus ſit, os colluatur.

Vel vsurpetur aqua viridis, seu gargarismus supra in ozænis propositus. Ad serpentes & depascentes Aphthas ac vlcera summè efficax est, teste Aëtio, radix foeniculi vsta per se, aut cum melle illita, amurca in æneo vase ad mellis crassitudinè cocta & illita. Alumen scissile tritum, & cum gallis & oleo exceptum illitumque; Auicennas gal-  
lar. alumin. balaust. p. æ. sumit, & puluerisata per se cum melle applicat.

Vsurpatur etiam à multis Vitriolum vstum & ærugo, & squamma æris cum melle illita. Et vnguentum Ægyptiacum in aqua plantaginis cum paucò aceto dissoluitur, adiecto melle rosato. Monet tamen Guillelmus Fabric. cent. 3. obseq. 92. cancrōsis illud vlceribus esse ad verissimum.

Cauendum verò, ne quid de medicamentis erodentibus in fauces illabatur.

Ardor relictus mitigetur lacte in ore retento, vel aqua plantaginis, aut solani sæpius mutata.

In vlceribus Gallicis antiquis, interdum caro putrida tota præscindenda est, & ea parte præcipitati puluis ad-mouendus, cum gossypio in aqua plantaginis prius in-fuso.

De Aphtharum curatione plura videantur apud Aëtium, tetrab. 2. serm. 4. cap. 39. 42. 43. 44. Et Oribas. lib. 4. de loc. affect. curat. c. 68.

Aqua fortis hausta ad hoc caput referenda & illa vlce-ra, quæ ex aqua forti incautè haustâ, aut veneno sumpto excitantur, quæ curantur lacte bibito, iusculis pingui-bus, & mucilagine, sem. cydonior. ac Psylli, vt postea de morbis Oesophagi dicetur.

De vlcere magno & cancrōso circa radicem linguæ, vi-deatur Guillelmus Fabricius, centur. 4. obs. 20.

#### Dieta.

In infantibus lac nutricis corrigatur, cibus & potu laudabili & bona nutritio, ac alimenti in infante coctio procuretur. Expediit in cibus vt cydoniis, pyris, sorbis, mes-pilis, & si opus sit, lactuca vel portulaca. In adultis vi-ctus ratio vt plurimum declinet ad frigidum, vitentur acria



acria, salsa & acida, & quæ pravi succi sunt & difficilis curationis.

## De ossis palati corruptione.

Aliquando etiam os palati perforatur, & corrumpitur *Ossis palati corruptio.* seu à vulnere, seu ab humore corroderente: id quod accidit sæpè in lue venerea. Quod ubi euenit, sermo vitiatur, cum aer, qui per os elidi debeat, simul per foramen illud ad nares penetret, & per eas egrediatur.

Si ex vulnere malum sit, & os sit purum, natura per carnem vel callum illud tandem, etsi tardè, claudere solet. Si verò os nigrum sit, prius radendum. Antequam verò foramen illud claudatur, vel si etiam planè claudi non possit, ut vitium illud sermonis tollatur, fabricanda est lamina aurea instar clypei, quæ in medio ymbonum, seu eminentiam habeat; cui spongiola sicca, foraminis magnitudini respondens, alligetur, atque ita foramini adaptetur. Vbi enim spongia humorem imbiberit, dilatatur, ut lamina firmiter hæreat, & foramen occludat.

Historiam talis morbi & curationis in instit. lib. 5. part. 1. sect. 2. c. 11. proposui. Cum enim studiosus quidam ad nasi radicem, internūmque oculi dextri angulum cultro vulneratus esset, & cultri fracti pars ferè digiti longitudine, vulnere extrà consolidato, ibi remansisset, accidit, ut post menses quatuor cultri fracti pars illa spontè sua via facta in palato erumperet & eximeretur. Cum verò in superiore parte palati foramen inde apertum fuisset, præter medicamenta abstergentia, exsiccantia, laminam auream, modo antea exposito, applicaui: quæ instructus etiam conciones habere potuit, sine sermonis impedimento. Sensim tamen illud foramen carne impleri vidi, & tandem etiam planè occlusum fuisse ad me relatum est.

## Verruca in gutture &amp; lingua.

Nec prætereundæ hic verrucæ in gutture & lingua. *Verruca in gutture & lingua.* Marcellus Donatus, de histor. med. mirab. lib. 3. cap. 5. refert, quendam Iohannem Iacobum Fugacinam, ciuem Mantuanum, verrucis quampluribus guttur, fauces, & radicem linguæ occupantibus diu vexatum fuisse, quæ

deglutitioni maximè officiebant, vt & alterum quendam Attilium Malegnanum vniuersam linguam eiusmodi verrucis, sed longè minoribus conspersam habuisse. Fuisse autem ex illis, quas myrmecias vulgò appellant. Habent autem ortum ex iisdem causis, vt in aliis partibus, de quo suo loco dicemus.

C A P V T XIX.

De fœtore oris.

**S**ymptomata postea oris quod attinet, pertinent huc oris apertio vitiata, dolor faucium & fœtor oris. Primum nimirum ad hunc locum referri posset oris clausura, idque aperiendi impotentia, vt & oris p.n. hiatus: verum de istis supra, Cap. 6. dictum.

Pertinet deinde huc faucium dolor sine tumore, de quo Hippocrates, lib. 1. prædict. & in Coacis: *dolentes fauces cum labore & molestia absque tumore manifesto ac suffocatione præceps exitium minantur. Et, faucium gracilium dolores suffocantes conuulsionem minantur.* Verum quæ de his dici possent, è doctrina de angina patebunt. Ideoque hic solum de fœtore oris agemus.

Oris fœtor.

Oris, seu anhelitus & animæ fœtor molestum, astantibus præcipuè, symptoma est, cuius quidem causa proxima est vapor, seu halitus foetens ex ore egrediens. Verum ille multis ex causis ortum habere potest.

Causa.

Primo quidem ex ventriculo, cum scilicet cibi foetidi, sumpti sunt, vt allium, cepæ, & similes, quod & à vino & cereuisia copiosius hausto accidit. Deinde ubi quidem cibi, qui assumuntur, per se foetidi non sunt, sed in ventriculo corrumpuntur, è quibus eiusmodi vapores foetidi exhalant. Cæterum non semper immediatè è ventriculo foetidus iste vapor exhalat, verum etiam ex aliis partibus halitus ille foetens communicatur, vt ex vermibus in intestinis, ex vlcere intestinorum, vel ab ipsis intestinorum excrementis, cum scilicet orificium ventriculi

culi inferius, quo in intestina sese aperit, non arctè, & vt secundùm naturam fieri debebat, clauditur. Tum enim fœtidæ excrementorum exhalationes per laxam hanc viam in ventriculum ascendunt, & fœtore suo anhelitum inficiunt, qui propterea etiam stercoreosus percipitur; id quod præcipuè in iis euenit, qui crapulâ continuâ orificium ventriculi inferius laxum & debile reddunt. Idem accidit ex humoribus prauis in venis mæsaraïcis, vel circa lienem contentis, ex vtero & fœtū mortuo in eo.

Secundò, fœtidus ille halitus ore egreditur, cū in dentibus, corrosis & cauernosis, præcipuè gingiuis aut palato aliquid fœtidum continetur, cū scilicet cibi, & caro præcipuè in dentium interstitiis hæret, atque ibi putredinem, & hinc prauum odorem acquirit; aut cum vlcera sunt in ore, vt in scorbuticis, aut cū salina fœtidis humoribus inquinatur, id quod interdum in catharris, febribus malignis, item lue venerea contingit.

Tertiò, idem halitus fœtidus exhalare potest etiam ex humore corrupto in osse colatori detento, vt & ex vlceribus nasi & partium palato vicinarum.

Quartò ex pulmonibus & pectore; vt in pectoris vlncribus, vlceribus, empyemate; vnde etiam iis, qui gibbosi sunt, plerumque os fœtet.

#### *Signa diagnostica.*

Malum ab adstantibus facillè percipitur. E qua parte *Signa.* verò halitus ille fœtens attollatur & proueniat, facillè ex partium modò enumeratarum signis patet. Si à ventriculo sit, fœtor maior est ante cibum. Si ab osse colatorij, ore clauso aqua pleno etiam percipietur.

#### *Prognosticum.*

Pro causæ ratione malum magis vel minus pericul- *Progn-*  
osum est. Si enim anhelitus fœteat in tabidis, vt plurimum *sticum.*  
lethale signum est.

#### *Curatio.*

Cum halitus ille fœtens sit proxima fœtidi anhelitus *Curatio.*  
caussa, vitium hoc aliquo modo quidem corrigi potest, iis  
adhibitis, quæ suauem odorem præstant.

Detinendi nimirum in ore cariophylli, nux moschata, zedoaria, rad. angelicæ, imperatoricæ, cyperi, ireos, ligni aloës, cortic. citri, fol. lauri, rorismarini, cinnamomum, sem. anisi, foeniculi, coriandri, carui, myrrha, moschus, ambra. E quibus varia parari possunt medicamenta, quibus vel os colluitur, vel quæ in ore detinentur pilulæ & Trochisci. Vt *℞. Cariophil. nuc. mosch. ana ʒ. j. rosar. ʒ. ij. rad. ireos ʒ. ʒ. cardamom. ligni aloës, cinamoni, an. ʒ. j. gall. moschat. ʒ. ʒ.* Cum melle rosato. F. Pilulæ, vel cum mucilagine tragacanthæ aqu. rosar. facta Trochisci in ore detinendi.

Sed cum hoc modo foetor odore suavi saltem obscuretur & causa non tollatur, causa etiam tollenda est, quæ non una est, ut supra dictum. Si à cibis, qui grauem odorem spirant, si foetor, anhelitus, breui spontè euanescit. Si vitiosi humores sint in ventriculo, illi euacuandi, & vitium, unde proueniunt, corrigendum, ventriculusque ipse roborandus. Imprimis hic aloë utilis & pilul. aloë-phang. ut & absinthium, vel vinum purgans cum absinthio.

Et ne cibi, præcipuè caro, in ventriculo putrescat, facile, condiendi aromatibus, aceto & acetosis. Pani semen foeniculi, anisi & carui permisceatur. In fine mensæ sumantur, quæ ventriculum laxum claudunt, & suauem odorem spirant, ut cydonia, diacydonium, confectio sem. anisi, foeniculi, coriandri, & similia.

Si à vermibus, vel aliis partibus foetens vapor exhalet, partium illarum vitia corrigenda. Si dentes immundi sunt, mundandi, ut supra dictum. Si oris vlcera adsint, vel à causa alia salua inquinetur, vitium illud corrigatur. Si tandem à thorace aut pulmone proueniat foetens anhelitus, causa, quæ foetidum anhelitum suppeditat, tollenda.

DE GURGVLIONIS  
affectionibus.

## CAPVT XX.

## De Gurgulionis laxatione.

**G** AVE S Græcis φάρυγξ, ea dicitur regio quæ, ut Galenus interpretatur ante stomachum & laryngem, hoc est, antegula & asperæ arteriæ extremitatem sita est. Nonnunquam tamen φάρυγξ pro Larynge, hoc est, summo asperæ arteriæ capite, vel ipsa quoque aspera arteria usurpatur.

*Gurgulionis laxatio.*

Et Suidas quidem, atque alij Grammatici Græci genere distinguunt, ut φάρυγξ, propriè fauces significet, ὁ φάρυγξ, verò Laryngem aut Tracheam. Sed Galenus indifferenter utroque genere vocabulum φάρυγξ, de summo tracheæ capite & de ipsa trachea accipit.

Eadem faucium regio etiam ἰσθμὸς, nominatur per metaphoram, quod tanquam angustus terræ tractus inter duo maria veluti utrimque posita exporrigitur. Hinc παρισθμία, vocantur tonsillæ, siue amygdalæ; hoc est, glandulæ insignes ad radicem linguæ in faucibus oppositæ, salivâ, quam copiosam continet partes vicinas humectantes.

Inter tonsillas medius dependet gurgulio, Græcis γάργαραν, particula scilicet carnosa à palato in os propendens, soli hominum aviumque nonnulli generi propria, ob vocis potissimum modulationem condita, unde & γάργαραν φωνῆς, à Paulo Ægineta nominatur, lib. 6. c. 31.

Nomen Gurgulionis, ut & Græcum γαργαρεῶν, factum videtur à sono, qui gargarisando fit ad illam oris particulam.

Atque hæc propria illius particulæ in summo ore appellatio est. Κίων, verò, siue κίονις, & σφύλη, affectionum præter naturalium eiusdem partis nomina sunt. Quando

enim gurgulio præter naturam intumescens in longum æquali crassitudine extenditur columnæ instar, κίων, & κιονίς, dicitur. σαρύλλα verò, quando ima parte in rotunditatem crassescens, suprà qua dependet, gracilior efficitur, vt vix à pendiculo suo pendentis speciem præ se ferat. Aëtius, *tetrab. 2. serm. 3. c. 40.* etiam tertiam affectionem addit, quam ἱμάτωα, id est, lorum appellat, quando ex suffitu, vt scribit, nimium ignitus gurgulio, hoc est, desiccatus gracilescit, & loco similis propendet. Accidit idem, cum ob ἀποφύω eius partis, tùm ob paralyfin (paralysis tamen vocem non propriè accipiendo) vt Aëtius *seq. cap.* docet.

Differt igitur ἱμάς ἀπὸ τῆς κιονίδος, quod in hac gurgulio non extenuatus est, vt in lora, sed crassitiem ex fluxione magnam est adeptus. Aretæus ἱμαώτι, de membranarum vtrinq̃e circa gurgulionem in latum tanquam alarum vespertilionum explicatione, de qua mox dicetur, interpretatur, *de causis acutor. c. 8.* Frequentiora autem duo mala sunt, gurgulionis laxitas & inflammatio eiusdem. Illam τὸ γαρζαρεῶν χαλάσις, hanc φλεγμονήν, nominant, de quibus iam dicemus.

Κίων ergo vel κιονίς, absolutè, & cum adiectione, κίωνες χαλάσις, est γαρζαρεῶν χαλάσις, seu gurgulionis laxatio, quæ affectio vulgo casus columellæ appellatur, *der Zapffe ist gefallen oder geschossen.*

Fit autem, quando gurgulio multo humore præter naturam perfusus citrà inflammationem laxatur & elongatur, vt radici linguæ & faucibus incumbat, sicut in catarrhis continuis sæpè accidit. Humor plerumque pituitosus est è cerebro demissus, partem illam nimium humectans. Columella sic laxata mollis est, albicans & concolor palato sine dolore & calore.

Historiam gurgulionis mirè laxati describit Marcellus Donatus, *de hist. med. mirab. lib. 3. cap. 3.* ex Leonh. Botallo, cuiusdam, cui repentè ex labore columella ita laxata fuerat, vt ad anteriores dentes protenderetur. Aretæus etiam, *loco citato*, miræ cuiusdam columellæ laxationis meminit, vbi scribit bicornem columellam reddi, geminis membranis hinc atque inde pendentibus, quæ ab

utraque parte iaceant quasi vespertilionum alæ.

*Curatio.*

Curatio eadem propemodum est, quæ gurgulionis inflammati, siue intemperiem frigidam & humidam rigentibus, de qua c. seq. dicetur. Fiant igitur per venæ sectionem ac cucurbitulas, præmissa, si opus, purgatione capitis ac totius corporis, diuersiones & euacuationes, vt decet: Capiti etiam prospiciatur errhinis, aliisque remediis humorem pituitosum absumentibus.

Topica autem initio sint adstringentia & repellentia, postea etiam paululum dissoluentia, & exsiccantia. Imprimis verò & præ cæteris prodest decoctum & aqua plâtaginis, capriforij, myrti, rosarum, fol. rubi, rad. caryophyllatæ, origani, hyssopi, oxycratum, & acetum, quæ interdum sola sufficiunt. Fiat ergo gargarismus, vel collutio oris talis:

℞. Aqu. plantag. ℥. j. diamor. vel dianuc. an. ʒ. j. M. vsurpentur leni gargarismo. Aut ℞. Flor. rosar. rubr. balaust. m. ℞. fol. acetos. plantag. an. m. j. gallar. immat. ʒ. ij. alum. vsti ʒ. ℞. sem. cydon. ꝑ. iv. Coq. in l. q. aquæ ad tertias pro ℥. j. Colaturæ adde diamori ʒ. j. aceti vini ʒ. ℞. M. pro gargarismo. Vel ℞. Fol. plantag. mespilor. caud. equ. rosar. rub. an. m. j. fol. scabios. m. ℞. Coq. in aq. Colaturæ ℞. ℥. ij. adde mel. ros. aut diam. ʒ. ij. ace. ros. ʒ. ℞. M. Vel ℞. Fl. malu. arb. ros. rub. fol. prun. veron. salu. vuln. (quâ ob signaturam nonnulli hîc commendant) an. m. ℞. Rad. torm. ʒ. ij. al. crudi mell. ʒ. ij. Coqu. omnia in aq. ℥. ij. & acet. ʒ. viij. ad quartæ partis consumptionem. Colatura vtere pro gargarismo. Vel ℞. Decoct. salu. hyss. an. ℥. ℞. alum. sacch. ꝑ. j. diam. ʒ. j. mell. ros. ʒ. ℞. M. Vel ℞. Aq. torm. plant. ros. an. ʒ. iiij. syr. de ros. succ. myrt. an. ʒ. ℞. spir. vitr. ꝑ. j. M. Vel ℞. Aq. planta. cent. an. ʒ. ij. ros. prunell. an. ʒ. j. ℞. succ. gran. ʒ. j. rob. berberum ʒ. ℞. M. Vel ℞. Sem. sum. ʒ. ij. balaust. ʒ. j. ℞. ros. rub. ꝑ. j. ℞. rad. torment. ʒ. j. aqu. plantag. fol. quercus, an. ʒ. iiij. Ebulliant vnica ebullitione & colentur. Colaturæ admisce Syr. de ros. succ. ʒ. ℞. diamori, ʒ. iiij. essent. rosar. rubrar. ʒ. j. ℞. spirit. vitriol. ꝑ. ℞. M. Vel ℞. Rad. tormentill. & vulvar. an. q. s.

Coquantur in cereuisia & cum modico melle dulcorantur

rentur pro gargarismo. Commendatur & conferua rosar. vitriolata, aut fiat talis puluis :

℞. Rosar. siccar. balaust. alum. scissil. an. 3. β. piper. zingiber. an. ℥. j. myrr. Contusa & cribrata per calamum insuflentur, vel vt mox dicetur applicentur.

Galenī repellens & discutiens est ex gallarum immaturar. alumin. scissil. & salis ammoniac. partibus equalibus.

Vel ℞. Alumin. vsti, & boli armeni, p. æ. quibus tritis, cochlearique, siue *σικυλονίαν*, instrumento impositis columella contingatur.

Ad pulueres hos & similes columellæ rectè applicandos vtile etiam est cochleare & follis Guillelmi Fabricij, quæ descripsit, cent. 2. obs. 31.

Aëtius ad valdè laxatam & tumentem columellam hunc puluerem probat.

℞. Piper. myrrh. an, 3. j. alumin scissil. gallar. an. 3. j. Contritis vttere, è vestigio enim columellam firmat & reficcat.

Si malum diutius protrahatur, validè discutientia commisceantur, vt pulu. piper. trium generum zingib. cinaom. macis, galang. pyrethr. sal. ammon. sinapi, hyssopi, pulegij, origani, prassij, calaminthæ.

Vulgus initio solo piperis longi contactu columellam sanat, vbi scilicet materia pauca est, & caput excrementis non plenum.

Alias intempestiuus eius vsus noxius est. Addi potest aliquid aluminis & boli armeni, vel myrrhæ, vel myrobal. citrinorum. Nonnulli piperis loco zingibere vtuntur.

Quidam futuræ coronali applicant emplastrum confectum ex acacia cum aceto, aut ex gallis vstis cum aceto, quo columella eleuatur. Alij ouum recens coctum ad duritiem per medium dissectum, & thure vel zingibere confersum calidè vertici imponunt. Alij folium quercinum melle inungunt, & vertici applicant. Potest & puluis olibanī, succini, & ligni aloës admoueri.

Vel ℞. thus & gallas puluerisatas, & cum farina tritici, & melle virgin. in formam emplastri redigantur, & vertici imponantur.



*De Gurgulionis inflammatione, & exulcerat.* 93

Quidam nuces iuglandes cum spiritu vini contusas vertici imponunt. Alij fermentum vetus syncipiti imponunt, linteolo inductum, cui nonnulli admiscunt puluerem succini albi. Alij matricariam recentem cum fermento contundunt & applicant, aut syncipiti illinunt axungiam leporinam. Ore verò excipere iubent suffitum ex succino albo, puluere caryophyllorum, ligni aloës, mastiches.


In non delicatis quidam vtuntur stercore albo canis ossa comedentis, siue pulueris forma, quo columella attollatur, addito pauco cinamomo, siue cocto illo in vino cum fol. rutæ forma gargarismi.

Vel ℥. Pulv. capul. glandium 3. j. albi græci, 3. β. pip. long. zingib. an. 3. j. M. Nonnulli etiam ceruici topica imponunt.

Si defluxio ita acris & salsa sit, vt columellæ erosionem efficiat, humore temperato & euacuato, diuersionibusque vsurpatis exulcerationi ipsi extergentia, adstringentia, & tandem solidantia adhibeantur.

Paretur ergo gargarismus ex aqua & melle simpl. aut melle rosato & diamoro. Post extersionem partes erosæ sæpe tangantur specillo lana obuoluto & intincto in hoc liquore:

℥. Aq. ros. plantag. an. 3. iij. mellis despumati 3. iij. licij 3. ij. Ferueant vnica ebullitione. Aut ℥. Succ. moror. rubi, moror. Celsi de cornis, an. 3. β. mellis despumati, 3. ij. Coq. ad iustam consistentiam, postea in eo dissolue licij, 3. iij. alumin. scissil. 3. j. β. Iterum leniter coq. pro columellæ erosæ illinitione.



C A P V T X X I.

*De Gurgulionis inflammatione & exulceratione*

¶ QUANDO etiam inflammatur gurgulio, & Græcis κίωνις φλεγμίνουσι, nominatur, & quidem interdum retenta sui naturali figura, mole tamen auctus, interdum alienam, vix scilicet a pediculo suo pendentis figuram acquirit, & tunc τσούλη appellatur. Et quidem affectio quæ

Gurgulionis inflammatione & exulceratio.

quæ πφύλη, seu vua dicitur, rarius gurgulioni accidit, frequentius verò is ita inflammatur vt naturalem suam figuram magnitudine tantum mutata retineat. Galenus, 6. de *compof. med. sec. loca cap. 30.*

*Causa.*

*Causse.*

Causa est defluxus humoris è capite ad gurgulionem, qui humor sanguis imprimis tenuis est, aut pituita cum sanguine mixta, de quo etiam Hippocrates, 2. de *morb. Arabes* & à cæteris humoribus deducunt, qui colore & specie doloris discernuntur.

Quod si materia acris aut salsa sit, non solum inflammationem, sed & exulcerationem efficit, nisi maturè occurratur. Affectio ipsa cum sit inflammatio, morbus est intemperiei cum materia & magnitudine aucta, & si exulceratio sequitur, etiam cum soluta vnitatem.

*Signa Diagnostica.*

*Signa.*

Malum oculis est expositum, aperto ore, & depressa lingua, adest tumor, dolor, ardor, & rubor cum deglutendi difficultate, & suffocationis quodam periculo, interdum & cum febre.

Et quod signa causarum attinet, ex sanguine magis est affectio partis; si pars ipsa rubicundior sit, & dolor in ea sentitur pulsatilis; ex bile si colore sit citrina, & dolor adfit punctius, atque sic de cæteris.

*Prognostica.*

*Prognostica.*

1. Quanto magis vuula est inflata in apostemate, & quanto magis elongata in relaxatione, tanto magis nocet operationibus, & tanto deterius est signum.

2. Gurgulionem inflammatione laborantem incidere, aut scarificare, aut vrere periculosum est, præsertim quamdiu rubicundus, tumidusque fuerit. Sequitur enim sanguinis fluxus, qui facile sedari non potest, & à quo suffocationis periculum imminet ob decubitum ad pulmones. Vicinarum quoque partium inflammatio metuenda est, ratione doloris attrahentis. Hippocrates 3. *progn. aph. 31.* Ideò ad excisionem non statim festinandum est, sed extrema prius remedia tentanda sunt.

3. Contractas & rotundas vuas, & sanguinolentas, aut  
subni

subnigras Chirurgia aggredi non decet, sed tenues & oblongas, & summa parte imminutas & resolutas, & non valde sanguinolentas, sed albicantes: hæ enim inflammatione carent, cum venæ extenuatæ sint, & sanguine destitutæ, Paulus lib. 6. cap. 31.

4. Quibus gurgulio totus excinditur, vel eroditur, raro clarè & distinctè loquuntur. Obseruauit tamen Bauhinus, vt in *theatro anatom.* refert, vt & Guillelmus Fabricius Hildanus, *Cent. 2. obs. 21.* aliquos quibus columella fuit erosa, distinctè & articulatè locutos fuisse. Si etiam gurgulio totus excinditur, periculum à *Φθίσι* imminet, cum particula iam deficiat, quæ impetum irruentis frigidi æris auertere, & aliquid de cerebri destillationibus excipere, & à pectore auertere solita est.

## Curatio.

Vt in aliis inflammationibus, ita & in gurgulionis inflammatione primum vniuersalia præmittenda, & si plethora adsit, venæ sectio, imprimis cephalicæ, instituenda, postea etiam vena sub lingua aperienda, aut cucurbitulæ cum scarificatione ceruici aut scapulis affigenda. Fiant etiam diuersiones per clysteres, frictiones & ligaturas extremorum & similes. Sin vitiosi humores abundet, ij euacuandi.

Curatio.

Topica remedia initio sint repellentia, quæ forma gargarismi & pulueris vsurpentur, atque vbi moderata est fluxio austera illa sint, vbi vehementior, acerba quæ fortius adstringunt & repellunt, docente Galeno, 6. de *comp. med. sec. loca*, c. 3. His mel additur, ne exasperando dolorem pariant, fluxionemque irritent.

Moderata ergo sunt diamorū succus ex moris cum melle. Diluantur hi succi cum aquis, aut decocto rosarum, plantaginis, prunellæ, myrtillorum, rubi, sumach: balaust. gall. hordei pro gargarismo, vel collutione potius. Nam valida, & multa gargarisatione plus materiæ ad locum affectum attrahi potest.

Vt ℞. Diamori, ʒ. vj. vin. granat. ʒ. s. decoct. rosar. balaust. sumach. lb. s. M. pro collutione oris. Vel ℞. Aqu. plantag. equiseti, prunellæ, an. lb. j. flor. rosar. rubrar. m. s. balaust. p. j. Ebulliant vnica ebullitione, adde diamori, ʒ. iij.

Aut

Aut ℥. Fol. plantag. portulac. prunell. an. m. j. flor. ros. rubr. fol. myrt. an. m. β. cortic. granat. 3. ij. Coq. in f. q. aquæ, pro ℥b. j. β. Col. adde succ. malor. granat. 3. j. acet. rosat. 3. β. rob. nucum 3. ij. β. M. pro gargarismo vel collutione oris. Vel ℥. Aq. fragor. prunellæ, an. 3. j. β. nymph. plantag. ros. an. 3. j. syr. cerasor. 3. β. rob. ribes 3. iij. diamori 3. ij. nitri præp. 3. ij. M. pro gargarismo.

In primo principio; ubi exigua est fluxio, sufficit gargarismus ex posca vel vino granat. vel sine gargarisatione liquor resupinato capite in ore teneatur, immutando quando incalescit.

Efortiora sunt rob. de ribes, rob. nucum viridum, syrup. de agresta, succus cornor. & sorbor. acacia, hypocist. melle etiam hæc subacta. Decocta item myrti, & baccar. eius, fol. tenerorum quercus, mespilor. vitis, capular. glandium, fumach. balaustiorum.

Pulueris forma conueniunt rosæ, balaustia, cortic. granat. hypocist. gallæ, & prius enumeratarum plantarum folia exiccata.

E. g. ℥. Pulu. spong. sambuc. 3. j. summit. centinod. prun. an. 3. j. flor. ros. rub. 3. β. F. puluis.

Applicantur cum cochleari aut specillo cōcauo, siue *σφλοπαίον*, instrumento, yt Paulus nominat, vel instrumento à Guillel. Fabricio depicto, cent. 2. obseru. 21.

Æger etiam sæpius lambat mel rosatum, vel rob. nucum, quod multum commendat Galenus, 6. de compos. med. sec. loca. cap. 1. Ex narratione de Hortulano.

Vel ℥. Fol. plantag. bdellij minor. an. m. j. prunell. m. β. flor. ros. rubr. p. j. passular. maior. cum arill. contusar. 3. j. sem. cydon. 3. j. Coq. in suffic. quant. aq. Colat. ℥. ℥b. j. mell. rasar. diamori an. 3. j. β. Vel ℥. Flor. ros. rubr. p. ij. balaust. sem. fumach. 3. j. β. fol. plantag. prunell. an. p. iij. cup. glandium 3. j. alumin. 3. j. Coq. in f. q. aq. f. ad tertias, colentur. Colat. ℥. 3. ix. in quibus dissolue rob. nucum, moror. syr. myrtini, an. 3. β. ol. 3. β. 3. β. M. pro gargarismo. Vel ℥. Fol. quercus, alchimill. plantag. an. p. ij. hyssopi p. j. cort. granat. nuc. cupress. balaustior. an. 3. j. sem. rad. glycyrrb. 3. ij. alum. roche 3. β. Coq. in aq. plantag. ℥b. j. β. ad medietatem.

In colatura dissolue. *mellis ros. colat. syr. fl. ciam. an. 3. ℞. de ros. sicc. myrtini, an. 3. ij. pblegm. aluminis 3. ℞. M. pro gargarismo.*

Atque hæc ferè in principio conueniunt.

Postea repellentibus admisceantur nonnulla moderatè discutientia, cuiusmodi sunt flor. chamæmeli, meliloti, anethi, sem. foenigræci, folia althææ, maluæ, radix iridis, cyperi, hyssopi, ficus, thus, mirrha. Vt *℥. Prunell. hyssop. an. m. j. flor. violar. bord. an. m. ℞. glycyrrh. 3. ℞. uuar. passar. exacinat. 3. j. caricar. N. v. Coqu. in aq. simp. Colat ℥. ℥. j. oxymell. simpl. mell. rosat. diamori, an. 3. j. Vel ℥. Rath. malu. alth. an. 3. ij. fl. violar. purp. bord. mundi, an. p. j. sem. malu. althææ, cydonior, an. 3. j. 4. frig. maj. an. 3. ℞. Coqu. in aq. comm. puræ f. q. colaturæ ℥. 3. iij. in quibus dissolue diamori 3. j. nitri trochisc. 3. j. M. pro gargarismo. Si fluxio fuerit frigida.*

*℥. piper. 3. ℞. radic. irid. 3. ij. succ. glycyrrh. 3. j. ℞. sacchar. cand. 3. ij. mell. rosat. collat. 3. j. M. F. Lohoch, quod calidè æger sumat.*

Rondeletius in muliere, quæ penè suffocabatur, feliciter vsus eclegmate Scribon. Largi ex pipere, myrrha & melle, cuius vsu maximam pituitæ quantitatem, quæ circa columellam & fauces collecta erat, reiecit.

Sæpe etiam, vt monet Galenus, 6. de comp. med. sec. loca c. 3. in principio quippiam ex discutientibus addendum est, quando scilicet corpus ægri prauis humoribus refertum est, & particula affecta sua natura debilis.

Si verò simul dolor vehemens adfuerit, mitigantia dolorem quoque misceantur, quale est contusa glycyrrhiza cum mellis & aquæ pari mensura, cocta & gargarisata, lac gargarisatum, vel emulsio seminis papaueris, vel ptisanæ.

Quod si inflammatio, in duritiem vertatur, (quod tamen rarius fit, quoniam locus affectus est calidus & humidus, & materia tenuis ac fluxilis) emollientibus, vt tendendum, vt radicibus & fol. althææ mucilag. sem. lini, fœnigræci; postea discutientia addantur, vt glycyrrh. radix irid. puleg. organ. calaminth.

Si ad suppurationem tendat, maturetur decocto caricarū cum aqua mulsa, aut cremore ptisan. hord. vel auenæ cū decocto passul. decocto glycyrrh. aut furfur. tritic. lotura calida. Vel *℞. Rad. glycyrr. 3. ij. fl. malū. arboresc. p. ij. furfuris triticeī in petiā ligati 3. ℞. caricar. ping. N. iv. iuiubar. N. v. Coqu. in aq. comm. pro 3. ix. in quibus dissolue, mellis passul. 3. j. ℞. cremor. ptisanæ, auenæ 3. j. M. pro gargarismo.*

Si non succedat, ferro aperiatur. Post puris effusionem extergentia & desiccantia vsurpentur, vt aqua mulsa, aqua hordei cum melle rosato. Item succus agrimon. aut caulium fūcus cum melle.

Si columella putrescere & in gangrænā transire incipiat, tali gargarismo vtendum. *℞. Origan. hyssop. an. m. iij. scabios. m. j. glycyrrh. 3. ℞. Coqu. in aqu. pro lb. j. Collat. adde oxymell. f. 3. iij. M.*

Si vlcus vix putrescat & serpat, chalcantio & similibus metallicis vtendum est. Et utilis etiam hic est aqua viridis supra proposita, & aqua viridis Plateri.

Ad vlcera Gallica conuenit aqua fortis benè diluta, vel aqua, in qua decoctum est sublimatum, adhibita simul vniuersali morbi Gallici curatione. Mitius est hoc:

*℞. Vnguenti Aegyptiaci 3. ℞. aluminis 3. ℞. mellis rosati colati 3. j. ℞. M. pro linimento, quo vlcus contingatur.*

Si remediis hisce malum curari non possit, ad Chirurgiam veniendum, vt Paulus monet, *lib. 6. cap. 3. ne ex assiduis irritationibus tussis & vigiliæ, aliquando & suffocatio sequatur.*

Itaque vuula corrupta & marcida, quæ non amplius tumet, nec rubicunda est, atque ita sanguine & vita destituta, abscindenda eo modo, quem monstrat Paulus *ibid.* & cuius Aëtius meminit, *tetrab. 2. cap. 41.* qui forcipe obtorquere, & prius illaqueare vuam iubet, vt stupida effecta minus sanguinis profundat. Sed hæc Chirurgica operatio periculo non caret, refertque Valescus de Taranta, *lib. 3. cap. 3.* historiam cuiusdam presbyteri, cui pletorico cum vuula fuisset abscissa, sanguinis fluxus in tanta quantitate ad pectus secutus est, vt inde maxima pectoris angustia & respirationis difficultas oborta, ægerque cum amplius sangui

sanguinem è pectore eiicere non posset, suffocatus sit. Ideoque ipse octo canones in vuulæ abscissione instituenda obseruandos proponit. 1. est, vt vuulæ abscissio non tentetur, nisi corpore prius euacuato, vt & monet Hippocrates, 3. *prognost. apb.* 21. 2. ne fiat affluxu humorum adhuc durante. 3. nisi vbi alia remedia non satisfecerint. 4. nisi tumor ille valdè lædat & molestus sit. 5. instituendam esse in aëre lucido. 6. ante vuulæ abscissionem, & post eam vsurpanda esse, gargarismata astringentia. 7. ne nimis rubra & tumida abscindantur, sed solum alba & versus radicem angusta. 8. non abscindatur, nisi quantum magnitudinem naturalem excedit.

Vbi etiam incisione opus est aliquid, si fieri possit, relinquatur, necessarij vsus gratia.

Ad vuulam tamen commodè & sine periculo abscindendam peculiare instrumentum inuenit Guillelmus Fabricius, idque depinxit, *cent. 2. obseru.* 21. Etsi fluxus sanguinis metuatur, & putrefactio aliqua adsit, cauterium actuale commodissimum est, quod quomodo adhiberi debeat, docet Paulus, *loco alleg.* Et peculiare atque ad hanc rem idoneum instrumentum descripsit Guillelmus Fabricius, *loco alleg.* Hieron. Fabricius ab Aquapend. *de operat. Chirurgicis, titulo de vna chirurgia*, præcisione facta, quam forficulâ instituit, exiguum ferramentum in cochlearis formam factum bene calefactum non ignitum ad-mouet.

#### Dieta.

Viçtus ratio talis sit, qualis in aliis inflammationibus præcipitur, imprimis quies & inedia in principio morbi competit. Vsurpentur in cibis, quæ leniter astringunt, vt succus cydonior. granator. moror. vuarum immaturarum. Mastice æger tenera mori vel quercus folia. Vitet laboriosas deglutinationes, respirationes, loquelam.

## CAPVT XXII.

*De tonsillarum inflammatione, & ulceribus.*

*Tonsilla-  
rum in-  
flamma-  
tio.*

**T**ONSILLÆ duæ vtrinque ad radicem linguae paulò supra laryngem positæ sunt, quæ Latinis tonsillæ, vulgo à figura amygdalæ, Græcis *αιριades*, & *αιριδια*, vocant, cum quod inter se oppositæ, tum quod circa isthmum oris sitæ sint. Galeno autem, 3. de *sympt. causis* cap. 4. & in *lib. de tumoribus* p. n. cap. ult. *αιριades* sunt illarum glandularum tumor aut inflammatio, *αιριδια* inflammatio eorum, quæ circa isthmum sunt locorum, hoc est, partium, quæ os & gulam interiacent.

Tonsillæ igitur cum conditæ sint, vt congregata salua laryngem & trachæam rigent, sæpe humore nimio ex frigida destillatione oppletæ intumescunt, sed sine inflammatione, ita vt colorem suum naturalem retineant, & dolore careant.

Interdum verò eas occupat inflammatio cum rubore, ardore ac dolore & siti, & cum quadam deglutitionis ac respirationis difficultate. Quâ inflammatione in abcessum degenerante pus intra fauces effunditur, vnde sæpe vlcus fordidum græueolens relinquitur.

*Tonsilla-  
rum vl-  
cere.*

Fiunt tamen ibidem vlcera citra inflammationem ex destillatione falsâ vel acri, molles illas partes exedente, aut tali halitu eo ascendente, quod lue Gallica infectis familiarè est.

Nonnunquam maligna & serpentia vlcera in iis partibus oriuntur, tempore imprimis verno & pestillente aeris constitutione, teste Aëtio, *tetrabibl. 2. serm. 2. cap. 46.* Siue ex præcedente inflammatione efferata, siue ex quavis alia causa, vt ex apththis in pueris & adultis, qui prauis humoribus abundant.

Interdum etiam tonsillæ planè indurantur, vnde Mercurialis, *de morb. pueror. lib. 2.* Paulum Æginetam sub tonsillis etiam scrophulas, seu tumores duros & scirrhusos complecti, scribit. Vide etiam historiam tumoris eiusmodi



modi cancroſi apud Guillelmum Fabricium, centur. 3.  
obſeru. 84.

### Cauſſæ.

Cauſſæ eædem ſunt, quæ inflammationis gurgulionis. *Cauſſæ.*  
Concitur ſcilicet inflammatio tonsillarum ex affluxu  
humorum ad illas; qui cùm calidi ſunt, partes illas cali-  
das & humidas inflammant, in iis præcipuè, qui multo  
ſanguine abundant; cùm copioſi, tumefaciunt; cùm acres  
& ſaſi, erodunt.

Et quidem tonsillæ magis obnoxie ſunt inflammatio-  
ni, quàm gurgulio, propter molliem & laxitatem ſub-  
ſtantie & temperamenti proprii, ac loci caliditatem ac  
humiditatem.

Inflammatione etiam tonsillarum magis laborant, qui  
ſanguine magis abundant. Priuatim verò, vt Aëtius ſcri-  
bit, *lib. modo citato cap. 45.* pueris hoc malum frequens eſt  
ob teneram corporis texturam, & ob *addn. paſſar.* & lacten-  
tibus è lactis vitio & praua qualitate.

Puellis quoque uſque ad menſtrua purgationis tempo-  
ra hoc malum frequens eſt, Aretæus *lib. 1. cap. 9.* In adultis  
verò generatur hoc malum ex nimia meri potatione, ac  
multâ & auidiore deuoratione ciborum, maximè acrium  
& aſperorum. Ita ceraſa auidius comēſta facilè acidita-  
te ſua tonsillarum inflammationem, & gurgulionis laxita-  
tem efficere perhibentur.

### Signa diagnoftica.

Tonsillis tumefactis foris ſub maxillas tumor tactu vi- *Signa.*  
ſuque deprehenditur, & intus ſeu fruſtulum quoddam  
faucibus adhæreſcente mole ſua premit, obſtâtque, ne fa-  
cilis fiat deglutitio, idque ſine ſiti & ardore.

Inflammatis iſſdem præter deglutiendi, & quod Pau-  
lus addit, *lib. 6. cap. 30.* reſpirandi difficultatem, dolor  
adeſt, rubor, ardor ſitis, interdum & febres.

Maligna tonsillarum vlcera partim alba ſunt maculis  
ſimilia, partim cinereo colore, aut ſimilia cruſtis, quæ  
ferro inurantur. Accidit ergo ſiccitas in deglutiendo, &  
ſuffocatio confertim incidit, maximè cùm rubor ſubit  
mentum, aut vbi hæc acrimonia præterierit, *rem.* loca

illa infestans succedit, & cum hac putrefactio, vt docet Aërius, *tetrabibl. 2. ferm. 2. cap. 46.*

*Prognostica.*

*Prognostica.* 1. Tonsillarum inflammatio morbus acutus est, & sæpe suffocationis periculum minatur.

2. Tumor autem vel resoluitur, vel suppuratur, vel induratur.

3. Tonsillæ in febribus degnigratæ & arefactæ mortem imminere portendunt.

4. Vlcera tonsillarum quædam familiaria sunt & mitia, quæ scilicet sunt munda, exigua, non altè descendētia, nec inflammata, nec dolorem excitantia, quædam aliena & pestifera, quæ lata sunt, caua, quodam concreto humore albo, aut liuido, aut nigro sordentia, quæ aphthæ etiam nuncupantur. Quod si concreta illa fordes altius descenderit, eschæra gignitur, quam rubor insignis, inflammatio & venarum dolor circumscissit, sicut in carbunculo. Exigua quoque & rara exanthemata oriuntur, quibus superuenientia alia in vnum vlcus coalescunt, latumque vlcus efficiunt. Id si interius in os depascendo serpit, columellam exedit, & linguam quoque & gingivæ ac alveolos dentium occupat, vnde dentes labefactantur & nigrescunt. In columella etiam phlegmone erumpit, atque non multis post diebus phlegmone, febris, fœtore, inediâque consumti intereunt.

5. At si in pectus per trachæam id malû inuadat, eodem illo die strangulat, pulmo enim & cor neque talem odoris foeditatē, neque vlcera, neque serosos humores sustinet, sed tussis ac spirandi difficultas enascitur. *Aræteus, lib. 1. cap. 9.*

6. Tonsillarum vlcera sine febre securiora sunt.

7. Tonsillarum vlcera æstate suborta peiora sunt, quàm quæ aliis oriuntur temporibus. Citò enim serpunt.

8. Serpentina circa fauces vlcera, quæ magnâ molestiam exhibent, & acuta magis sunt, vt plurimum spirandi difficultatem adferunt. Videantur plura eiusmodi prognostica apud Hippocrat. *lib. de dentitione.*

9. Glandulæ istæ faciliè indurantur, & in scirrhum degenerant, qui nunquam aut raro curatur.

10. Ali

10. Aliquando tonsillarum tumores suppurantur & ab-  
cessus extrà erumpunt, & ægri sanantur: cuius rei exem-  
plum est apud Dodonæum, in obseruat. cap. 16.

## Curatio.

Si levis sit inflammatio, circa initia gargarismi adhi-  
beantur astringentes, cauendo, ne mel multum admis-  
ceamus, quod suâ acrimoniâ malum irritaret, vt monet  
Aëtius, loco citato, cap. 45.

Curatio.

Remittente autem inflammatione, rectè & vtiliter illud  
admiscetur. Vt ℞. Aqu. plantag. ℥b. j. ℞. flor. rosar. rubr.  
m. ℞. sem. cydon. 3. j. ℞. Semel ebulliant; Colaturæ adde  
diamor. 3. j. ℞. dianuc. 3. ℞.

M. pro gargarismo, quo tepide interna oris colluantur.  
Nam inflammata neque frigus tolerant, neque multum ca-  
lorem. Aut ℞. Fol. plantag. m. j. flor. rosar. rubr. P. j. cortic.  
granat. 3. iij. gallar. immatur. N. iij. fol. prunell. m. j. nuc.  
cupress. 3. ij. Coqu. in f. q. aqu. pro ℥b. j. Collat. adde dia-  
nuc. 3. ij. ℞. Misce pro gargarismo.

Vbi vehemens est inflammatio, vt periculum sit à suf-  
focatione, statim cephalica secetur, repetita sanguinis de-  
tractione in magna plethora; aut primum basilica, postea  
cephalica aperiatur.

Vbi venæ sectio locum non habet, aurium scarificatio  
utilis. Cucurbitulæ etiam venæ sectionis vicariæ esse pos-  
sunt.

Frictionem longam in carpo rusticis familiarem esse,  
scribit Rondeletius, lib. 2. cap. 4. Prodesse autem reuera ob-  
diuersionem.

In foeminis, vbi opus, vena tali primò incidatur.  
Ad euacuandam postea materiam coniunctam prodest fe-  
care venas sub lingua. Si cum sanguine vitiosi humores  
simul redundant, clysteres & pharmaca leniter purgantia  
exhibeantur.

Deinde ad topica veniendum est, quæ primum sint re-  
pellentia, vt decoctum ex rosis, balaustris, fol. plantag. vi-  
tis, rubi, sorbis, cornis, mespilis, gallis, fumach, fol. & bacc.  
myrti ac similibus, quorum formulæ antea sunt proposi-  
tæ. Repellentia autem practici fere omnes solum intra

applicant. Ab iis tamen & vulgata consuetudine dissentit Rondeletius, qui *allegato loco* non vult astringentia solum in parte interna, & relaxantia in externa applicari, sed ea intus & extra adhibet. Cum enim partes laxæ sint, non amplius esse laxandas censet, cum defluit materia, sed cum consistit fluxio, ut materia ad exteriora trahatur. In principio verò astringentia extra etiam apponit in lateribus arteriæ sub maxilla inferiore. Quod in seipso expertum esse scribit, & anginam & defluxionem ad fauces prohibuisse, & multos à scrophulis incipientibus sanasse. Verum omnino hæc cautione opus est, & videndum, quæ materiæ affluentis sit copia. Si enim corpus adhuc plenum sit & affluxus magnus, nulli autor fuerim, ut repellentia extra apponat; cum facile fieri possit, ut materia ad interiora repulsa periculosam anginam excitet. Semperque tutius materia ad exteriora, quàm interiora feratur.

Post repellentia ptisanæ succus gargarifetur, in quo decoctæ sunt passulæ vel iuiubæ, aut furfur. decoctio, aut decoctum glycyrrhizæ, ficum & hyssopi. Lac tepidum gargarisatum acrium collutionum mordacitatem temperat.

Extra etiam illinatur guttur oleo amygdalarum dulcium, liliorum alborum, chamæmeli, aut fomento cum spongia ex decocto chamæmeli, meliloti, althææ, malvæ, scabiosæ, sem. lini, fænigræci: aut cataplasma ex iisdem paratum cum farina hordei, sem. lini, fænigræci, althææ, hordei, ol. chamæmel. amygdalar. dulcium, butyro recenti, aut cataplasma ex pane albo & melle apponatur, vel emplastrum de meliforo. Soluctur ita tumor, & quod reliquum est, discutietur.

Post cataplasmatibus, de quo dictum ablationem, partes circa mentum tegantur, circumposita lana molli oleo nardino irrigata, ne partibus illis refrigeratis materia introcedat.

Interdum natura spontè sua materiam ad externa convertit, natis utrimque in collo infra aures tumoribus, vel spontè, vel scalpello apertis pus effluit, atque ita ton-

*De Tonsillar, inflammationibus, & ulceribus.* 105  
filla abscessu liberantur, sicut & in angina fieri consue-  
nit, teste Hippocrate, 6. aphor. 37.

Si tonsillæ inflammatae in abscessum tendant, quod de-  
prehenditur augescente inflammatione & exacerbationi-  
bus circa vesperam fortioribus factis cum horrore & inæ-  
qualitate, nonnunquam & cum febre, ut docet Aëtius:  
tunc suppuratio sine mora adiuuetur gargarismis ex aqua  
mulsa calente, decocto caricarum & hyssopo cum gly-  
cyrrh. vel decocto caricarum in lacte, vel decocto passu-  
lar. vel iuiubar. cum viol. & malua.

Vel ℥. Farina triticea in petid ligata ʒ. j. Caricar. ʒ. iiij.  
radic. malua. ʒ. j. β. aqu. communis lb. ij. Coq. ad con-  
sumtionem quintæ partis. Deinde colentur. Fiat gargaris-  
mus.

Foris cataplasma applicetur ex farina hordei, tritic. &  
sanigræc. cum decocto ex caricis, rad. althææ, & melle,  
vel emplastrum diachylon.

Vt ℥. Fol. malua, violar. an. m. j. Coq. ad mollietiem,  
& per setaceum traiciantur. Adde farina tritici ʒ. j. β.  
croci ʒ. β. butyri s. sale. q. s. F. cataplasma.

Celsus vaporem aquæ calentis ore excipere iubet. Con-  
fecto pure, quod ex dolore & tumore remittente cogno-  
scitur, abscessus collutionibus acrioribus rumpatur, ex  
hyssopo, pulegio, thymo, calamintha in sapa aut mulsa  
coctis & gargarisatis, aut ferro aperiatur eo modo, quem  
Aëtius, tetrab. 2. serm. 2. cap. 45. & Paulus, lib. 6. cap. 30.  
tradunt; aut deuoratis maioribus frustis panis. Rupto  
abscessu aqua mulsa gargarisetur primùm per se, postea  
admixta lenticula & rosis, vel plantagine, quibus immo-  
randum est, donec vlcus ad cicatricem perducatur.

Si ex longo valdè refrigerantium & repellentium usu, vel  
aliis etiam tonsillæ indurescant, quod fieri solet non præ-  
missa phlebotomia, vel purgatione, ante topica garga-  
rismi emollientes & resoluentes conueniunt, ut:

℥. Rad. althææ mund. lilior. alb. an. ʒ. β. fol. violar. malua,  
an. m. j. scabios. prunell. an. m. β. extremit. sambuc. ʒ. ij. bord.  
P. j. ficus, N. iiij. sem. sanigræc. malua, an. ʒ. j. nidi hyund. ʒ.  
β. Coq. in s. q. aqu. addendo in fine. sem. cydon. lini, an.

3. *β. aq. scabiosæ, caprifol. an. ʒ. ij. pro t̄b. ij. Colaturæ adde mell. rosat. colar. ʒ. iiij. diamor. ʒ. j. Misce pro gargarismo.*

Si tonsillæ iuduratæ deglutitione & respirationem impediētes, medicamentis emolliri nequeant, Celsus & Paulus ad Chirurgiam accedunt, tonsillæque extrahere conantur. Sed Chirurgia hæc neque facilis est, neque tuta. Qua de re videatur Hieron. Fabric. ab Aquapendente, de *operationibus Chirurgic. titulo de consiliis.*

Ad nomas siue serpentia vlcera tonsillarum, præmissa venæsectione, corporis euacuatione & diuersionibus, conuenit diamorum ex aqua mulsa, insperso puluere flor. ros. rubr. vel sumach. Paulus succum exprimit ex malo punico dulci cum cortice cōtuso, cuius partes æquales sex miscet cum vna parte mellis, & ad mellis spissitudinē cocta illinit. Vtilis est & hic gargarismus suprā propositus, cuius hætenus aliquoties facta est mentio. Possunt etiam aristolochia & iris & chalcitis adhiberi cum melle, aliquando & Andronis & Musæ pastilli. Mirabiliter Aëtio crustas auferit stercus caninum cum melle illitum, & vstarum hirundinum cinis cum melle, & centaurij minor. cinis cum melle.

Expertum quoque in vlceribus tonsillarum malignis linimentū ex cineribus centaurij minoris, & ex puluere stercoris canini, si cum melle ad iustam spissitudinem misceatur. Addi potest aliquid de puluere radicis iridis. Vide Galenum, 10. de *simpl. med. facult. cap. de stercore canino*. Tabernæmontanus commendat tanquam experimentum, decoctum radic. morsus diaboli.

Omnia autem oris vlcera vehementioribus exsiccantibus & adstringentibus gaudent, quam externa vlcera, cum ne amplius serpent, tūm quia semper à salina fiunt humidiora, vnde & medicamentorum vis infringitur.

Post irritationes ab acrioribus hisce medicamentis factas gargariletur decoctum glycyrrhizæ, quod paratur ex vino nigro dulci, ex mastiche, myrrha, croco, deinde etiam addito amylo, & tragacantha. Cohibito iam vlcere depascente, lac gargarisandum cum terra Samiā mixtum. Cru-  
stis sublati & purgato vlcere hoc conuenit.

24. Flor. rosar. rubr. 3. B. croc. 3. ij. balaust. myrrh. an. 3. j. nuc. pinear. 3. j.

Tritis & subactis cum melle vtere ad illitionem. Progressu temporis addi possunt, amyli 3. ij. alumin. scissil. 3. j. Vide plura huius generis apud Aëtium, loco citatō cap. 46.

Dieta.

Abstinentum ab acribus, à fumo, à Solis æstu, à vino, *Dieta.* ab exercitio & motu corporis, atque animi nimio, præsertim ab ira, à balneo, & omnibus, quæ affluxum humorum augere possunt.

C A P V T XXIII.

De iis, quæ in guttur vel gulam inciderunt, eximendis.

**A**CCIDIT nonnunquam, ut siue dormientibus siue *Illorum,* vigilantibus etiam per incuriam aliquid in guttur *qua in* vel fauces illabatur, quod suffocationis metum & alia pericula afferat. Quæ res quâ ratione eximendæ sint, dictum quidem in Institut. lib. 5. part. 1. sect. 2. cap. 10. Addere tamen quædam libet.

Sunt autem, quæ in guttur vel fauces incidunt, alia animata, alia inanimata. Ex animatorum genere sunt primùm hirudines, quæ vel per nationem in stagnis ore imprudenter excipiuntur, vel vnâ cum aquis minutissimæ ipsæ adhuc hauriuntur, & faucibus vel gulæ affixæ attracto sanguine grandescunt. Adhærent verò vel palato versus superiorem nasi partem, & tum sanguis sine scretu egreditur, vel gutturi, ubi sanguis cum scretu excernitur: & quidē si in initio sit trachææ, tussis continenter affligit; vel gulæ, & tum deglutitio impeditur, vomitusque concitatur; vel denique ipsi ventriculo sunt affixæ, atque tunc nullum impedimentum in deglutitione sentitur, adest verò vomitus, cum quo sanguis reiicitur.

Hirudinum nonnullæ venenatæ sunt, quæ & grauiora symptomata accersunt, ut syncopen, tremorem cordis, febrem acutam, & vlcera denique maligna. Agnoscuntur quod magna habet capita, corpore sunt lanuginoso, colore nigro

re nigrae aut virides, maculis, vel lineis variis distincta, quemadmodum eas describit Auicennas, *1. canon. fen. 4. doct. 5. cap. 22.*

Vbicumque verò hirudo ore concepta hæret, titillationis sensum obscuro suo motu efficit, punctio quoque sentitur, dum sanguinem fugit, & sanguis ex ore tenuis ac paucus per interualla expuitur, quoniam ab exilibus seu capillaribus venis hirudo sanguinem allicit. De quo Hippocrates, *2. prædict.* Quibus fauces sanguine frequenter & noctu & interdiu replentur, cum neque capitis dolor prægressus fuerit, neque tussis, neque vomitus, neque febris prebenderit, neque pectoris aut dorsi dolor tenuerit, in his nares & fauces inspiciendæ, num quid vlcus in eo loco aut hirudo compareat.

Quando igitur hirudo in ore ita hæret, vt oculis conspici queat; Chirurgus eam idoneo instrumento apprehendat, & caput eius fortiter stringat; ne si medio fortè corpore præscindatur, pars eius anterior cum capite intus affixa remaneat.

Vbi verò hirudo profundius latet, vt chirurgiæ locus non sit, medicamentis res peragenda erit. Itaque Rhases gargarismos præcipit ex acerbis, & amaris, quibus offensa hirudo sponte sese retrahat, vel quibus enecetur, qualia sunt sinapi cum aceto gargarifata, aut sal cum aceto, aut cepæ succus. A proprietate valere creditur succus salicis. Iubent & nigellam ac sinapi tritum gutturi insufflare. Enecant etiam absinthium, abrotonum, lupini, mentastrum, nasturtium, sem. sanctum, aloë, hiera, agaricus.

Amotam vel enecatam hirudinem æger sreatu, tussi, vel vomitu relicere conabitur. Si educta hirudine expulsiō sanguinis perseveret, venulis adhuc hiantibus, vnde hirudo suxit, non statim ille suppressendus est, sed permittendus, monente Auicenna, vt moderatè effluat, ne retentus venenositate sua, quàm ab hirudine contraxit, noceat. Eadem quoque venenositas corrigatur exhibita theriaca aut mithridatio, aut terra sigillata cum Zedoaria, dictamno, tormentilla & similibus.

Postea sistatur sanguis gargarismis ex decoctione cortic. mali granati, balaustrorum, & sumach, vel puluere insuffla



sufflato ex balaustiiis, thure, sangu. draconis, amylo.

Quod si hirudo stomacho inhæreat, medicamenta Rhas-es exhibet, quibus vermes enecantur & eiiciuntur, aut æ-grum in balneum siccum, siue Laconicum ducit, ubi sitî vehementi contracta, postea aquam frigidissimam æger ore contineat, semper eam permutando, si incaluerit vt hirudo æstu etiam afflicta, prorepat in os ad reficiendum sese frigida, qua alioquin naturaliter delectatur. Proba-tur & hoc :

*℞. Farin. lupinor. pulu. turbitib. agarici, sem. nigell. an. 3. ij.* Incorporentur cum succo absinthij & fiant trochisci pondere 3. j. dissoluaturque vlcus in decoctione sem. ni-gellæ, deturque vnus ieiuno stomacho.

Interdû animalia alia dormientibus in os irrepunt, quod de lacertis ac serpentibus compertum est. Hæc eodem modo in balneo sicco cum aqua frigida ore retenta proii-ciantur, aut apposito ad os ægri vase lactis calentis ple-no, cuius nidore siti etiam vexatum animal prorepat; præ-fertim si vas illud ita dispositum sit, vt splendentis solis radios excipiat. Oportet autem ægrum prono capite in ventrem incumbere. Quidam & affatim hoc bibere iu-bent ad vomitum vsque: vt simul cum lacte animal red-ditum quod ingressum est, excutiat.

Inanimata, quæ vel casu vel spontè deglutita in guttu-re aut gula subsistunt, siue mole sua inhærentia, vt bolus panis, vel carnis non masticatus, annulus, moneta gran-dior, nucleus pruni: siue acumine suo se ingigentia, vt fragmenta vitri, acus, spina piscis, os acutum, & similia, suos etiam modos habent, quibus eximantur.

Et quidem si crassum quid deglutitum inhæreat, nisi immisso idoneo instrumento apprehendi & eximi queat, ægri ceruix aliquoties pugno concutiat, ita vt depres-sam illam teneat, humerusque eleuatus, qua concussio-ne res in gula hærens ad ventriculum delabatur; aut si propè fauces hæreat, rufsi per os reiciatur. Iuscula etiam carnum pingua, vel cum butyro parata liberaliter & af-fatim hauriantur, vel ptisana cum melle aut oleo amyg-dalarum dulcium, vt lubrica reddita gula, facilius, quod illapsum

illapsum est, in ventriculum descendat, aut vt vomitus saltem istis pinguibus prouocetur. Rhases quoque ægrum in balneum aquæ tepidæ se demittere iubet vsque ad mentum, vt viæ in gula emolliantur & laxentur.

Si his nihil proficitur, candela cerea mediocriter crassa, vel stylus plumbeus nonnihil incuruatus sumi potest, quo melle vel oleo oblito & in gulam demisso res ibi subsistens in ventriculum detrudatur.

Si acutum est, quod infixum hæret, neque oculis ita patet, vt forcipe prehendi possit, tussis excitanda, oxymel continuò lambendo, aut sternutatio quoque si locus affectus propior sit trachæ arteriæ, vel ipsa etiam sit trachea. Vehementi enim hac corporis concussione, spiritus simul expulsionem adiuuante, res obhærens excludetur.

Si obfessa est gula, aqua mulsa crebrò gargarifetur, oleum etiam & pingues sorbitiones & albumina ouorum cruda & lubricantia alia bibantur.

Vtilis est & continuus vsus eclegmatum emollientium, vt quod paratur ex mucilagine, semine maluæ radic. althææ, ficubus, passulis, iuiubis, sebesten & similibus cum syrupo violarum. Tandem magni boli deglutiantur, vel ficus siccæ integræ, quo impetu id, quod subsistit, in ventriculum simul detrudatur.

Quod si his modis nihil perficitur, Rhases instrumentum commendat ex plumbo factum, quod foraminulis multis exilibus pertusum est instar retis, quorum vsus est, vt dum instrumentum vertitur retrahiturque, res gulæ infixæ illis foraminulis implicetur, simulque educatur, & vt respiratio per illa non impediatur. Quem imitatus est procul dubio Guil. Fabricius in fabrica sui instrumenti, quo ad res gulæ & faucibus infixas extrahendas vtitur, quodque *cent. 1. obseru. 36.* delineauit. Qui etiam videatur *eadem cent. obseru. 31. 32. 33. 34. 35.*

Si nec hoc modo suo loco moueri res immissa possit, naturæ & tempori negotium totum committendum. Progressu enim temporis calor naturalis coquendo & alterando rem illam mutat (si eius natura talis sit) & imminuit. Et vt maturius id fiat, natura in coctione adiuuanda medicamento

mento ex radicibus althææ, ficibus, farina sem.lini, feni-  
græci, hordei, aut mucilagine ex iisdem paratis, flor. cassiæ,  
butyro, oleo amygdalar. dulc. chamæmeli, lilior. albor. pin-  
gued. gallin. & similibus.

Quod & faciendum si, ossiculum, vel simile quid inflam-  
mationem in œsophago excitet. Hac enim ad suppuratione-  
nem perducta & abscessu rupto æger ab angustia & dolo-  
re liberatur. Exemplum de spina gulæ infixâ habet Dodo-  
næus; in obseru. c. 17.

Compertum est ab Arculano, ossiculum acutum gulæ  
infixum post bimestre spatium per cutem in collo aperta  
spontè via exiisse. Beniuenius deuoratam acum decennio  
post perforato stomacho extrusam vidit. De acubus cum  
vrina emissis meminit Iohan. Langius. lib. 2. Epist. 40. De  
acicula per alium cum grauissimis symptomatibus deiecta  
videatur Guil. Fabricius. *allegata centuria 1. obseruation.*  
34. Quod si tale quid naturam moliri videmus, ne ventricu-  
lus vel intestina lædantur, exhibendus cremor hordei, ius-  
cula pingua, lac amygdalarum dulcium, oleum amygd.  
dulcium, cassia.

## CAPVT XXIV.

## De Angina.

**A**NGINA Latinis ab angendo, quæ vox à Græco  
ἀγγα, id est, suffoco, & strangulo deducitur; Græ-  
cis Σνάρυχη & Κνάρυχη, & masculina terminatione, Hip-  
pocrat. lib. de loc. in homine, & 4. de rat. viſt. in acut. aph.  
30. vsurpatur Σνάρυχη & Κνάρυχη, eodem etymo, à suf-  
focando scilicet, dicitur. Etsi enim, vt postea in diffe-  
rentiis dicetur, posteriores Græci inter Græcas voces dum  
per σ Σνάρυχη & per κ Κνάρυχη, scribitur, differentiam  
quandam constituerint, & κνάρυχη, quàm à canibus ita  
appellari censent, seu quod canibus familiaris sit, seu  
quod ægri hiant ore, & exerta lingua spiritum duce-  
re cogantur, canum per æstum sitientium more,  
pro

pro grauiori affectu habeant; *Συάρχη*, verò, quam dictam putant, quod si ea frequenter corripiantur, pro leniore malo: tamen Galenus, 3. *prognost. text.* 18. hanc de literis contentionem tanquam inutilem contemnit, quod & 4. *de viſſ. rat. in acutis, text.* 30. facit.

Etenim & *Συάρχη* & *Κυάρχη*, apud Hippocratem, & antiquissimos Medicos Græcos generale nomen est, quale apud Latinos angina, quod in genere sumptum, omnem faucium & gutturis affectionem, spirationem nullo in thorace vel pulmone vitio existente, difficiliorem reddentem, & deglutitionem impediētē, seu meatuū, per quos spiritū attrahimus, cibūque & potum assumimus, angustia, spiritum difficilem reddentem, & deglutitionem impediētem significat. Etsi enim per morbos thoracis, pleuritidē, peripneumoniam & alios respiratio lædatur: tamē affectus ille angina non dicitur, cū illæsis faucibus fiat. Hippocrates tamen interdum distinguit inter faucium inflammationem & anginam. Ita 6. *epid. sect.* 8. t. 1. inquit. *Quibusdam verò faucium inflammationes aderant, aliis angina.* Vbi procul dubio anginam intelligit inflammationem musculorum laryngis, quæ respiracionem difficilem valdè reddit, & viam spiritus intercludit: inflammationem verò faucium, partium aliarum vicinarum; quæ spiritus & cibi viam non ita intercludit. Possunt enim & tonsillæ & musculi ossis hyoidis, & musculi in radice linguæ inflammari, vt postea dicetur, quæ partes omnes etiam in faucibus sunt: quia tamen harum partium inflammatio à gutture longius distat, anginam per se non parit. Anginæ ergo in genere ita sumpta causa erit, quicquid spiritus cibique & potus viam angustio rem reddere, & hoc modo vtriūque meatus capite & principio quasi occluso respiracionem difficiliorem reddere, & deglutitioni cibi ac potus impedimento esse potest. Quod cū pluribus de causis fieri possit, duplex angina statuitur, vna propriè dicta & exquisita, quæ est ab inflammatione summarum gulæ & gutturis partium sanguine è venarum iugularium ramis in partes illas effuso, altera notha, quæ prouenit à frigida & pituitosa destillatione, è capite in fauces & ceruicis ac colli musculos.

decumbente, & tumorem *οἰδηματώδη*, sine febre, rubore ac dolore excitante; etſi dum primò fluxio concitatur, quidam inæqualis calor & horror ſentitur, qui tamen paulò poſt definit.

Poſſet tamen & illa in faucibus inflammatio, quam Hippocratem ab angina diſcernere diximus, forſan angina notha appellari, & ita duplex angina notha conſtitui, vna ratione cauſæ, altera ratione ſubiecti. Nam & harum partium inflammatio ſæpe etiam reſpirationem & deglutitionem non parum lædit.

Quò etiam referri poteſt angina illa, quæ fit à luxatione vertebrarum ceruicis, verſus anteriora vel latus, ſiue à cauſis externis, ſiue ab humore frigido affluente fiat, idque citra inflammationem.

Si enim inflammatio accedat, vel ab inflammatione luxatio ortum habeat, ad exquisitam anginam pertinet, & acutiſſima angina eſt, vt poſtea de differentiis dicetur. Videatur etiam infra Quæſtio.

*De Angina exquisita.*

Angina ergo exquisita eſt anguſtia ſummarum gulæ & gutturis partium, ſeu faucium, ab inflammatione earundem ortum habens, difficilem reſpirationem reddens, deglutitionemque lædens. Seu eſt inflammatio in faucibus & ſummo gutture, anguſtiam earundem partium & hinc difficultatem ſpirandi inferens, ac deglutitionem impediens. Seu, vt Galenus breuiter definit, 4. de rat. viſſ. in acut. text. 20. & 2. ad Glaucom. cap. 1. eſt *φλεγμὴν τῆς καὶ φάρυγγος μερῶν*. Per fauces autem intelligitur pars, quæ gulæ & gutturi præiacet, & duo dictorum meatuum oſtiola comprehendit. Imò, vt ſuprà dictum, *φάρυγξ* etiam pro larynge & ſummo aſperæ arteriæ capite accipitur, vt ita, dum Galenus anginam per inflammationem *φάρυγγος*, ſeu faucium definit, non ſolùm intelligenda ſit ea pars, quæ gulæ & gutturi præiacet, ſed ipſa etiam larinx eiùſque muſculi. Et quamuis ſimul vicina complecti ſoleat inflammatio, vt glandulas vtrinque circa radicem gutturis ad latera trachææ poſitas, & muſculos oſſis hyoidis, muſculos item in radice linguæ, & glandulas, quæ tonſillæ dicuntur, &

*Angina  
exquisita.*

quæ sub auribus & inferiori maxilla consistunt: tamen partium harum à gutture longius distantium inflammatio anginam non parit, nisi malum faucibus, id est, parti ex gutture & gulâ constitutæ, communicatum respirandi impedimentum afferat.

Dodonæus etiam anginam statuit ex inflammatione pulmonum fieri, de qua postea indifferentiis de cynanche dicetur.

*Causse.*

*Causse.*

Ergo caussa ut aliarum inflammationum, ita & huius in angina est sanguis, seu purus, seu biliosus, pituitosus aut melancholicus. Et iis quidem è venarum iugularium ramis in has partes effusus. Nam frequentissimè fit hoc malum per viam fluxionis, rarè per viam congestionis.

Affluit autem sanguis vel per modum attractionis, si fauces & guttur vehementer caleant & doleant; vel per modum transmissionis, si loca illa imbecilla sint laxa, & ad suscipiendum fluxionem idonea; pleonexia verò humorum adsit siue in toto, siue in capite, ac imprimis circa fauces. Vbi enim sanguis vel copiosus in corpore adest, vel impurus, atque is ad caput fertur, cerebrum verò robustum est, id eum non recipit, sed maximam partem per easdem venas ad subiectas partes retrudit, unde inflammationes earum variæ gignuntur, parotides, ophthalmiæ, anginæ & similes. Hinc etiam iuvenes senibus angina crebrius corripuntur, quò multo biliosoque sanguine, qui aptissima huius mali materia, abundant, & qui habitu corporis sunt crasso, ac multo sanguine, præsertim in capite, abundant. Viros quoque frequentius quàm foeminas anginâ corripì, ex Cælio Aurèlio statuitur; idque videtur obseruasse Hippocrates, 6. *epidem. sect. 7. tom. I.* ubi epidemiam sui temporis constitutionem describens, quâ angina, tussis, peripneumoniæ vagabantur, paucissimas foeminas ægrotasse scribit. Aliam tamen causam non reddit Hippocrates eo ipso in loco quàm quod non perinde atque viri in publicum prodibant, & ita aëris externi iniuriis sese non obiciebant. Id tamen, quod dicitur, foeminas minus ex sua natura anginæ esse obnoxias,

xias, quàm viros, de vera & exquisita angina intelligendum. Habent enim foemina sanguinem frigidiorē, & præterea laryngem minorem, ac gutturis partes & venas angustiores exiliorēsq̃, quæ sanguinem non ita faciliè admittunt. Interim tonsillarum, columellæ, ac laxarum in faucibus partium inflammationibus, quæ minus exquisitam, seu notham anginam, quam Hipocratem, loco allegato, simpliciter faucium inflammationem appellare, & ab angina distinguere diximus, gignunt, ob partium laxitatem, & excrementitiorum humorum abundantiam magis obnoxia sunt quàm viri. Ad pleonexiam etiam humorum, quæ anginam excitat, cumulandam faciunt hæmorrhoides & menses suppressi, victus ratio multo & calido sanguini generando apta, potus vini meracioris.

Sæpe quoque angina accidit in febribus, vbi materiæ pars ad hunc locum depellitur, vt ita febris tum potius comitata sit, quam appellant, quàm symptomatica; talesque anginae sunt ferè epidemiae, quæ nonnunquam publicè grassantur, qualis fuit illa, quæ anno 1517. multos sustulit, vt annotauit Forestus, lib. 6. obseru. 2. atque illa, quæ anno 1544. & 1545. plurima Germaniæ inferioris loca Rhenique accolæ vexauit. Sunt enim quandoque etiam anginae, vt pleuritides, peripneumoniae & similes morbi, epidemiae. Nam etsi humores qui morbos epidemios excitant, præcipuè si non pestilentes sint, & imprimis à fluxionibus prouenientes, à manifestis aëris alterationibus, frigiditatisque & caliditatis ac humiditatis excessu proueniant: tamen occultæ etiam qualitates ab astrorum influxu pendentes miscetur. Atque hinc accidit, vt nunc ad laryngem, & fauces, nunc ad pleuram, nunc ad pulmones humores fluant, ibique subsistant, nunc ad alium perueniant.

Externæ causæ sunt, quæcunque fluxiones humorum ad istas partes concitare valent, quales sunt pluuiosa anni constitutio & imbres assidui, vt est 3. Aphor. 16. A'p'sleia item quæcunque caloris & frigiditatis in aëre & ventorum flatibus, quorum hæc comprimendo expellit humo-

res ad guttur & fauces, illa laxando facit, vt humores ad fauces affluant. Præterea subita à magno æstu refrigeratio, haustus plenus potus frigidissimi, lotio capitis intempestiua pleno corpore, nimia capitis tectura vel nulla, vocis nimia intentio, denique ictus capitis, cervicis aut locorum prope fauces, infixæ in faucibus, vel gula spinæ vel ossicula, vt & vertebrarum cervicis luxatio, si nimirum non solum ipsa angustiam in locis istis pariat; sed & inflammationem excitet.

Quidam etiam à cibis quibusdam & medicamentis peculiari vi & proprietate anginam induci statuunt, vt cerasis, fungis quibusdam, andacocha, vt habet Auicennas, quæ trifolij species est, quæ scilicet in se vel vim suffocandi, vel qualitatem aliquam laryngi & faucibus occulto modo aduersam habent, eas quæ sanguini inflammationem excitaturo suscipiendo aptas reddunt, aut quocunque modo has partes vellicant & offendunt, & sanguinis ad eas affluxi occasionem præbent: sicut cantharides vesicæ peculiari modo aduersæ sunt. Verùm de hoc dicitur infra, *quæst.* 2. Nonnulli huc etiam referunt eam suffocationem, cuius Aretæus, *lib. i. passion. acut. c. 7.* memini, quæ accidat ex spiritus ad calidissimum & siccissimum conuersione; quod aliqui de aëre illo crasso, qui è carbonibus accensis & musto ac cereuisia feruente attollitur, explicant. Verùm, vt postea in *quæstione* 1. dicitur, non loquitur Aretæus de causâ extrinsecus adueniente, sed intrinsecus hærente, vbi vitium præcipuè est in pectore. Non tamen ista suffocatio huc pertinet, sed ad respirationem læsam, vt postea dicitur. Neque enim omnis suffocatio angina dicenda est; aliàs enim & catarrhi suffocatiui ad anginam reducendi essent, sed ea saltem, vbi nullo in pectore vitio existente (quod tamen in suffocatione illa ab Aretæo descripta accidit) ob faucium inflammationem suffocationis periculum imminet. Vnde nec ardor in faucibus, qui in febribus ardentibus percipitur, & vulgò *die Breune* nominatur, cùm scilicet fauces & lingua exsiccantur, exasperantur & denigrantur, angina nominandus est.



## Differentiæ.

Differentias anginæ quatuor recentiores Græci, vt ex Galeno, 4. de loc. affect. cap. 3. & Paulo Ægineta, lib. 7. cap. 2. & Tralliano, lib. 4. cap. 1. videre est, recensent. Inflammantur enim seu φάρυγγος, id est gulæ musculi; seu laryngus, id est, gutturis seu capitis tracheæ arteriæ: sæpè etiam, quæ vtramque hanc partem connectunt. Has ergo differentias vt recentiores Græci etiam vocabulis distinguerent, generica illa vocabula κριάγγης, & συνάγγης, cum alias specierum nominibus destituerentur, certis differentiis accommodauerunt.

Prima differentia nomine generis συνάγγης, ita dicta, vt autoribus placet, quod suis sit familiaris (quæ tamen differētia linguæ Græcæ analogiæ non respondet, ideóque potius à propositione συν & ἄγγω nomen hoc deductū videtur) nominantur, vbi interni faucium musculi vel ambitus faucium interior inflammatur, ceruice quoque ad linguæ radicem simul comprehensâ; & tumore foris ac intus apparente.

Secunda παρὰ συνάγγης, vbi externi faucium & colli musculi linguam & os hyoides contingentes, & qui œsophagum firmant ac retrahunt, sunt inflammati, tumore sese nonnunquam etiam ad pectus diffundente.

Tertia κριάγγης, ita dicta, quod canes eâ frequenter corripiantur, aut quod homines eâ laborantes veluti canes sitibundi linguam exferant, cum inflammatio in internis laryngis seu gutturis musculis delitescit, & neque intus neque foris in ceruice tumor apparet, vnde etiam latens angina appellatur, tantusque est dolor, & spirandi difficultas tanta, vt æger erecta ceruice & ore hiantes, ac linguâ exsertâ, canum sitientium more, spiritum trahere cogatur.

Cuius generis & illa est angina, quam describit Galenus, 4. aphor. 33. cum, inquit, nullo neque ore multum aperto in faucibus, neque extrinsecus tumore apparente æger deglutire non potest. Symptoma n. perniciosum est ob inflammationem musculorum gulæ substratorum, in-

terdum verò gulæ ipsius morbum. Est enim partibus illis per nervos & ligamenta commune quid & societas cum spinali medulla & membranis ipsum ambientibus, ac postea hisce extrinsecus adiacentibus vertebrarum offibus. Cùm itaque ad partes inflammatas ligamenta & nervi tenduntur, vertebra quoque vel intrò, vel ad latus trahi necesse est. Nam si in altero tantùm nervorum exortu tensionem fieri contigerit, ad latus; si utròque, intrò fiet vertebrarum distortio.

Hoc loco facienda est mentio anginæ, quam describit Remb. Dodonæus, cap. 18. quam etiam latentem appellat, in qua circa laryngem & asperam arteriam talis dolor fit, vt nec contingi, quantumcùmque leniter, citra grauissimum dolorem queant, sed nec moueri sursum, nec attolli. Quamobrem non spiritus tantùm cum difficultate trahitur, sed & cibus & potus ægerrimè, aut non dimittitur. Inflammari autem statuit Dodonæus per huiusmodi anginam non interiores ac latentes laryngis musculos, (id quod sectione se deprehendisse scribit) sed pulmonem.

Verùm enim verò nulla est angina propriè dicta sine musculorum circa laryngem inflammatione. Itaque morbus, quem describit, vel non fuit angina, sed peripneumonia, quæ tamen ob communem membranam laryngem & vicinas partes in consensum traxit, vnde respiratio & deglutitio fuit læsa; vel fuit angina, quæ tamen subitò in peripneumoniam grauissimam mutata est.

Quarta est *πυρογενής*, vbi externi præcipuè gutturis muscoli inflammentur; tumor tamen intus manifestè conspicitur, ore diducto & lingua depressa. Et cùm hæc quarta differentia, nisi medicamenti occurratur, facile in *κρίσις*, degeneret, & si affectus augeatur, etiam interni tandem muscoli inflammentur, Galenus, 4. de loc. affect. cap. 3. in differentia tam externas, quàm internas gutturis partes affici scribit.

Verùm istam accurationem nominum distinctionem à posterioribus Græcis introductam Galenus, loco modò allegato, & 3. prognost. aph. 58. non magnificat, cùm omnis

angina

angina sit faucium, id est, partis ex gutture & gula constitutæ, inflammatio: & Hippocrates vno *κωάριχλω*, nomine omnes istas differentias complexus est. Non prætereundem tamen, Hippocratem, lib. 3. de morbis, etiam in nominibus quandam differentiam obseruare, & duas anginae species ponere: *κωάριχλω*, quæ sit angina grauissima, & *παρὰ κωάριχλω*, quæ mitior sit.

Præter enumeratas istas quatuor anginae differentias Galenus, 4. de loc. affect. c. 3. addit quintam ex 2. epid. sect. 2. ex luxatione vertebrarum ceruicis, quæ tamen potius ad anginam notham referenda est, nisi inflammatio ipsi coniungantur. Fit autem, vbi ceruicis vertebrae ad anteriora luxatis fauces comprimuntur, cauo ponè in ceruice apparente. Quod accidit vel à causis externis, ictu, casu, vel ab affluxu humoris pituitosi vincula vertebrarum laxantis, & vertebrarum internodia lubrica reddentis, aut copia sua vertebrae sede sua deicientis; vel à vicinis musculis inflammatis, quibus vertebrae ad anteriora trahuntur. Atque vbi anginae coniungitur inflammatio, vera angina est, dolorque etiam fortis ad contactum in ceruice sentitur. Vide Hippocrat. 2. epidem. sect. 2. & Galenum, 4. de locis affect. cap. 3.

Aëtius, qui quatuor illas differentias in tres contrahit, hanc vertebrarum ad anteriora luxationem quartam numerat, eamque propriè *κωάριχλω*, à veteribus appellatam, aut quoniam lingua à luxata vertebra iuxta radicem suam à proprio loco depulsa æger hians ore, ac exserta lingua spiritum ducere cogitur, canum per æstum sitientium more.

Sunt & aliæ quædam anginae differentiae, quod scilicet inflammatio alia maior, alia minor est; vnde etiam magis vel minus periculum expectandum: & quod alia est à sanguine puro, alia à sanguine cum aliis humoribus mixto: vt & quædam epidemia est & maligna, alia malignitatis experts.

#### Signa diagnostica.

Anginam exquisitam ex iis, quæ hætenus dicta sunt, Signa cognoscere non ita difficile est. Verùm cum sit morbus

periculosus & peracutus, qui celeri suo motu sæpe omnem Medici diligentiam superat, vtile est, etiam imminentis signa cognoscere, vt omni modo eius incrementum præcaueatur.

Si quis ergo sine manifesta causa collum vix mouere & vix deglutire potest, ac difficulter spirare incipit, & dolorem ac calorem insuetum circa fauces percipit, anginam imminere suspicio est, præsertim si tempus vernum & pluuiosum ac humidum sit, aut angina alias populariter grassetur.

Præsentem autem anginam, in quacunque etiam parte sit, adsunt imprimis duo: primò difficilis respiratio citra aliquod thoracis ac pulmonis vitium, ita vt sæpe & suffocationis periculum immineat. Vnde Plautus in *Mostellaria*, *act. I. 3. vers. 61.*

*In anginam ego nunc me velim verti, vt venefice illi*

*Fauces præbendam & enecem.*

Deinde deglutitio difficilis, adeò vt nonnullis potus per nares resiliat. Neque enim deglutitio solùm œsophagi ministerio perficitur, sed etiam muscoli duo à larynge exorti, œsophagici dicti ac circulatores, quod suis fibris transuersis semicirculum imitantibus œsophagum complectantur, cibi & potus deglutitionem atque ad inferiora detrusionem adiuuant, dum laryngem deglutitionis tempore sursum trahunt, vt descendenti cibo locum concedat: præterea etiam muscoli faucium, dum ad suum principium contrahuntur, cibum ad œsophagum detrudent. Hi ergo muscoli cum in angina afficiantur, non mirum est deglutitionem lædi. Postea dolor circa guttur & fauces percipitur, rubor item & calor, plerumque & tumor, febris adest continua. Lingua ipsa intus tumet & rubet, & quodammodo coarctata est, vnde etiam eius motus impeditur.

Et si enim in angina notha, quæ fit ab humore pituitoso fauces occupante, febris non semper adest; in angina tamen exquisita febris continua semper adest, seu vt symptomatrica ex inflammatione generetur, seu sit primaria, qui angina accedit.

Differentiæ quoque non difficulter pateſcunt. In ſynanche eſt minor reſpirationis difficultas, deglutitionis verò maxima, vt etiam liquida vix tranſire poſſint, ſed potus ferè per nares reiiciatur. In paraſynanche inter omnes differentias reſpirationis difficultas minima eſt, & rubedo foris in ceruice conſpicitur, dolorque percipitur, ſi locus contractetur; cùm inflammatio foràs vergat. Interdum etiam pectus rubet, quia ibi prorepunt duo muſculi ad cartilaginem ſcutiformem. In ſynanche verò neque in faucibus intus, neque extra in ceruice quicquam ruboris vel tumoris apparet, & tamen fauces vehementer interim dolent cum metu ſtrangulationis, ita vt æger erecta ceruice & aperto ore ſpirare cogatur; lingua eſt liuida & nigra, & vt ſcribit Hippocrates, 4. de rat. viſſ. in acut. inflexa vel retorta, ob ſummam venarum circa linguam repletionem, adeſt quoque febris acuta. Seu vt Hippocrates 3. de morb. deſcribit: ex angina dicta. homo ſuffocatur, & fauces magis occupare videtur, vt neque ſaliuam, neque aliud quicquam deorſum trahat, oculi affecti ſunt, & veluti iis, qui ſtrangulantur, prominenti & per eos contentè intuetur, neque eos conuertere poteſt, crebrò ſe iactat & exſilit, fauces & facies incenduntur, ac etiam collum. His verò, qui intuentur, nihil mali habere videtur, & viſus atque auditus hebeſcit, nihilque præ ſuffocatione intelligit, neque quid dicat, aut audiat, aut faciat, ſed iacet ore hianſe ſaliuam effundens. In paracynanche reſpiratio non eſt tam difficilis, nec dolor tantus, & rubor ac tumor aliquis intus circa fauces deprehenditur. Si ex luxatione ſit angina, plerumque id accidit è cauſſis euidentibus & violentia. Poſtea etſi ſit ab inflammatione & affluxu humorum, deprehenditur ex inſpectione ceruicis. Ceruix enim circa primam & ſecundam vertebram, excauatur ob depreſſam vertebram, & difficilis redditur reſpiratio ob anguſtiam faucium ex compreſſione. Videatur etiam Hippocrat: 2. epid. ſect. 2. vbi incipit: ἡ δὲ τῶν κωαναχίαναι τὰ πρὸς τὴν μύτην τε δὲ, &c. Egregiè enim & prolixè eo loco deſcribit Hipp. eam anginaſ ſpeciem, quæ ex vertebrarum colli λυγρῶς τε καὶ λῶς τε, inclinatione & peruerſione oritur: quæ lo-

cū propterea Gal. 1.3. *de lo. aff. c. 5.* dignū iudicauit, vt cōmentario eum explicaret. Videatur etiam *lib. 2. prorrhet. comm. 2.*

Signa caussarum & humorum ex aliis locis patent. Sanguis abundans ex habitu corporis aliisque signis cognoscitur, adest maior distensio, calor faciei est rubicundus, faciēque ruborem & calorem habet insignem. Si adfit bilis, ardor & dolor maior est cum siti, oris amaritudo, & morsus circa guttur. Si ex pituitoso sanguine fit, dolor minor est, febris exigua, tumor citra insignem ruborem. Et vt Galenus, 4. *aphor.* 34. & 4. *de rat. vict. in acut. t.* 30. docet sanguis biliosus plerumque laryngis prius musculis quàm faucium, seu gulæ inflammationem parit, sicuti pituitosus sanguis potius faucium seu gulæ inflammationem, & glandularum, quàm laryngis excitat. Cū enim laryngis venæ sint exiles, in eas nō nisi sāguis tenuis penetrat; crassus verò, qui eas penetrare nō potest, in faucibus potius & glandulis subsistit. Anginæ etiam biliosæ maximè æstate & autumno proueniunt: quod in æstate bilis generatur & in autumno retinetur, quæ æstate genita est. At pituitosa ferè fit ex pituita hyeme genita.

#### Prognostica.

Prognostica.

1. Angina teste Galeno, 1. *aph.* 12. & 2. *aphor.* 19. Tral-  
liano, *lib. 4. cap. 1.* Celso, *lib. 4. cap. 4.* pestiferum acutū-  
que malum est, quod celeriter ad finem properat, ac pe-  
riculo non caret, ægrōsque laquei modo strangulat & suf-  
focat. Et si enim pars absolutè princeps non afficiatur: ea  
tamen pars afficitur, sine qua cor, membrum nobilissimum  
saluum esse non potest; quæ scilicet destinata est respira-  
tioni, & simul deglutitioni inseruit, quorum neutro ho-  
mo carere potest. Adest simul febris continua, quæ & cor-  
dis & ipsius corporis vires labefactat, ideòque Galenus, 1.  
*aph.* 12. hoc modo laborantibus salutis spem in virium  
robore consistere scribit. Et suffocatur plerumque æger,  
vel quia tumor eò vsque creuit, vel tanta facta est verte-  
brarum colli luxatio: vt faucibus coarctatus spiritus pla-  
nè percipiatur, vel quia rupto tumore pus in pulmones  
ruit eòsque implet.

2. Et quidem quo maior est faucium & gutturis angustia, eò periculosior est angina, præsertim si febris & ipsa sit acuta. Atque ita *συνάγχη* à posterioribus Græcis in specie descripta omnium periculosissima est & grauiissima, quæ intra vnam diem plerumque intra 4. iugulat, de quo Hippocrates, 1. aphorism. 34. *Si febrem habenti suffocatio repente superveniat, nullo tumore in faucibus existente lethale est.* Et 3. progn. 16. & in Coac. *Anginae grauiissimæ sunt & celeriter interimunt, quæcunque nihil conspicuum faciunt in faucibus neque ceruice, plurimum verò dolorem inferunt, atque orthopnæam.* Hæc enim in eodem die, & secunda, tertia, & quarta strangulant. Neque enim tum paruitas mali significatur, quod nihil conspici sese prodit, sed quia magnus dolor adest, & summa respirandi difficultas, significatur tumorem in internis gutturis partibus hære, ibique conclusum spiritui aditum præcludere, atque ita subito strangulare. Aliàs si respiratio & deglutitio non valdè lædatur, neque magnus dolor adsit, paruitas mali significatur. Idem tamen Hippocrates 3. de morb. *συνάγχη*, ad nonum diem protrahi posse docet.

3. *Παρασυνάγχη*, paulò minori cum periculo coniuncta est, & potest diutius protrahi, de quo Hippocrates 3. prognost. 17. *Quæcunque verò dolorem alioquin alteri similem inferunt, in faucibus verò tumorem & ruborem excitant, valdè quidem lethales sunt, recedentibus verò diuturniores, si magnus rubor adsit quia tandem in cynanchen transit.* Sic mortua quinta die Phytonis vxor, 3. epid. sect. 2. t. 7.

4. Minus periculi autem adhuc est à *συνάγχη*, in qua plus læditur deglutitio, quàm respiratio. Homo enim sine cibo & potu aliquantisper vivere potest, non verò sine respiratione, præsertim cùm febris coniuncta est, eaque acutior. Et tumor ad interna vergens euocari longius & medicamentis digeri potest.

5. Leuissima est, & omnium minimè periculosa Parasy-nanche; quia inflammatio longius à gutture abest; Hinc Hippocrates, 6. aphor. 37. *Angina correpto, si tumor in collo appareat bonum.* Foràs enim morbus fertur. Et 7. aphor. 49. *Ab angina detento tumor & rubor in pectore superveniens bonum;* quia

quia extra morbus fertur. Et 3. *prognost.* 18. quibus vero fauces & ceruix simul rubent, hæ sunt diuturniores; & maximè ex ipsis liberantur, quibus ceruix & pectus ruborem contraxerit, nisi erysipelas intro recurrat. Et aphorism. 20. 3. *prognost.* Securissimum est, si rubor quàm maximè foràs, in ceruicem scilicet & pectus feruntur. In his nimirum duabus differentiis neque dolore nimirum vexatur æger, neque difficultate spirandi tenentur. Etenim cùm partes hæ sint glandulosæ, molles & laxæ: affluentem humorem sine magna difficultate recipere, & quia laryngis musculi non inflammantur, respirationis viâ non intercluditur. Easdem sententias iisdem ferè verbis tradit Hippocr. *lib. de Coac. prænot.* Historias autem & euentus differentiarum 6. *Epidem. sect. 7.* ubi de signis anginæ epidemiæ loquens tandem concludit: *In summa; qui solùm deglutire non poterant, his valdè mites, & toleratu faciles erant; pessimè verò his, quibus vnâ spiritus sublimis erat.*

6. Angina laborantes nisi celeriter cocta exspuant, malè habent. Hippocrates in *Coacis*.

7. Angina biliosa periculosior pituitosa; quia & dolorem maiorem & febrem, & maiorem spirandi adfert difficultatem.

8. Si in angina tumore, & rubore intùs in faucibus apparente, rubor die non critico euanescat, remaneat verò tuberculum sine dolore, quod nec naturæ nec artis beneficio suppuratur, mortem vel ruboris recidiuam minatur, ex 3. *progn.* 17. Mortem quidem, quia relicta foris crassa materia tenuior & feruentior intrò ad guttur conuersa est; ruboris recidiuam, quia materia calidior ex accidente aliquo intrò repulsa est, non autem discussa.

9. Si in angina tumore & rubore foris apparente ista subito intrò euauerit, malum; quia materia ad interiora recurrens suffocationem parit, ex 6. *aph.* 25. Nisi tamen cricrice discussa, aut aliò depulsa materia hoc fiat, atque æger melius habeat.

10. Si febre detento repente collum intorqueatur, ac vix deglutire queat, nullo tamen tumore intùs vel foris apparente lethale est, 6. *aph.* 25. ob luxationem scilicet vertebrarum.



11. Pueris angina ferè accidit ex vertebrarum cervicis intrò-luxatione, 3. aph. 26. Huius curationem Paulus Ægineta, lib. 9. c. 27. non aggreditur; cùm nullam, vti censeret, illa recipiat; quod tamen intelligendum est non de luxatione, quæ ex crudorum humorum affluxu paulatim facta evenit, quæ antequam planè perficitur, curari potest; neque etiam ex crudo tuberculo, modò vertebra non planè suo loco deiecerit; quales fuisse videntur anginae, quas Hippocrates, 2. epidem. sect. 2. describit ex vertebrarum colli luxatione facta, quorum tamen neminem, qui tùm laborarunt, mortuum fuisse refert: sed quæ fit ab inflammatione, vertebra distendendo violenter suo loco dimouente. Hæc enim omnino incurabilis; cùm quia ipsa inflammatio reductionem vertebrarum prohibet, tùm quia respiratio & deglutitio valdè læditur.

12. Quibus ex Angina in pulmonem fit conversio, intra septimum diem moriuntur; si verò hos effugiant, ἔμψοι, id est, purulenti, evadunt, 5. aph. 10. & 3. prognost. 20. Si angina materia in pulmonem convertatur, desipientiam affert; & ægri magna ex parte ἔμψοι, fiunt. Εἴμψοι, enim fiunt abscessu rupto & in pulmonem effuso; vapores verò calidi sursum exæstuentes delirium excitant.

13. Si strangulatis & suffocatis, ita & anginosi, spuma circa os appareat, lethale signum est, 3. aphor. 43. Extremam enim cordis angustiam significat, feruorémque summum, à quo materiam agitante spuma illa excitatur.

14. Quando in angina magna fit spirationis angustia, & spuma iam in ore apparet, nulla sanitatis spes relinquitur, nisi æger adhuc viribus valeat, & nutrimentum appetat. Quando verò infirmo ægro febris inualefcit, & facies ægri sit viridis & sinus oculorum denigrantur, extremæque frigent, & lingua nigra ac crassa cernitur, lethale est. Nam in forti febre multa in spiratione opus est, quam angina negat, testè Avicenna capite proprio.

15. In anginosi subarida spuma gracilium mala, Hippocrates, in Coac. Angina enim talis est periculosa, sine tumore in collo & faucibus, vti prognost. 2. dictum, quo plerumque ægri suffocantur. Et licet, quod rarissimè fit, sup-  
puretur:

puretur : si tamen sputum sit subaridum , febrilem calorem maximè indicat , quo sputum glutinosum & crassum redditur. *Qui enim vt ibidem, habet Hippocrates , anginosi non celeriter exspuunt cocta ; lethali ter habent.*

16. Qui in angina tumores faucium sine vlla ratione repente euanescent, lethales sunt, *in Coac.* Etsi enim aliquando præcedente euacuatione , vel repellentium vsu tumor subsident : tamen si sine his atque ita præter rationem id fiat , malum periculosum est , cum non soluantur morbi manentibus iis , quæ eas faciunt, causis. Significatur enim materiæ ad interiora recessus , vnde periculosior in partibus internis morbus excitare potest , vel quod interdum accidit , ad partem vnde discedit , repente iterum delata subito suffocationem inducit.

17. *In anginis sine signis dolores in caput conuersi, lethale, in Coac.* Etenim cum fiant sine crisi, aut materiæ translatione, & manente eadem gutturis & faucium, angustia, ac difficili respiratione; malum non imminui & tolli, sed diffundi, & cerebro communicari significant. Eodem modo si in hypochondriis, vel cruribus dolor excitetur, & angina non solvatur , morbi augmentum & humoris vitiosi etiam alias partes occupantis redundantiam significat.

18. Qui vehementer suffocantur, narium pinnas exspirando contrahunt, in spirando verò dilatant. *Galenus 3. epidem. 2. comm. text. 4.* Cum enim ob extremum suffocationis periculum, aut caloris vehementiam membranarum respirationi inseruientium motus necessitati satisfacere non possit, natura ad cartilagineas illas diducendas sese conuertit, quasi aliquod commodi inde perceptura.

19. Soluitur autem angina vel tumoris *Αἰσθησις*, causa eius reuulsa distracta, euacuata aut discussa : aut tumoris maturatione, & puris ex illo aperto euacuatione , aut materiæ ad aliam partem translatione quod ex doloris & tumoris subita cessatione , pulsusque mutatione cognoscitur. Optimum autem est , materiam discuti, vel tumoris maturatam materiam euacuari, aliò eam transferri periculosum, vt iam dictum.

20. Transfertur autem materia vel ad cerebrum, vbi statim

rim dolor capitis grauis, deliria & phrenitis sequitur, vel ad musculos colli, vbi dolor & tumor, interdum & conuulsio excitatur; vel ad pulmones & pleuram, vnde dolor pectoris, tussis, difficilis respiratio oritur; vel ad cor, vnde tremor eius, syncope & pulsus obscuritas excitatur.

## Indicationes.

Quas aliæ inflammationes habent indicationes, eadem *Indica-  
tiones.* & in angina obseruandæ, saltem partis affectæ habita ratione. Nimirum sanguis & materia, quæ adhuc affluit, aut affluxura est ad partem affectam, reuellenda, deriuanda: quæ verò iam affluxit, adhuc tamen in paruis venis consistit, vel in parte fluctuat, ne in partem recipiatur, atque in eo consistat, repellenda; & in parte affecta foras protrudenda per adstringentia: quæ verò extra venas effusa est in partis spatia, & repelli non potest, insensibiliter discutientia est per digerentia, quod tutissimum est; vel si digerentibus non cedat, & ad maturationem tendat, maturatione adiuuanda, & diligenter simul cauendum, ne adstringentibus & refrigerantibus foris quocunque tempore applicatis materia intrò repellatur, sed relaxantia potius extrinsecus adhibeantur, quibus materia foras euocetur, periculumque suffocationis auertatur.

## Curatio.

## V E N A E S E C T I O.

Cùm ergo angina sit inflammatio, & quidem eius partis à qua præsens periculum suffocationis imminet, & à sanguine vel solo, vel cum alio humore mixto ortum habeat: in omni angina sanguinis missione & euacuatione opus est. Estque venæ sectio optimum, præsentaneum & compendiarium in hoc morbo remedium. Ideoque vt sanguis ad fauces ruens reuellatur & euacuetur, periculumque maximè vrgens auertatur, venæ sectio statim & sine omni mora instituat, præmisso, scilicet clystere.

Et quidem aperiatur in cubito cephalica aut mediana, aut vtraque si magna adsit plethora. Hoc enim modo & vena

vena in brachio aperta, & vniuersum corpus promptius euacuatur, & non parùm sanguinis à parte affecta auertitur. Et primò quidem mediana, hinc cephalica aperiatur, si vtriusque sectione opus. Et si inflammatio alteram partem magis affligat, vena in oppositum primùm brachio reuulsionis gratia, postmodum in latere eodem aperienda, aut si semel saltem venam aperire liceat, vena in eodem latere secetur. Si verò nullum lateris discrimen sit, aut dubitetur, vtra pars magis affligatur, sanguis ex dextro brachio emittatur, cùm epar sit plerumque pars mittens.

Si menses vel hæmorrhoides suppressæ sint, quæ vena primò aperienda sit, autores dissentiunt. Alij enim saphe-nam, alij venam in cubito primò aperiendum censent. Verùm distinctione hîc opus videtur. Etenim si periculum non vrgeat, ex poplite vel talo sanguinis missio primùm instituenda, vt menses suppressi reuocentur, & sanguis ad partes distantes reuellatur: imprimis si purgationis tempus instet. Et si malum augeatur, mox vesperi aut sequenti die cephalica aperienda; non tamen neglectis reuulsionibus, quæ in cruribus institui possunt. Si verò morbus vrgeat, & periculum instet, quod plerumque fieri solet, mox vena in cubito aperienda. Periculosum enim est, neglecta cephalica cum affecta parte communicante in distantissima parte venam secare. Vena autem brachij aperta postea venam in poplite aut talo secare licet. Sic enim & vrgenti affectioni, ac celerem reuulsionem & euacuationem requirenti, & suppressæ euacuationi satisfacit. Imò sunt optimi Medici, qui in angina periculosa non solum in suppressis mensibus venam primò in brachio secandam censent, sed etiam fluentibus mensibus. Et tali in casu, dum sanguis per venas superiores euacuatur, cucurbitulas femoribus affigendas censent, vt minor fiat sanguinis versus superiora retractio.

Euacuetur autem sanguis maiore vel minore copia pro eiusdem abundantia, magnitudine ipsius affectus & virium robore. Etsi verò fuerint, qui in angina etiam vsque ad syncopen sanguinem euacuandum censuerint, persuasi  
sen

sententia Galeni, qui *1. aphor. 34.* scribit, in ardentissimis febribus, in maximis inflammationibus & vehementissimis doloribus, vsque ad animi deliquium sanguinem detrahendum esse: tamen Græci, Aëtius, *terrab. 2. serm. 4. c. 47.* Paulus Ægineta, *lib. 4. cap. 37.* Trallianus, *lib. 4. cap. 1.* vt & Arabes plerique, item Cælius Aurelianus, *lib. 3. acut. cap. 4.* & posteriores Medici plerique, sanguinem non semel atque confertim, sed sæpius & repetitis vicibus euacuandum censent; ne, si confertim euacuetur, animi deliquio superueniente, suffocatio, quæ antea vrget, augeatur, ægerque suffocetur. Quanquam enim ipsa inflammatio, si sit magna, tale præsidium requirere videatur: prohibet tamen id respirationis difficultas, & imprimis suffocationis periculum. Respiratio enim cum sit actio vitæ valde necessaria, quâ ne exiguo tempore viuus homo carere potest: plus valet hîc prohibendo difficilis respiratio, quæ ex animi deliquio succedente ad largam sanguinis effusionem ita augeri possit, vt illico suffocatus æger interiret, quàm magnitudo inflammationis eam indicando. Itaque vbi minor est spirandi difficultas, copiosius, si inflammationis ratio postulet, sanguinem mittere licet, vt inflammatis faucium musculis. Si autem respirationis difficultas valde vrgeat, id quod accidit, inflammatis laryngis musculis, cauendum est à larga sanguinis missione, quæ animi deliquium inducere posset, sed tum partitis vicibus, quatuor vel quinque horarum intervallo sanguinem euacuare commodius est. Et repetita venæ sectio plus reuellit, quàm vna larga sanguinis euacuatio. Præterea cum sæpe accidere soleat, vt ad partem affectam nouus affluxus fiat, repetita venæ sectio etiam humores iterum affluentes auertit. Videndum tamen, ne nimis parcè prima vice sanguis euacuetur, ne, antequam alteram aut tertiam sectionem adhibere possimus, æger interim moriatur.

Et quidem primò in opposita parte vena aperiatur, deinde in brachio lateris affecti. Et si malum fert inducias, manè vna vena aperiiri potest, vesperi vel sequenti die altera. Foramen non fiat nimis angustum, ne crassior sanguis

intus remaneat, nec nimis amplum, ne spirituum magna copia dissipetur.

Grauidæ etsi sanguine emisso interdum abortiant, tamen in morbo tam periculoso necessitas postulat, ut sanguis, sed minore copia, detrahatur. Et plurimæ grauidæ ita sanguine abundant, ut venæ sectionem sine abortus periculo tolerare possint. Imò compertum est, nonnullas foeminas, nisi sanguis iis detrahatur, abortire aut in alia mala periculosa incidere. Fiat autem sanguinis euacuatio ex vena cubiti.

Si phlebotomiam vires non ferant, aut saltem repetitam sanguinis euacuationem non tolerant, cucurbitulæ cum scarificatione apponantur cruribus, vel supra renes, postea etiam in brachiis, non in collo. Nam si statim in principio cucurbitulæ parti in loco affecto propinquæ applicantur, maior ad partem affectam fluxus concitabitur, malumque augebitur. Postea verò in loco propinquo applicari poterunt; sicut venas sub lingua secare licet, ut postea dicetur. Simul etiam alia adhibeantur, quæ repellere possunt, ut lotiones & frictiones, ac ligaturæ extremorum, & cucurbitulæ in partibus remotioribus, ut modò dictum.

#### *Purgatio.*

*Purgationem,*

Venæ sectione peracta mox instituenda purgatio, præcipuè si bilis in corpore abundet, ut illa pharmaci irritatione motus humorum fiat *καταρροια*.

Cùm autem anginæ coniungatur febris, de purgatione initio anginæ instituenda autores dissentiunt, dum alij & plerique omnes Græci ac Arabes summum periculum attendentes, mox in principio purgandum esse censiunt alij verò, inter quos præcipuus est Massariæ, ad cruditatem humorum respicientes purgationem in principio prohibent.

Verùm febris natura hic attendenda. Nam, quod plerumque fieri solet, si febris vel præcedat anginam, vel simul cum ea inuadat, & materia peculiari naturæ motu humores vitiosos extrudere conantis ad fauces depellatur, atque ita humores turgentis materiæ conditionem referant

referant, & errabundi quasi à natura è venis expellantur, nondum immobiles sint, & licet ad certam partem ferantur, vagabundi tamen adhuc quasi sint, & tales, qui etiam ad aliam partem mox moueri possint, sicut sæpe angina in pleuritidem & peripneumoniam mutatur, ad turgentem materiam meritò referuntur, & propterea ex consilio Hippocr. 1. *aphorism.* 22. statim euacuandi sunt: Id quod etiam à doctissimis Medicis hætenus cum commodo ægrotorum factum fuit, & ipse Hippocrates præcepit, *lib. de locis in hom. & lib. 3. de morb.*

Et omninò sunt in ea sententia, et si angina sit inflammatio, (quod & pleuritide, peripneumonia, parotidibus & similibus affectionibus intelligendum) primam tamen occasionem ei præberi à cacochymia, (nisi causa externa sanguinis affluxum excitet, ut spinæ vel ossicula gulæ infixæ, vel vertebrarum luxatio.) Natura enim irritata à prauis humoribus, eos ad partes corporis externas detrudit, ad latera, tonsillas, fauces, post aures, ad inguina, & alias partes. Verùm ut in hæmorrhagiis narium criticis, quæ in febribus acutis à natura sæpe instituuntur, non præcipuè sanguinis, sed cacochymia causa ea euacuatio à natura instituitur: ita & hîc natura quidem vitiosos humores expellere conatur, non tamen eos sine sanguine extra venas protrudit, sed cum sanguine permixtos extra venas in spatia partium effundit, vnde inflammatio excitatur. Et ipsi tales humores è venis effusi, acrimonia & prauitate sua naturam stimulantes, maiori sanguinis affluxui occasionem præbent.

Si autem inflammatio præcedat, neque ea ex humoribus vitiosis à corpore protrusis ortum habeat, & postea febris sequatur, non adeò multum commodi ex purgatione prouenit, nisi forsitan metuatur, ex affluxu humorum vitiosorum inflammationem augeri posse.

Et quidem maturè statim in initio instituenda purgatio. Narratque Alexander Trallianus, *lib. 4.* se eodem die sanguinem misisse & purgasse, his verbis: *Post missionem sanguinis, si nullus laxitatis sensus oriatur, sed cibi & aëris*

*transitus adhuc impediatur, etiam venas linguae subiectas incidere ne graueris, neque in crastinum differre, sed eodem die facito. Ego sanè memini, me, cum usus valdè vrgeret, venā manè aperuisse, diluculo linguae subiectas secuisse, & vesperi ex cremore ptisanæ extractū scammonij exhibuisse, atq; ita laqueum ex inflammatione ortum vix potuisse dissolvere. Imò aliū quendā noui me, postquā brachiorum duorū venas in cubito secuissem, repurgasse, sequenti die non expectato. Et omninò affectus grauitas sæpe purgationem ita vrget, vt statim instituenda sit, nec tempus matutinum expectari possit. Etsi enim & ad venæ sectionem, & ad purgationem horæ matutinæ sint commodissimæ; tamen vtraque etiam tempore vespertino institui potest, si quid mali impediat, vel vt venæsectio vel purgatio maturetur, vrgeat. Itaque si suffocationis periculum vrgeat, manè instituta venæsectione, vesperi exhiberi potest purgans. Sic non solū Trallianus, vt modò diximus, vesperi purgauit, sed & Galenus, 14. M. M. cap. 8. in quodam, cui lingua tumefacta erat, vt ore contineri non posset, purgans vesperi exhibuit.*

Eligantur autem purgantia, quæ febrim non augeant, nec humores valdè agitent, cassia, manna, tamarindini, syrupus rosar. & violar. sol. rhabarbarum, electuarium diasebesten, diacatholicum. Si humor pituitosus admixtus sit, fortiora vsurpare licet. Vt ℥. Syrup. rosar. solut. ℥. iij. vel iv. Aqu. cichorij ℥. ij. M. Vel ℥. Manna ℥. j. β. vel ℥. ij. Dissolue in iusculo pulli, vel decocto prunorum, iterum colentur. Exhibeatur horis duabus ante prandium. Vel ℥. Rhabarb. elect. ℥. iv. cinamoni ℥. β. Infunde in decocti communis flor. & fruct. vel aqu. endiu. ℥. iij. vel ℥. iv. In colatura dissoluatur manna ℥. j. vel ℥. j. β. Colatura exhibeatur, postea detur feri lactis caprini ℥. j. vel ℥. j. β. Ita enim purgatio sine insigni calefactione perficitur. Vel ℥. Electuar. de psyllo ℥. β. Dissoluatur supra ignem in decocti florum vel fructuum, vel pectoralis, vel aqu. cichor. ℥. iij. β. In collat. dissolue manna ℥. j. Iterum coletur. Adde syrupi violar. ℥. β. M.

In humore pituitoso addatur agaricus. In melancholia



lia admixta sena & manna exhibeatur. Sena enim & manna in actionis modo & tempore valdè conueniunt.

Recentiores Chymici hîc etiam vomitoria & antimoniaia exhibent, sed nulla euidenti ratione adducti. Neque ea tutò in morbo, qui aliàs suffocationem minatur, exhiberi possunt. Ita refert Trincauellus, *lib. 5. cap. 7. de ration. curand. part. corporum affect.* foeminam quandam sumpto medicamento purgante, & quidem cassia saltem, excitato vomitu, statim strangulatam interiisse.

Verùm quia facultas deglutiendi plerumque est impedita in angina, frustra sæpe præscribuntur purgantia, quæ æger deglutire non potest. Rondeletius equidem pilulas dissoluit. Verùm vix hoc tutum est. Propter abominandum enim saporem facilè vomitus excitari posset, qui in hoc affectu minimè tutus. Et modò æger liquida deglutire possit, facilè alia purgantia concinnari possunt, vt pilulas dissoluere opus non sit. Vbi verò planè purgantia sumere æger non potest, clysteres acriores ex emollientibus & cholagogis, & quidem, si febris acuta coniuncta sit, clementioribus constantes iniiciendi, & iterum atque iterum deinceps reiterandi sunt. Vt *℞. Malua, parietar. mercurial. centaurij minoris, an. m. j. Coqu. in aqu. simpl. Colat. ℞. lb. j. adde electuar. diacathol. de succo rosar. an. ʒ. j. ℞. mellis rosar. collati ʒ. j. ol. violat. ʒ. ij. salis. ʒ. ℞. F. Clyster. Vel ℞. Decocti emollient. ʒ. ix. in quibus dissolue elect. diasebesten, ʒ. j. diaphanic. ʒ. iij. ol. violac. ʒ. j. ℞. sal. gemm. ʒ. ℞. M. F. Clyster. Vel ℞. Decocti st. & fr. ʒ. ix. in quibus dissolue, elect. lenitiu. ʒ. vj. de psyllio ʒ. ℞. syr. ros. Sol. ʒ. j. sal. comm. ʒ. j. M. F. Clyster.*

### Repellentia.

Statim post primam sanguinis missionem purgantia vsurpanda sunt, ne inflammatio augeatur. Debent autem repellentia solùm intus in faucibus, non verò extrà adhiberi, ne materia magis ad interiõra & versus fauces repellatur.

Vsurpanda verò sunt repellentia forma gargarismorum & collutionum oris, vel linctuum. Et si enim quidam &

Repellentia.

suffimigij formâ talia exhibeant: tamen cùm omnia, quæ in fumum resoluta ore & faucibus hauriuntur, guttur & fauces exasperare, & suffocationem augere soleant, à plerisque hic modus reiicitur. Et quidem forma gargarismorum, seu collutionum vtilissima est. In infantibus tamen, qui gargarizare non valent, sæpe linctibus utendum est.

In Medicamentis autem inueniendis hîc non solum ad communem, quæ ex natura inflammationis sumitur, indicationem respiciendum, sed etiam ad partis affectæ conditionem. Nam cùm, vt Galenus, *1. de comp. med. sec. loc. cap. 1.* docet, non solum rarior & mollior sit superficies tunicæ oris, quàm est cutis, quæ totum corpus ambit, & præterea ex medicamentis aliquid facile in ventriculum vel pulmonem defluere possit, sint illa talia, quæ omnis acris & malæ qualitatis, quæ vel fauces lædere, vel deglutita nocere possunt, expertia. Et cùm diutius in ore, vbi gustus sedes est, detinenda sint, quantû fieri potest ingrato sapore careant, ne nobis accidat, quod Medico illi seu imprudenti seu imperito accidit, qui cùm referente *ibid.* Gal. gargarisma ex atramento sutorio constans adhibuisset, magnum cum insuauitate nocumentum gulæ & asperæ arteriæ extremitati, ac ventriculo & pulmone intulit.

*Quatuor  
medica-  
menta à  
Galeno.*

Commendatur à Galeno, *6. de comp. med. sec. loc. cap. 1.* quatuor medicamenta, quod ex musto, quod ex moris, & quod ex nucum corticibus viridibus cum melle, quod insuauitatem & nimiam astringendi vim, quæ est in his succis, temperat, conficitur.

Primum ex musto fit, iniiciendo ad decem musti heminas, tres heminas rhois coriariorum, aut eius, qui obsoniis inspergitur; vel ex vtriusque parte æquali. Cuius quidem plures aliæ descriptiones ibidem leguntur. Alterum ex moris ita fit: ℥. succi mororum heminas vj. ad strigmentitiam spissitudinem coquito. Deinde tritas croci 3. j. myrrhæ 3. ij. omphacij 3. j. alumin. sciss. obel. iij. mellis heminam vnâ addito. Vel ℥. croci 3. β. alum. 3. iij. β. iniiciatur, & passi hemina vna, & vini maris expertis austeri hemina vna. Coctura autem fit vsque ad com-

pagem melleam. Tertium fit ex mororum rubi succo, eodem modo, vt ex succo mororum. Quartum denique fit ex nucum corticibus viridibus, si eorum succus exprimatur, per linteum excoletur, coquatur, & tandem mel, veluti in eo, quod ex moris fit, admisceatur. Inter hæc autem medicamenta primum est mitissimum, secundum fortius, tertium adhuc fortius, quartum fortissimum, quod etiam præcipuè à Galeno commendatur. Hoc enim vim astringendi cum substantiæ tenuitate habet, atque ita profundius penetrat, cuius rei argumentum est, quod succus ille manibus tractatus ita altè inficit, vt faciliè abstergi non possit. Vario autem modo, vt Galenus ibidem docet, ad diuersa morborum tempora eiusmodi medicamenta parantur. Si enim in ipsis astringens qualitas præualeat, principiis conueniunt, Si verò mitigatoria & laxatoria ac concoctoria, in doloribus & vigoribus inflammationum. Imò si vnum saltem horum medicamentorum præsto sit, id ipsum per aquam simplicem solui, & per additionem parabilium cuius tempori & scopo accommodatum reddi potest. Sunt autem parabilia ex astringentibus, rosæ, & myrti baccæ, & myrtus, & lentiscus, & rubus, & rubus caninus, & galla omphacitis appellata, & Ægyptiæ spinæ fructus, omniâque aluminis genera. Post hæc parabilia sunt rhus culinariis & coriariis, & succus, qui ex Syria affertur: atque hic quidem per se admiscetur, culinariis autem & coriariis rhus aqua prius decocti, vtiles mixtura fiunt. Est autem & glaucium ex parabilibus, & omphacium, & cytrini, & balaustia. Ex discussoriis autem parabilia moderata sunt caricarum & fursurum decoctum, & aqua mulsæ, in qua origanum, aut hyssopum, aut thymus, aut calamyntha, aut pulegium, aut mentha odora, quàm hedyosmum vocant, sint incocta: fortiora autem sunt etiam hæc, si diutius eoquantur, amplius autem & nitri spuma, aut ipsum adeò nitrum vstum: fortius verò his est sulphur viuum. Vtilis est & succus malorum, citriorum, & rob cornorum, ac sorborum, syrupus granatorum, myrtillorum, de siccis, dia-

morum vt & decocta & aquæ prunellæ, plantaginis, polygoni, plantaginis, maluæ arboreæ, folior. rubi, myrti, radic. pruni syluestr. fumach, semen rosarum, balauſtia, cortices granatorum, hypociftis, acacia. Atque ex his eligantur fortiora vel mitiora, prout maior vel minor fuerit inflammatio, humorumque affluxus, & prout corporum natura ſeſe habet. Mollioribus enim & ſceminarum corporibus mitiora, fortiora durioribus adhibenda. Ita etiam in laryngis inflammatione primò mitiora adhibenda medicamenta, ne dolor & ſymptomata fortiorum vſu exaſperentur. Ideoque præcipue illa valida adſtringentia, gallæ, balauſtia, fumach, hypociftis, vix ſola vſurpanda, ſed modicè ſaltem, vbi opus eſt, reliquis admiscenda. Monendū & hoc, in angina, quæ à ſpina vel offiſculis, vel aliis rebus acutis gulæ inhærentibus, fit, adſtringentia locum non habere. Talis enim inflammatio citò ad ſuppurationem duci poſtulat. Ab adſtringentibus verò tum dolor intenditur. Cùm enim talia corpus acutum infixum magis parti impingant, dolorem intendunt.

Attendendum & hoc, pro humoris inflammationem excitantis varietate medicamenta etiam varianda eſſe. In ſanguine enim & bile refrigerantium & repellentium viſ intendenda; in pituita autem reſoluentium; in melancholia emollientium.

Succi vel illinantur faucibus, vel diſſoluuntur in decoctis aut aquis, iſſque os colluitur potius, quàm vt gargarismus fiat, ne nimia gargarificatione affluxus augeatur. Eadem collutiones oris ex aquis deſtillatis & decoctis plantarum modò enumeratarum parantur.

In principio ergò ſequens gargarismus vel oris collutio vtilis eſt.

℞. Hord. integr. ꝑ. ij. ſol. vitis, plantag. an. m̄. ſ. flor. roſar. rubr. ꝑ. ij. balauſtior. ʒ. ſ. fragor. excicat. ʒ. j. ſ. ſem. acetos. ʒ. j. Coq. in aq. comm. pro ꝑ. j. in qua diſſolue Succ. cort. nuc. iugland. virid. ʒ. j. ſyr. gran. ʒ. j. ſ. m̄. Vel ℞. Rad. althææ, ʒ. ſ. ſol. rubi, m̄. j. alum. vſſi, ʒ. ij. ſacch. ʒ. ſ. Coq. in aq. comm. pro ʒ. x. In quibus diſſolue mell. roſat. colat. ʒ. j. ſ. ſucci myrtillor. recēt. ʒ. j. M. Vel ℞. Aq. plant. prunel. roſ. an. ꝑ. ſ. acet. roſ. ʒ. ſ. ſucci granat. ʒ. j.

In quibus dissoluatur, *diamori, rob nucum*, an. ʒ. j. ʒ. ʒ. pro oris collutione. Vel ʒ. *Aq. radic. altheæ*, lb. j. Coq. in ea flor. *malvæ arboreæ* Colat. adde syr. de succo *cydonior.* ʒ. iij.

Vel colluatur os lacte, in quo lens palustris cocta sit.

Aliàs si dolor non vrget, sola repellentia vsurpanda.

Vt ʒ. *Fol. plantag. prunell.* an. m. ʒ. flor. *rosar. rubr. malvæ arbor.* an. P. ij. *balaust. sem. cydon.* an. ʒ. j. Coqu. in aqua hordei, lb. ʒ. ad tertiæ partis consumptionem. Colaturæ adde *diamori, dianuc.* an. ʒ. j. M. Vel ʒ. *Summitat. rubi*, m. j. *balaust. cortic. granator.* an. ʒ. j. Coqu. in aqua simpl. Colaturæ lb. j. adde *diamori. rob nucum*, an. ʒ. j. M. Vel ʒ. *Agrimonia, plantaginiss* an. m. j. *rosar. rubr. cortic. granator. sem. acetosæ, portulacæ*, an. ʒ. ij. Coq. in aq. ad lb. j. Adde *diamor. dianuc. succi granator.* an. ʒ. j. ʒ. F. gargarismus. Vel ʒ. *Aq. prunell. acetosæ, ros. rubr.* an. q. s. *diamor. rob. sambuci*, an. cochlear. j. M. Linctus etiam profunt ex diamoro cum succo granatorum, vel ex syrupo de iuiubis, myrtino, diamoro.

Si dolor sit vehementior, admiscenda sunt medicamenta, quæ dolorem leniendi vim habent, & præcauent, ne fauces exasperentur. In quem vsus lac utilissimum, possuntque in eo coqui summitates rubi, reliquis etiam addi glycyrrh. iuiubæ, passulæ.

Recentiores hîc laudant sal *prunellæ*, siue nitrum præparatum in oris collutionibus.

Deinde ex Conradino, lib. de feb. Vngar. cap. 119. hanc aquam.

ʒ. *Semperuiui maj.* q. v.

Contundatur succusque exprimatur, & singulis lb. addatur *Salis ammoniaci*, ʒ. ʒ. reponantur in loco humido, donec sal liquescat. Postea aqua destilletur, qua fauces colluantur. Si verò hæc aqua in promptu non sit, sumatur aqua *semperuiui vulgaris*, & in eius libra vna dissoluatur *salis ammoniaci*, ʒ. j. ac modo dicto adhibeatur. Vel ʒ. *Cancros viuos viij. sedi maior.* m. iv. Contundantur, & succus exprimatur, quo fauces colluantur.

Vel ʒ. *Ap. semperu. maj.* lb. j. ʒ. & admisc. succum ex quatuor cancris viuis expressum.

Verum ista etſi in angina etſiam ſuum locum habere poſſint: tamen ab autoribus horum medicamentorum inuenta & uſurpata ſunt ad linguæ ardorem, ſiccitatem & nigredinem in febribus ardentibus, quod malum vulgò *die Breune* nominatur, quod ab angina differte ſupra diximus. Iſtud enim faucium & linguæ incendium & ſiccitas febrium acutarum ſymptoma eſt, neque ab eo tam ſubitò ſuffocationis periculum, ut in angina, imminet.

Valdè etiam in hoc affectu prodeſt caſſia extracta cum aq. plantag. diſſoluta, & collutionis loco adhibita, ut & decoctum cortic. ligni berberum, vel cortic. interioris coryli. Ut & decoctum auenæ rubescens, item decoctum ſol. & cymarum ceraſi arboris. Pauperiores vtantur aquâ fabrorum, vel aquâ & aceto inuicem mixtis, vel aquâ hordei.

Notandum autem hîc in vniuerſum, quæcunque in calidæ valdè & ſanguineæ anginæ incremento & ſtatu imponuntur, eadem pituitosæ initiis præſcribi poſſe: Et quæ declinantibus illis, eadem vigentibus his debent adhiberi.

#### *Deriuantia.*

*Deriuantia.*

Postquam venæſectio in cubito & purgatio eſt inſtituta, etiam venæ narium, & quæ ſub lingua ſunt, aperiantur, aut hirudines venis narium, frontis, poſt aures & ceruici applicentur. Nonnulli & ſcarificationes aurium adhibent. Trallianus, ut ſuprà dictum, eodem mox die, non expectato craſtino, venas linguæ ſubiectas incidit. Sed Gale-nus, neque ſine ratione, in principio anginæ venam in cubito ſecat, ut reuellat, quod inſluit; poſt principium autem venas ſub lingua, ut quod in parte affecta vel locis vicinis collectum eſt, euacuetur, in *lib. de cur. rat. per ſang. miſſ. cap. 9. & 4. de rat. victus in acut. aph. 30.* Si tamen morbus admodum velox eſſet, primo die venam ſub lingua cum Tralliano ſecareliceret.

#### *Digerentia.*

*Digerentia.*

Malo procedente & augeſcente, quod ſecundo, & tertio die accidere ſolet, præpoſitis repellentibus digherentia admiscenda. Monentque hîc doctiſſimi Medici plerique, in  
angina

angina rarissimè solis repellentibus, & non, nisi cùm imminet inflammatio, aut vbi primùm incepit, vtendum esse, & contra solis discutientibus vix etiam vnquam vtendum esse, atque in eo differre curationem anginae ab aliarum partium inflammationibus, in quibus in principio sola repellentia vsurpantur; post statum verò repellentia omitti possunt; idque ob partis affectæ naturam. Cùm enim partes, quæ in angina afficiuntur, ferè sint laxæ & molles, citòque inflammationem admittant, etiam in principio discutientium aliquid addendum, ne humor qui influxit, nimio refrigerantium vsu impactus hominem suffocet; in fine etiam aliquid adstringentium addendum, vt partes roborentur & ne solo discutientium vsu in parte laxa & molli maior, vel nouus humorum affluxus conciteatur. Vbi ergo morbus augmentum sumpsit, gargarismis vtendum discutiētibus ex decocto thimi, pul. calam. hyssop. orig. beton. glyc. flor. cham. melil. sem. lin. fæn. & similibus.

Vel ℥. Glycyrrh. rec. ʒ. j. passul. mundat. Par. x. dactyl. caricar. an. P. iv. sem. alth. fænig. an. ʒ. ij. bord. integ. P. j. fl. viol. cham. an. P. ʒ. Coq. Col. addè mell. ros. col. ʒ. ij. ciner. hirund. ʒ. ij. croci ʒ. ʒ. F. gargarismus.

Vel ℥. Hyssopi, puleg. an. m. ʒ. beton. P. ij. rad. glycyrrh. ʒ. iij. passul. minor. ʒ. j. Coq. in f. q. aq. fluuiat. pro ʒ. ix. In quibus dissolue oxymel. simpl. j. ʒ. diamori ʒ. vj. M.

Vel ℥. Aq. althææ, lb. ʒ. hyssop. ʒ. ij. syr. de beton. ʒ. j. ʒ. M. Vel ℥. Fol. plantag. prunell. an. m. ʒ. balaust. flor. rosar. rubr. cham. an. P. j. caric. pingu. N. iij. hordei m. ʒ. sem. lini, fæn. an. ʒ. j. Coq. in aq. simpl. Col. ℥. lb. j. Cui adde mellis rosacei col. ʒ. j. dianuc. ʒ. j. ʒ. F. gargarismus.

Commendatur & aqua è fol. & flor. periclimeni. In statu augeantur discutientia & emollientia. Galenus consistente fluxu crocum & myrrham addit, quæ concoquere & discutere valent, crocūque similiter leniente adstringit, Vt

℥. Fol. prunell. violar. an. m. j. scabios. malu. albor. an. m. ʒ. flor. chamamel. melilot. an. P. j. glycyrrh. ras. ʒ. iij. sem. fæn. ʒ. ij. caricar. pingu. N. iij. passul. ʒ. ʒ. Coq. in aq. hordei f. ad tertiæ partis consumptionem.

Colaturæ ℥. ℥. j. in qua dissolue *cassia recent. extract.*  
 3. ℞. *myrrh.* 3. j. *croc.* 3. ℞. *mell. rosat. colat.* 3. j. Misce pro  
 gargarismo.

Ad dolorem leniendum valet succus ex pane albo in a-  
 qua vel lacte cocto expressus, item cremor ex furfuribus  
 tritici expressus, ut & mucilago semini lini, cydonior. al-  
 thææ, succus ptisanæ, lac amygdalarum dulcium, & sem.  
 4. frigid. maior. item cassia cum parte æquali olei amy-  
 gdalarum dulcium mista.

Declinante tandem morbo coquitur aliquid de nido  
 hirundinis, aut dissolvitur in colatura cinis combusta-  
 rum hirundinum & cochlearum combustarum: Vel, quod  
 nonnulli pro secreto habent, cancrorum combustorum,  
 aut cribratum album canis, aut gallinæ. Illinire etiam li-  
 cet faucibus illa stercore melle excepta.

## EXTRA ADHIBENDA.

*Exsiccantia, & resolventia.*

*Externa.*

Dum hæc intus faucibus adhibentur, tentandum omni  
 modo, ut inflammatio exteriora versus trahatur, & discus-  
 tiatur, in quem usum multa passim ab autoribus propo-  
 nuntur, ut oleum dulce, amygd. dulc. chamæmeli, ane-  
 thi, lilior. arborum, quorum aliqua sponsia vel lana suc-  
 cida applicari possunt, succus cucumeris sylvestr. melle  
 subactus, & huius generis alia. Inter quæ tamen ab ini-  
 tio, & ubi corpus non satis euacuatum fuerit, mitiora e-  
 ligenda, ne humoribus attractis malum augeatur.

In principio ergo & prima statim die anterior colli  
 pars illinatur, oleo chamæmelino, amygdal. dulcium, vel  
 liliorum alborum.

Vel ℥. Ol. lilior. alb. amygdal. dulc. violac. an. 3. ij.  
*pingued. capon.* 3. j. *empl. de meliloto q. s. M. F. linimen-*  
*tum.* Vel ℥. *Mucilag. gummi Arabic. tragacanth. sem. cy-*  
*donior. aq. ros. extr.* an. 3. ij. *butyri recentis insulsi, pingued.*  
*porcin.* an. 3. j. *stercor. hirund.* 3. ℞. *ol. irini, chamæmel.* an.  
 q. s. M. F. linimentum. Præstantius est unguentum Varan-  
 dæi.

℥. *Pulv. nidi hirund. stercor. canis ieiunio macerati, co-*  
*lumbi*



*lumbini*, an. ʒ. j. *rad. ireos*, *flor. chamæm.* an. ʒ. *β. pingued. gallinar.* ʒ. *β. ol. lilior. alb.* ʒ. j. *β. ceræ flauæ parum.* M. pro vnguento, quo collum & partes tumentes inungendæ.

Vel parentur cataplasmata ex farina vel cremore sem. lini, *fenigræci*, *althææ*, *maluæ*, *hordei*, *flor. chamæm. meliloti*, & similibus.

Vel ʒ. *Farina hordei*, *pulpæ passul.* an. ʒ. ij. *pulu. rad. althææ*, ʒ. j. Cum *ol. amygd. dulc.* Fiat cataplasma. Hoc etiam vtile est:

ʒ. *Farin. bord.* ʒ. j. *mucilag. sem. lini & althææ cum aqua maluæ factæ*, an. ʒ. *β. pulu. flor. chamæmel.* ʒ. iij. Cum oleo *chamæmel. amygdalar. dulc.* an. f. q. Fiat cataplasma.

Nidum etiam hirundinis cataplasmatibus modo foris applicandum admisceri vulgatum est, idque cum commodo ægrorum fieri vsu deprehensum; de quo postea *quæst.* 3. dicetur.

Vt ʒ. *Nidum hirundin.* N. j. *fol. maluæ, violar.* an. m. j. *flor. chamæmel. melilot.* an. m. *β. rad. althææ*, ʒ. vj. *lilior. albor.* ʒ. ij. *ficuum*, N. iv. Coquantur ad mollitiem. Contusis adde *farin. sem. lini, fenigræc. hordei*, an. ʒ. iij. *butyri recent.* ʒ. *β. olei amygdal. dulc. chamæmel. viol.* an. q. s. F. cataplasma ad anteriorem colli partem.

Vel ʒ. *Nidum hirundinis*, Coq. in decocto *radic. althææ*, ad pultis consistentiam. Adde *Ol. amygdal. dulcium, anethi*, an. ʒ. ij. *croci.* ʒ. j. *cassia*, ʒ. j. *β.* Fiat cataplasma. Vel ʒ. *Farin. tritic.* ʒ. ij. *sem. lini, fenigræc.* an. ʒ. j. *caricar. ping.* ʒ. *β. nidi hirundin. contusi*, ʒ. j. Cum oleo *lilior. albor.* Fiat cataplasma.

Vel ʒ. *Stercor. hirund.* ʒ. j. *farin. fabar.* ʒ. ij. *ol. chamæmel. lilior. albor.* an. q. s. Fiat cataplasma.

Paratur & tale emplastrum vel cataplasma ex nido hirundinis.

ʒ. *Nidi hirundinis*, ʒ. ij. *vnguenti dialthææ. æsopi* an. ʒ. j. *β. rad. iridis* ʒ. ij. *ol. irini, lilior. alb.* an. ʒ. *β. ceræ flauæ* q. s. Fiat emplastrum.

*Cataplasma de nido hirundinis. D. Pauli Lutheri.*

ʒ. *Pulu. nidi hirundin.* ʒ. iij. *radic. alth. chamæmeli*, an. ʒ. iij.

℥. iij. *fenigræc.* ℥. ℞. *mutilag. ficuum cum aq. chamæm. expr.*  
 ℥. j. *ol. chamæm. lilior. alb. amygd. dulc. an.* ℥. ℞. *Fiat l.*  
*a. cataplasma.*

*Aliud emplastrum ex nido hirundinis.*

℥. *Nidor. hirundin.* N. j. *Coq. in aq. malu.* ℥. vj. *Postea*  
*colentur & exprimantur fortiter. In colatura coqu. Rad.*  
*malu. bryon. althææ, an.* ℥. ij. *sem. lini, ℥. j. nigell. ℥. j.*  
*herb. violar. parietar. an.* ℥. ij. *ol. lilior. cheirini, axung. por-*  
*cin. an.* ℥. iij. *cereæ, ℥. jj. F. l. a. emplastrum.*

*Aliud ex cineribus hirundinum & albo græco paratur*  
*h. m.*

℥. *Ciner. hirund. stercor. canis perieiunium-emaciati an.* ℥.  
 ℞. *pulu. croci, flor. spicæ, an.* ℥. j. *benzoës ℥. ℞. mellis ℥. iij.*  
*F. cataplasma.*

*Vtile est etiam cataplasma ex medulla cassiæ cum oleo*  
*chamæmeli, & vnguento dialthææ, & emplastrum de me-*  
*liloto.*

*Vel* ℥. *Sem. cymini ℥. j. absinthij viridis contusi, farina*  
*hordei ℥. ℞. albi græci, ℥. iij. Cum melle fiat Cataplas-*  
*ma.*

*Vel* ℥. *Furfuris tritici, albi græci, an. q.v. Cum melle*  
*fiat cataplasma.*

*Laudatur etiam epithema ex aq. scabios. ℞. j. & spir.*  
*vini ℥. j. loco affecto admouendum.*

*Fortiora fiunt emplastra, si aliquid fermenti, vel cepa*  
*sub cineribus cocta addatur. Nonnulli etiâ mel anacardi-*  
*num & vesicatoria applicant. Notandum etiam, vt medi-*  
*camenta ista semper calida actu applicentur.*

*Si materia rebellis digerentibus non cedit, etiam in*  
*parte affecta, vel ei vicina cucurbitulas affigere licet, sub*  
*mento scilicet, si tumor circa fauces & maxillas existat, in*  
*collo verò inter 2. & 4. vertebrae, cum affectis inter-*  
*nis musculis tumor foris non apparet. Et si materiam ad*  
*externa vergere videmus, adiuuandus est motus materiæ*  
*appositis ceruici cucurbitulis cum scarificatione, vt san-*  
*guis ad circumferentiam extrahatur.*

*Matu-*  
*rancia.*

*Maturantia.*

*Si verò malum discutientibus non cedit, indicio est, ad*  
*suppu*

suppurationem tendere, quod plerumque quarto vel quinto die contingere solet. Quod si animaduertatur, adiuvanda est maturatio, tum externis, tum internis medicamentis.

Intus quidem utile est frequenter cassiam extractam, seu medullam cassiæ in ore tenere, ut paulatim liquefcens in gulam descendat. Lenit enim, maturat & resoluit. Gargarismi verò & collutiones fiunt ex lacte tepido cum saccharo, vel ex decocto radic. althææ, maluæ, lilior. alb. caricarum, dactylorum, iuiubarum, passularum.

Vel ℥. Flor. malu. violar. an. m. j. scabios. summitat. meliloti, an. m. β. nidi hirundin. ʒ. β. caricar. pinguium, N. v. passular. ʒ. β. semin. lini ʒ. ij. cydon. ʒ. j. Coq. in aqu. hordei simpl. Colat. adde sapæ ʒ. ij. F. gargarismus.

Vel ℥. Passular. exacinat. ʒ. j. glycyrrh. ʒ. β. caricar. ping. N. v. sem. althææ ʒ. ij. cydonior. ʒ. j. Coq. in hydrom. vel aqua pro gargarismo.

Vel ℥. Dactylos N. ij. caricar. pinguium ʒ. β. chamem. p. j. sem. lini fenigræci, an. ʒ. j. Coq. in aq. l. ad medietat. consumpt.

Colat. ℥. lb. j. in qua dissolue sapæ ʒ. ij. M. fiat gargarismus.

Extrâ verò applicari possunt emplastra maturantia, ex farina & remanentiis decocti sem. lini & fœnigr. cum butyro non salito, adipe gallinæ, & oleo lilior. alb. & quæ antea fuerunt proposita, ex nido hirundinis.

Vt ℥. Nidi hirund. pulu. ʒ. β. sem. lini, fœnigræc. radic. althææ, an. ʒ. β.

Coqu. ad formam pultis, & addatur ol. chamemel. ʒ. j. Fiat cataplasma.

Vt autem facilius rumpatur abscessus, aliquid nitri, vel cineris hirundinis, vel stercoreis canini addi potest.

Vel ℥. Sem. sinapis, ʒ. j. Coq. in hydromel. lb. j. Pro gargarismo.

Nisi spontè abscessus rumpatur, æger ut sreatu & leni tussi, vel vi id præstet conetur. Nonnulli præcipiunt,

vt æger spongiolam filo alligatâ, aut carnem falsâ semicoctâ deglutiat, vt filo attracto abscessus rûpatur. Alij panis crustam deglutire iubent. Verùm cùm liquidus cibus vix deglutiri possit, multò minus solidâ deglutientur. Commodum ergo ceream candelam oleo, amygdal. dulc. illitam in œsophagum immittere, vt ita rumpatur abscessus. Alij hiante ore linguam deprimunt, & cultro ligneo acuto, vel scalpello tumorem, si conspiciatur, aperiunt. Quæ omnia tamen cautè peragenda, ne in periculum suffocationis æger coniiciatur.

Abscessu rupto, ne pus in pulmones aut gulam influat, id prono capite exspuat æger. Postea vlcus extergatur colutione vel gargarismo cum hydromelite vel aqua saccharata, vel decocto hordei adiuncto melle. Et si post puris euacuationem vlcus quiddam sordidum, vel putridum præ se ferat, fortius detergentia & putredinem inhibentia vsurpanda, qualia suprâ in vlceribus oris proposita sunt.

Vel ℥. Fol. scabios. agrimon. an. ṡ. j. nueum cupressi, 3. j. radic. aristoloch. longæ, iridis Florentinæ, an. 3. ḡ. flor. rosar. rubr. p. ij. myrrhæ. ʒ. j. Coq. in hydromelite ad ṡb. j.

Ad consolidandum vsurpetur linctus ex bolo Armeno cum syrupo vel melle rosato; aut puluis ex thuris, myrrhæ, rosarum, boli armeni æqualibus partibus. Qui si melle excipiat, forma linimenti exhiberi potest. Interdum tamen accidit, vt angina neque resoluatur, neque etiam intus tumor rumpatur, idque cum summo ægri periculo. Cùm enim, vt suprâ etiam dictum, detur anginæ species, eâque deterrima, in qua nullus tumor, nulla rubedo intus vel extra apparet, ægróque tamen suffocationis periculum imminet, cuius Hippocrates in *Prognost.* Galenus 4. *de loc. aff. c. 3.* Aëtius, *tetrab. 2. serm. 4. cap. 47.* meminerūt, in qua aliis remediis nihil proficitur: in vltima desperatione sub maxillis & supra collum altioribus plagis scarificationem nonnulli instituerunt, & ægrum à suffocatione imminente liberarunt, nonnunquam pure, nonnunquam sanguine effluente, ægróque ita leuato vt postea reliquis præfidiis locus esset. Qua de re scribit Anton.

ton. Beniuenius, de abdit. morb. causf. cap. 38. Angina laborabat Nicolaus Rota, sed nullus tamen rubor, aut tumor, vel intus in gula, vel extra videbatur, & ipse nihilominus vix spiritum trahens, quicquid præterea edendum sumeret, per os statim & nares reiciebat. Quare cum arescente corpore pallente iam facie, ac vertentibus oculis spes omnis sublata esset, & Medici, quibus cura demandata fuerat, ægrum non amplius adirent, me licet iuniorem conuocant, ægrum ostendunt, & quæcunque acta fuerant, exponunt. At ego cum & ægrum ipsum ad mortem tendere, & Medicos, quæcunque opportuna fuerant, præsidia adhibuisse intelligerem, cœpi mecum ipse cogitare, satiùsne esset, ægrum ipsum Deo, & naturæ, ut ceteri Medici, incuratum dimittere, an aliquid, licet insolitum, utile tamen auxilium experiri: Verùm adhortantibus his, qui ægro assisteant, consilium capio, & locum altioribus plagis sub ipsis maxillis, ac etiam supra collum incido, ex quo cum sanies multa prorumperet, ad eò morbus lenatus est, ut faucibus ipsis spiritum simul, & cibum capientibus, facilis deinde ad bonam valetudinem ægro ipsi daretur regressio.

Hoc etiam in curatione anginae animaduertendum, semper vsque ad morbi declinationem aliquid detergentis medicamenti admiscendum esse, sicut in omnibus inflammationibus, quæ tenui cute teguntur; per quam semper aliquid resultat, id quod in angina copiosissima sæpe sputi reiectio monstrat. In quem finem mel commodè adhibetur.

Atque ut vsum topicorum hætenus propositorum in summam contrahamus; in principio vtendum repellentibus, & nonnihil abstergentibus; in augmento abstergentibus & repellentibus parum digerentium admiscendum; in augmenti fine & circa principium status abstergentia cum æquali quantitate digerentium & adstringentium permiscenda; in declinatione tandem ferè solis digerentibus vendum, & pauxillum saltem roborantium & adstringentium admiscendum.

*Specifica medicamenta.*

A proprietate prodesse traduntur fungus fumbucinus *Specificæ.* coctus & bibitus, & foris etiam impositus. Lignum quo-

que hederæ à proprietate valere dicitur ad apostema gutturis. Vnde Ioannes Marquardus *in practica* scribit, quod comedens ex cochleari de ligno hederæ, vel bibens ex vase hederaceo, nunquam vel rarò in apostema gutturis vel vuulæ incidat. Commendatur & ad tumores faucium rumpendos, si in decocto radicum althææ & ficuum cum momento Zingiberis, addita vini quarta parte maceretur, & decoctum diu in faucibus teneatur.

Commendant etiam tanquam expertum lupi guttur, seu asperam arteriam, si angina laborans per eam bibat. Laudatur & hirundinum pulvis, si sale aspersi vna cum pennis in fictili comburantur, & cinis melle mixtus illinatur, Galenus, 6. *de compos. med. sec. loc.* Et Celsus, lib. 4. cap. 4. scribit: *Vulgo audio, si quis pullum hirundinis ederet, anginâ toto anno non periclitari, servatûmque eum ex salé, cum is morbus urget, comburi, carbonémque eius contritum in aqua mulsâ, quæ potui datur, infricari & prodesse.*

Laudant & filum sericum purpura tinctum, quo vipera strangulata sit, collo circumligandum, Galenus, 6. *de simp. med. facult.* Varignana, l. 7. *de cur. morb. c. 1.* Commendantur & exuvie serpentis in oleo amygdal. dulc. coctæ, si in oleo illo linteam tingatur, collóque circumponatur. Stercus item canis ossa comedentis, vt & cochlææ cum testis vstæ, & cancri vsti. Item rasura dentis castorei ℥. j. vel 3. ℥. pondere in aqu. scabiosæ propinata; vel rasura dentis apri, si eius ℥. j. cum ol. amygdal. dulc. recent. 3. ℥. misceatur, & cum saccharo cando albo dulcoretur ac assumatur.

Reiicit tamen hæc à proprietate substantiæ medicamentæ. Petr. Paulus Pereda ideò, quod angina est morbus manifestus, non occultus. Et non abs re est, medicamentorum quorundam, quæ à proprietate substantiæ hîc prodesse creduntur, rationes reddi posse. Ita stercus hirundinis & canis, vt & cochlææ & cancri combusti proculdubio vi exsiccandi & discutiendi, quàm à sale imprimis habent, hîc profunt. Si quæ verò sunt medicaméta, quorum causa facilè reddi non potest, illa proculdubio causæ anginæ oppo-

opponuntur, in qua aliquid maligni & occulti inesse potest. Qua ratione forsan filum purpura tinctum, quo viperâ strangulata fuit, prodest. Refert etiam Cardanus, *lib. 7. de varietate rerum c. 25.* quod rubeta cocta & pro emplastro imposita adeò anginosi prodest, ut quendam hoc auxilio iam iam moriturum liberarit; creditque & filum, quo rubeta suspensa interit, conferre. Vide etiam Plinium, *l. 30. c. 4.*

# Α Α Ρ Υ Γ Γ Ο Τ Ο Μ Ι Α.

Si extremum suffocationis periculum immineat, & metuendum sit, ne antequam materia discutiatur, vel maturetur, homo suffocetur, ut æger seruetur, *λαρυγγισμῖα*, quæ *φαρυγγισμῖα*, à Paulo Ægineta, *lib. 6. c. 30.* nominatur, seu incisio tracheæ sub larynge inter duos annulos tertium & quartum & quintum tentanda. Quod antiquum iam ab Asclepiade & Anthillo usurpatum est remedium, ut ex Paulo Ægineta, *loco citato*, & Cœlio Aureliano, *lib. 3. cap. 4.* videre est: de quo postea *quæst. 4.* dicitur. Modus operandi in Institut. *lib. 5. p. 1. s. 2. c. 7.* propositus est.

## Dietæ.

Ær sit temperatus. Sedeat aut decumbat æger erecto corpore, & omninò ea figurâ, quâ se leuari senserit. Victus sit tenuissimus, cremor ptisanæ, & in nostris regionibus ius pulli & carnis, ac, si vires requirunt, ova forbilia. Ut illa quoque sunt pruna & passullæ cum saccharo decoctæ, & iuscula cum lactuca, portulaca, & semen quatuor frig. maior. alterata. Potus sit aqua hordei, syrupo violato, vel syrupo de succo citri dulcorata, vel aqua mulsa: vel cerevisia tenuis. Vinum, & omnia, quæ fluxionem humorum commovere & febrem augere possunt, vitentur.

Quod si æger planè deglutire non possit, nonnulli canulam intra gulam immittere iubent, ac deinde liquidum alimentum per eam infundere, modo inflammatio ad illas partes non pertingat. Alij fistulæ bubulam vesicam alligant, sicut in clysteribus fieri solet, eamque succo nutriente implent, eiusque extremitatem initio gulæ apponunt, vesicamque comprimunt, ut liquor in œsophagum descendat.

Quæ omnia si frustra tententur, ad clysteres nutrientes confugere licet, de quibus in Institut. dictum: Perfecta equidem nutritio inde sperari non potest; iuscula tamen talia bene nutrientia & facilis coctionis, si in tenuiorem quandam chyli substantiam conuertantur, corpus nonnihil reficere possunt, donec via iterum alimentis per os assumendis patefiat. Nonnulli etiam odore panis & carniū vaporis ægrum reficiendum censent.

De epidemia angina anni 1565. vide Dodoneum, *obseru. cap. 18.* Et de cynanchæ, quæ intra 10. horas iugulauit, Antonium Brassauolam, *in comment. aph. 10. sect. 5.* Et de alia, quæ 12. horis ægrum sustulit, Amatum Lusitanum, *Centur. 7.* & de alia, quæ horis 12. iugulauit, Antonium Brassauolam, *lib. 4. de victus ratione in acut. & Fernelium, lib. 5. patholog. cap. 9.*

*De Curatione Anginæ ex vertebrarum colli luxatione.*

Vncia hîc indicatio est, vertebram è suo loco remotam in suum locum restituere. Ergo cucurbitula ceruicis parti, qua fouea apparet, affigenda, vt vertebra suo loco restituatur; aut quod tutius est, comprimatur per anteriora colli iuxta latera asperæ arteriæ vertebra illa, atque extra, & in sedem naturalem pellatur.

*De Angina notha.*

*Angina notha.* Angina, quæ notha appellatur, oritur à pituitosa & frigida materia è capite in fauces, aut ceruicis & colli musculos decumbente, & tumorem *induratum* efficiente. De ea loqui videtur Hippocrates, 2. de morbis, dum scribit: *Oritur autem angina, cum pituita in capite agitata deorsum confertim fluxerit, & in maxilla ac citra ceruicem constiterit.* Abestque in angina notha inflammatio, quæ anginam veram constituit. Itaque etsi etiam à melancholia anginam fieri posse postea ex Heurnio dicetur: tamen ea non est notha angina, sed quia melancholiæ admiscetur sanguis, parit veram anginam, etsi non puram.

*Signa.*

*Signa.* Cognoscitur ista angina, quod inflammatio, calor, rubor, febris abest, dolor est exiguus aut nullus. Atque cum



à materia in externis colli musculis hærente excitetur, minus periculosa est hæc angina. Diuturnior contra est, ita ut dolores sæpe longo tempore durent.

## Curatio.

Eadem ferè indicationes hic sunt propositæ, quæ in angina vera. Nam humor qui affluit, euacuandus est, reuclendus, repellendus; qui affluxit, discutiendus, vel maturandus, & deinde euacuandus. An ergo venæ sectio vsurpanda sit; docebit habitus corporis & plenitudo. Et si enim humor anginam istam producat, venæsectionem non requirit: tamen ne à sanguine affluente morbus augeatur, si abundet, venæsectione imminuendus & reuclendus est. Humor pituitosus per clysteres acres & medicamenta conuenientia euacuetur.

Vsurpentur etiam alia reuulsoria auxilia, ut vincula, frictiones, lotiones extremorum & cucurbitulæ, cum scarificatione cruribus & dorso supra renes impositæ.

Gargarismus primo die talis vsurpetur.

℞. Fol. plantag. primell. flor. rosar. rubr. an. ℥. j. balaustior. 3. j. Coqu. in hydromelite. Colaturæ ℞. ℥. j. mell. rosar. colat. rob. nucum, an. 3. vj. Fiat gargarismus. Sequentibus diebus

℞. Nucis cupress. 3. ℔. balaust. 3. ij. mastich. 3. iij. Coqu. in hydromelite. Colaturæ ℞. ℥. j. Adde rob nucum 3. j. mell. rosatum 3. ℔. alumin. 3. ℔. myrrha, croci, ana ʒ. ij. F. Gargarismus. Malo procedente talis vsurpetur.

℞. Passular. 3. j. caricarum num. vj. sem. lini, fenigræc. ana 3. ℔. sinapi, radic. pyrethri, ana 3. j. In colaturæ ℥. ij. dissolue myrrha, croci, an. ʒ. ij. F. Gargarismus.

Celebre fuit apud antiquos medicamentum Diabesasa, id est, ex ruta syluestri dictum, quod descripsit Galenus, 6. de comp. med. sec. loc. c. i. Quod quia hirundines recipit, appellatur etiam ab Aretæum Diachelidonium.

Si dolor vrgeat citra statum talis fiat Gargarismus.

℞. Sem. maluæ, caulis, an. 3. j. ficus num. iv. Coqu. in decoct. glycyrrh. ℥. j. ℔. Adde butyri recent. sine sale, 3. ℔. F. Gargarismus. Ad maturandum talis utilis est.

℞. Caricarum pinguium, dactylor. ana num. vj. passularum, iuiubar. an. 3. 3. sol. byssopi ℥. j. myrrha 3. j. croci 3. ℔. Coqu.

*in hydromelite pro gargarismo. Potest etiam addi pulvis hirundinum.*

Paratur autem pulvis hirundinum hoc modo :

*Pulvis  
hirundi-  
num.*

*℥.* Hirundines , truentur capite , & sanguis supra plumas exstillare permittantur , deinde paucō sale conspergantur , & in fictili comburantur . Pulvis hic gargarismis addi , vel etiam melli ad discutiendum admisceri potest .

Extrā collum inungatur oleo chamæmelino , amygdal. dulcium , lilior. albor. vnguento dialthææ . Postea imponatur catasplasma ex farinâ hordei , semine lini , sænigræc. ficubus & similibus . In statu .

*℥.* Maluæ cum radicibus , althææ , meliloti , an. m. j. Coquantur ad mollitiem . Contusis adde farinæ sem. lini , sænigræc. an. ʒ. ss. pingued. porci sine sale ʒ. x. ol. amygdal. dulcium , chamæmel. an. q. s. F. Cataplasma . Vel *℥.* Nidi hirundinis ʒ. j. ss. emplastri de meliloto ʒ. ij. medullæ cassiæ ʒ. ss. Cum s. q. sapæ . F. Cataplasma .

*Angina  
à melā-  
cholia.*

Cæterum annon merito adhuc alia constituenda sit nothæ anginae differentia , quæ ab humore melancholico & atro proueniat , lectori iudicandum relinquo . Facit eius mentionem Heurnius , *de morbis pectoris* . Oritur autem ea maximè in sæminis melancholicis , quibus menses non fluunt , & sæpè in cancrum degenerat . Vidit talem ter Heurnius , bis in duabus puellis , & semel in nupta fere senescente . Nigredo quædam ad epiglottida fere apparuit . Nupta deglutiendi & difficultate periit . Atque exesus oesophagus ac musculi sternohyoides , ita ut cibus per interiora proflueret , ac exesis jugularibus hæmorrhagiâ interiret vna , altera sensim contabesceret .

## Q V A E S T I O I.

*An omnis Angina sit ab inflammatione?*

*An om-  
nis angina  
sit ab  
inflam-  
matione.*

Angina per inflammationem vulgo , & quidem ex Galeni doctrina , 4. de rat. victus in acutis text. 20. & 2. ad Glaucon. cap. 1. definiri , suprà diximus . Galenus tamen , 4. de loc. affect. cap. 5. addita Hippocratis , ex 2. epidem. sententia ,

tentia, etiam inter anginæ species recenset eam, quæ ex vertebrarum ad interiora luxatione & perussione fit. Et Aretæus, *lib. 1. cap. 7.* aliam, quæ fit solius spiritus præna conuersione ad calidissimum & siccissimum mutati vitio, nulla capitis per se inflammatione laborante, addit.

Verùm enim verò non omnis suffocatio, multò minus respiratio læsa est angina. Equidem si vocabulum anginæ spectes, quod ab ἄγχι, deducitur, omnes suffocatio angina dici posset: vsus tamen obtinuit, vt propriè & in specie illa suffocatio saltem dicatur angina, quæ saluo thorace à faucium & gutturis, & partium huc pertinentium læsione præuenit. Et quidem cùm vulgatissimè à partium harum tumore & inflammatione accidat, anginæ etiam harum partium inflammatione determinatur. Luxatio verò vertebrarum ceruicis, etsi eandem suffocationem inducere possit: tamen cùm rarius accidat, & à causa externa pendeat, inter anginæ quidem in genere ita dictæ differentias referri potest; est tamen alterius curationis, quàm ea, quæ ab inflammatione præuenit. Anginæ verò, cuius Aretæus mentionem facit, vix ad anginam commodè referri potest, sed potiùs ad suffocationem læsam, de qua parte secunda dicetur, pertinet: cùm, sicut ipse Aretæus scribit, in pectore vitium sit, vbi spirandi initium ponitur, quòdque hominem celeriter eadem die iugulet. Neque tamen, vt nonnulli existimant, de ea suffocatione loquitur hic Aretæus, quæ ex aëre crasso & denso, qualis è carbonibus accensis exhalat, originem habet. Expressè enim scribit Aretæus, causam mali non extrinsecus aduenire, sed intus excitari. Sed si ea, quæ tradit Aretæus, diligenter perpédamus, de acutissima aliqua pulmonis inflammatione, aut certè de æstuosissima & acutissima febre, qua spiritus calidissimus redditur, loqui videtur. Heurnius anginam hanc fieri existimat ob inflammationem nerui, qui enatus è colli vertebris, ac per pericardium elatus etiam diaphragmati implantatur. Videatur etiam Hippocrates, *1. de ratione victus in acut. text. 21. & seqq.* & Galenus, *in commentario.* Et fortassis talis fuit angina, cuius

mentionem facit Dodonæus, *in obseruat. cap. 18.* qui in dissectis talibus ægris demortuis pulmones purulentos fuisseprehendit. Scribit autem eò loci Dodonæus, destillante à cerebro humore asperæ arteriæ ramos primò repletos fuisse. Deinde eodem ad alia vasa transmissio liberari quidem arteriam, pulmonis autem malè affecti partes à dolore occupari. Tale quid Polemarchi vxori, *5. epid. sect. 61.* accidit, quæ cum primùm angina teneretur, sanguine misso faucium suffocatio desuit, sed humore ad pulmones proculdubio decumbente septimo mortua est.

## Q V Æ S T I O II.

*An humor Anginam excitans à cerebro & capite defluere possit.*

*An humor anginam excitans à cerebro defluat.*

Docet id expressè Hippocrates, dum *4. de rat. victus in acut. text. 30.* scribit, anginam fieri, dum hyeme & vere fluxio multa & viscosa ad iugulares defluerit venas: Id quod ex capite fieri, Galenus, *in comment.* rectè docet.

Videtur tamen huic opinioni aduersari id, quod angina est tumor calidus à sanguine ortum habens: in hyeme verò, quæ pituitæ est metropolis, frigidi & crudi humores cumulantur, & inde excernuntur, vt in catarrhis & coryza fieri videmus. Deinde quod excrementa cerebri per nares & palatum præcipuè euacuentur, per quas vias in spatia illa, in quibus angina generatur, pertingere non possunt.

Verùm sciendum, excrementitios humores, qui in cerebro colliguntur, præcipuè ea parte, vbi venæ & arteriæ primùm in eius substantiam inseruntur, non omnes per palatum & nares euacuari; sed in vasa regurgitant, atque hinc, si post aures defluerint, parotidas, si per iugulares ad faucium & gutturis venas, anginam excitant, vt istos varios defluxionum modos Hippocrates, *in lib. de locis in homine & de glandulis* explicauit. Vnde etiam isti humores non soli & separatim, vt dum per palatum & nares fluunt, in fauces irruunt, sed quia per venas feruntur, sanguinem seu comitem seu vehiculum adsciscunt, vnde inflammatio excitatur, sed huius vel illius humoris particeps.

## QVÆSTIO III.

*An vera sit angina, quæ à fungorum esu & similibus venenatis rebus oriri dicitur?*

Cognata quæstioni præcedenti est & ista, an illa suffocationis species, quæ à fungorum esu & similibus venenatis infertur, sit angina. Etenim supra in causis anginae diximus, à nonnullis etiam inter causas anginae recenseri fungos & similia. Etenim fungi quidam pariunt quasi suffocationem, id quod Pausaniæ puellæ accidisse refert Hippocrates, 7. epid. Idem accidit ab helleboro albo & aconito; & vñctor apud Harpalidem, lib. 7. epid. ex esu medicamenti purgantis suffocationem quasi incurrebat. Herba bella donna dicta similem qualitatem habet, de qua Heurnius: *Ioci causa*, inquit, (verum in talibus iocus locum ita tutò non habet) *scrupulus de radice derafus mace-*  
*retur in vini 3. j. 8. horis ad summum duabus, & deinde per-*  
*colato, ac digitis presso id vini recentis additur, quod poculum*  
*repleat. Totum potandum parasitis præbetur. Fit inde, ut paulò*  
*post, qui biberint, nihil prorsus edere possint magno spectantium*  
*oblectamento. Discutitur fucus à risu aceto potui dato. Id enim*  
*presentissimum antidotum. Idem habet Ioh. Baptista Porta,*  
*lib. 14. Magiæ naturalis.*

*An vera sit angina à fungorum esu, &c.*

Verum sciendum talia venenata, si saltem angustiam quandam & quasi suffocationem sine inflammatione inducant, ad causas anginae referri non posse, patetque latius suffocatio quam angina. Si verò occasionem præbeant, ut sanguis ad fauces confluat, atque inflammationem excitet, inter causas anginae meritò referuntur.

## QVÆSTIO IV.

*An nidus hirundinis aliquem in angina curanda usum habeat?*

Vulgatum esse apud Practicos, ut nidus hirundinis topicis medicamentis ad digerendum & discutiendum in angina admisceatur, supra dictum. Aliqui tamen id im-

*An nidus hirundinis aliquem*

probant. Reprehendit primò vsum nidi hirundinis Mercurialis, scribitque Practicos plerosque malè consilium veterum intelligentes existimare, hanc vim inesse nido hirundinis, cùm tamen eam habeat avis. Nam hirundo ad anginam commendatur, de quo Celsus, lib. 4. cap. 4. *Vulgo audio, si quis pullum hirundinis ederet, angina toto anno non periclitari, servatùmque, eum ex sale, cùm is morbus urget, comburi, carbonemque eius contritum in aqua malsa, quæ potui datur, infricari, & prodesse.* Et pulvisculus ex hirundinibus etiam gargarismis admiscetur. Verùm etsi vim aliquam peculiarem ipsa avis in hoc morbo haberet: tamen vfu deprehensum iam est, etiam nidum prodesse, atque vis illa proculdubio nido inest, ob excrementa pullorum hirundinum, eaque sale multo abundantia, sicut & vis stercoreis canini, si biduo vel triduo tantùm ossa comederit, proculdubio à sale proficiscitur. Deinde Petr. Paulus Pereda etiam vsum nidi hirundinis hîc improbat, quòd terra repellat. Verùm non omnes terræ æqualem vim repellendi habent, nec ipse negare potest, sterco hirundinis digerere. Ideoque si quis omnino metuat vim repellendi in terra, ea maxima ex parte, vbi stercore hirundinum destituitur, separari potest, ut vis resoluendi & attrahendi, quæ est à stercore, fiat fortior. Neque enim existimo nidum hirundinis, præcipuè ob terram, quæ ei inest, adhiberi, sed potius ob sterco hirundinum, quod, ut Galen. 10. de simp. med. fac. & 6. de cõp. med. sec. loc. docet, acre & discussorium est; id quod ex historia Tobix patet, qui ex stercore hirundinis calido ipsi in oculos illapso excatus est. Quam acrimoniam cùm admixta terra temperet, accommodatissimum discutiendis tumoribus, præsertim faucium & gutturis, est remedium, imprimis si hirundini aliqua peculiaris vis contra anginam inest.

## Q U Æ S T I O V.

*An laryngotomia tuta & utilis sit?*

*An laryngotomia tu-*

Equidem nonnulli laryngotomiam planè improbant, utpote quæ periculosa sit, cùm primò ossa, & cartilagi-

nes, è quibus & trachea pulmonis arteria constat, coalescere nequeant, ex sententia Hippocratis, 6. aph. 18. atque ita ægro interitus afferatur. Deinde metuendum sit, ne sanguis è vulnere effluens in pulmones rueret, ægrumque suffocare possit. Tertio etiam Aretæus & Aurelianus fide experientiæ hanc operationem destitui existimant.

Verum vulnera tracheæ planè insanabilia non sunt, sicut exemplo docet Albucasis Chirurg. lib. 3. c. 43. atque aliquot etiam Schenckius, lib. 2. obs. 40. collegit. Atque ipse etiam arteriam ita vulneratam, vt vulnus in cavitatem eius penetraret, sanatam fuisse bis vidi. Et quamvis ipsa cartilago non coalescat: tamen carnis duræ & veluti calli interuentu, & membranæ, qua iunguntur annuli asperæ arteriæ, conglutinator. Neque etiam de fluxione sanguinis in pulmones metus est, si sectio rectè instituat. Nul- lum enim insigne vas est eò loci. Iis verò, qui experientiæ fidem in dubium vocant, meritò ea exempla, quæ passim apud Medicos occurrunt, opponenda, quæ Schenckius l. alleg. collegit. Refertque etiam Ant. Musa. Brassauolus in comm. in 4. Hipp. lib. de vict. rat. in acut. se suis manibus, cum chirurgus quidam imperitus id non auderet, angina laboranti morti propinquo guttur dissecuisse, quod & aliàs pluries cum felici successu se tentasse scribit.

## CAPUT XXV.

De Strumis in collo & bronchocele, ac  
hydropse gutturis.

**N**ANDEM inter colli vitia meritò etiam strumæ dictæ explicandæ; Strumæ autem, quæ Græcis στρῦμα, dicuntur, seu στρῦμα ὑποχρῆμα, id est petris è mari prominentibus, seu στρῦμα ὑποχρῆμα, id est, scrophis, ynde & vulgò scrophulæ dicuntur, quod scrophis, id est, quibus frequenter in collo oriuntur, etsi in genere pro omnibus induratis tumoribus & peculiari membrana conclusis, qui in glandulis, in collo, sub axillis, in inguinibus, vt & mammis oriri solent, accipiuntur, vt ex Celso, l. 5. c. 28. & Aëtio,

Struma.

tetrah.

*tetrab. 4. serm. 3. cap. 5.* videre est : in specie tamen à nonnullis struma pro tumore in gutture accipitur , de quo agere huius loci est : de reliquis huius generis strumis de tumoribus in genere dicendum.

## Q V Æ S T I O.

*An bronchocele , & struma in gutture sit idem morbus?*

*An bronchocele & struma in gutture sit idem morbus.*

Verùm cùm tumorum horum natura & curatio rectè explicari & tradi non possit , antequam hæc quæstio expediatur , eam , quæ aliàs postponenda esset , huic capiti præmittere libet. Fecit autem huius controuersie iam mentionem Ioh. Langius *lib. I. epist. 243* ubi scribit , bronchocele , seu herniam gutturis longè diuersum à struma fuisse veteribus tumoris genus. Cello scilicet , *lib. 5. cap. 28.* strumam esse tumorem , in quo subter concreta quædam ex pure & sanguine quasi glandulæ oriuntur : id quod in ceruicæ , alis , inguinibus , in lateribus & mammis , quoque accidat : bronchocele verò sit pendulus circà guttura tumor à bocij , vetricosi poculi similitudine bocium appellatus , inter cutè & asperâ arteriam : in quo modò , caro pituitosa , modò humor aliquis melli aut pulti similis membranulis includitur , interdum etiam pili minutulis ossibus mixti reperiantur. Verùm cùm consuetudo sit dicendi magistra , parùm referre putat bronchocele & charades strumas quoque appellari.

Verùm etsi forsan hæc ita sese habeant , & strumæ vocabulum pro tumore , in quo subter concreta quædam ex pure & sanguine oriuntur , quæ febres mouent , atque alio tumore , quam qui hodie hoc nomine appellantur , ( strumæ enim hodie notæ febrem non excitant ) & forsan pro apostemate aliquando scirrhuso acceperint : tamen de hoc etiâ adhuc quæstio est , an strumæ hodie notæ differât à brôchocele. Nâ video & hac de re etiâ inter autores discrepantiâ. Alij enim bronchocele sub strumis comprehendunt , & bronchocele statuunt esse strumam in gutture ; alij verò eos tractatione seiungunt & separant. Hieron



Fabric. de oper. chirurg. hanc differentiam constituit, quo bronchocele sit tumor non in glandula aliqua, sed supra arteriam asperam obortus, struma verò in collo sit tumor in glandula aliqua ex iis, quæ asperæ arteriæ adiacent, potissimum in iis, quæ sub larynge statim hinc inde ad asperæ arteriæ latera ponuntur, atque ita bronchocele sumit pro abscessu aliquo penitiori membranæ incluso ad *σπογγη*, id est, asperam arteriam enato, strumas verò sumit pro glandularum in collo tumoribus. Idem statuit etiam Franciscus Peccettius, qui lib. 1. chirurgiæ c. 23. strumas glandularum tumores esse scribit bronchocele verò tumorem seu abscessum magnum, mollem & rotundum inter cutem & asperam arteriam: Et ex Guidone scribit, si huiusmodi tumor in capite oriatur talpariam seu talpam dici, in collo bocium, in testiculis herniam (carnosam scilicet) Distinguit etiam strumas, & bronchocele Platerus, etsi alio modo, ut postea dicetur. Ut ergo, quæ utriusque sit natura, videamus seorsim de utroque affectu dicemus.

## De Strumis in gutture.

Strumæ ergo in gutture sunt tumores in glandulis, quæ asperæ arteriæ adiacent, orti è pituita lenta & crassa, aliquando etiam peculiari carne geniti, peculiari membrana conclusi. Struma  
in gut-  
ture.

Hippocrates in *Coacis* lib. 2. *tertiæ sect. aphor. 2. ex distinct.* Hollerij, ab anno 14. ad 42. strumas fieri docet; ab ea verò ætate ad annos tres & sexaginta strumas fieri negat. Quod procul dubio verum est, ubi ab interno humorum vitio strumæ fiunt; cum ea ætate materia amplius deesse videatur. Interim non videtur impossibile, etiam post 42. annum strumas fieri posse ab aquarum vitiosarum potu, quod illis accidit, qui ad Alpinos populos veniunt. Tumores enim hi quibusdam locis endemij sunt, scribitque Hieron. Fabricius ab Aquapendente, tales tumores frequentes esse in quadam Bergomensis agri parte, ubi cum viri tum mulieres ferè omnes antè in collo gestant

gestant tumores magnos, molles, mobiles & pendulos, doloris expertes. Idem morbus & Allobrogibus & Alpinis, ac Charinthiæ & Styriæ Alpinæ inhabitatoribus, & Hispaniæ quibusdam locis familiaris est.

Tumores hi, vt diximus, & strumæ & scrophulæ dicuntur. Platerus tamen inter eos talem facit differentiam, & strumas illos tumores in gutture appellat, qui sunt magni & penduli, & sæpè cum gutturi profundè incumbunt, raucedinè vel dyspnæam aliquam efficiunt; scrophulas verò eos saltem tumores, cum vna simplex glandula vel ex duabus, tribusque nonnunquam instar vix complicata prominet, appellat. Nam etiam scrophis, seu porcis tumores hi saltem prominent, non dependent.

*Causse.*

*Causse.*

Oriuntur autem strumæ hæ imprimis ex humore crasso & lento, quem vulgò pituitosum esse statuunt, cui interdum etiam melancholicus admisceatur. Platerus tamen non sine causâ hîc monet, non satis rectè vulgò statui, ex sola pituita, aut melancholia hos glandularum tumores deduci. Ex his enim si strumæ & eiusmodi tumores alij ortum haberent, non tam diuturni essent, sed putredini & corruptioni obnoxij, & in pus mutarentur, vt alij ex humoribus simpliciter excrementitiis orti tumores. Ipse verò è succo nutriente hos tumores oriri statuit. Cum enim glandulæ, quàm aliæ carnes crassiore succo nutrantur, si is quantitate, & qualitate moderatus sit, eas in suo naturali statu conseruat; si verò qualitate & imprimis quantitate excedat, tumores varij excitantur. Etenim si aliquid humorum planè excrementitiorum admisceatur, tumores eiusmodi citiùs in abscessum abeunt. Si verò succus ille nutriens solus sit, sed copiosior, quàm vt parti omnis apponi possit, in eiusmodi tumores degenerat. Naturaliter enim talis humoris non plus in corpore generari debet, quàm vt partibus illis nutriendis sufficiat. Si verò plus eius generetur, talium tumorum causâ est. Natura enim vt vitiosos humores alios ad alias partes protrudit, vt in scabie, erysipellate, bubonibus, arthritide videre est: ita etiam quod in alimento est ignobilius, non partibus nobilibus apponit, sed

sed glandulis, vnguibus, capillis. Quapropter etiam si talis ignobilis, feculenti, & crassi alimenti plus generetur, natura rectè agens ad illas partes, cum quibus conuenientiam habet, glandulas scilicet protrudit, ex quo proinde etiam carnem, aut carni quid simile generare tentat. Vnde etiam Autor definitionum Medicarum strumas dicit carnem siccam, & Aëtius ex Leonida carnem subalbescentem facilè augescentem. Et quidem peculiari membranæ strumæ includuntur, quæ & ipsa à facultate formatrice, quæ omnibus partibus viuentibus insita & nunquam otiosa est producit. Dum enim ab affluente humore superfluo membrana distenditur, & forsân etiam rumpitur, natura nouæ quasi membranæ texturam aggreditur.

Platerus his causis addit etiâ semen & facultatem formatricem in vtero, & scrophulas has, vbi sunt alicui loco familiares, à parentibus in liberos propagari potius, quàm cibi vel potus alicuius peculiari causa euenire, statuit. Quod vt non rarò verum esse existimamus; ita potum & causas ante propositas reiiciendas non censem: cum obseruatum sit, eos, qui sani in talia loca perueniunt, si aliquandiu ibi degant, strumas tales contrahere.

Habet autem humor ille ortum è cibis crudis & crassis, vnde etiam ætati puerili, quæ tales humores cumulat, malum hoc familiare esse ex Hippocrate modò dictum est, imprimis ex potu aquarum crudarum & niualium: Qua de causa, qui Carinthiam & Styriam, & alia ibi loca Alpes versus incolunt, plerique bronchocele laborant. Langius equidem *lib. 1. epist. 43.* & *lib. 3. epist. 4.* qui eò loci videatur, in hydrargyrum, seu aquas ex montibus metallorum feracibus scaturientes, & Mercurium in se continentes causam huius rei refert. Et omninò negandum non est argentum viuum peculiari modo pituitam ad fauces & glâdulas ibi protrudere, ita vt etiam extrâ inunctus saluationem excitet & dētium vacillationem pariat: Quia tamen in Hungaria & Transsylvania, atque alibi etiam in magna copia Mercurius prouenit, vbi tamé morbus ille epidemius est: malo simpliciter ex aquar. crudarû, & ex niue liques

liquefcente resolutarum potu id fieri, quas Hippocrates lib. de aëre, aquis, & locis ὕδατος φλεγμονώδους & βραχυδύσματος nominat.

### Signa Diagnostica.

*Signa.*

Affectus ipse per se patet. Apparet enim tumor rotundus, pendulus, propriæ membranæ inclusus, qui propterea ad tactum mobilis est, & à cute separari potest.

### Prognostica.

*Prognostica.*

1. Strumæ hæc vt omnes difficulter curantur, in pueris tamen facilius curantur, quàm in adultis.

2. Liberæ ac nulli vasi implicatæ strumæ curantur facilius, quàm quæ vasi implicatæ sunt.

3. Excisione sine periculo vix curantur, propter nervos recurrentes eò loci latentes, qui si læduntur, vox perit: quod cuidam accidisse refert Galenus, 1. de loc. aff. c. 5. qui cum strumas in profundo in collo incumbentes excinderet, & inter secandum quoddam vas non specillo secaret, sed vnguibus euelleret, imprudens ob ignorantiam simul nervos recurrentes distraxit, atque hoc pacto puerum liberavit à strumis, sed mutum reddidit. Ideoque strumæ, quæ in anteriore colli parte sunt, periculosiores sunt, quàm quæ in posteriore.

4. Nisi folliculus radicitus excindatur, malum reuer-  
ti solet.

### Curatio.

*Curatio.*

Materia tumoris causâ tollenda est, & si quæ materia affluat, ea etiam euacuanda. Quod fit; dum vel insensibiliter absumitur ac discutitur, vel in pus mutatur, vel excinditur.

Primò ergò, si adhuc vitiosi humores, præcipuè pituitosi, qui causæ antecedentis rationem habeant, in corpore abundant, ij tollendi, & corpus conuenienter euacuandum, cum per vniuersalia, tum per ea quæ caput purgant.

Deinde corpore euacuato ea medicamenta exhibenda, quæ materiam strumarum absumunt, absorbent & exciscant. In quo genere primò est radix scrophulariæ, quæ nomen inde habere videtur, quod scrophulis medeatur, item radices vrticæ mortua, filipendulæ, gladioli. Lau-  
datur

datur & radix rusci, cuius efficaciam sibi quoque comper-  
tam esse testatur Fallopius, si eius in puluerem redactæ  
drachma vna singulis diebus cum vino assumatur. Vel  
℥. Rad. rusci 3. ℞. iridis ꝑ. ix. Cum vino dulci vel mulla  
exhibeatur diebus 40.

Plurimum etiam commendatur spongia, ac sequens  
medicamentum vt secretum in multis probatum com-  
mendatur.

℥. Spongiam nouam, crudam non lotam, quæ calculis  
& nodulis sit refertissima. Infundatur tota in s. q. cereui-  
fix, ita tamen, vt aliquandiu decoctum sufficiat. Coque  
cum cereuisia, vt absumatur quantitas duorum transuer-  
forum digitorum. De eo bibat æger vesperi, cum cubi-  
tum itur, haustum calidè. Sin autem assumi illa potio præ  
nausea nequit, addi possunt aromata pro libitu, aut radix  
polypodij querni.

Arnoldus de Villa noua hunc puluerem laudat, vt pote  
à quo omnes infra vigesimum quintum annum infallibili-  
ter curentur :

℥. Cineris spongiæ marinæ & paleæ marinæ, ossis sepiæ, pi-  
peris longi & nigri, zingiberis, cinamomi, salis gemmæ, py-  
rethri, nucum cupressi, gallarum quercus, rosar. an. 3. ij. Fiat  
Puluis.

De quo æger sæpius de die & nocte in ore aliquid te-  
neat, & paulatim deglutiat. Idem & cibus inspergi po-  
terit.

Idem & alios pulueres proponit. Valdè etiam commen-  
datur hic puluis.

℥. Rad. aristoloch. rotundæ, raphani, spatulæ fetidæ. an. 3.  
j. fol. pimpinellæ, pilosellæ, rutæ maioris, an. 3. ij. scrophulariæ,  
filipendulæ, an. 3. ℞. sem. anisi 3. ij. zingiberis 3. j. turbib.  
opt. fol. senæ elect. an. 3. ij. sacch. albiss. 3. iiij. F. Puluis, de  
quo sumatur de singulis diebus cochlear vnum cum vino  
albo vel aqua genistæ. Vel ℥. Lapidis spongiæ 3. iiij. sal.  
gemmæ 3. ij. salis tartari 3. j. Fiat Puluis. Sumantur à qua-  
dra vltima quotidie ex vino 3. ℞. vel 3. ij. Alius puluis con-  
tra strumas.

℥. Spong. marin. pile marin. corall. rub. vst. 3. ij. papyri tenuiss.  
Lib. II. L & albiss.

& albiss. omnium combust. an. 3. s. Quibus cineribus admisc. rad. scrophular. maj. 3. iij. off. sepia, sal. gem. gallar. an. 3. ij. nuc. mosch. piperis long. & alb. zingib. a. an. 3. j. cinamomi ac 3. j. s. sacchari 3. j. s. M. F. Tragema.

Ex pulueribus istis cum syrupo betonica vel alio conueniente fieri possunt etiam electuaria. Vel talis paretur portio.

℞. Rad. scrophularia, filipendula, an. 3. s. fol. agrimonie, pilos. pimp. an. s. j. flor. betonica, xoris marini. an. P. j. Coq. in vino albo vase clauso. Colatura dulcoretur saccharo, & addatur aq. cinamon. 3. s. pro duabus vel tribus dosibus.

Topica  
emolliē-  
tia &  
resoluen-  
tia.

Tertio topica vsurpanda, & primo quidem danda opera, an materia tumoris caussa insensibiliter discuti & absumi possit. Et adhibentur ferè medicamenta, quæ scirrhis applicari solent, & primo quidem emollientibus, incidentibus & discutientibus vtendum, & imprimis ea eligenda, quæ strumis priuatim prodesse compertæ sunt, vt scrophularia & similia: atque vt corpus mollius vel durius, tumor recentior, vel antiquior fuerit, ita fortiora, vel mitiora vsurpanda. Vt ℞. Rad. alibæ 3. j. mucilag. sem. lini, fanigræci, an. 3. vj. pingued. gallin. humane, an. 3. j. ol. amigd. dulc. 3. s. croci 3. s. ceræ q. s. F. Vnguentum. Vel ℞. Rad. scrophularia autumnio effossæ & purgatæ q. v.

Contundantur cum s. q. butyri recentis, inque fictile operculo clausum loco humido reponantur per dies 15. Deinde lento igne calefiant & colentur. Linimento hoc strumæ illinantur. Vel ℞. Folia cupressi. F. Puluis.

Pulvis hic vino conspergatur & in massam vnā redigatur. Hoc medicamento strumam illines, & tertio die demum solues, tum locum exprimas, quem contractum inuenies. Denuò medicamentum induces, atque iterum obligabis per triduum, donec strumâ euanescat.

Et talia plurima passim à Galeno, Paulo, Celso, Rhase, Auicenna & aliis describuntur, quæ omnia hic cumulare opus non est, præsertim cum plurimi diffidant huic curationi in antiquis strumis. Quanquam enim Galenus & alij curandas hoc modo strumas esse præcipiant, ac Valescus de Taranta in strumis vnius anni talibus resoluentibus

cum felici successu se vsum esse scribat : tamen si sint antiquiores & perfectæ ac membranis conclusæ , hoc modo integra curatio vix sperari potest.

Itaque vbi per emollientia & resoluentia tumor discuti non potest, ad maturationem & suppurationem veniendum. Vt ℞. Rad. lilior. albor. althææ. iridis. Coqu. ad molitiem. Suppurantia.

Deinde adiecta farina triticea & oleo dulci, vel liliorum alborum, ac pinguedine anserina vel gallinacea fiat Cataplasma.

Vel alia maturantia applicentur, quæ passim nota sunt. Insistendum autem tamdiu vsui suppurantium, neque locus antè aperiendus, donec tota materia intus conclusa in pus mutata fuerit. Vomicâ enim adhuc conclusâ calor etiam conclusus manet, atque reliquum etiam materiæ facilius in pus vertit. Quod si vomica citius aperiatur, cum humoribus etiam spiritus & calor effunditur, quo expirante reliqua pars materiæ postea tardius & cum difficultate suppuratur. Cui & hoc accidit, quod pars materiæ suppurata facit, vt & reliquum facilius in pus mutetur.

Vbi verò struma fuerit in pus mutata, aperienda est vel medicamento, vel ferro aut cauterio. Apertâ vomicâ pus euacuandum, deinde sinus expurgandus vnguento Apostolorum, medicamento de apio, vel simili, hinc sinus carne implendus & cicatrice claudendus. Imprimis verò hoc vnguentum ad strumas suppuratas & apertas commendatur. Apertio.

℞. Olei laurini ℥. j. cerussæ puluerisatæ & cum aqua vite læuigatæ itidem ℥. j. aluminis rochæ ℥. s. salis communis ℥. ij. F. Vnguentum. Vel applicetur Emplastrum diachylū compositum. Vel ℞. Rad. iridis ℥. iij. Coq. in aceti & mellis ℥. vj. Contundantur minutim & addantur terebinthina, vnguenti dialthææ an. ℥. iij. pulu. cumini, fenigræci, an. ℥. j. cere. q. s. Fiat Emplastrum. Vel ℞. Galbani, bdellij. an. ℥. j. ammoniaci ℥. ij. sordis alueariorum apum, assypi, an. ℥. ij. terebinthina, picis liquidæ, an. ℥. j. s. baccar. lauri, staphidis agriæ, cumini, pyrethri, an. ℥. s. stercoreis caprini, ouilli, anserini an. ℥. ij. axungie porci, seu caprini, ceruini, ursini, an. ℥. j. ol. chamæmel.

*memel. lilior. albor. cera*, an. q. s. F. Emplastrum, quod potenter resoluit. Vel  $\mathcal{Z}$ . *Rad. brionie, cyclaminis, cucumeris agrestis, ireos*, an.  $\mathcal{Z}$ . ij. Coqu. in vino albo & rantur.

Deinde adde *ammoniacy aceto dissoluti, bdellij, opopanax in oleo sesamino dissoluti*, ana  $\mathcal{Z}$ . j. *stercoris columbini, caprini*, an.  $\mathcal{Z}$ . j. *ß. ladani, stiracis, calamitæ*, an.  $\mathcal{Z}$ . *ß. picis navalis q. s.* F. Emplastrum. Vel  $\mathcal{Z}$ . *Emplastrum de meliloto*  $\mathcal{Z}$ . j. *bdellij aceto scillitico dissoluti*  $\mathcal{Z}$ . ij. *castorei pinguis*  $\mathcal{Z}$ . j. *ß. pulu. radie. ireos, fol. cupressi*, an.  $\mathcal{Z}$ . j. *ol. chamamel. lilior. albor. amygdalar. amar.* an. q. s. F. Emplastrum.

*Septica,*

Quod si nec hoc modo curatio sperari potest, extrahenda est struma: quod quidem fit primò sectione, quæ quomodo peragenda sit, in Instit. lib. 5. part. I. sect. 2. c. 13. dictum.

*Septica,*

Quod si æger ferrum non admittat, alius modus superest strumas tollendi per medicamenta, seu caustica & corrodentia, seu septica & putrefacientia. Hæc autem in re diligenter obseruandû, ne partes vicinæ à medicamentis his lædantur & inflammentur. Ideò muniendæ sunt vnguento refrigerante Galeni, rosato Mesue, & similibus. Perficitur autem hæc res duobus modis. Alij scarificationem præmittunt, & strumam in minutissima scarificant, deinde inspergunt puluerem paratum ex *morsus diaboli siccæ in umbra*  $\mathcal{Z}$ . j. *arsenici rubri, vitrioli, lithargyri, auri pigmenti*, an.  $\mathcal{Z}$ . j. Pulueri impone emplastrum diachylum, quod post 24. horas demum deme & vide, an struma sit castigata. Nisi fuerit, aufer scalpello cutem mortuam, denuoque inspergere puluerem, & emplastrum imposito. Post 24. horas castigatæ scrophulæ illinatur locus butyro & vitello oui mixtis in formam linimenti. Et ita singulis 24. horis linimentum mutabis, donec caro mortua deciderit.

Alij sine scarificatione mox medicamenta caustica & septica adhibent: alij tamen alia. Fallopius in corporibus rusticis vitur troschiscis de minio, quos describit Iohan. de Vigo, lib. 8. cap. 13. vbi & similia medicamenta plura reperiuntur, pro quibus ille, vt. mitiores hos substituit.

$\mathcal{Z}$ . *Auripigmenti, arsenici crystallini*, an. q. s. Misce cum  
pasta



pastâ ex farina triticea, & F. trochisci. Pro quibus etiam in apertam vomicam hoc medicamentum imponit.

*℞. Arsenici rubri, sandarachæ Græcorum, an. ʒ.ij. axungie suillæ q. s. M. fiat vnguentum.*

Et plurimi quidē in censent, arsenicum hac in re primatum obtinere. Verū cautione opus est, & non temerè admouendum. Nam supra modum vehemens ac virulentum est, febres excitat, & plurima alia praua symptomata inducit, & in minima etiam quantitate multa præstat. Ideoque ultra quantitatem dimidij grani triticei non adhibendum, & quidem in corpore robusto, & loco à membris nobilibus remotiore. In corporibus vero mollioribus & iuxta membra nobilia minor quantitas adhuc adhibenda, semperque præstat minimam quantitatem vna vice applicare, & postea idem medicamentum, si opus sit, repetere, quàm nimia quantitate ægrum lædere. Et cum per dies tres duret operatio eius, eo temporē æger semper ut febricitans aliquis regendus, & contra malignitatem muniendus. Itaque cum non sine periculo arteriæ applicetur, præstat lapide caustico, quos fonticuli a pplicari solent, quēque in *Instit. lib. 5. cap. ult.* descripsi mus, uti.

Quando glandula iam corrupta & absunta fuerit, crusta indurata à sana parte remouenda butyro loto cum farina triticea & axungia suilla. Crustâ demta si quid adhuc vitio si reliquum fuerit, illud etiam per medicamentum erodentia, ut vnguentum Agrippæ & similia, tollendum, & tandem vlcus, ut fieri solet, sanandum.

Est tamen adhuc alius modus strumas sanandi, quæ ab exili radice pendent. Illas enim serico filo, aut setis equinis versus radicem constringere licet, & quidem in dies arctius, donec resiccatae fuerint, & spontè deciderint. Potest etiam medicamento exsiccante actio vinculi promoueri & adiuuari.

Tandem de curatione strumarum non prætereundum, vulgo ferri, Reges Galliæ solo attractu sanandi strumas vim habere. De quo etsi alij aliter sentiant, & alij in imaginationem, alij in aëris mutationem & motum corporis

*Curatio  
strumarum à  
contactu  
Regis  
Galliæ.*

causam huius rei rejiciant : vana hæc esse facile patet. Cum autem hæc vis à Clodoueo primo Galliarum Rege profecta sit, atque inde ad successores per traducem, nullo respectu familiarum habito, translata sit, procul dubio donum est supernaturale diuinitus concessum. Nam cum dictus Clodoueus primus Galliarum Rex esset idolorum cultor, Clotildis uxoris monitu & precibus persuasus est, ut Christi nomen profiteretur. Cum ergo à Remigio Rhemensis Archiepiscopo, baptisatus & chrysmate unctus esset, ab eo tempore hanc vim strumas sanandi accepit, & quasi per traducem in omnes suos successores deriuauit. Solent autem passim è vicinis & peregrinis locis quotannis strumis laborantes affluere, quibus Rex manum imponit, & hæc verba Gallico sermone profert : *Le Roy te touche, & Dieu te guarit : Rex te tangit, & Deus te sanat*, atque apposito crucis signaculo, ab uno & trino Deo vim eam deriuari, publicè profitetur. De qua mirabili strumas sanandi vi, solis Galliarum regibus Christianissimis diuinitus concessa, peculiarem librum conscripsit Andreas Laurentius, qui videatur.

*De Bronchocele.*

*Bronchocele.*

Bronchocelen verò definit Celsus, *lib. 7. cap. 13.* quòd sit tumor in ceruice seu collo inter cutem & asperam arteriam quo modò caro habes, modò humor aliquis melli aquæue similis includitur, interdum etiam minutis ossibus pili immixti.

Quæ autem & de causis eius & de curatione vulgò traduntur, parum ab iis, quæ de causis & curatione strumarum dicta sunt, differunt. Ideoque ea etiam non repetemus. Hoc verò non prætereundum, Felicem Platerum aliam planè & à vulgata opinione diuersam de generatione & curatione bronchoceles sententiam habere, quam proponere libet.

Ille autem statuit, bronchocelen seu gutturis herniam esse tumorè in colli anteriore sede, seu gutture amplo spatio extuberantem, qui tensus est admodum, ut cum pulsatur, sonum edat, & cum premitur, sicut vter cedat, sed mox iterum attollatur, quibus à struma facile secernatur.

Causam

Causſam autem huius mali ſtatuit eſſe ſtatum ſub cutem membranámque generalem cuti ſubſtratam, adnexámque in colli anterioribus irrumpentem. Collectionis autem aëris eò loci cauſſam eſſe ſtatuit luxationem, ſeu auulſionem cutis cum membrana illa, quæ eò loci craſſior eſt & rubicundior, quàm alibi, à ſubiectis aſperæ arteriæ muſculorúmque colli anteriorum ſedibus, ſpatiumque illic efficientis, in quod ob fugam vacui aër, ſeu ſtatus è vicinis locis irrumpens illud non ſolùm implendo, cutem membranámque in tumorem eleuat, ſed & continuatione diſtendens in vniuerſum adaugēt, vnde nomen rectè acceperit tumor, quod brónchocéle, quaſi rupturæ ſeu hernia gutturis, appelletur.

Cauſſam autem auulſionis membranarum ſtatuit eſſe conatum vehementem, qui fit, dum ſpiritu retento excrementa vel foetum in partu excludere nituntur, aut buccas vehementer inflant.

Verum enim verò etſi facilè concedimus, cauſſam principalem eſſe auulſionem cutis & membranæ illius à partibus vicinis: tamen verò vix ſimile videtur, ſolùm ſtatum, vtpote mobilem, nec facilè vno in loco hærentem, malum tam diuturnum procreare poſſe, & tangenti aliud etiam facilè deprehendere eſt. Ideòque mihi probabile videtur, in vacuum illud ſpatium, præcipuè membranis extenſis, ſuccum aliquem & nutrimentum craſſius effundi, è quo natura carni quid ſimile formet. Vnde etiam, vt ipſe Platerus ſtatuit, niſi malo huic maturè occurratur, vix dum amplius abigi poſſe, ſed toto vitæ curriculo permanere illic, quo p.n. excreſcit, ſeſe circa vicina vaſa implicante, & iis pertinaciùs adhæreſcente.

#### Curatio.

Curatio ergo, vt ex Plateri ſententia rectè inſtituatur, principio, ne tumor incrementum ſumat, aſtringentia ſunt applicanda, vt emplaſtrum ad rupturam, & quæ in hydrope ſolent adhiberi, vt membranarum illa contiguitas ſoluta iterum iungatur.

Idem tamen etiam interna quædam adſtringentia & ſiccantia exhibet, commendátque puluerem aluminis

visi 3.ß. pondere exhibitum. Possunt & alij pulueres antea de strumis propositi exhiberi.

Si verò tumor iam incrementum sumserit, discutientia antea in strumarum curatione proposita etiam hîc locum habere possunt.

*De hydropo gutturis.*

*Hydrops gutturis.* Non prætereunda hîc rara affectio gutturis. Solent enim interdum partes quædam priuatæ ab aqua intumescere, non solum internæ, vt pulmo & vterus, sed etiam externæ. Et vidi semel atque iterum, & idem annotarunt alij, toto corpore saluo, manum tantum intumuisse tumore aquoso, pertinacissimo. Idem in gutture factum in puella, vidit Montanus, qui etiam hydropem illam gutturis per incisionem curauit.





LIBRI SECVNDI  
PARS SECVND A.

DE

ASPERÆ ARTERIÆ,  
PVLMONIS, MEDIASTINI,  
DIAPHRAGMATIS, THORA-  
cis præter naturam affectionibus.

P R Æ F A T I O.

*Summam tractandorum continens.*

**P**OSTQVAM HACTENVS  
morbos & symptomata, quæ partibus  
inter caput & thoracem intermediis  
accidunt, explicauimus, vt ad vitia  
thoracis, & partium in eo contenta-  
rum accedamus, ordo postulat. Hâc ergo secundâ  
libri secundi parte dicemus de affectibus præter na-  
turam asperæ arteriæ, de pulmonis morbis, puta  
eius intemperie, inflammatione, seu peripneumo-  
nia, obstructione, de grandine & calculo, ac vermi-  
bus in pulmone genitis, de hydropè pulmonis, de  
pulmonis cum thoracis membranis coalitu, de ru-  
ptura & erosionè vasorum pulmonis, de vulneribus,  
& vlcèribus pulmonis; de mediastini inflammatio-

ne ; de diaphragmatis inflammatione ; de pleuriti-  
de, seu inflammatione pleuræ & musculorum thora-  
cis, de vulneribus & fistulis, de empyemate, de  
hydrope pectoris, de vertebrarum dorsi luxatione  
& gibbositate, de fracturis costarum, & earum ad  
interiora compressione. Hinc dicendum de sympto-  
matibus, quæ inde proueniunt, puta de respiratione  
læsa, asthma, suffocatione ; vocis & locutionis læ-  
sione, tussi, dolore lateris & pectoris, sputo sangui-  
nis, & grandinis, ac calculorum & vermiculorum è  
pulmonibus reiectione.

~~~~~

## C A P V T I.

### *De aspera Arteria morbis.*

*Aspera  
arteria  
morbi.*

**A** V C I B V S & gutturi succedit arteria, Græcis,  
**τρυχία**, dicta, ad differentiam earum, quæ è sinistro  
cordis ventriculo in vniuersum corpus distribuuntur : I-  
tem **βρόγχο**, quod ex bronchiis, id est, annulis cartila-  
gineis constet. Habet ea naturalem constitutionem suam,  
vt passim ab Anatomicis describitur; à qua si deflectat, va-  
rij morbi in ea oriuntur.

#### *Morbi intemperiei.*

*Intem-  
peries.*

Et primò quidem morbis intemperiei corripitur, quam  
inducit imprimis aer, quem inspiramus, vt & quem ex-  
spiramus, qui si frigidior fuerit asperam arteriam refrige-  
rat; si calidior calefacit, si humidior, humectat; si siccus  
exsiccat. Possunt idem præstare etiam cibus & potus. Hinc  
ab aqua frigida vel potu alio congelato, aut glacie refrige-  
rato aspera arteria refrigeratur. Eadem tamen intempe-  
ries accidere potest ab humoribus & materia, quæ eam  
præterlabitur, siue à capite ad eam confluat, siue à pul-  
mone & thorace reiiciatur, Possunt etiam intemperies  
partium vicinarum trachæ intemperiem aliquam indu-  
cere. Ita oesophagus inflammatus calidam intemperiem  
arteriæ asperæ communicare potest.

Cognoscuntur autem istæ intemperies à causis antecedentibus, scilicet vel calefacientibus, vel frigefacientibus, vel humectantibus, vel siccantibus, item ex vocis mutatione, oris ariditate vel humiditate, caliditate vel frigidityte, deglutiendi difficultate, vel facilitate, vt & iuantibus ac nocentibus.

Si verò intemperies à materia in corpore contenta inducatur, arguunt eam tussis, sensus grauitatis, dolor, anhelitus difficultas. Materia autem & humoris natura etiam intemperiei speciem indicat.

Simplices autem intemperies & qualitates, siccitatem si excipias, facilè sanantur, remotis, quæ eam induxerunt, causis, & contrariis adhibitis; difficiliùs verò intemperies sanantur, quæ à materia fouentur.

De curatione autem in genere hoc tenendum, cum partes è quibus aspera arteria constat, sint frigidissimæ & exangues, in refrigerantium vsu cautus esse debet Medicus. Cum etiam pars hæc sicca sit, & à cerebro defluentia excrementa subinde recipiat, audaciùs siccantibus vti licet; exasperantium tamen vsus vitandus.

Intemperies autem simplices saltem remotionem causæ eam inducentis & contraria medicamenta indicant.

Si adsit materia eam fouens; illa remouenda.

Si nimirum intemperies sit calida, alteretur frigidis, *syrupo violarum, rosarum, cucurbitæ, mucilagine, semin. psyllij, & similibus.*

Si frigida sit intemperies, conueniunt species & rotulæ *diatreos, diacalaminthæ, diabyssopi, syrupus de byssopo, de betonica.* Extra inungatur collum *oleo irino, costino, & similibus.*

Si intemperies sit humida, vtile est decoctum & aqua *byssopi cum melle, species diatreos, diacalaminthæ.*

Si intemperies sit sicca, vtendum *syrupo violarum, iuibino, de glycyrrhiza, lacte, emulsione seminis papaueris, amygdal. dulc. pinearum.* Extra collum inungendum *oleo violar. amygdal. dulc.*

Si cum materia sit intemperies, ea cura requiritur, quæ in catarrho ad pectus labente proposita est.

## Asperitas.

Asperi-  
tas.

Deinde aspera arteria patitur morbum superficiiei, cum scilicet, quæ intus & secundum tunicam interiorem naturaliter lævis esse debet, aspera redditur & inæqualis.

Causa.

Quod si à rebus acribus immodicè detergentibus & erodentibus, ut falso & acri catarrho, rebus acidis, oleo, quod licet alias partes lenire & læuigare possit, asperam tamen arteriam & oculos exasperat, præcipuè si sit rancidum, vel frixione tale enaserit, rebus item oleosis & rancidis aliis, ut nucibus & similibus; puluere item & fumo vaporibusque acribus, quos cum aëre inspirando atrahimus, accidit. Longa etiam oratio & vocis intentio asperam arteriam reddunt; humores item maligni, ut in lue Gallica; item vapores acres in febribus malignis ex inferioribus partibus eleuati.

Signa.

Asperitas asperæ arteriæ cognoscitur ex causis, quas modo enumerauimus, & ex utilitate, quam præbent lenientia & damno, quod oritur ex acrium & acidorum usu. Imprimis autem ex effectu cognoscitur, nimirum ex raudedine vocis, quæ ex asperitate arteriæ huius excitatur.

Cura.

Asperitas autem asperæ arteriæ cura lenientia, & læuigantia remedia, & emplastica morfu expertia postulat. Cuiusmodi sunt amyllum, tragacantha, bolus armenus, amygdale dulces, nuclei pinei, dactyli, ficus, lac, vinum dulce, diapenidium, diatrag. frig. syrupus de iuiub. diacod. syr. de glycyrr. lobo de psyllio, de papauere, succus & extractum glycyrrhizæ. Imprimis hic profunt hypoglottides, ac pilulæ & trochisci sub lingua tenendi, ut pilulæ bechiæ, trochisci bechi, oleum amygdal. dulc. cum saccharo cando.

Arteria-  
ca medi-  
camēta.

Atque omninò huius loci sunt arteriaca dicta medicamenta, quod membranæ arteriam asperam succingenti profunt. Composita talia ex antiquis multa proposuit Galenus, 7. de compes. med. secund. loca. Verum cum, ut idem Galenus, ibid. cap. 1. ait, omnium simplicium medicamentorum vires exquisitè nosse oporteat cum, qui compositum quodnam sit factururus, simplicia arteriaca hic proponere libet.

Est autem illorum triplex genus. Primum complectitur lenien-



lenientia, quæ sine omni mordicatione læuigant, qualia sunt, *butyrum recens s. sale, amyllum, lac mustum dulce decoctum, passula, dactyli, iuiuba, amygdalæ dulces, pinei recentes, glycyrrhiza, tragacantha, gummi Arabicum, cremor ptisanæ hordeaceæ & triticeæ, mucilago, sem. psyllij, cydoniorum, emulsio seminum quatuor frigidorum maiorum.*

In secundo genere sunt, quæ abstergunt simul nonnihil, citra tamen rosionem. Et possunt etiam in hunc finem vsurpari medicamenta ex priore classe, si quæ sunt huius generis propria adduntur. Sunt autem talia, *saccharum, mel, saccharum penidium, carica, syrupus violarum iuiubinus.*

In tertio genere sunt paulò acriora, quæ exsiccant, abstergunt, & discutiunt, vt *hyssopus, thymum, radix ireos, semen urticae, cinamomum, amygdalæ amarae, spica, thus, myrrha, terebinthina, farina orobi, spec. diaireos Salomonis.*

Eti verò pluribus modis talia exhiberi possunt, vt syruporum, linctuum: tamen commodissimè ferè in hypoglotidas, seu trochiscos sub lingua tenendos, qui paulatim liquefiant, conformantur. Hæere enim necessum est.

Composita multa talia, vt dictum apud Galenum, 7. de compos. med. sec. loca exstant. Vnum atque alterum saltem addemus.

℞. *Sem. cydon. psyll. spec. tragacanthi frig. an. 3. j. Fiat nodulus, qui madesiat in decocto passular. & glycyrrhizæ. Vel ℞. Glycyrrhizæ rec. in taleolas sectæ q. s. pass. min. cass. extr. sacch. cand. sem. cydon. Ebulliant parum & pro vsu seruentur. Vel ℞. Rad. althææ, 3. j. glycyrrh. branca ursinæ an. 3. 8. pass. mund. iuiubar. sebesten, an. N. x. flor. viol. maluæ, an. P. j. sem. 4. frigid. maior. cydon. an. 3. iij. hordei mand. P. j. Fiat decoctio, in tb. j. dissolu. syrup. violar. 3. viij. iuiubini, 3. j. M. pro tribus dosibus. Vel coquantur ad spissitudinem & addatur saccharum penidium. Fiat lohoh.*

#### *Angustia asperæ Arteriae.*

Tertiò patitur aspera arteria morbos cavitatis, seu angustiam, quæ fit à rebus extra comprimantibus, laqueo, manu, similibusque causis asperam arteriam extrà coarctanti

*Angustia asperæ arteriae. Causæ.*

stantibus; ab inflammationibus item & tumoribus asperæ arteriæ incumbentibus; bolis item grandioribus deuoratis, vel rebus aliis duris deglutitis in œsophago subsistentibus, & arteriam, quæ à posteriore parte gulæ adiacet; comprimantibus, luxatione vertebrarum cœuicis. Quò etiam referri potest natiua pectoris angustia, item nimia obesitas, unde arteriæ comprimuntur, & angustiores redduntur. Obstruitur à rebus extrà in eam illapsis, humoribus crassis & glutinosis confertim à cerebro in eam illabentibus, vel pure ex rupto pulmonis abscessu, vel etiam abscessibus in faucibus ruptis, seu grumis sanguinis vndecumque in eam illapsis; grandine item & calculis in pulmone genitis, & tandem à carne, quæ post vulnera vel vlcera arteriæ in ea nata eius meatum claudit.

*Signa.*

Asperæ autem arteriæ angustiam patefaciunt causæ cum externæ, tum internæ, quæ aptæ sunt canalem hunc comprimere, vel obstruere. Monstrant eadem effectus, respirationis difficultas, & imminens suffocationis metus modò maior, modò minor, pro angustia, à qua prouenit, ratione, tussis item, præsertim si extrà illapsa sit causa angustia.

Et quidem inter morbos asperæ arteriæ angustia grauissimus & periculosissimus est, qui suffocando & spiritus intecipiando hominem iugulat, siue id fiat à laqueo, siue à catarrho confertim in pulmones illabente, siue à sanguine in tracheam influente, siue à rebus aliis in eam illapsis. Cuius rei historias collegit Schenckius *lib. 2. obs. 14.* Pro causarum etiam ratione malum nunc facilius, nunc difficilius curatur. Angustia enim asperæ arteriæ, quæ ob gibbum ex asthmate fit ante pubertatem, non curatur. Hippocrates 6. *aphor. 46.*

Ad prognostica pertinet & hoc, quod ea, quæ in asperam arteriam illabuntur, interdum magno conatu in ipsum pulmonem detruduntur; quæ postea tamen interdum tussi reiciuntur, interdum vomitum ibi excitant. Ita Alex. Benedictus, *lib. 3. cap. 18.* annotauit, Lucretiæ cuidam cum nucem ponticam dentibus frangeret, oborto ri-

su,

fu, nucem in arteriam delapsam, & ancipiti conatu ad interiora propulsam, vbi ruptis venulis vomica in pectore exorta est, quâ tandem sanata obsessis meatibus vox rauca semper percepta est. Sic anno 1620. cùm hic vir quidam cerasa comederet, nucleus cum maximo suffocationis periculo & tussi maxima in guttur, & tandem in ipsum pulmonem illapsus est. Vnde suffocationis periculo cessante in eam venit opinionem, illum suffocationis metum non à nucleo, sed catarrho, præcipiti, cui aliàs valdè erat obnoxius, prouenisse. Verùm durauit per interualla tussis ista tribus septimanis, & dolorem quandam grauâtem in dextra thoracis parte sensit. Tandem cùm nocte quadam vehementer integram horam tussiuisset, nucleum illum pituita obductum tussi reiecit, & ab ea liberatus est.

Curatur autè angustia asperæ arteriæ causæ, quæ eum *Curatio.*  
excitant, ablatione. Si extra quid arteriam comprimat, illud tollendum. Si etiam extra quid in eam illapsum sit, tussi reiiciendum. Si verò causâ obstruens interna sit crassus & viscidus humor, is incidendus, attenuandus & extergendus, vt facilius tussi eiici possit, *syrupo* scilicet *de hyssopo, capill. Veneris, de prassio, glycyrrhiza, oxymelite cum mulsâ, vel decocto aut aquis hyssopi, capilli Veneris, prassij, loch de pino, de scilla, & similibus,* quæ postea in obstructionibus pulmonis proponentur. Si superiore parte œsophagi quid hæreat, ac asperam arteriam etiam coarctet, tum conuassatis pugno dorsi, vel intra scapulas vertebris quibus gula adiacet, impacta in ventrem detruduntur, quò tandem larynx & dilatari, & liberiùs aërem admittere possit.

*Vulnera & ulcera asperæ Arteriæ.*

Tandem etiam morbos solutæ vnitatis patitur aspera *Causæ.*  
arteria, vulnera scilicet, quæ præcipuè à telis, gladiis, vel aliis causis externis inducuntur. Quandoque etiam à tussi violenta, & magna vocis intentione, vt in pulmone, ita in aspera arteria vasa rumpuntur.

Exulcerationem verò inducunt acres humores & erodentes, præcipuè falsi & nitrosi, vt appellat Hippocrates,

4. de rat. viſt. in acut. à cerebro defluentes , vt & humores acres & venenati in lue Venerea.

*Signa.*

Vulnera autem externa-aſperæ arteriæ ſenfui patent, & ægri vel adſtantes referunt , quæ cauſſæ ea induxerint. Et ſi dubitetur , an vulnus ad cavitatem arteriæ penetret, id facile manu , candela , vel alia re vulneri admota, dum æger loquitur , & omninò ex æris per vulnus egreſſu cognoscitur. Ruptura autem vaſorum ex tuſſi nimia , vt & vocis intentione , quæ præceſſit , ac præcipuè ſanguinis ſputo , quod ſequitur , innotefcit.

Interna autem exulceratio pateſcit è cauſſis quæ præceſſerunt , vel adſunt , catarrhis falſis , medicamentis acris , lue venerea , vt & iis quæ exulcerationem conſequuntur, dolore, tuſſi, ſputo ſanguinis in principio quidem puro , hinc purulento , aut materiæ purulentæ , & ſordidæ , vt & cruſtularum , quas Græci *ἰφελίδας*, vocant reiectione. Interdum etiam bronchia & cartilagineſe aſperæ arteriæ tuſſi reiiciuntur , quod tamen ex pulmonibus frequentius accidit, rarò ex aſpera arteria , quæ durior eſt , quàm vt viuente homine tantam corruptionem pati poſſit. Symptomata equidem , quæ vulneribus & vlceribus arteriæ ſuperuenire ſolent , recenset Hippocrates, 2. de morb. Verùm , vt mihi quidem videtur , agit eò loci Hippocrates de aſpera arteria etiam de vulneribus vulnerata vel exulcerata , de qua nunc nobis fermo , ſed de eius ramis iam per pulmonis ſubſtantiam diſperſis; cum inter cætera expreſſe ſcribat , in vulneribus eiufmodi tandem *βρόχια*. pulmonis reiici.

*Prognostica.*

Vulnera autem aſperæ arteriæ periculofa ſunt , & plerumque inſanabilia, præcipuè ſi ſubſtantiâ ipſa cartilaginea ſit vulnerata, præcipuè per tranſuerſum diſſecta , quæ vix coaleſcit. Interdum etiam inflammatio accedit , & hinc gangræna & ſphacelus , quæ ægrum ſubitò iugulant.

Aliquando tamen ſanantur , præſertim ſi vulnus inter duos annulos , atque ita membranam cartilagineam connectentem incidat , cuius rei exempla collegit Schenckius , lib. 2. obſeru. 40. Et ipſe bis vulnera arteriæ aſperæ penetrantia ſanata vidi. Si autem moriatur æger, iugulatur

latur, vel statim sanguinis effusione, qui in arteriam illapsus ægrum suffocat, vel lentè, quod post aliquot septimanas factum vidi, cum aliquid carunculæ vulnere succrescit, quod ægrum tandem suffocat.

Vlcera, quæ internam asperæ arteriæ partem occupant, difficilia quidem curatu sunt, ob partium situm & naturam, cui difficulter & non omnis generis medicamēta applicari possunt. Plerumque tamen sanantur, modò non sint profunda, & cartilagine exedantur & putrilago accedat.

Vulnere asperæ arteriæ curationem quod attinet, *Curatio.* cutis labia distantia coniungenda, & deinde emplastris convenientibus extrà adhibitis vulnus, ut moris est, conglutinandum. In ore verò, ut & intus conglutinatio iuuetur, continuò aliquid medicamenti detinendum, quod liquatum sensim per viam asperæ arteriæ delabatur; id quod facilius fiet, si æger supinus iaceat, ut *rotulæ diatraganth. frigid. diacodium, & similia.* Vel ℥. *Spec. diatragac. frigid. 3. j. gummi Arabici, boli Armeni, an. 3. ℔. rad. consolidæ sub cineribus coctar. 3. j. syr. myrtin. q. s.* Fiat electuarium. Vel ℥. *Conseru. rosar. rubr. rad. consolidæ maiori, an. 3. j. boli Armeni, spec. diatragac. frigid. gummi Arabici, an. 3. ℔. syr. de rosis siccis q. s.* Fiat electuarium.

Potest etiam exhiberi lochi sanum & expertum.

Æger verò non multum loquatur, & omnia quæ tussim excitare possunt, præcaueat.

Vlcera quoque curantur detergentibus, siccantibus, id, quod amissum est, regenerantibus, & cicatricem inducentibus. Detergunt *mulsæ, mel rosatum cum aqua hordei.* Siccant & glutinant *bolus armenus, thus, myrrha, radix aristolochiæ puluerisata, & cum melle in formam eclegmatis redacta.* Et si ab humoribus acris & salis vehementer detergentibus vlcera eiusmodi ortum habeant, lac commodissimū est, cuius solius usu humorum acrimonia temperatur, sordes detergentur, ac quod deest, restituitur. Imprimis si lac debito modo præparetur, & eas, quas debet, condiciones habeat, de quo vide Galenum, 5. *meth. med. cap. 12.*

## QVÆSTIO.

*An ulcera aspera Arteriae sint sanabilia?**Ulcera  
aspera  
arteriae  
an sint  
sanabi-  
lia.*

Galenus equidem, 5. meth. med. cap. 12. ubi ex professo de curatione ulcerum asperæ arteriæ tractat, & propterea hac de re videri potest; scribit se non paucos eorum, qui hoc morbo laborarunt; curasse, quod & Aëtius, tetrab. 2. serm. 4. cap. 64. se fecitasse testatur. Marcellus Donatus tamen, de historia medica mirabili, lib. 3. c. 1. recenset historiam cuiusdam, qui omni diligentia à Medicis adhibita, nihilominus hoc morbo periit. Et omnino non simpliciter affirmandum, esse sanabilia hæc ulcera, ut etiam de vulneribus dictum. Etenim cum sanies non nisi tussi reiici possit, facile fit, ut isto conatu partes ulceratæ lacerentur. Quibus accedit & hoc, quod aspera arteria non carnosæ est, cuiusmodi partium vulnera & ulcera facile sanantur, sed dura & cartilaginosa. Præterea cum membra ulcerata siccatione indigeant, etiam hac de causa asperæ arteriæ ulcera difficilius sanantur, cum continuo humiditas quædam, præcipue à vicinis tonsillis, destillet: & imprimis, cum aspera arteria natura sua sicca sit, & vehementius siccare postulet.

Et omnino ista rationi consentanea sunt. Quapropter statuendum, ut & Auicennas, 3. can. fen. 10. tr. 4. cap. 18. docet, si vlcus in principio sit, & saltem externam superficiem asperæ arteriæ occupet, sanabile esse: si verò vlcus penetrauerit, & ipsas cartilagineas asperæ arteriæ eroderit, tale vlcus vel planè insanabile esse, vel omnino difficulter curari.

~~~~~

## CAPVT II.

*De Pulmonis intemperie.**Pulmonis  
intempe-  
ries.*

**A**SPEERA arteria in ipsum pulmonem tendit & inseritur. Ideoque proximum est, ut de eius morbis dicamus. Quæ autem naturalis sit constitutio pulmonis,

ex

ex Anatomicis petatur. A qua cùm deflectit, varios morbos patitur. Inter eos sunt, primò morbi intemperiei, cùm pulmo vel nimis calefit, vel refrigeratur, vel humectatur, vel siccatur; & quidem nunc sine materia, nunc cum materia.

## Causæ.

Morbum intemperiei sine materia inducunt causæ simili qualitate præditæ, imprimis aer, quem spiritu ducimus, quique ad pulmonem parùm alteratus defertur, præcipuè in iis quibus columella deest, Quamcunque enim qualitatem aer habet, eam pulmoni imprimit. Hinc qui tempore hyberno per loca niuosa, aut ventis frigidis exposita iter faciunt, iis, pulmones refrigerantur. Idem interdum euenit à potionibus nimis frigidis, imprimis quæ glacie refrigeratæ sunt, quarum portio aliqua, licet exigua, per asperam arteriam in pulmones defluit. Pertinent & huc, quæ tota substantia pulmonibus aduersa sunt. Quanquam enim talia occultis qualitatibus præcipuè pulmonibus noceant: tamen & ipsæ sæpè vnà qualitatum manifestarum excessus habent, quos & ipsos pulmonibus imprimere possunt. Extrà quoque applicata thoraci medicamenta pulmonem alterare possunt. Ita refert Galenus, 10. *meth. med. c. 9.* quod quidam imposito præcordiis refrigerante medicamento difficultate respirandi laborauerit, alter verò tussierit. Afficiuntur etiam & alterantur pulmones à vicinis quibusdam partibus, vt corde, epate, liene. Hæ enim partes, si incalescant præter naturam, plerumque etiam pulmoni intemperiem illam communicant.

Intemperies autem cum materia fit; vbi ea in pulmone vel sensim, seu ob facultatis concoquentis, seu expellentis imbecillitatem colligitur, vel aliunde confertim affluit. Imprimis autem à capite ad pulmonem materia transmittitur in catarrhis sæpè à gutture & faucibus, quarum partium inflammatio nonnunquam in pulmonem conuertitur. Frequentissimè autem ab ipso epate, imò per epar à toto venoso genere, seu multo sanguine, seu vitiosis humoribus repleto transmittitur. Nonnunquam

etiam à thorace materia, vt pus & sanies, pulmoni & communicatur; quod interdum quoque à membrana costas succingente, vt à costarum musculis inflammatis, accidit. Nec extra culpam semper est vterus, à quo etiam sanguis ad thoracem conuertitur, teste Hippocrate: nisi quis malit à venoso genere, antequam ad vterum feratur, ad pulmonem mitti sanguinem.

*Signa Diagnostica.*

*Signa.*

Calida pulmonis intemperies cognoscitur ex causis, quæ præcesserunt, irâ nimia & diuturna vocis intentione, motu nimio, inspiratione aëris calidi, medicamentis & cibis nimis calidis intemperie vicinorum viscerum calida; è rubore genarum, qui provenit à fumis calidis ascendentibus, siccitate linguæ & faucium, siti ingenti, quem potus non sedat, & frigidi aëris inspiratio, è magnitudine, celeritate & frequentia anhelitus, vt & pulsuum differentia simili, languore corporis, & quod æger causis, quæ calorem augendi vim habent, offenditur, iuuatur ab iis, quæ refrigerant.

Frigida pulmonis intemperiei signa sunt causæ refrigerantes, quæ præcesserunt, imprimis mora in aëre frigidus, & locis ventis borealibus expositis, imprimis si corpus & præcipue os non muniatur aduersus hanc aëris iniuriam, potus frigidus, imprimis qui glacie refrigeratus est, aut antea frigore congelatus fuit. Respiratio est tarda, parua & rara, pulsusque similis, expiratio est frigidior. Æger frigidorum usu offenditur; commodum ex calidis, præsertim aëre calidiore percipit.

Signa pulmonis humidi petuntur à causis humectantibus, quæ præcesserunt, à vocis rauedine, anhelitu frequenti cum sibilo & stertore, sputo multo; & læsione ab humectantibus & commodo ab exsiccantibus.

Sicca intemperies tandem cognoscitur, quod causæ exsiccantes præcesserunt, motus & vocis intentio diuturna & nimia. Morbo hoc imprimis aurifabri & Chymici, ac qui circa metalla occupantur, infestantur, à quorum valde exsiccantibus halitibus cum aëre, quem inspirant, attractis pulmones exsiccantur. Morbo hoc affecti paulatim contabescunt,



besunt, & si mortuorum pectus aperitur, nullum vlcus in pulmone apparet, sed pulmones veluti fumo exsiccati conspiciuntur. Respiratio est parua & frequens, sitis continua, sputum paucum. Exsiccantibus æger læditur, ex humectantibus emolumentum percipit.

Intemperis verò cum materia innotescit ex humorum in corpore redundantium notis, quæ alibi, & quantum pulmones spectat, postea proponentur.

#### Prognostica.

1. Intemperies sine materia, (siccâ exceptâ, quæ plerumque incurabilis est) quàm quæ cum materia committitur, facilius curatur, nec suffocationis periculum coniunctum habet. Prognostica.

2. Periculosior verò est intemperies cum materia. Nam grauiora inde excitantur symptomata, atque ob visceris situm medicamenta difficilius eò penetrant, & maius & minus periculum coniunctum habet morbus, pro virium robore & debilitate, & ipsius materiæ conditione, quæ coctionem vel facilius vel difficilius recipit, & facile vel difficulter excernitur.

3. Si pulmonis intemperiei catarrhus coniunctus sit, curari ea non potest, nisi catarrhus prius tollatur & sistatur.

#### Indicationes.

Si simplex intemperies sit sine materia, indicat contraria alterantia; si cum materia, etiam ea, quæ materiam à pulmone reuellunt & euacuant. In frigidis tamen adhibendis cautè agendum, nec nimis frigida exhibenda, quorum usu pulmo offenditur, ac tussis inde & alia mala interdum excitantur. Indicationes.

Pulmo autem euacuatur commodissimè per tussim; cum per arterias per ipsam dispersas quæ in vnam magnâ tandem coeunt, materia rectissimè euacuetur. Licet autem per vrinam & aluum etiam aliquando ista euacuatio fiat; tamen hoc rarissimè accidit. Etsi verò tussis à materia concitetur, expultrice excitata ad eiiciendum ea, quæ molesta sunt; ars tamen naturæ subsidio venit medicamentis, quæ becchica & tussim excitantia appellantur. Pulmo quomodo euacuatur.

Sunt autem ea, quæ facile per asperam arteriam in pulmonem destillant, & crassam & viscidam materiam incidunt atque extenuant, & ob acrimoniam aliquam, quæ prædita sunt, naturam ad tussim stimulant.

Medicamenta autem, quæ pulmoni adhibentur, vel interna sunt, vel externa. Interna quæ per os sumuntur, alia per asperæ arteriæ latera in pulmonem sensim destillant; alia verò statim in ventriculum descendunt, & per viscera reliqua ad pulmones transeunt. Priora ita sint comparata, & talia eligenda, quæ nec pulmonem offendunt, nec nimis liquida sunt, ut statim in ventriculum defluant, sed talia quæ mediocrem crassitudinem habent, qualia sunt eclegmata siue lambilia, vel si sint duriora, talia tamen, ut in ore detenta sensim liquefcere & in pulmonem destillare possint. Posteriora, & quæ mox ad ventriculum perveniunt, quod attinet cum circuitus, viæque, per quam ad pulmones talia medicamenta perveniunt, longus sit, & longæ ambages, medicamenta ea validiora sint, & maiore copia, & frequentius exhibeantur, ut ubi ad pulmones perveniant, vires adhuc morbo curando sufficientes obtineant.

Externa pectori applicantur extrâ, quod cum sit maxima ex parte osseum, ut validiora ea sint, oportet. Cauendum autem hîc, ne refrigerantia, repellentia & adstringentia valida pectora applicemus. Nam & frigus pulmoni inimicum, & vitiosos humores talia medicamenta in pulmonem ab externis partibus compellunt.

#### Curatio.

*Curatio.* Calidum ergo pulmonem refrigerant medicamenta ex *violâ, endiviâ, papavere, hordeo, nymphaea, syrup. violar. decoct. hordei, loch de psyllio.* Extrâ inungatur thorax *oleo violarum.* Vel fiat epithema ex decocto lactucæ, violar. endiviæ.

Dixit medicamentis respondeat. Aër, quem spiritu trahimus, sit actu frigidus, qui nisi talis sit natura, arte comparetur, ut alibi dictum. Potius sit aqua hordei simplex, vel cum iulepo violarum. Ager à vino absteineat. Cibi quoque refrigerandi vim habeant, & condiantur endiviâ,

diuina, lactuca. Vigilias nimias æger vitet. Quies motui præferenda; cum motus calorem augeat, ut & silentium sermoni. Vitanda est ira & excandescencia.

*Frigidam* verò pulmonis intemperiem corrigunt *hyssop.* *Pulmo-*  
*prassium, capillus veneris, helenium, thymus, calamintha, tus-* *nes cale-*  
*filago, nicotiana, radix ireos, crocus,* quem nonnulli pul- *faciētia.*  
monis animam nominant, qui & ex ovo sorbili, vel cum  
aliis medicamentis sumi potest, & cum linimentis mis-  
ceri. Et ex his parata decocta & aquæ. *Syrupi item capill.*  
*Veneris de hyssopo, de glycyrrhiza, de prassio, de calamintha,*  
*species diatragacant. calid. diatreos Salomonis, diaprassium, ut*  
*& suffitus aromatum.*

Extra illinatur pectus oleo irino, amygdal. amarar. ruta-  
ceo, anethino.

Diæta medicamentis sit similis. Aer sit calidus, & nisi  
talis sit natura, ut antea comparetur. Potus sit vinum &  
mulsum. Cibus sit carnes animalium aromatibus condi-  
tæ. Vtilis est pulmonis & totius corporis exercitatio, quæ  
calorem viscerum excitat.

*Humidam* pulmonum intemperiem corrigunt medica- *Pulmo-*  
menta calida modò enumerata. Habent enim eadem e- *nes sic-*  
tiam vim ficcandi, ut & decoctum ligni guaiaci, & sassafras. *cantia.*

Extra pulmonem exsiccant aquæ salæ, sulphuræ, bi-  
tuminosæ, ut & sacculi milio ac sale pleni pectori im-  
positi.

Aer sit siccus vel sua natura talis, qualis est maritanus  
& montanus, vel suffitu herbarum calidarum & siccarum  
modò enumeratarum, ut & aromatum, & lignorum ca-  
lidorum suaueolentium, ut & styracis, thuris, myrrhæ,  
benzoes, alis redditus. Suffitus etiam ad exsiccandum  
pulmonem ore excipi potest. Diæta medicamentis con-  
sentiat. Potus ergo sit vinum hyssopo, marrubio, helenio,  
vel aromatibus conditum. Cibus etiam vim ficcandi ha-  
beat; quales sunt aues montanæ. Vtilis est etiam corpo-  
ris ac imprimis pulmonis exercitatio, quæ fit multo ser-  
mone & locutione.

*Siccos* pulmones humectant *cassia, glycyrrhiza, viola,*  
*iniuba, passula, amygdalæ dulces, sem. melonum.*

Extra conuenit aquæ dulcis tepidæ balneum & oleum amygdalarum dulcium. Imprimis verò ad siccitatem pulmonum corrigendam utilis est diæta.

Aër sit humidus naturâ, vel arte talis factus. Potus & ipse vim humectandi habeat, qualis est vinum album dulce, decoctum hordei, emulsio feminis melonum & amygdal. dulc. In cibis conueniunt oua sœrbilia, carnes hædinæ, vitulinæ, pullorum gallinaceorum, pisces saxatiles, caro gammarorum & cancrorum ac testudinum; lac imprimis recens. Vtilis est & somnus, quies & animi tranquillitas.

~~~~~

### C A P V T III.

#### *De Pulmonis inflammatione, siue Peripneumonia.*

*Pulmonis inflammatione.*

**O** S T intemperies pulmonis de inflammatione eiusdem agere libet, vt intemperie cum materia. Et si enim & magnitudo aucta accedere possit: tamen magis lædit intemperies. Vlcus verò, quod interdum accedit, ad solutionem continui pertinet, de qua infra.

*Πνευμονία* autem, & *πνευμονία* Celso, l. 4. c. 7. morbus peripneumonicus, vulgò pulmonia (est enim hic morbus ex eorum genere, qui à parte affecta nomen acceperunt) est phlegmone pulmonum cum febre acuta, spirandi difficultate & tussi.

Morbus est primò intemperiei cum materia, quia sanguis p. n. ad pulmonem affluxit, deinde in magnitudine aucta, quia est tumor parenchymatis pulmonum, quibus interdum & soluta vnitas accedit. Pars affecta est pulmo interdum secundū vnū vel alterum lobum, interdū totus.

*Causa.*

Oritur autem hic morbus ex sanguine, vt. aliæ etiam inflammationes omnes, vel solo, vel bilioso, vel pituitoso. Et plerumque, (interdum enim solam plethoram huius inflammationis causam esse impossibile non est) vt etiam supra dictum, in talibus inflammationibus humores vitiosi in venis cumulati prima mali occasio sunt, quibus cū se se natura exoperare cupit, simul eos cum sanguine ad

partem

partem aliquam corporis protrudit & deponit. Sanguis autem semper præualeat, etsi motui primam occasionem alius humor præstare possit. Alias non esset inflammatio.

Infunditur autem sanguis in pulmonem à dextro cordis sinu per venam arteriosam. Nonnunquam aliis morbis succedit peripneumonia, ut angina, pleuritidi, dum è faucibus & lateribus humor *et materia*, repente in pulmones irruit. Etsi enim à pleura ad pulmonem nullus sit vasorum ductus: tamen quia pulmones cum pleura communem membranam habent, quæ omnes thoracis partes inuestit, per eam malum hoc vicinis partibus & pulmōi communicari potest, de quo postea de pleuritide dicetur. Accidere tamen etiam potest, ut humores ad fauces, aut pleuram ruentes in venas recurrant, quos cum natura iterum aduersus thoracem pellere conatur, eos per venam arteriosam in pulmones trudit, unde tum pleuritidis in peripneumoniā degenerat, causā antecedente, quæ pleuritidem auctura erat, ad pulmones conuersā. Potest enim, ut Galenus 7. *aph.* 11. docet pleuritis in peripneumonia mutari & degenerare, potest & pleuritidi peripneumonia superuenire.

Degeneratio fit, cum priore cessante morbo, alter succedit; superuenire verò, cum priore permanente alter accedit.

Sanguinis in pulmonem effusi pars aliqua in arteriæ asperæ ramos impulsā ichore primū, hinc cruore sputum imbuat, tandem mutatus & coctus per tussim copiosius eiicitur, illasā pulmonum substantia. Hæc enim si lædatur, phthisis succedit.

Causæ autem, quæ faciunt, ut materia ad pulmones fluat, ferè omnes sunt, quas postea in pleuritide recensēbimus, vehemens scilicet exercitatio post quietem longam & corpore repleto, clamor & vocis intentio nimia. Ira etiam sanguinem commouere potest, ut ad pulmonem confluat. De quo Hippocr. 6. *epid.* com. 5. r. 8. præceptum atque acerba iracundia cor & pulmonem in sese, & ad caput calorem & humorem trahit.

Aër frigidus & aquilonius australem præcipuè sequens, aër enim frigidus pulmōi est inimicus, qui facilius pectus

afficit, si ab aëre tepido partes thoracis laxatæ sunt. Facie huc & aquarum lacustrium & stagnantium vsus tempore hyberno: vnde Hippocr. *de aëre, aquis, & loc.* scribit, in regionibus lacustribus & paludosis frequenter obseruari pulmonias, Hyeme scilicet. Aqua enim eiusmodi non glaciata potius inferioribus partibus nocet, atque ipse Hippocrates per æstatem alui profluvia, intestinorum difficultates, lienes magnos, hydropem adesse scribit; de aqua verò glaciata scribit, *5. aph. 24.* frigida, veluti nix & glacies, pectori inimica tusses mouent, venarum ruptiones & destillationes efficiunt. Cùm enim tales aquæ non defluant, sed aquæ pluuiæ noua semper inferatur, tempore æstiuo, cùm sol eas vrit, corrumpuntur, hyeme verò glaciuntur, & frigida ob niuem & glaciem euadunt.

Pertinent huc & medicamenta venenata, & præcipue lepus marinus qui peculiari vi pulmones exulcerare, & hinc inflammationem eius excitare solet. Nonnunquam & in constitutionibus epidemiis talis est humorum malignitas, quæ peculiariter pulmones lædere apta nata est. Hinc obseruatæ sunt epidemiæ peripneumoniæ quibusdam annis, siue solæ, siue cum pleuritide coniunctæ, in quibus tempestiuè, id est, primo, secundo, aut tertio detractus sanguis profuit, quarto aut quinto die nihil iuuat, ægro septimo vel octauo die extincto: qualis fuit ea quæ anno 1564. & 1565. inferioris Germaniæ & Rheni accolæ inuasit. Vide Dodonæum, *in obseruat.*

Rariùs ad catarrhū & asthma sequitur peripneumonia. Notham tamen seu spuriam quandam esse volunt, quando tenuis & acris destillatio e cerebro confertim in pulmones illapsa, ardore p. n. accenso febrem cum tussi & spirandi difficultate infert, qua & sensim æger conficitur sine vlcere, & cruoris exspuitione. A pituita tamen e capite in pulmonem delapsa in pulmone putrescente facilius lædi, & tussi superueniente pulmo concuti potest, vt sanguinem inflammationis causam attrahat, vnde vera peripneumonia generatur: Et tum catarrhus peripneumoniæ occasio potius est, quàm causa.

Causa verò proxima inflammationis pulmonis est calor putrescentis pituitæ, ob quem attrahitur sanguis copiosior, & antea calidus faciliè incalescit.

Magna autem est inter peripneumoniam & pleuritidem cognatio, imò sæpissimè coniunguntur. Differunt verò præcipuè loco affecto. Galenus equidem, 4. de caus. pulm. c. 12. respiciens ad diuersitatem compositionis, vel structuræ partium pulmonis & pleuræ, inter peripneumoniam & pleuritidem sic discernit, quòd pleuritis à tenui & bilioso, peripneumonia verò à pituitoso & crassiore sanguine ortum habeat, cum tenuis & biliosus sanguis in rarà & laxa pulmonum substantia non adhærescat. Sed commodissimum erit saltem loco affecto hos duos morbos distinguere, ita vt, si soli pulmones afficiantur, & pleura non sit affecta, peripneumonia, pleuritis verò excitetur, cum pleura vel sola, vel cum pulmonibus inflammatur. Causam communem esse posse, & humorem qui producit pleuritidem, peripneumoniam quoque gignere posse, & contra vel ex eo patet, quod angina & pleuritis sæpè in peripneumoniâ mutantur, & cum pleura plerumque pulmones simul afficiuntur. Et sanguis etiam si biliosus, nihilominus in substantia pulmonis p. n. eò effusus hæere potest. Quamuis enim laxa & mollis sit pulmonis substantia; talis tamen est: vt non minùs tenues in ea humores, quàm in spongia aqua contineri possint. Imò maiorem quantitatem tenuis humoris recipere posse videtur pulmo, quàm crassus. Crassa enim poros citò obliunt seu obstruunt: tenuiora verò penitiùs sese insinuant. Neque ipse Galenus alibi id negat, vbi phlegmonem hanc *ἰνσπιλατῶδη* esse statuit

*Differentia.*

Dantur etiam aliquæ peripneumonix differentix. Prima est à parte affecta. Afficitur enim vel totus pulmo, vel eius pars & quidem dextra vel sinistra. Secunda à causis. Sanguis enim qui inflammationem pulmonis excitat, vel purus est, vel biliosus. Vnde Hippocrates, lib. de intern. affectione etiam erysipelate pulmonem affici posse scribit. Verùm Hippocrates non solum eam, quæ à bile multa admixta

mixta sit, inflammationem erysipelas hic appellat, sed illam, quæ à sanguine; quæ verò à pituita, bile, & sanguine permixtis, inflammationem, vt videre est, *lib. i. de morb.* vbi de erysipelate pulmonis inquit, quòd sanguis plurimus è venis magnis trahitur, & *lib. de intern. affect.* hunc tumorem potissimum è sanguine oriri scribit. Contrà de inflammatione pulmonis, *lib. i. de morb.* inquit, hanc fieri, cùm pulmo commotam & humectatam pituitam & bilem ad se traxerit, & *in lib. de intern. affect.* pulmonis inflammationem fieri, cùm ad sese pulmo ad sanguinem, aut pituitatem falsam traxerit, & paulò post morbum hunc ex pituita suam originem habere asserit.

Verùm forsan Hippocrates illam differentiam hic intelligit, quæ ex causâ & generationis modo diuerso prouenit, cuius etiam suprà facta est mentio. Aliquando enim causâ inflammationis è venis magnis, id est, è venâ arteriosa è dextro ventriculo cordis affluit: qui sanguis cùm sit calidior, inflammationem erysipelati similem excitat; aliquando verò pituita è capite defluens inflammationi huic occasionem præbet. Hanc enim vbi pulmo natura sua rarus imbibit: atque ea calorem concipit, inflammatio excitatur. Aliquando verò sanguis est pituitosus, vel melancholicus. Tertia à modo inuadendi. Accidit enim peripneumonia vel per se, & à principio, nullo alio morbo præcedente, vel aliis affectibus, vt anginae & pleuritidi, superuenit.

#### *Signa Diagnostica.*

*Signa.*

Et si peripneumonia plurima signa cum pleuritide habeat communia, quibusdâ tamen distinguitur. Difficultas enim spirandi maior est, quàm in pleuritide, & cum periculo suffocationis, vt æger erectus spiritum ducere cogatur. Et si enim ægri in supino decubitu libenter permanerent, vt virium debilitati conuenientiori: tamen ad erectum corporis situm ipsos cogit respirationis difficultas & angustia. Hoc autem situ thorax facilius dilatatur, quippe qui decumbentibus in se concidit, eò quod pectoris partes in spinam declinant, qua erecta thorax etiam simul fertur non amplius seipsum grauans, vt Gal. 4.



de loc. affect. cap. 7. docet. Interdum, nec bibere nec loqui commodè possunt ob respirationis angustiam. Nam maior refrigerandi cordis necessitas vrget, cùm inflammatio sit cordi vicina, quàm in pleuritide, vt pulmo inflammatus humore plenus, etsi plurimum distendatur: aërem, vt opus excipere non possit. Itaque æger erectâ ceruice & confertim respirat, crebra anhelatione vexatur, intumescit, nares expandit, non secus ac equus post cursum, & linguam crebrò exserit, pectus ei sonum edere videtur, & grauitas inesse, quam pectus capere nequit. Hipp. lib. 3. de morb. Difficilem hanc peripneumonicorum respirationem sublimem vocat Hipp. 3. epid. sect. 2. comm. 4. scribens; in ea summum moueri thoracem ad operta scopula vsque. Et quidem principio peripneumoniæ, præsertim biliosæ, respiratio est frequens & magna, quæ tamen breui, ob virium debilitatem & instrumenta spirandi affecta, in paruitatem mutatur, & frequentia augetur. Sufpiratio est calida, & vbi plurimum efflant, alleuationem sentiunt, & multum aërem frigidum attrahere cupiunt. Cordis enim calor temperatur non solùm refrigeratione, quam præstat aër inspiratus, sed etiam expulsionem fuliginum, quæ expiratione perficitur, quæ fuligines cùm in peripneumoniâ ob magnum incendium copiosissimè colliguntur, ad earum subitam expulsionem, vehementem expirationem æger molitur, ac sæpè tam magnam vt sufflationis nomen mereatur.

Pectoris angustia adest cum dolore, dolorque non est pungens, sed grauatiuus, spinam attingens, vbi membrana pleuram ambientes sustentantur, isque dolor remissior est, nisi membrana simul inflammata fuerit. Nam deprehensum est in dissecctis peripneumonia mortuis, sæpè membranam pulmones ambientem simul inflammari, & aliquoties, vt dictum, simul cum pulmone pleuram quoque inflammatione corripì, vbi dolor acutior, & punctorius est; vbi verò ipsæ membranæ primariò non afficiuntur, sed visceribus quæ ambiunt inflammatis extenduntur, dolor tantùm grauis excitatur.

Febris acuta est, & quidem acutior, quàm in pleuritide, ob

ob cordis vicinitatem. Adest etiam anxietas & iactatio, ut Hippocrates, *de morb.* habet, ægrique situm & figuram decubitus sæpè mutant, quod fit ob febris vehementiam summam respirandi difficultatem, & virium debilitatem. Ob summam enim respirandi difficultatem & angustiam ægri sese frequenter erigunt, & sedere conantur, ex corporis hac erectione aliquam alleuationem sperantes, ob virium tamen imbecillitatem erecti diu sedere non possunt, ideoque situm iterum mutare coguntur. Pulsus est magnus ob vehementem arteriæ percussione, & usum urgentem; languidus tamen ob virtutis imbecillitatem.

Facies rubet ob vapores calidos ad caput exhalantes, & sanguinem simul secum rapientes, malæ imprimis, ubi cutis est tenuior, & propterea sanguinis color ibi evidentiùs efflorescit. Eadem de causâ oculi & venæ temporum tument, lingua flava est, vel lentore multo obducta, tandemque nigrescit, sæpè accidunt deliria, sitis magna adest & potus frigidi, imprimis verò aëris frigidi appetentia ob linguæ & faucium à calidis vaporibus ex inflammato pulmone exhalantibus inductam siccitatem, quæ ori ventriculi ob communem tunicam communicatur: unde pulmones etiam membrum siticulosum appellantur.

Signa differentiarum quod attinet, ac primò ratione subiecti, quia intersepimento quodam pulmo in partem dextram & sinistram diuiditur, prout hæc vel illa afficitur, ita dolor & grauitas in dextro vel sinistro latere magis percipitur. Si verò utraque pars sit inflammata, in toto pectore is dolor sentitur. Idem quoque ex altera clauicula, vel hypochondrio condolente æstimari potest. De qua re videatur Hippocrates, in *Coacis text.* 400. in codice Foesij, vel *comm.* 1. in *lib.* 5. *sect.* 2. *aph.* 47. in Hollerio: *In pulmonis inflammationibus, si lingua tota fiat alba & aspera, utraque pulmonis partes inflammatione laborant: quibus verò dimidia lingua qua parte id apparet, inflammatio affligit. Et quibus quidem ad unam clauiculam dolor subit, iis una superior pulmonis ala laborat; quibus verò ad ambas clauiculas dolor extenditur, ambæ superioris pulmonis ala*

ale laborant ; quibus ad mediam costam , media , quibus verò ad septum transversum , inferior , quibus verò una tota pars laborat , quæ ei parti respondent , omnia ægrotant. Si quidem igitur suspensæ utrimque pulmonis partes aortæ distæ tanta inflammatione detineantur , ut ad latus adhæreant , illa corpore parte resolutionem patiuntur , quæ morbo respondet , & ad costam liuores fiunt , quos veteres βλῆτες , istos vel sideratos vocabant. Quod si tanta non est inflammatio , ut adhæreant , dolor quidem totum occupat , neque tamen resolutionem sentiunt , neque liuores habent. Quibus verò totus pulmo , una cum corde inflammatur , ut procedat in latus , resolvitur totus æger , iacet frigidus & sine sensu. Moritur autem secundo & tercio die. Hæc Hippocrates.

Resolutionem autem seu paralyfin , quæ ex pulmonis inflammatione fit , quod attinet , triplicem eius causam reddit Desid. Iacotius in comment.

Prima est , quia primi inter costales recipiunt à pulmo- Paraly-  
sis in  
inflamma-  
tione  
pulmo-  
nis.  
ne noxam & tumore premuntur. Quoniam autem ab il-  
lis ad brachia deriuantur nervi , ideò fit , ut eiusdem late-  
ris brachium sensu & motu benè destituatur. Deinde quia  
musculorum thoracem mouentium calor internus resol-  
uitur & facultas motrix labefactatur , cuius defectus re-  
solutio est. Postremò quia extincto calore cordis & suffo-  
cato , morte repentina , citra syncopen tamen , veluti at-  
toniti affecti moriuntur , denegata subitò vi mouendi.  
Verùm commodissimum est statuere , fieri hoc ob con-  
sensus spinalis medullæ & arteriarum & intercostalium.  
Etenim si pulmones tanta inflammatione laborent , ut san-  
guis etiam in arteriam magnam copiosè irruat , ita ut e-  
tiam arteriæ intercostales repleantur & tumeant , & hinc  
etiam ramuli illi , qui per foramina vertebrarum thora-  
cis in spinam penetrant , fit inde , ut & nervi è spinali  
medulla ibi progredientes comprimantur , atque ita pa-  
ralysis partium , in quibus nervi illi resolvuntur , exci-  
tetur.

Tussis molesta est , ob pulmonem primò affectum , cum  
qua sputum redditur sanie primùm tenuiore , mox cruo-  
re , aliàs alio colore tinctum , nonnunquam spumofum.

Et ipsum sputum & hinc sequens stertor quasi quidam peripneumoniam à similibus affectionibus discernit. Cuius rei exēplum est apud Hippocrat. *lib. 5. epid. Larissa*, inquit, Hippopsthene's pulmonis inflammatione Medicis detineri, falsò ramen, videbatur. Principio quidem lucta se exercens duro in loco supinus cecidit, super incidente ei aduersario, & lauit frigida, cœnam sumpsit, & grauior sibi videbatur. Postridie verò febris & tussis siccior, ac spiratio crebra tenuit. Quinto autem die cruentum paucum secreuit, & delirare cœpit. Cùm tussis urgeret, tum dolor pectus & dorsum infestabat. Sexto postquam sternutasset, sanguis ex naribus effluxit ad quatuor ferè heminas. Sub vesperam neque loquebatur, neque quid fieret, aut quid diceretur, sentiebat. Undecimo mortuus est. Quinque autem diebus quandòque bene sentiebat, quandòque verò minimè, febre liber erat. Sputum verò nullum excernebatur, neque stertor detinuit, quoniam sputum non aderat.

*Signa differentiarum.*

Signa differentiarum ratione causæ quod attinet, patent ea ex notis humorum in corpore redundantium. An autem per venas sanguis affluerit, an verò catarrhus malo occasionem præbuerit, etiam faciliè patet. An suppressa aliqua euacuatio vel lochia retenta mali causa sint, etiam latere non potest. Et quæ purgationes in puerperio retentas sequantur symptomata, docet Hippocrates, *de morb. mulier. lib. 1.*

Diuerfitatem autem humorum, inflammationem excitantium, ex sputi colore & substantia cognoscimus; aut si æger non exspuat, ex aliis humorum signis.

*Prognostica.*

*Prognostica.*

1. Peripneumonia vehemens & acutum malum est, quod plus periculi, quam doloris habet, ut Celsus, *lib. 4. cap. 7.* ait, paucique eâ correpti euadunt.

2. Estque peripneumonia periculosior, quam pleuritis; quia pulmo præstantius viscus est, cordique vicinior, & soluta continuitas in hoc non faciliè coalescit.

3. Cùm vna salus pleuriticorum & peripneumonicorum consistat in virium robore, teste Galeno, 3. *prorrhet. aph. 4. & 10. meth. med. cap. 5.* si magna adsit virium debilitas, valdè periculosa peripneumonia est.

4. Periculosior est peripneumonia, in qua nihil expuitur. Arguitur enim humoris contumacia & naturæ infirmitas, 3. *epid. comm. 1. aph. 4.* ac in ipsa peripneumonia, ut & pleuritide sæpe plus iuuat facile & copiosè exspuere, quam ipsa coctio, ac plerique ex defectu exspuitionis moriuntur.

5. Sreatio flaua, & multùm permista sanguine, si in peripneumonia inter initia excernatur, salutis indicium est; si septimo die tardiùs, minus securè, Hippocrates, 2. *prognost. aphor. 50.* Nam in longius tempus morbus protrahitur. Interim verò multa ægro aduersa accidere, atque imprimis vires deiici possunt. Quo quidem aphorismo non probatur sputum, vel quatenus flauum vel rubrum est. Sreatio enim flaua sincera improbatur, 2. *progn. 46.* & rubra tanquam cruda improbatur à Galeno, 1. *aph. 12.* sed quatenus ex flauo & rubro mixtum conspicitur. Tunc enim aliquod coctionis signum exhibet, quæ si statim primis, tertio scilicet vel quarto, diebus appareat, morbum non ultra diem centesimum duraturum significat.

6. Sputum quandocunque dolorem non tollit, malum; quod verò soluit, bonum. Hippocrates, in *Coacis.*

7. Si lingua initio nigrescat, celeriores sunt liberationes, postea verò tardiores. Hippocrates, *lib. de diebus indicatoriis.*

8. In pulmonis inflammatione quibus circa initium vrinæ crassæ sunt, deinde ante quartum diem tenues eadunt, mors impendet. Hippocrates in *coacis.*

9. Sudores circa ceruicè & caput aborti, mali sunt, nisi vrinæ multæ & crassæ prorumperint, & sputa cocta prodierint. Hi enim sudores mali sunt ex suffocatione, impetu & violentiâ. Hippocrates, *de ratione victus in acutis.*

10. Iudicatur autem peripneumonia breuissimè in septem aut nouem diebus, longissimè octodecim, vel viginti diebus. Vbi æger vigesimum diem transgreditur, non moritur peripneumoniâ, sed tussit & pus exspuit, & pectus dolet. Empyicus enim fit, nisi in diebus criticis pulmo expurgetur. Hippocrat. 2. & 3. *de morbis in libro de internis affectionibus.* Et si enim, ut *prognost. 2.* dictum, peripneumo-

nia periculofior morbus eft, quàm pleuritis, & pauci ex ea euadunt, ac propterea etiam, vbi lethalis eft, citius interimit, quàm pleuritis: tamen quæ mitior eft, & falutis fpem præbet, longiore indiget tempore, vt integrè indicetur. Nam vt ex iis, quæ Galenus, 7. *aph.* 31, tradit, colligi poteft, in morbis pulmonis periculofis morituri breui moriuntur; qui verò euadunt, non nifi longiore tempore euadunt.

11. Si lethalis futura fit peripneumonia, vigilia adest continua, aut fomnus levis, à quo delirium, ægerque morbi vehementiam non sentit, frigent extrema, vngues liuidi curuantur; hi quarto aut ad summum feptimo die moriuntur. Aëtius, *tetrabibl. 2. ferm. 4. cap. 66.* Si verò ad falutem permutetur, fanguinis è naribus fluxus fit, aut alia perturbatio, biliofis multis exeuntibus cum fignis coctionis & in die critico. Vide infra *quæft. 1.*

12. Si inflammatio in pus conuertitur, fi per vrinam & aluum excernitur, liberantur ægri. Per quam autem viam id fiat, dicetur de pleuritide. Si autem in pulmones irruat, aut suffocantur ægri, aut ad tabem deducuntur. Aëtius, *loco allegato.*

13. Pleuritide & peripneumonia detento, diarrhæa superueniente, malum, 6. *aph.* 16. quod tamen folùm verum eft, cum non ab ingeftis ea oritur; fed ob magnitudinem morbi etiam ventriculus & epar afficiuntur, vt ventriculus nec cibum concoquere, nec epar chylum attrahere poffit. Aliàs & in mitiore peripneumonia bonum indicium eft diarrhæa, cum coctionis fignis antecedentibus critica euacuationis loco fit. Itaque tutior & vtilior tum eft diarrhæa, quæ fit in morbi principio, quàm quæ fit in fine vel ftatu. Illa enim cauffam antecedentem vtiliter tollit; hæc verò nec antecedentem, nec coniunctam, fed vires potiùs profternit.

14. Quibus ex angina in peripneumoniam fit mali conuerfio, intra feptem dies moriuntur; fin hos effugiant, purulenti euadunt, 5. *aph.* 10. Membrum enim nobili ac principi inferuiens ac vicinum, materiam vitiofam talem tolerare diu non poteft, fed id efficit, vt morbus cito,  
vel

vel ad bonum, vel ad malum terminetur.

15. Qui empyj fiunt ex peripneumonia, si natu maiores sint, id est, inter senes & ἀμειζόντες medij, potius intereunt, quàm natu minores; cùm expultrix facultas in iis languida sit, vt pus rejici satis nequeat, quo retento & pulmonem excedente, frustra curatio instituitur, 2. prognost. 99.

16. A pleuritide peripneumonia malum, 7. aph. 11. quoniam translatio fit ab exterioribus ad interiora, & à minùs nobilibus ad nobiliora, cordique propiora. Sed cùm in coacis contra scribatur, peripneumoniam, quæ post pleuritidem fit, mitiorem esse, sciendum ex Galen. in comm. 7. aph. 12. aliud esse, morbum alium in alium transmutari; aliud verò, morbo morbum superuenire. Nam transmutatio vnius morbi in alium fit, quando priore cessante alius aduenit; superuenit verò morbus alij, quando altero manente alter superuenit. Ideoque cùm, vt Galenus explicat, loco alleg. loquatur de peripneumonia superueniente pleuritidi, omninò ea periculosa est. Arguit enim humoris excitantis pleuritidem tantam copiam, vt in pleura affecta totus contineri non possit, sed in pulmonem retundet. Si pleuritis in peripneumoniam ita mutetur, vt nullum pleuritidis signum remaneat, paucitas omninò humoris indicatur, quæ etiam peripneumoniam adeò periculosam excitare non potest.

17. Contrà à peripneumonia pleuritis bonum, quia ex morbo periculoso minùs periculosus excitatur, quamuis id rarò accidat, vt Galenus, 7. aph. 11. docet.

18. A peripneumonia phrenitis malum, 7. aph. 12. Facta enim materiæ calidæ à pulmonibus ad caput translatione, si ad interiora capitis feratur, phrenitim excitat, quæ periculosa est. Aliàs etiam ad peripneumoniam delirium sequi solet, non cum tanto periculo calidis vaporibus ad caput ascendentibus, & cum spiritibus mixtis.

19. Quibus vrina in peripneumonia crassa & cocta apparet, circa quartum verò attenuatur, lethale est. Hippocrates, in coac.

20. Quibus in peripneumonia abcessus fiunt ad aures,

aut ad sedes thoracis inferiores, & in longum exeunt, seu in fistulam abeunt, vt materia euacuari queat, item abscessus ad crura omnes viles sunt: optimi verò sunt, qui fiunt signis coctionis in sputo apparentibus. Criticæ enim expulsiõis huiusmodi abscessus soboles sunt. Hippocrates, & Galenus, 2. *progn. aph.* 64. 65. & in *coac.*

21. Grauedines & sternutamenta per omnes morbos, qui in pulmone sunt, præuenire & superuenire malum est. Hippocrates, 2. *progn.* 49. Etsi enim, vt Galenus, in *comment.* docet, per se grauedines peripneumonicis non officiunt, cum humor inde ad pulmonem non descendat: per accidens tamen dupliciter malæ sunt, vt signum scilicet & vt causa. Vt signum, quia monstrant adeò magnam esse pulmonum affectionem, vt capiti etiam communicetur, idque repleat; vt causa, quia sternutatio, quæ grauedinem comitatur, thoracem concutit, pulmonemque inflammatum lædit.

22. Peripneumonia, vt ex dictis patet, quinque modis finitur. 1. Coctione & sputi excreatione, qui modus turissimus est. 2. Crisi, quâ deriuatio & euacuatio fit materiæ per hæmorrhagiam narium, fluxum mensium, hæmorrhoides, sudores, aluum, vrinam. 3. Abscessu post aures, vel in cruribus. 4. suppuratione, ex qua empyema fit, aut phthisis. Et quidem post suppurationem rupto apostemate duo modi ad salutem, duo ad mortem tendunt. Si nimirum pus per sputum vel vrinam, vel aluum excernatur, æger conualescit; ad mortem fertur suppuratio, si propter copiam puris æger vel suffocetur, vel phthisis exulcerato pulmone sequatur. 5. Morte, ægro per sputi suppressionem strangulato. Nam vbi spirandi difficultas adest magna, vt ægri ferè suffocari videantur, febrisque est vehemens, & sputi nihil vel parum reiicitur, virésque sunt debiles, lethalis morbus est.

*Indicationes & curatio.*

Cum peripneumonia sit inflammatio, etiam aliarum inflammationum modo indicat, vt materia, quæ ad pulmonem fertur, auertatur, quæ affluxit, euacuetur, vt postea de pleuritide pluribus dicetur. Est enim eadem ferè peri



peripneumoniæ, quæ pleuritis, curandæ ratio.

Curatio autem peripneumoniæ omninò maturanda est, ob summum periculum, & in id omni studio incumbendum, ut materia resoluatur & discutiatur, ac materiæ suppuratio præcaueatur. Aut si id fieri nequeat, ut sputum & pus quàm citissimè educantur, ne pulmonem corrumpant.

Itraque si vires & alia permittant, vena basilica eiusdem lateris, in qua inflammatio percipitur, aut utriusque, si pulmo secundum utramque partem inflammatus sit, aperiatur. Sanguinis enim missione venis exinanitis sanguis non solum affluens ad vacuum implendum introcedit, sed etiam ille, qui iam in parte affecta est, succedit. Euacuetur autem sanguis eâ copiam, quam sanguinis plenitudo inducat ac vires permittunt, & liberalius quidem, ob subitum, quod morbus minatur, periculum. Vires tamen nullo modo liberaliore sanguinis missione deiciendæ sunt; cum in hoc præcipuè morbo, ob maximam respirationis angustiam, ex virium debilitate non mediocriter periculum immineat. Præstat potius, si vires id ferunt, venæsectionem in altero brachio repetere. Et si peripneumonia sit sanguinea, copiosius sanguis educatur; si biliosa, parcius; si pituitosa, adhuc parcius.

Si verò peripneumonia alteri morbo, qui iam aliquandiu duravit, succedat, & vena iam antea ægro aperta sit, videndum, quid vires ferant. Si enim vires ferunt, sanguis moderatè adhuc euacuari potest. Si verò metuendum sit, ne venæsectione vires deiciantur, brachiis & thoraci cucurbitulas scarificatas applicare licebit, quæ à profundo thoracis ad cutem & partes externas sanguinem trahunt.

Primò tamen brachiorum musculis adhiberi cucurbitulas utile est, ut aliquò modo sanguis euacuetur, & à pulmonibus auertatur, postea & scapulis vel pectori, si id carnosum sit. Et si enim locus vicinus esse videatur: tamen à pulmonibus aliquatenus distat, & ab interioribus ad exteriora trahitur. Et cum adhibentur cucurbitulæ, tum vel antea venæsectio præmissa est, vel vires ob debilitatem venæsectionem non ferunt.

runt. Ideoque non tanta plethora dum adesse potest, ob quam attractio ad partem affectam metuenda sit. Quem in finem & ligaturæ, frictiones ac cucurbitulæ sine scarificatione extremis adhibendæ.

In eundem etiam finem & clysteres infundere decet, & medicamentis aluum mouentibus primis diebus & materiæ impetum à pectore auertere, & humores vitiosos, si turgeant, ac in corpore abundant, euacuare. Cauendum tamen, ne fortioribus medicamentis humores nimium agitentur, febris incendatur, virésque deiciantur: sed sufficiunt mitiora, quæ aliàs pectori amica sunt; vt syrupus rosarum solut. violar. solut. de cassia cum manna, diaprun. simplex, quibus tamen rhabarbar. agaric. & similia benigniora purgantia addere licet. Vt *℞. Decocti pectoral. ʒ. iij. in iis dissolue, manna ʒ. j. vel ʒ. j. ʒ. Colat. adde syrup. rosar. sol. ʒ. vj. M.*

His peractis omni studio laborandum, vt materia per sputum è pectore eiiciatur, quod iis medicamentis fit, quæ postea de pleuritide proponuntur. Valentiora tamen illa sint hic, & eorum vsus frequentior. Vtilia hic sunt, *caricæ cum hyssopo coctæ, hydromel. in quo hyssopus, scabiosa, pulmonaria, salvia, radix iridis & similia sint decocta, item oxymel.* Pro humoris tamen peccantis ratione delectu quodam medicamentorum opus est. Si enim materia sit calidior, vsurpentur *viola, iuiubæ, sem. 4. frigid. maior. bordei, rad. althææ, syrupus violar. iuiubinus.* In frigidior materia conueniunt *aqua mulsa, hyssopus, capillus Veneris, origanum, Oxymel* in vtrâque causâ hic locum habet.

*℞. Rad. glycyrrhiz. ʒ. ʒ. capill. Veneris, hyssop. an. m. ʒ. scabios. flor. papau. errat. an. p. ij. iuiubar. sebesten, an. N. 10. ficus N. iv. sem. malu. melon. an. ʒ. ij. passular. ʒ. j. Coqu. in aqu. suffic. Colat. dulcoretur saccharo cando. Vel ʒ. sem. card. Mariæ ʒ. ij. sem. 4. frig. maior. excort. ʒ. ʒ. pinear. mundatar. amygdal. dulc. excort. an. ʒ. iij. aqu. scabios. capill. Veneris, endiu. papau. erratic. an. ʒ. iij. F. Emulsio, quæ dulcoretur saccharo cando, vel iulepo violatum. Vel ʒ. spec. diatrag. frigid. ʒ. ij. diatr. simpl. ʒ. ʒ. sacchar. penid. ʒ. ʒ. Cum syrup. papau. errat. & violar. F. Loch.*

Si validioribus expectorantibus & incidentibus opus sit, quando scilicet sputum crudeum & tenax est, oxymelite loch de caulibus, tussilagine, prassio uti licet.

Topica quoque eadem ferè, quæ in pleuritide, conveniunt, quæ scilicet feruorem pectoris ac pulmonis nonnihil lenire ac mollire & digerere ac discutere possunt, sed omnia calidè applicata. Fortiora tamen hîc requiruntur & quæ ad interiora penetrent. Eam ad rem etiam forma medicamenti aliquid facit. Nam profundius penetrat vis ceroti & emplastri, quàm vnguenti. Cerotum tale fieri potest.

*℞. Butyri recent. adip. anser. an. 3. ij. ol. rutac. amygdal. dulc. amar. an. 3. ℞. pulu. irid. Florent. hyssopi, marrub. an. ʒ. ij. Cera q. s. F. Cerotum.*

Aut omisâ cerâ eadem excipiantur terebinthina lota cum aceto forti, & emplastrum conficiatur.

In peripneumonia biliosa parentur fomenta ex aqu. violar. cum modico aceti. Inunctiones fiât ex ol. viol. chamæmel. amygdal. dulc. & similibus.

#### Dieta.

Diæta quoque eadem ferè est, quæ in pleuritide. Cibi *Diæta.* non sint falsi, neque acres, neque austeri, neque aluum adstringentes, sed potiùs extenuantes. Hinc commendatur pitana cum melle. Plerique etiam dulcia commendant, de quo postea, *quæstione 2.* dicetur.

Postquam verò cessante defluxione sputum laudabile iam apparere incipit, iuscula pingua, monente Celso, exhibere conuenit. Laudatur etiam decoctum hordei vel simplex, vel cum passulis & glycyrrh. hydromeli, in quo sol. hyssopi cocta sint, vel oxymel dilutius, vel hydrosacchar. s. ex aqua pura. Aut tale.

*℞. Aquæ puræ lb. iv. sacch. cand. glycyrrhiz. 3. iij. sem. anisi 3. j. cinamomi 3. ℞. Coqu. ad tertiæ partis consumpt. Colat. adde iulepi viol. 3. ij.*

Omnis autem potus paulatim sumatur, nec frigidus sit. Abstineat æger ab omni motu, præsertim sermone multo, & vocis intentione & clamore.

Reliqua ex doctrina de pleuritide patebunt.

## QVÆSTIO II.

*An in peripneumonia hæmorrhagia narium utilis sit?**An in peripneumonia hæmorrhagia narium sit utilis?*

Et si Aëtius, *tetrab. 2. serm. 4. c. 66.* scribat; si ad salutem perueniat morbus, hæmorrhagia narium copiosâ solui; tamen Galenus, *3. de cris. cap. 3.* scribit contingere interdum, ut per sanguinem fluentem è naribus pleuritis soluatur; non tamen lethargus aut peripneumonia fluxum sanguinis amant. Præsupposuit proculdubio hic Galenus peripneumoniam, ut & lethargum simpliciter à sanguine pituitoso fieri; cum tamen, ut supra dictum, peripneumonia à sanguine, & sæpe etiam bilioso, fieri possit, hæmorrhagia narium tum utilis est.

## QVÆSTIO III.

*An dulcia in peripneumonia conueniant?**An dulcia in peripneumonia conueniant.*

Hippocrates, *2. de morb. in peripneumoniæ curatione* primis diebus dulces sorbitiones exhiberi iubet, ut, quod pulmonibus inhæret, eluatur. Et aliàs etiam dulcia pectori amica sunt. Verùm alij dulcia improbant, utpote quæ calida & facilè bilefcentia febrem augent, & ad iecoris ac lienis inflammationem nocent. Et cum Hippocrates, ubi de pleuritidis curatione agit, acidas potiones exhibeat, quo sputum faciliùs proueniat, eadem quoque peripneumoniæ competere videntur, cum eadem ferè sit cura pleuritidis & peripneumoniæ.

Verùm enim verò sciendum; dulcia non vnius esse generis: alia enim sunt calidiora, alia potiùs temperata, imò nonnulla aquosa, è quibus posteriora non facile nocere possunt. Et quæ sunt calidiora, non per se & sola, sed iis, quæ impediunt, ne facilè bilefcent, diluta exhibentur. Et quamuis dulcia magis epar offendere possunt, quàm pulmonem, cum ad epar integra & parum mutata perueniât; ad pulmonem verò exigua eorum portio proximè pertingat, tutius omninò est, dulcia minus calida eligere, & aliis permista exhibere. Et si humores, qui in pulmone continentur, crassiores sint, acidis admixtis vis incidédi & extenuandi

puādi intendi potest. Vnde oxymel medicamētis thoracis affectibus conuenientibus admixtum ad viscidorum exspuitionem accommodatissimum est remedium, 3. de rat. vict. in acut. com. 2.

C A P V T I V.

*De vasorum pulmonis, & primò de asperarum Arteriarum angustia.*

**A**S P E R Æ arteriæ, quæ per pulmonem disperguntur, cū & aërem, qui inspirando attrahitur, admittere & fuliginibus exitum præbere debeant, causæ eā de causā factæ sunt, nullūque humorem vel aliud quicquam in se continere debent. Quæ naturalis earum constitutio si lædatur, morbum in cavitare seu angustia patiuntur.

*Causæ.*

Fit autem hæc angustia, vel ab obstructione, vel à *Causa.* compressione, vel ab exsiccatione.

Obstructionem efficiunt humores crassi in bronchiis pulmonis hærentes, siue ibi sint geniti (quod tamen rariùs accidit, cū pulmones nutriantur sanguine tenui, & puro, è quo succus crassus facilè colligi non potest) siue à capite transmissi, vt & à venis & reliquo corpore. Idem præstat crudum tuberculum, vapor crassus, calculi & grana in pulmonibus geniti, carunculæ itē & vesiculæ, vt & vermes in pulmone procreati. Sanguis item, qui ex gutture, oesophago, ore, pulmone, thorace vulnerato eò effunditur, vt & pus post ruptum partium vicinarum abscessum in pulmonem illapsum, aut è thorace in pulmonem imbitum.

Comprimendo asperas arterias angustiores reddunt eadem ferè causæ, si in arteriis læuibus & vena arteriosa ac substantia pulmonis consistent, asperasque arterias comprimant; humores nimirum crassi vel in pulmone geniti, vel per venam arteriosam in eum effusi, crudum

item tuberculum extra arterias asperas consistens, easdémque comprimens, calculi, vermes. Neque enim semper (quod de asthma & catarrho suffocatio notandum) materia per asperam arteriam tantum in pulmones defluit, & bronchia pulmonis obstruit, sed sæpè etiam per venas in pulmones effunditur.

Idem accidit in hydrope pulmonis, in hydrope pectoris, in empyemate, quando humores seu in pulmone seu in thorace consistentes asperas arterias comprimunt, in inflammationibus pulmonis, septi, transuersi, mediastini, in gibbositate & luxatione vertebrarum dorsii, in lienis, tumoribus, ventriculi, epatis.

Tandem si asperæ arteriæ valide exsiccantur, angustiores redduntur, nec satis dilatari possunt ad aërem hauriendum. Quam siccitatem imprimis auras & vapores metallicos inducere posse, atque idè Chymicis & aliis qui metalla tractant, familiarem esse, suprà dictum. Ita refert Heurnius de morbis pectoris, typographo cuidam adèd siccatos fuisse pulmones, vt aridum pomum retulerint.

#### Signa diagnostica.

*Signa.*

Angustia bronchiorum pulmonis in genere ex effectis cognoscitur, respirandi nimirum difficultate; vt & plerumque tussi.

*Pulmo repletus.*

Hippocrates, lib. 2. de morbis, etiam pulmonis repleti mentionem facit, eiusque symptomata describit hoc modo: Si pulmo repleatur tussis, difficultas spirandi quæ sit erecta cernice, & anhelatio detinet, linguam exerit, pustulis velut ex igne rubentibus impletur, pruritus occupat, dolor acutus pectus & scapulas vexat, neque sedere, neque recumbere, neque stare potest, sed infirmis est viribus. Hic quarto ferè die moritur, quem si superauerit, spes plerumque superest, sæpè tamen etiam septimo die periculum subit, quem si effugerit, conualescit. Verùm inflammationem potius quam pulmonis & acutum malum, quam simplicem obstructionem describere videtur.

Caussas verò quod attinet, obstructio cognoscitur ex caussis, quæ præcesserunt, nimirum catarrhis & humoribus

bus pituitosis è capite in pulmonem delapsis apostemate aliquo partium vicinarum è quo rupto pus in pulmonem effunditur ; empyemate & pure in thoracæ contento, pulmonis & thoracis substantiam penetrantibus, vt & partium vicinarum vulneribus, è quibus sanguis in thoracem effunditur. Respiratio est difficilis cum sonitu, quandoque etiam cessat, & remittit, vbi pituita excernitur. Speciem materiæ, id quod tussi eiicitur, indicat. Si crudum tuberculum adsit, seu obstruendo, seu comprimendo angustiam pariat, difficilis est respiratio & assidua, nec citra stertorem & strepitum, nec vlla ante fuit destillatio, malum sensim gignitur, & æger aliàs benè habens de difficili respiratione conqueri incipit, quæ in dies augeatur, tussis, quæ coniungitur, sicca est, adestque maxima pulsus inæqualitas.

Si humores vitiosi in læuibus arteriis, & pulmone hærentes comprimendo angustiam pariant, catarrhus abest, & vitiosorum humorum vel in epate, vel toto corpore redundantium signa adsunt, respiratio est difficilis, tussis abest, de quo postea dicetur.

Calculos & grandines in pulmone cognoscere, difficile est, & vix aliter cognosci possunt, nisi ex sputo præcedente & symptomatibus sequentibus. Si quis nimirum sputum crassum & viscidum valdè exspuat, postea verò eiusmodi sputum cesset, & respiratio absque sonitu difficilior reddatur, suspicio est, materiam in calculos, vel grandines conuersam esse.

Vermes etiam non faciliè cognoscuntur, nisi vbi tussi reiciuntur, & præcessit plerumque tussis diuturna, quæ nullis remediis vinci potuit.

Tumores pulmonum, diaphragmatis, mediastini, pus in thorace è suis signis cognoscuntur.

Si ex pulmonis & asperarum arteriarum exsiccatione proueniat, angustia cognoscitur ex defectu sputi, macie totius corporis, ac præcessit causa, quæ talem siccitatem in pulmonibus generare potuit.

*Prognostica.*

1. Angustia asperarum arteriarum pulmonis nunc *Prognostica.*  
plus

plus nunc minus periculi coniunctum habet, pro causarum, à quibus illa, pendet, varietate. Quò enim causa vehementior, & pertinacior est, eò etiam plus periculi est metuendum. Simul tamen respiciendum ad respirationem læsam, tussim, pulsum, & alias actiones læsas, quæ magnitudinem morbi determinant. Ergo si obstructio sit à multis crassis, crudis & viscidis humoribus, vel subitò suffocationis periculum imminet, vel morbus diuturnus expectandus.

2. Angustia, quæ fit ex humore viscido & crasso, vel crudo tuberculo in læuibus arteriis consistente, cum pulsus magna æqualitate, solet cordis palpitationem, respirandi difficultatem, ac tandem suffocationem & mortem afferre, vt Antipatri Medici casus docet, de quo Galen. 4. de loc. affect. c. ult.

3. Angustia vasorum pulmonis à siccitate plerumque incurabilis est, & tandem lenta morte hominem enecat. Reliqua ex iis, quæ de aliis, pulmonum morbis dicentur, patebunt.

#### *Indicationes.*

*Indicationes.*

Materia, quæ angustię bronchiorum pulmonis causa, seu obstruendo, seu comprimendo id præstet, tollenda; quod fit si materia viscida attenuetur, detergatur, expectoretur. Crudum tuberculum attenuantibus & exsiccantibus absumatur. Grandines, calculi, vermes tussi eiciantur; partes tamen materiam ad pectus mittentes simul euacuandæ & roborandæ sunt. Siccitas pulmonis emendanda est, vt supra de intemperie sicca pulmonum dictum.

*Curatio angustię Arteriarum pulmonis ab humore frigido & crasso.*

*Curatio Interna.*

Vt igitur materia crassa commodè euacuari possit, primò præparanda est incidentibus & detergentibus medicamentis; è capillo Veneris, hyssopo, prassio, pulegio, radic. enulæ, iridis & similibus, quæ postea proponentur.

Vt 4. Capill. Veneris, byssop. scabios. prassij, an. M. ʒ. rad. belen. ʒ. i. an. 3. ij. sem. anisi, sænicul. an. 3. j. passular. glycyrrh.



*glycyrrh.* an. ʒ. ʒ. *ficuum*, N. vj. Coqu. in aqu. f. ad remanentiam tertiæ partis. Colaturæ adde *Syr. Capill. Veneris*, de *byssopo*, an. ʒ. j. *oxymel. scillit.* ʒ. ʒ. M. pro duabus dosibus, & potio hæc bis, vel ter iteretur.

Vel ʒ. *Rad. fænicul. glycyrrh. ireos*, *helen.* an. ʒ. ʒ. *capill. Veneris*, *tussilag. scabios. byssop. prassij*, *satureiæ* an. M. ʒ. *iuiubar. sebesten.* an. N. xx. *caricar.* N. vj. *passular.* ʒ. ʒ. *sem. anisi, fæniculi, maluæ* an. ʒ. j. Coq. in f. q. aquæ puræ. Col. ʒ. ʒ. j. adde *oxymel. scillit. syr. de prass. de glycyrrh.* an. ʒ. j. ʒ. *Aq. cinamomi* ʒ. ij. M. pro 4. dosibus.

ʒ. *Syr. de prassio, de byssopo, de glycyrrh.* an. ʒ. j. *oxymel.* f. ʒ. j. ʒ. *Aq. scabiosæ, veronicæ, byssopi*, an. ʒ. ij. M. pro 3. dosibus.

Præparata materia euacuetur. E. g. in decocti supra secundo loco parati suff. quantitatem. *agarici trochiscati*, ʒ. j. *sem. cartham.* ʒ. vj. Ebulliant; ita aluum simul mouebit.

Vel ʒ. *Pil. de agaric.* ʒ. ij. *assaiereth.* ʒ. j. *coctiar.* ʒ. ʒ. Cum *oxymel. scillit.* F. pilulæ xxiv.

Nonnulli frequenter ad purgandum in obstructione pectoris ab humore crasso vtuntur trochiscis de violis, à Mesue, *cap. de asthmate*, descriptis; quos tamen reprehendit Alexander Massarias, eà de causâ, quod non sit compositio satis artificiosa, nec diagrydium satis correctum. Verùm potest diagrydij loco sumi extract. scammonij. Possunt etiam sine scammonio hoc modo parari:

ʒ. *Flor. violar. Martiar. non nimium exiccatorum.* ʒ. ij. *turbith. elect.* ʒ. j. ʒ. *agaric.* ʒ. j. *succi glycyrrh.* ʒ. ij. ʒ. *manne.* ʒ. j. ʒ. Cum *syrupo violarum.*

Fiant trochisci, quorum ʒ. ij. vel ij. in decocto pectorali, vel liquore conueniente exhibeantur.

Vinum medicatum tale fieri potest.

ʒ. *Rad. helen. ireos*, an. ʒ. ʒ. *turbith. electi*, ʒ. ij. *scab. carduiben.* an. P. ij. *sem. anisi, cinamomi, galangæ*, an. ʒ. j. Affundatur vini mensura vel ʒ.

Sumat æger manè iusculum galli, & superbibat haustum vini. Imprimis commendatur ius galli decrepiti purgans, in quo radix ireos & semen carthami coctum sit. Vel paretur hoc modo:

℥. Gallum antiquum euisceratum, in ventre eius con-  
tusa imponantur, sem. cartham. ℥. j. rad. polypod. 3. vj. pas-  
sular. 3. j. B. ficuum, 3. j. sem. anisi, fœniculi, an. 3. ij. aga-  
rici albi, 3. B. turbit. elect. 3. j. B. zingiber. 3. ij. Coqu.  
donec caro ab ossibus separetur.

Vel ℥. Gallum decrepitum euisceratum, ventremque e-  
ius sequentibus reple.

℥. Passular. ficuum, an. 3. j. B. glycyrrh. byssop. satureia,  
thymi, an. 3. B. sem. fœniculi 3. j. cartham. 3. B. turbit. e-  
lect. 3. ij. agarici trochisc. 3. B. zingiberis 3. j. Coq. in aq.  
pura.

Decocti detur manè haustus, qui si non satis aluum  
moueat, addatur mannæ aliquid.

Quanquam autem purgantia talia humorem saltem in  
vniuerso corpore euacuare videntur: tamen hoc modo  
reuellunt & humores ad pulmones tendentes retrahere  
possunt. Ideoque nec reuellentia & deriuantia omittan-  
tur, vt vomitus, clysteres, & diuretica. Auicennas ta-  
men fortia diuretica improbat, quod subtile extrahant  
relictò crassiore.

Corpore toto euacuato, danda opera, vt continens  
seu proxima caussa è pulmone tollatur. Ideoque ad mate-  
riam crassam, & viscidam attenuandam, incidendam &  
detergendam adhibeantur, capillus Veneris, byssop. prassium,  
puleg. calamintha, scabiosa, rad. ireos, pimpinel. belenij, sem.  
anisi, fœniculi, scilla, ammoniacum, millepedes vsti, sulphur,  
& hinc composita, syrup. capill. veneris, de byssop. de prassio,  
scabiosa, oxymel. s. composit. scillit. extr. ireos, belenij, spec.  
& rotula diareos s. diatr. Salomon. loch de caulibus, scilli-  
ticum.

Videndum tamen, ne nimia medicamentorum calidi-  
tate humores, exsiccentur, & magis crassi ac lenti reddan-  
tur. Ideoque vtile est attenuantibus & incidentibus hu-  
mequantia permiscere, vt glycyrrhizam, passulas, caricas,  
iuiubas, pineas, maluam, althæam.

Vt ℥. Passul. 3. j. B. sem. fœnicul. 3. B. byssopi, saluie  
acutifol. an. M. B. capill. Veneris P. j. iuiubar. sebesten. an. N.  
xij. dactylor. sine nucleis, ficuum, an. N. iv. glycyrrhizæ rasæ,  
sem.

*De asperarum Arteriarum angustia.* 207

*sem. anis. cinam.* an. 3. ij. *rad. belenij*, 3. β. Conscindenda conscindantur & coq. in lb. iij. aq. in vase duplici, Colatura dulcoretur *sacch. albi*, 3. v. Fiat potio clara.

Vtile est & hīc ius galli decrepiti, si in eo thoracica medicamenta coquantur.

Vtile est & oxymel, quod à Cratone, *conf. 79.* commendatur.

℥. *Herb. byssop. veronic. scabios. marrub. origan. pulegij, carduibenedict.* an. M. j. *Rad. ireos*, 3. vj. *zingiber.* 3. β. *agar. alb.* 3. β. Infunde in aceti lb. j. β. Aq. *veronic. carduiben.* an. lb. β.

Stent in vase vitreo obturato loco calido per triduum, deinde ebulliant lento igne & colentur.

℥. Colaturæ lb. j. β. mellis, lb. β. Coqu. ad syrapi formam, qui aromatizetur cinamomo, calamo aromatico, de quo sumat æger manè cochlearia duo vel tria.

Vel ℥. *Glycyrrh. rasæ* 3. ij. *sem. anisi contusi, fœniculi*, an. 3. β. *spir. vini* lb. vj. Stent in vase vitreo bene obturato. Macerentur dies duos. Postea adde mellis lb. ij. *ambre gryseæ* ḡ. xij. *moschi*, ḡ. x. *sacch. alb.* 3. ij. *solutionis perlar.* 3. j. Stent per dies x. quotidie agitando, postea clarum separetur. Dosis 3. β. cum 3. ij. lactis caprilli ieiuno stomacho.

Valdè etiam commendatur terebinthina, quæ non solum pulmones abstergit, sed & epar, lienem, renes, simulque aluum citra noxam soluit: vt & oleum amygdalarum dulcium recens expressum ad 3. vj. cum saccharo sumptum, quod pulmones & pectus relaxat, & detergendo humores viscidos per aluum euacuat.

Imprimis hīc commendantur eclegmata, seu loch vulgò dicta, vt loch de caulibus, de prassio, de pino, passulatum, de hyssopo, de scylla, sanum & expertum, & quod ad asthma dicitur.

Nonnulli diabutrum commendant, hoc modo paratum.

℥. *caricar. pingu. dactylor. passular.* an. 3. ij. Contusa in aqua mulsæ, lb. iij. per diem infundantur. Hinc coquant. & exprimantur.

Cola

Colaturæ expressæ adde butyri recentis aqua fontana diligenter loti, & non falsi ℥. iv. Iterum coquantur, & colentur. Postea adde *Amygdalar. amarar. pinear. mundatar. contusar.* an. ℥. ij.

Et omnia simul in mortario misceantur, addendo paulatim *Succi glycyrrh. ℥. ℞. pulu. tragacanth. sem. urtic. byssop. ireos, thymi, saturiæ, prassij* an. ℥. ℞. *cinamon. zingiberis, pyreth.* an. ℥. ij. *caryop. galang. piperis nigri, anisi, carui, cardamomi* an. ℥. ℞. *ligni aloës, D. j. pulmon. vulpis* ℥. ij. *M. Galenus in fine lib. 6. de comp. med. s. l.* Aliquot ex veterum scriptis medicamenta recenset, atque inter ea, & hoc:

℥. *Succi scillæ crudæ, mellis part. æquales, Coq. lento igne. Dosis ℥. ij. ante & longe post cibum. Vel* ℥. *Æris viui (flores commodiores essent,) sem. rutæ sylvestr. aristol. absinth. abroton. ammoniac.* an. ℥. ℞. Terantur & fiant cum aceto trochisci magnitudine fabæ, quorum manè & vespere tres exhibeantur cum liquore conueniente.

Externa,

Cùm internis medicamentis & externa coniungenda. Illinatur nimirum pectus *Ol. amygdal. dulc. chamamel, anethino, lilior. albor. cheirino, additis mucilaginibus & pinguedinibus emollientibus.*

Vt ℥. *Ol. amygdal. dulc. lilior. albor. rutacei,* an. ℥. vj. *adip. gallin. anser.* an. ℥. ℞. *mucilag. sem. fenigræc. cum aqu. scabios. factæ* ℥. iij. *pulu. rad. ireos beleny, croci,* an. D. j. *Cere parum. F. linimentum.*

Interea non omittantur diuersiones, & si à catarrho malum foueatur, omnia illa, quæ suprâ de catarrho diximus, hîc locum habent. Fonticuli etiam in brachiis excitari possunt; quibus materia auertitur.

Pectore expurgato danda opera, ut exsiccantibus, & absorbentibus reliquæ in pulmone absumantur. In quem usum medicamenta pleraque ad humorem crassum expectorandum hætenus proposita adhiberi possunt. E quibus tamen fortiora eligenda.

Vt *Rad. belen. ari scylla, sulphur, benzoe, & similia. Vt Rad. ireos, ℥. ij. belen. ari,* an. ℥. j. *angel. scill. an. ℥. ℞. glycyrrh. ℥. j. byssop. saturiæ, puleg. marrub. calaminth.* an. M. j. *sem-*

*sem. fœnicul. an. 3. ij. vrtic. erucæ, cartham. an. 3. j. B. Coq. cum melle. Fiat syrupus.*

Cui sub finem adde *croci*, 3. B. Commendatur & syrupus de Nicotiana.

℞. *Nicotianæ siccæ* N. iij. *capill. Veneris, scabiosæ*, an. M. *j. byssop. marrub. calaminth. an. M. B. caricar. dactylor. an. N. x. rad. angel. fœnicul. an. 3. B. sem. fœnicul. anisi, an. 3. iij. vrtic. 3. B. rad. ireos*, 3. x. Coqu. in aqu. tb. iv. & addito melle & saccharo. Fiat syrupus.

Est & efficax decoctum ligni guaiaci, & farsæ parillæ, si pectoralia addantur.

Laudatur & ros Solis, si ei cum sem. botryos, glycyrrh. & marrubij sp. vini affundatur. Est & utilis aqua cinamomi.

In senibus & pituitoso ac frigido temperamento præditis, effcaces sunt aquæ pectorales dictæ, quæ humores crassos coquunt, eosque ac flatus dissipant, vires roborant, & sputum facilius reddunt.

Vt ℞. *Rad. ireos, belen. fœnicul. glycyrrh. tussilag. an. 3. B. mors. arabol. 3. iij. veronic. scabios. byssop. saluæ, marrubij, capilli Veneris an. M. ij. cinamomi, granor. iuniperi, an. 3. B. sem. fœnicul. anisi, cyllæ præpar. an. 3. ij. ficuum, N. x. amygdal. amarar. pinearum, an. 3. B. croci, 3. B. Affunde spir. vini optimi q. f. Stent in infusione diebus 14. postea destillantur.*

Hoc loco de aquis pectoralibus eiusmodi monendum, *Aqua* etsi multa in iis sint, quæ destillato vires suas communi-<sup>pectorales.</sup> cant: tamen multa etiam sunt, quæ per alembicum non eleuantur, vt glycyrrhiza, amygdalæ, pineæ, ficus, pasfulæ, & similia. Quare commodius esset, talia in spiritu vini, vel aquis eiusmodi macerare, & liquorem istum postea aquæ pectoralis loco vsurpare.

Vel ℞. *Spir. vini optimi, 3. iv. aqu. cinamomi, 3. B. vngul. caballin. scabios. an. 3. iij. sacch. candi, 3. ij. Misce. vel fiat eclegma.*

℞. *Amm. acet. scill. diss. 3. ij. sem. vrt. maluæ. an. 3. j. fl. sulp. 3. iv. croc. 3. B. cum mell. scill. F. lohoch. Vel F. hic pulvis.*

℞. *Rad. glycyrrh. ireos, belen. an. 3. j. vari. 3. ij. cinamomi, 3. ij. sem.*

ij. sem. vrtic. nasturtij an. 3. j. pulmon. vulpis præpar. 3. ij. croci 3. j. fl. Sulph. 3. j. benzoes 3. B. sacch. candi. 3. vj. F. puluis.

℥. Flor. sulphur. 3. j. B. benzoes. 3. vj. ammon. 3. iiij. croci. 3. iv. margar. præp. 3. j. mosch. 3. B. Fiat puluis, de quo quantum cuspidè cultelli capi potest, detur vesperi in ovo sorbilli, vel oxymelite scillit. vel aqua scabiosæ.

Pueris datur semen fœniculi in lacte coctum.

Vel ℥. Flor. sulphuris, 3. j. B. benzoes, 3. j. rad. helenij, 3. B. ireos, 3. j. croci, 3. j. sacch. cand. 3. B. F. puluis.

℥. Ammon. 3. j. B. croci, 3. B. flor. benzoes, vj. sacchari candi, succ. glycyrrh. q. s. F. pilulæ xxx. sumantur vna vice vj. vel vij.

Vel ℥. Flor. sulphur. 3. j. extr. helen. 3. j. sacch. alb. in aqua scabiosæ diss. 3. iiij. ol. anisi, gutt. iv. Fiant rotulæ. Vel ℥. Spec. diatr. 3. j. diatragag. calid. 3. B. balsam. sulphur. 3. B. sacchar. in aq. scabiosæ. dissolut. 3. iv. vel v. Fiant rotulæ.

#### Diatæ.

*Diatæ  
ab humore  
frigido.*

Aër quem spirando æger attrahit sit calidus, ficcus, attenuans & liber. Ideoque in conclavi, in quo æger versatur, suffragigia parentur ex styrace, thure, myrrha, benzoë, moscho, ambra. Vitetur aër frigidus, humidus & crassus.

Cibus easdem qualitates habeat, ideoque condidatur hyssopo, thymo, fœniculo, baccis iuniperi, cinamomo, & imprimis croco. Vtiles sunt passulæ, amygdalæ, pinæ, pistacia, & imprimis commodum est ius galli decrepiti cum thymo & croco. Melliti quoque cibi non inutiles sūt, si æger aliàs eos ferat. Vitentur verò adstringentes & crassi succi, ut pisces, caro suilla, lac & similes. Potus sit vinum tenue & subdulce, vel melicratum aut mulsū, in quo thoracica medicamenta cocta sint. Possunt & cerevisiæ medicatæ fieri cum salvia, hyssopo, roremarino & similibus. Vtilis est & potus ligni guaiaci. Æger sitim non ferat; sed sæpius, verum moderatè bibat; quia humectatione opus est, ad eam, quæ iam incisa & deterfa est in pulmone, materiam tussi eiiciendam. Somnus sit nocturnus moderatus, capite & pectore nonnihil eleuato.

*Cyratio angustie arteriar. pulmonis à reliquis causis.*

*Cyratio*

Si à spiritu aut flatu crasso obstructa sunt vasa pulmonis,

nis, is discutiendus & dissipandus est medicamentis flatus *angustia*  
discutientibus, quæ alibi proponuntur, è quibus thofa- *à reliquis*  
cica eligenda, vel hæc iis admiscenda, & danda opera, ne *cauffis.*  
flatus iterum generentur.


Si tuberculum est cauffa angustia, danda opera, vt attenuantibus & exsiccantibus absumatur, qualem facultatē aromata habere, Gal. 7. *de compos. med. sec. l. in fine* scrib.

Sunt etiam vtilia hīc ammoniacum, sulphur, benzoe, theriaca, mithridat. sales chymici, & similia enumerata.

Si à grandine & calculo fit angustia, locum habent millepedes & aselli, si nimirum in olla comburantur, donec albescant & melle excipiantur. Potentiùs fit medicamentum, si adiiciatur semen milij Solis.

Si à sanguine, extra venas effuso proueniat angustia, fluxus sanguinis cohibendus, vt postea de curatione sputi sanguinis dicetur; qui verò in vasis pulmonis, præsertim asperis arteriis hæret, si concretus sit, per poscam, oxymel, coagulum leporis, mumiam & similia dissoluendus, & per sputum ac tussim eiiciendus.

Si à siccitate pulmonis proueniat angustia, lac amygdal. dulc. & sem. melon. detur, syrupus de pomis, violis, borr. iuiubæ, dactyli, ficus, passulæ, lac & similia, vt suprà *de intemperie pulmonum sicca* dictum.



## CAPVT V.

## De angustia læuium pulmonis arteriarum.

**T**S I modò, vbi de caussis angustia asperarum pulmonis arteriarum dictum fuit, etiam læuium arteriarum eiusdem facta sit mentio: quia tamen hæc etiam obstrui & angustiores reddi possunt, vt asperas arterias non comprimant in specie, & peculiariter de læuium arteriarum in pulmone angustia aliquid dicendum est, imprimis cum hæc tractatio doctrinæ de asthma non parùm lucis allatura sit, & affectus ipse cognitu necessarius sit, cum hominem sæpè subitò in vitæ periculum coniicere possit, etsi ante nec de difficultate respirationis, nec de dolore & *Angustia læuium pulmonis arteriarum.*

grauitate pectoris, nec de tussi conquestus sit. Cuius rei memorabile exemplum recenset Gal. 4. 1. off. c. vlt. Locum, quia notatu dignus est, integrum adscribere libet. *Ea, inquit, quæ Antipatro medico acciderunt, nemo est, qui nesciat, utpote qui Medicam artem publicè apud Romanos professus est. Agebat hic ætatem sexaginta quidem annis minorem, sed quinquaginta iam annos excesserat. Is correptus aliquando febre quadam ephemera, idque ab euidenti causa, declinante iam febre, ut, quid sibi factu opus esset, intelligeret, pulsus ipse suum tangere aggressus est. Cùm igitur omne inæqualitatis genus in arteriarum motione inueniret, in primis quidem territus est, deinde verò, cùm sese non febrile planè sentiret, ilicò balneum subiit: quippe laboribus ac vigiliis corpus fatigauerat. Atque tenui quoque victu, donec diem tertium præterisset, usus est, quo cùm nulla appareret febris, ad solita negotia pertractanda prodiit: atque arteriam in extrema brachij sui parte tangens admiratus est perseuerantem in pulsibus inæqualitatem. Occurrens itaque mihi, extendit manum ridens, iussitque pulsus tangere. At ego subridens, quid, inquam, portendit hoc, quod proponis ænigma? ille iterum ridens obnixè orauit, ut tangerẽ. Igitur inter tangendum omnigenam in pulsu inueni inæqualitatem, non solum in multarum pulsationum cumulo, quam systematicam (id est congregatricem) vocant, verùm etiam in una arteriæ distinctione. Proinde miratus, quomodo adhuc vinceret, cùm talem haberet pulsus, interrogavi, num difficilis esset ei respiratio: illo verè nullam se sentire respondente, obseruari equidem, an aliquando mutaretur, quippe sex mensium spatio assidue arteriam tangebam. Cùmque ab initio interrogaret, quam corporis dispositio mihi videretur posse huiusmodi pulsus efficere, atque per quem modum, idque citra febrim: ad eam quæstionem respondi, in commentariis de pulsibus iam declarasse me huiusmodi inæqualitatem. Nàmque ob magnarum in pulmone arteriarum angustiam id euenire putavi: angustiae verò causam esse dixi visceris inflammationem. At tibi hanc ob causam id nunc accidisse impossibile est, quippe febre fuisses affectus. Relinquitur ergo, vel obstructionem ex liquidis & crassis & viscosis humoribus, vel crudi cuiuspiam tuberculi ortu in huiusmodi te dispositionem induxisse, tum ille respondens, oportuisset (inquit,)*



(inquit,) me suspiriosa orthopnœa laborare. At ego probabilia, inquam, ipsum dicere, sed à veritate aberrare: quippe fieri nonnunquam huiusmodi orthopnœam, quam diximus causam: id verò cum in asperis, non in læuibus arteriis crassus & lētus humor cumulat. Proinde omnē ei victus rationem, atque medicamenta quoque haud aliter, quàm asthmaticis, adhibere iussimus: deinde sex (vt dixi) mensibus elapsis, leui quadam spirandi difficultate affectus est, accedente simul cordis palpitatione, in primis quidem semel, deinde bis, atque ter, postea quater, ac sæpius quoque aucta simul spirandi difficultate ad quindecimum usque diem: post quem difficillima derepente oborta spiratione, resolutus statim obiit aliorum quorundam exemplo, qui cordis affectibus laborant. Causæ.

Causa autem huius angustię est duplex: obstructio & compressio. Obstructio fit à crassis, viscidis & pituitosis humoribus, qui quidem vel in pulmone, ex eius coctione vitiosa generantur, vel aliunde transmittuntur, id quod sæpè fit ex epate, dum illud crudo & pituitoso sanguine scatet, cuius pars aliqua per venam arteriosam in pulmones transfunditur, & quidem sæpè certis interuallis, vt infra de asthma dicetur. Non verò materia huius obstructionis causa è capite defluit. Hoc enim si fieret, prius à bronchiis pulmonis reciperetur, & difficultas spirandi ac tussis excitaretur. Deinde eadem obstructio fit à crudo tuberculo, de cuius generatione postea dicetur.

Causæ.

Comprimuntur verò hæ leues arterię itidem à crudo tuberculo, si illud in pulmone generatum extrà læuibus arteriis incumbit. Idem fit ab inflammatione pulmonis, vt etiam Gal. l. all. innuit.

Signa diagnostica.

Deprehenditur hoc malum è sola pulsus inæqualitate, Signs. nimirum tam systematica, quàm quæ est in vna pulsatione, qui nunc est paruus, nunc magnus, celer, tardus, rarus, frequens, vehemens, atque inter pulsationes aliquæ decurantur, aliquæ intermittunt, aliquæ intercidunt. Cum enim natura fuligines ob angustiam harum arteriarum non possit satis expellere, fit lucta quædam, & natura causæ morbiicæ sese opponens, vi, quod molestum est, expellere conatur. Vbi autem natura hunc suum finem assequi non potest,

test, aut dimidia facta est obstructio, syncopes aut suffocationis periculum imminet. Aliàs nihil molesti percipitur, nec difficultas respirandi, nec tussis, nec dolor, aut grauitas. Vbi tamen malum incrementum sumit, tandem ipsis arteriis communicatur, & tunc, quæ antea non aderat, difficultas spirandi superuenit, tandemque etiam palpitatio cordis, syncope & suffocationis metus.

Causarum signa quod attinet, si à crassis humoribus sit obstructio, pulsus est durus per tensionem; si per tuberculum, durus per tensionem & siccitatem. Si ab humore sit obstructio; pulsus magis variabit; si à tuberculo, inæqualitas magis erit vniformis, utpote à causa magis fixa proueniens. In obstructione æquales plures simul adesse possunt: at in tuberculo plures sunt inæquales.

Vbi tandem malo incrementum sumente & materia asperis arteriis communicata accedit difficilis respiratio, si malum sit à crassis succis, difficultas respirandi non est vniformis, sed nunc maior, nunc minor, pro causæ ratione, si verò sit à tuberculo, vniformis est difficultas respirandi, nisi forsan causa aliqua externa accedat.

Si malum sit ab inflammatione, ea ex febre & aliis signis supra propositis cognoscitur. *Prognostica.*

*Prognostica.*

1. Malum hoc longè periculosum est, à quo homo sæpè accedente syncope, vel suffocatione subito perimitur.

2. Quò in pulsus inæqualitate plures sunt magnæ, vehementes, celeres, intercidentes & æquales pulsationes, eò minus malum est: quò autem plures sunt languidæ, parvæ, decurtatæ, intermittentes & crebriores, eò maius periculum indicatur.

3. Quò minus actiones cordis læduntur, minorque est in syncopen propensio, eò malum minus est: quò verò hæc maiora, eò maius periculum imminet.

4. Quæ à crassis & viscidis humoribus est obstructio, non ita difficulter curatur, præsertim si recens fuerit; quæ autem angustia prouenit à tuberculis, curatu difficillima est, ut postea de tuberculis pulmonis dicetur.

5. Quò maior cachexia coniuncta est, eò periculosius est malum, cuius rei causa postea in quæstione dicetur.

*Indica*

## Indicationes.

Causa angustiam pariens est tollenda. Ideoque si humores crassi & viscosi sint, attenuandi, extergendi & euacuandi sunt. Crudum tuberculum, seu arteria has obstruat, seu comprimatur, attenuandum & resiccandum. Inflammatio si adsit, ea debito modo curanda.

## Curatio.

Crassi autem & viscosi humores quomodo præparandi & euacuandi sint è pulmonibus, capite præcedente iam dictum est, ut ea hic repetere opus non sit, & dicitur de eo etiam in asthma. Nam eius curatio ab huius causæ sublatione pendet. Vnum saltem hic moneo, quod etiam in curatione asthmatis repetendum, nonnullos paroxysmo asthmatico ingruente vomitum præcipere. Quæ res etsi alicui à veritate aliena videri posset: aliquoties tamen vidi, vomitu spontè superueniente à paroxysmo liberatos fuisse. Quærenda ergò huius rei causa: quæ nulla alia videtur, quàm quod materia, quæ ab epate ad pulmones ruit, ad ventriculum conuertitur. De quo postea in quæstione dicitur.

Crudum tuberculum quomodo curandum sit, dicitur postea cap. 8.

Inflammatio pulmonis quomodo curanda sit, iam antea cap. 3. dictum.

## QVÆSTIO.

*Quenam sit causa hydropis, quæ lænium arteriarum obstructione laborantibus superpenire solet.*

P. Salius Diuersus de aff. partic. cap. 21. censet ideò hoc fieri, quòd perseverante malo calor innatus, quoniam non sufficienter euentatur, languescat, atque inde epar debilitetur, cuius ratione postea aliqua hydropis species succedat.

Verùm enim verò, cum sæpè satis maturè sese cachexia prodatur, ubi cor adhuc satis bene valere deprehenditur, & epar nihil à pulmonibus, sed pulmones potius ab epate accipiant, credibile est, vel à pulmonibus refrigeratis epar refrigerari, vel quòd vero similis videtur, primam mali causam in epate hære, quòd, cum sit debile, sanguinem

*Hydrops in obstructione lænium arteriarum causa quanam?*

pituitosum & frigidum generat, qui cum necessario ad dextrum ventriculum cordis mittatur, porro etiam ad pulmones peruenit, & huius mali causa est. Cum enim vena arteriosa & arteria venosa per totam substantiam pulmonis in minutissimos ramulos diuisæ dispergantur, & multis anastomosibus coniungantur, facillè ex vena arteriosa in arteriam venosam humores transferri possunt.

~~~~~

## C A P V T V I.

### De apertione vasorum pulmonis.

*Apertio  
vasorum  
pulmo-  
nis.*

*Quatuor  
modis  
pulmonis  
vasa a-  
periu-  
tur.*

*A' vas-  
mōsew.  
Causse.*

**A**NGUSTIÆ vasorum pulmonis opponitur eorum apertio: & proinde de hac post illam meritò agitur. Ad morbos enim pulmonis, & quidem meatuum vitia & illi pertinent, cum vasa sanguinem continentia in pulmone, quæ clausa esse debent, aperiuntur. Id quod, ut in aliis etiam partibus, fit quatuor modis, ἀνομοίως scilicet, ἀνομοίως, ῥιζες & ἀγχοίως.

A' vasomōsew, seu osculorum in venis vel arteriis apertio fit primò à causa externa euidente, quæ proximè & sola orificia vasorum aperire potest, medicamentis scilicet abstergentibus & orificia vasorum aperiētibz, qualia sunt aloë & similia, vel caussis nimis laxandi vim habentibus. Deinde à causa interna, quæ vel est proxima, sanguis scilicet vasorum orificia aperiens; vel antecedens, sanguis scilicet aut copiâ peccans, aut calidus, aut acris, à quo facultas irritatur; quibus & motus sanguinis ad superiora addi potest. Ut enim à sanguine orificia vasorum in pulmone aperiuntur, causa non semper primario in pulmone hæret, sed sæpè ad pulmonem ab aliis partibus transmittitur.

Procatactica causse sunt, quæ vel sanguinem cumulant, ut suppressa eiusdem consueta per nares, hæmorrhoides, menstrua, euacuatio, & aliæ plethoræ causse, vel calidiorem reddunt, ut corporum motus, vehemens aer, cibis, potus, medicameuta calida; vel ipsum ad pulmones & superiora commouent, ut motus nimius.

*Διαπύδνσις*, id est, transcolatio siue transsudatio fit ob *Διαπύδνσις*  
 vasorum & tunicarum in iis raritatem, cuius caussa est *σις*.  
 sanguinis tenuitas & serositas.

*Ρήξις*, id est, ruptio vasorum fit primò à caussis externis *Ρήξις à*  
 euidentibus, quæ proximè vasa in pulmonibus rumpere *caussis*  
 valent, vt lapsu ab alto, vel percussione & contusione pe- *externis*.  
 ctoris, ira cum clamore, intentione vocis subitâ & magna  
 ac vehementi, non à leuiore quasi per gradus ascendente,  
 rursi nimia, conatu magno graue pondus attollendi, vel  
 loco mouendi, saltu, imprimis post balneum, vbi vasa &  
 totum corpus rarius redditum, cursu, lucta, retentione  
 spiritus in conatu excrementa excernendi, & foetum ex-  
 cludendi. Hinc Hippocrates, 3. Aphor. 29. scribit: iuue- *Iuue-*  
 nibus sanguinis expuitiones, sicut & phthisin esse familia- *nibus*  
 res: Et 5. aphor. 9. eadem ab anno 18. ad 35. frequentius ac- *phthisis*  
 cidere. Id quod Galenus non tam ætatis ratione accidere *cur fa-*  
 docet, quàm propterea, quod in ea ætate constituti in vi- *miliaria*.  
 ta & victu errores committunt. Etenim iuuenes pugnare,  
 aliisque exercitiis vti solent, sæpe frigori nimio se expo-  
 nunt, cibo & potu supra modum se replent. Quibus caus-  
 sis omnibus facilè vena iis, præsertim in pectore, rumpi  
 contingit, vnde sputum sanguinis primò oritur, quod nisi  
 tempestiuè cu retur, phthisis subsequitur. Præterea san-  
 guinem calidum & biliosum cumulant, qui non solum  
 rupturam, sed & reliquas causas, quæ vasa in pulmone  
 aperiunt, inducere potest. Easdem ob causas viri etiam  
 frequentius apertionem vasorum pulmonis patiuntur  
 quàm foeminæ. Galenus, 4. de loc. affect. cap. 5.

Deinde rumpuntur vasa pulmonis à causa interna, eâ *A causis*  
 que vel proxima, quæ est sanguis pulmonis vasa distendens; *internis*.  
 vel antecedens, sanguinis abundantia seu sola, seu cum spi-  
 ritu flatulento; vel proc atarctica, quæ scilicet vel sangui-  
 nem auget, vel ad pectus cōmouet; vt motus corporis ni-  
 mius, animi pathemata vehementiora, & ira imprimis.

Et præcipuè causæ istæ vasa rumpunt, cum vasa exten-  
 sioni resistunt ob frigus externum. Tum enim illorum tu-  
 nicæ frigore contractæ & induratae ad rupturam prom-  
 ptæ & paratae sunt. Hinc Hippocrates, 6. epid. section. 3.

ἡ ψυχρὴ φλεβὴ ῥυτίκεται, quod etiam habetur 6. aphor. 24.

Frigus verò ipsum per se vas aliquod frangere non potest, sed vel motum aliquem, vel plenitudinem accedere necesse est, de quo Galenus, 4. de loc. affect. cap. ita scribit: *Frigus ipsum per se rupturas non facit, sed quia venarum tunicas frigiditate suâ duras & ad extensionem contumaces reddens, ut rumpantur, paratiores efficit: ruptionis verò causa est aut vehemens motus, aut humorum abundantia.*

Διάβρωσις.

Διάβρωσις verò seu erosio fit ab humoribus acris & falsis, seu à capite destillantibus, seu aliunde ad pulmonem fluentibus. Quò faciunt acrium & prauorum ciborum vsus, inedia acres humores coaceruans, & similia.

*Signa diagnostica.*

Signa.

Si ἀνατομῶσι, vasorum pulmonis sit, præcesserunt causæ vasorum orificia aperiētes, quæ modò enumeratæ sunt. Et sanguis è vasorum orificiis apertis exit mediocri copiâ & sine dolore,

Si Ἀσπιδίτης adsit, exit sanguis serofus, paucus & sine dolore.

Si à ῥήξει, seu ruptura vasa pulmonis aperiantur, præcessit plethora, & causa aliqua rumpens antea proposita; & sanguis statim copiosus exit.

Si sit erosio, præcesserunt falsæ è capite destillationes, sanguis est acris, & propter humoris acris admixtionem malè coloratus apparet; percipitur sapor falsus & acris, præcesserunt causæ acres humores cumulantes, & primò quidem sanguis purus exspuitur, progressu verò temporis & erosione auctâ copiosior, tandèmq; sputum puris sequitur. Quæ signa confirmantur, si nulla causa violenta præcessit.

Præterea an à copia sanguinis, quæ tam ἀνατομῶσι quàm ruptionis causa esse potest, ut suprâ dictum, an verò ab acrimonia eiusdem proueniat vasorum pulmonis apertio, ex eo quoque discernitur; quod si à copia sanguinis, quæ naturæ oneri erat, ea proueniat, sanguinis copiâ euacuata is sponte subsistit, signaque redundantis sanguinis adsunt; si verò acrimonia sanguinis proueniat, sanguis ita facile sisti non potest.

1. Διαμήδους, minimè omnium periculosa est, & adstringentibus faciliè sanguis fistitur.

2. Post hanc minus periculosa est ἀναστόματος, ob quam si sanguis rejicitur, is sponte sæpè copiâ nimîâ euacuata subsistit, osculis spontè iterum sese occludentibus. Observatumque sæpius in consueto sanguinis, hæmorrhagiæ narium, hæmorrhoidum, mensium fluxu suppresso sanguinis superabundantem copiam absque vlllo damno è pulmone, osculis vasorum reclusis, euacuata fuisse: quod etiam Fernelius, lib. 5. de part. morb. & sympt. c. 10. annotavit. Et Ludouicus Duretus de seipso scribit, in comment. super Coac. Hippocr. aphor. 46. sibi, cùm olim familiaris fuisset narium hæmorrhagia, & quidem cum commodo valetudinis vsque ad annum ætatis quinquagesimum, tùm ea suppressa, nec tamen ἀναδρυσή, statis temporibus quiescente, quasi data porta proruisse per ἀναστόμασιν, vasorum pulmonis, atque quidem sæpe & multum; quæ tamen sedata nullam pulmonis offensionem reliquerit, præter summam corporis infirmitatem. Si tamen oscula vasorum vel nimium dilatata, vel motu continuo impulsâ iterum conuenire nequeant, interdum ex nimia sanguinis profusione mors sequitur. Aut si sanguis effusi portio in pulmone retineatur, illic putrescens pulmonem corrumpere potest.

3. Periculosior est ruptura vasorum. Nisi enim intra tertium & quartum diem ruptura consolidetur, inflammatio faciliè accidere potest, à qua, cùm tussi pus expuendum sit vulnus in dies maius efficitur. Et quamuis callus vlceri obducatur: tamen leui de causâ, vt vocis intentione, vel risu immoderatiore iterum rumpitur. Galenus, 5. meth. med. cap. 14. Celsus, lib. 4. cap. de Tussi.

Admodum etiam periculosa est vasorum pulmonis apertio, quæ fit in vulneratione, percussione & contusione thoracis.

4. Periculosissima verò est ἀλξήματος, seu erosio vasorum. Etenim vlcus sordidum, quod tum inducitur, non faciliè consolidatur; & vt vitium humoris corrigatur, longiore tempore opus est.

5. Si ruptura & erosio vasorum pulmonis sit recens, & antequam phlegmone accedit, non ita difficulter curatur. Si verò phlegmone accedat, exigua sanationis spes superest, ea præcipuè de causâ, ut dictum, quod pus & saniem tussi & pectore expurgare oportet, quâ vlcus semper maius & deterius efficitur. Hinc Galen. 5. meth. med. c. 13. & 14. scribit; se omnes curasse, qui è pulmone sanguiné expuentes mox primò die ipsius opera vñ fuerant; Qui verò post biduum aut triduum ipsius opera vñ essent, horù aliquos sanatos esse; quos autem phlegmone sic occupauit, ut iam febricitarent, eorum sanè nullum perfectè restitutù fuisse.

6. Morbus reuersionem faciens magis, quàm ab initio vrget, Hippocrates, de intern. affection.

#### Indicationes.

Indica-  
tiones.

Apertum vas, quocunq; modo apertio facta fuerit, claudendum est. Modus verò id præstandi varius est pro causarum diuersitate. Si nimirum ab ἀναστομίῃ, sit apertum vas, orificium vasis apertum obturandum & adstringendù est. Si à ἀλγυνδίᾳ, densantia & incrassantia requiruntur. Si à rupura, ruptum vas vniendum atque agglutinandum. Si ab erosione, sarcotica primùm, quibus, quod deperditum est, regeneretur, & hinc consolidantia requiruntur.

Præterea si vitium sit à causâ interna, eaque adhuc duret, aut vasorum agglutinationem impediat, ea tollenda. Sanguis nimirù ad pulmones affluens reuellendus & auertendus, copiosus imminuendus, calidus & acris refrigerandus & mitigandus, humores biliosi & acres alterandi & euacuandi sunt.

#### Curatio.

Curatio.

Cùm à vase in pulmone aperto sequatur sanguinis effluxus & hinc sputum sanguinis, vas apertum claudi non potest, nisi prius sanguis sistatur, & si forsan sanguis cōcretus circa vasa hæreat, is prius tollatur. Ideoque siue per ἀναστομίῃ, siue per rupturam, siue per erosionem apertum vās in pulmone fuerit, commodissimè instituitur venæsectio, quæ ferè plerisque scopis satisfacit. Et si enim, ubi causâ rupturæ amplius non adest, ut dum à contusione, lapsu, vel clamore nimio vas apertum est, sanguis saltem

fisten.



sistendus sit, & hinc vas claudendum & vniendum; vbi verò causa adhuc adest, id quod in plethora accidit, vbi à copia sanguinis vasa aperiuntur, non solum sanguis sistendus, & vas apertum claudendum sit, sed præterea etiam copia sanguinis minuenda: tamen his quoque omnibus satisfacit venæsectio. Etenim dum sanguinem alio auertit, eius fluxum sistit, dum verò eius copiam imminuit, causam morbi tollit.

Aperienda autem est vena in cubito. Si tamen consueta aliqua euacuatio suppressa sit, vena in pede etiam aperiri potest, vt ad remotiora fiat reuulsio, deinde vena in cubito aperiri potest, vt in inflammatione pulmonis dictum. Qua in re tamen distinctione opus est, vt infra, *part. 3. cap. ult.* in quaestione dicetur. Et quidem, si necessitas id requirit, bis vel ter eodem die vel spatio bidui sanguis mittendus, si virium lapsum timeamus. Si enim venæ apertio sæpius repetatur, & in plures vices sanguinis missio distribuatur, efficacior sit reuulsio, virésque minùs deijciuntur. Et quidem conuenientius sanguis mittendus, vbi copia sanguinis proxima & primaria apertionis vasorum causa est, in plethora scilicet, & vbi consueta aliqua sanguinis euacuatio suppressa est, sanguisque est calidior.

Si verò à prauitate humorum, qui vel orificia vasorum aperiunt, vel vasa erodunt, apertio vasorum proueniat, atque in iis, vt Galenus, *5. meth. med. cap. 14.* scribit, qui parum sanguinis habere videbuntur, ad quandam succi probitatem redactis humoribus detrahere aliquid sanguinis poteris, tum rursus reficere eosdem etiam rursus purgare, atque rursus reficere, denique si res suadeat, sanguinem mittere, potissimum quibus veluti limus viciosus & crassus totus sanguis est. Atque qui validi sunt, multique sanguinis, iis statim ab initio sanguis mittendus.

Quod si vires non ferant venæsectionem, cucurbitulæ cum scarificatione partibus inferioribus reuulsione gratiâ applicandæ, vel etiam epati, si à plethora sit ruptura. Hirundines etiam, præsertim si sanguinem antea fundere

dere consuetæ sint, hæmorrhoidibus applicari possunt.

Et omnino danda est opera, vt si consueta aliqua euacuatio, vel mensium vel hæmorrhoidum suppressa sit, ea reuocetur; sed per ista, quæ diximus, media. Nam menstrua per medicamenta menses mouentia hîc mouere non licet. Cùm enim sint calidâ, & sanguinem vehementer mouere, & venas aperire possunt.

Nec omittendæ aliæ reuulsiones, quæ fiunt cucurbitulis sine scarificatione, frictionibus, ligaturis & aliis, quæ citra euacuationem & virium deiectionem sanguinem reuellunt. Si defluxio sit à capite, ea reuulsio instituenda, quæ catarrhis debetur, vt suo loco dictum.

Deinde si sanguini vitiosi humores permisceantur, quæ qualitate sua vitiosa vasorum apertionis causâ sint, & qualitas illa vitiosa corrigenda, & vitiosi humores euacuandi. Ideoque & tum exhibenda alimenta boni succi, quæque acrimoniam sanguinis mitigant, vt ptisana, amyllum, tragacantha, succus granator. syrup. de portulaca, borragine, iuiubis & similia.

Ad purgationem exhibenda pulpa tamarindor. syrup. ros. solut. myrobal. manna, rhabarbarum. Scammonio cautè vtendum. Videndum enim, ne purgantibus fortioribus exhibitis sanguis magis agitetur, & fluxioni aptior reddatur.

*Grumos  
sanguinis in pe-  
ctore re-  
soluētia.*

Tertiò danda opera, vt grumi sanguinis in pectore ac pulmone dissoluantur, cùm non solum glutinationem vasorum impediunt, sed & retenti grauiâ symptomata exci- tent, & pulmones corrumpant.

Exhibendû autem oxycratû, seu posca, id est, mixtura ex aqua & aceto 3. vj. vel ix. mens. Sit autem posca, vt Galen. 5. meth. med. c. 8. tradit, ista mista, vt potu sit iucûda, & ne ob acetum copiosius tussim excitet. Ita enim & concretû sanguinem dissoluit, & ad glutinandû non nihil facit. Detur autem non frigida nec calida, sed tepida, & quidem bis vel ter de die, vel etiam trium aut quatuor horarum intervallo. Græci recentiores, vt Paulus Ægineta, Aëtius, Oribasius, commendât coagulum cerui, hædi, leporis imprimis, quæ vt dissoluta coagulant, ita coagulata dissoluunt, vt docet

docet Dioscor. lib. 2. cap. 26. Et quia acredinem non obscuram obtinent, vix magnitudine ciceris exhibent ex aquâ calidâ adstringente, aut oxymelite. Galenus tamen, 10. de simpl. med. fac. tit. coagulum, propter acrimoniam formidat coagulum dare ad reiectionem sanguinis in thoracis affectu, scilicet adstringentem requirente. Poscæ igitur vsus tutissimus. Forestus ad sanguinem congelatum exhibuit mumiam & sperma ceti. Donatus post poscæ assumptionem commendat puluerem seq.

℞. Rhabarb. 3. j. vel ꝑ. iv. mumie ꝑ. v. vel vij. subie tinctor. ꝑ. iv.

Detur cum vino rubro, aut aqua plantaginis exiguo aceto coniecto.

Langius, l. 2. epist. 31. hunc puluerem commendat.

℞. Rad. angelic. ꝑ. ij. coagul. lepor. ꝑ. ss. succin. 3. ss. sarin. orob. rubr. ꝑ. ij.

Exacte contusa cribro excernantur, ac de illius pulueris farragine 3. j. dissoluatur in stillatitij ceræ solij aut gingidij liquoris 3. iij. ss. & oxymel. 3. j. F. haustus.

De medicamentis verò grumos sanguinis in thorace dissoluentibus aliquid difficultatis oritur, quo scilicet tempore exhibenda sint, cum si iis vtamur, vasa non claudantur, sed potius aperiantur. In ista autem re perpendendum, an plus vrgeat sanguinis impetus, quam sanguis concretus. Nam si ruptura sit in pulmonis vasis, & metus sit, ne inflammatio excitetur, aut fluxus sanguinis augeatur, malique aliquid afferatur, statim sistendus est. Vbi autem iam ex parte aliqua impetus sanguinis cessat, vt ex eo cognoscitur, quod iam minus fluit, & colore non est amplius admodum florido, grumos dissoluentibus vt, & postea agglutinantia exhibere licet: imò medicamenta ex vtrisque composita, exhiberi possunt; exempli gratiâ, oxymel & syrup. de portulaca cum bolo Armenio. Si verò ruptis vasis pectoris exspuatur sanguis, & ex eo tantum periculum pthysicos immineat, primo eum expurgare & dissolvere, postea conglutinare licet. Idem faciendum, sanguisque concretus statim dissoluendus, si is è pulmonibus tantum per *αισχρομα* exeat, cum tum tantum in-

flammationis periculum non adfit.

Si catarrhus à capite defluens apertionis vasorum pulmonis causa sit, & vasa aperta conglutinari non possint, nisi catarrhus desinat, danda opera, ut primum catarrhus sistatur, de quo suprà, *lib. 1. part. 2. cap. de catarrho dictum.*

His ita peractis, & omnibus, quæ consolidationem vasorum impedire possunt, remotis danda opera, ut vas ipsum statim consolidetur, dum adhuc malum recens est, & præcipuè in ruptura & erosione vasorum, antequam phlegmone accedat, ut *prognost. 5. dictum.* In vasorum autem apertorum conclusionem procuranda quædam pro causarum diuersitate occurrit varietas. Si enim *Ἀσπιδιόν*, astringentibus utendum, sanguisque si sit tenuior, crasso victu emendandus, modo non adsit inflammatio, ut in pleuritide, ubi astringentibus abstinendum, & potius secretus promouendus. *Ἀσπίδων*, & rupturam curandi ratio ferè eadem est. Adhibenda nimirum adstringentia, emplastica & glutinantia medicamenta. Astringentia hic utilia sunt *portulaca*, quæ quocunque modo sumpta apertionem vasorum pulmonis, & sputum sanguinis inde proueniens curat; succus tamen eius efficacior est, *plantago*, *polygon. millefol. germina*, & fructus *rubi*, *cynobab.* *myrti*, *tenera quercus folia*, *rosæ*, *rad. symphit. maior. sumach. cortic. granat. balaustia*, *lapid. hematit. corallia*, *crocus martis.*

Emplastica sunt *bolus Armenus*, *terra sigillata*, *sanguis draconis*, *gummi Arabic. tragacanth. thus, mastich. amyllum.*

Glutinant hic *millefol. symphytum maius*, *lysimachia.* Et quia medicamenta pleraque plurimis prædita sunt facultatibus, ita ut quædam astringant, condensent, conglutinent, etiam Medici modo ad hanc, modo ad illam classem ea referunt. Et cum talia medicamenta non facile penetrent, sed sibi ipsis potius viam quasi præcludant, admiscendum aliquid medicamentorum quæ calore & tenuitate partium prædita *ἀραιώσιν*, ac distributionem cæterorum medicamentorum adiuuant. In quem usum commodissima sunt & vehiculi vicem præstant mel & saccharum.

Ex his varia sunt medicamenta, atque in usu potissimum

mum sunt trochisc. de terra sigillata, de carabe cum & sine opio, troch. ramich. spec. diatrag. frigid. syrup. de portulaca, de succ. plantaginis, de rosis sicc. de papauere, myrtin. loch de portulaca, conseru. rosar. rubra. antiq. de fol. quercus, syrup. de corall. vt & opiata, quam descripsit Fernelius, consf. 21.

℥. boli Armeni, aqu. rosar. lot. 3. ij. sem. portulac. lactuc. an. 3. ℞. gummi tragacanth. Arab. an. 3. ij. amyli, sem. nasturt. torrefact. an. 3. ℞. rosar. rubr. 3. ij. sacch. cand. rosar. tabul. an. 3. j. Cum syrup. myrtillor. Formentur trochisci, qui in ore detineantur.

Vel ℥. Conseru. rosar. antiq. 3. iij. boli Armeni, terræ sigillat. an. 3. ij. Cum syrupo de portulaca. F. Electuarium. Vel ℥. Conseru. rosar. rubr. antiq. symphyt. maior. an. 3. j. ℞. boli Armeni, terræ sigill. an. 3. j. lapid. hamatit. 3. iv. cum syrup. de portulaca. F. electuarium.

Vel ℥. Tragacanth. gummi Arabici, sanguin. dracon. boli Armeni, amyli, spod. an. 3. j. lapid. hamatit. sem. papauer. hypocist. an. 3. iij. Cum syrup. de succ. plantagin. & rosarum. F. electuarium sensim deglutiendum.

Vel ℥. Syr. de portulac. 3. j. iurubin. 3. ℞. boli Arment, aqu. rosar. præpar. syr. myrtini q. s. F. lambile. Forestus in rupta vena tale præscribit decoctum. lib. 16. p. 25.

℥. Rad. consolid. maj. 3. j. burs. pastor. portulac. sanicul. pyrolæ, polygon. an. fm. j. Sem. endiu. acetos. portulacæ, vrtic. an. 3. j. F. decoctio vt artis est in aq. communi pro fb. j. Colaturæ addendo 3. iv. syrup. myrtil. Clarificentur Puluis, qui Iulio Cæsari Scaligero & medicis Parisiensibus in vñu fuit, sed è Serapione cap. 25. tract. 2. desumptus est.

℥. Spod. rosar. rubr. boli Armeni, terræ sigillat. hamatit. an. 3. ℞. gummi Arabici, tragacanth. an. 3. ij. sem. papauer. portulacæ, rosar. rubrar. arnogloss. C.C. vñti. amyli torrefact. an. 3. ii. F. puluis.

De criptio pulueris huius nonnihil varians apud Hollerium exercit. Valetij in caput 27. talis habetur.

℥. Spodij, ros. rubr. bol. Armen. terr. sigill. hamatit. an. 3. v. corall. rubr. carab. margaritar. non perforat. an. 3. ij. ℞. gummi Arabici, tragacanth. an. 3. ij. sem. papau. portulacæ,

ros. rubr. arnogloss. cornu cerui combusti, an. 3. iij. acaciæ. succi barbe hircinæ. glycyrrh. an. 3. ij. amyli torrefacti, 3. iij. Terantur, misceantur, F. pulvis, cuius dosis sint 3. iij. Datur cum aqua pluuiali.

Vel ℥. Syr. myrtin. de portulac. de rosif siccis, an. 3. j. boli Armeni, lapid. hæmatit. c.c. an. 3. ij. aq. portulac. plant. bursæ pastoris, an. 3. iij. F. potus pro duabus vel tribus dosibus.

Vel ℥. Spec. diatrag. frigid. 3. j. conferv. rosar. antiq. 3. j. R. rob berberis, 3. R. pilul. de cynogloss. 3. ij. syr. de port. q. s. F. lambile. Vel ℥. Syr. myrt. de portulaca, an. 3. j. R. conferv. rosar. rubrar. antiq. fol. quercus, an. 3. vj. tragacanth. amyli an. 3. ij. rad. symphyt. terræ sigillatæ. boli Armeni, lap. hæmatit. an. 3. j. F. eclegma.

Interim & post sanguinis auersiones (ante has enim topica apponere tutum non est, ne ab adstringentibus sanguis intrò compellatur, & venæ, quæ in alto sunt, repleantur, vt & si ab externi aëris frigore vehementi sanguis intrò ad pulmones pulsus sit.) nec topica omittantur, pectusque inungatur oleo myrthino, mastichino, rosarum, quibus addi possunt pulueres adstringentes. Vel F. tale cataplasma.

℥. Fol. plantagin. portulac. polygon. an. m. j. rad. symphyt. maior. 3. j. cortic. granator. farin. bard. an. 3. R. cydon. siccor. 3. iij. Coqu. in vino adstringente ad mollitiem. Contusis adde Thuris, mastich. boli Armeni, an. 3. iij. corallor. rubr. 3. j. ol. rosar. & myrtin. an. q. s. F. Cataplasma.

Si refrigeratio rupturæ vasorum pulmonis occasionem præbuit, Galenus, 5. meth. med. cap. 13. calefaciens ceratum ex thapsia pectori adhibet ad tollendam eam intemperiem. Sed si adhibendum est, diu tamen ibi non relinquendum, ne multum calefaciat, malum augeat, ipsamque mortem inferat cum magna Medici ignominia, qualem historiam recenset Forestus, lib. 16. obs. 16. in scholio.

Possent forsan etiam, vt in hæmorrhagiis periapta, vt iaspis, vmbilicus marinus, & similia vsurpari.

Si vulnere pectoris in pulmones vsque penetrante sit facta apertio vasorum, vulnus curandum & conglutinandum,

nandum, vt cap. sequenti dicitur.

Erosio autem vasorum pulmonis difficilius curatur, vt supra dictum. Statim autem initio ( vt & in anastomosi ex sanguine bilioso ) etiam bilis purganda, nec purgatio procrastinanda, ne dum studemus acrimoniam humoris corrigere, ille acrimonia sua maius malum inducat. Neque hic concoctionem expectare opus est; cum humor non sit putridus, seu crudus, & præterea tenuis, qui ductum medicamento purgantis faciliè sequitur. Validiora tamen & calidiora purgantia vitanda, ne humorem magis agitent & acriorem reddant, vt & aloë, vtpote quæ venarum orificia aperire solet.

Peculiaris autem hic offertur indicatio regenerandi partem erosionem deperditam. Id quod præstant alimenta boni succi, vt pisana, lac & quæ ex lacte conficiuntur, iuscula gallinæ & carnes, & medicamenta carnem gignentia, qualia sunt thus, mastiche.

Si verò catarrhus adhuc adsit, qui è capite ad pulmones defluit, is primùm cohibendus. Id quod triplici medicamentorum genere effectum dedit Galenus: 1. purgatione peccanti humori conueniente. 2. medicamento diaspermato, quod somnum conciliat, sensum doloris tollit, tussim sedat, & siccandi vim habet, cuius loco vti possumus theriaca recente, pilulis de cynoglossa, & similibus. 3. cerato ex thapsia, vel stercore columbino capiti imposito, vt catarrhi defluentis impetus prohibeatur, quod & alia huius generis medicamenta & cauteria præstare possunt. Postea ægrum reficit cibus boni succi, frictione, inambulatione, balneo. Imprimis verò lac exhibet, quo neglecto malum vix sanatur. Neque interim sanguinis missionem negligit, sed eam vel statim, si abundet, vel si paucior sit & prauus, vbi ægrum cibus boni succi refecit, eam instituit.

Curationem hanc Galeni reprehendit quidem Trallianus, l. 7. c. 1. verùm quid de ea sentiendum sit, supra l. 1. c. de catarrho dictum.

Inter medicamenta autem, quæ vas erosum claudunt, Trallianus *allegato loco*, commendat lapidem hæmatitem,

*Catarrhi  
cum spu-  
to san-  
guinis  
curatio.*

in subtilissimum puluerem tritum, quem  $\mathfrak{D}$ . iv. pondere circa principium si magna sit sanguinis reiectio: in succo mali punici, vel succo polygoni, si minor, cum sola aqua tepida exhibet.

Vel suspendatur lapis hæmatites tritus in linteolo in aqua, & nodulus exprimatur, ut aqua rubescat, addaturque syrup. de portul. vel myrtinus. Exsiccat enim vlcus & prohibet ne pus generetur. Vtilis etiam est bol. Armenus & terra Lemnia. Ut

$\mathfrak{L}$ . Boli Armeni  $\mathfrak{z}$ . ij. spec. diatrag. frig.  $\mathfrak{z}$ . j. sacch. in aq. port. diss.  $\mathfrak{z}$ . iij. F. rotulæ, de quibus per intervalla fumantur sex vel plures. Vel  $\mathfrak{L}$ . Conseru. rosar. rub.  $\mathfrak{z}$ . ij. rad. consolid. maior. costar. vel cons. earum  $\mathfrak{z}$ . j. bol. Arm. mastich. thur. an.  $\mathfrak{z}$ . j. hypocist.  $\mathfrak{z}$ .  $\beta$ . Cum syrupo de portulac. F. electuarium.

*Diatæ.*

*Diatæ.*

Aër sit temperatus, aut moderatè ad ficcum & frigidum declinet. Calidus verò ut alia incommoda habet, de quo postea in quæstione dicetur, ita etiam sanguinis profusiones inuehit. Victus sit tenuis primis diebus, & vim adstringendi habeat vel emplasticam. Vnde conueniunt sorbitiones ex ptisana, pultesque ex oryza, auena, farina hordei, tritici & amylo cum lacte coctæ, quibus si libet, addi potest cons. ros. antiqua. A nonnullis commendatur earo suilla ut glutinosa. Et recitat Suidas historiam Daminiij Philosophi, qui cum sanguinis scuto laboraret, oraculum de medicamento consuluit, à quo responsum accepit ut carne suilla vesceretur, quam quoties comedebat, sanguinem non reiciebat, ubi abstinebat sanguinis fluor rediit. Lac etiam hîc optimum alimentum est, refertque Trallianus, se solius lactis usu plures curasse. Nec inutilis est caseus recens, non falsus. Ex oleribus conueniunt lactuca, acetosa & præcipuè portulaca, mala aurantia, granata. Abstinentum verò à cibis flatulentis, falsis, acris, & aromatibus. Aceti quoque usus præsertim acris non conuenit.

Potum quod attinet exhibeatur aqua hordei cum melle vel saccharo, ubi abstergendum, ubi verò glutinandum, aqua hordei chalybeata. Vel bibatur cereuisia tenuior, aut



lac amygdalar. dulcium, vt & lac acidum ebutyratum. A vino verò abstinendum. Æger non moueatur, sed quiescat, non clamet, non excandescat, & quantum fieri potest, dormiat. In obesioribus tamen somnus sit interruptus, ne sanguis nimius in thorace collectus dormientem suffocet. Videatur etiam Hippocrates, *lib. de intern. affect.* mox ab initio.

Q V A E S T I O.

*Qualis aër in apertione vasorum pulmonis ab aëre frigido proueniat?*

Equidem principium est in methòdo medendi, contra-  
ria contrariis curari; ac proinde etiam rationi consentaneum videtur, vbi ab aëre frigido vas aliquod in pulmone ruptum est, aërem calidum adhibere. Contra, quia calidus aër dilatat, non tutum esse videtur, vase aliquo aperto eum adhibere.

*Qualis aër in apertione vasorum pulmonis ab aëre frigido conueniat?*

Verum enim verò etsi plura in ruptura vasorum pulmonis sint indicantia: tamen quod maximè vrget, est sanguinis fluxus; qui non solum sine vitæ detrimento largius effluere nō potest, sed & dum fluit, facit vt vas claudi non possit, & quò diutius fluit, eò magis vas dilatat. Quapropter æger potius in aëre frigido quàm calido, qui laxat, detineri debet. Etsi enim adhuc adsit aliqua intemperies frigida, quæ tussiculam aliquam excitare possit: tamen spiritus retentione facilè sedari potest. Et ipse aër frigidus, in quo æger domi conclusus degit, non est tam frigidus, vt ad rupturam vasis aliquid facere possit. Et ipse, vt suprà dictum, aër frigidus vasa non rumpit, modo plenitudo sanguinis dempta sit, & æger ab omni motu violento cesset, nullum ab eo periculum est. Aër tamen ille moderatè sit frigidus. Et quod in ruptura vasorum pulmonis in principio calida non conueniant, etiam vbi ab aëre frigido est ruptura, exemplo etiam docuit Gal 5. *meth. med. c. 13.* in iuvene, qui ex refrigerato pectore sanguinem exspuebat; cui intrò nihil calidi adhibuit.

~~~~~

## CAPVT VII.

*De grandine, calculo & vermibus in pulmone generatis.*

**E**s planè alienas quandòque in pulmone generari obseruatum est, grandines, calculos, imò ossa & vermes, quæ non solum angustiam vasorum pulmonum parere possunt, sed & aliis modis præter naturam sunt, & à plerisque ad morbos numeri referuntur; de quo iam non disputamus, cum ea de re dictum sit *in institution.*

Galenus, vt 4. *de loc. affect.* c. 8. refert, quendam vidit, qui grandines erui magnitudine è pulmone eiecit. Ipse idem in quodam viro docto & olim Professore huius Academix obseruauit, qui grandines colore albo & duros è pulmone eiecit, tandem phthisi correptus ac mortuus est. Si materia illa sit copiosior, & in maiorem molem concreascit, calculi inde fiunt, id quod Trallianus, *lib. 5. cap. 4.* Paulus Aegineta, *lib. 6. cap. 31.* & alij auctores annotarunt, quos allegauit Institut. *l. 2. part. 2. cap. 9.*

Ossa pulmonibus impacta vidit Columbus, vt annotauit, *lib. 15. Anatomia.*

Carunculas etiam & vesiculas piscium vesicis similes interdum è pulmonibus eïci obseruatum, vt eius rei historias collegit Schenckius *lib. 2. obs. 50.*

Tandem quoque vermiculos; & quidem non vnus figuræ, è pulmonibus eiectos obseruatum à Medicis, vt apud eundem Schenckium, *lib. 2. obs.* videre est.

*Causæ.*

*Causæ.*

Galenus, *loco allegato*, ex lento humore, qui antea tussi reiciebatur, retento ficcato. induratòque grandines generari statuit. Et reuera humor crassus & viscidus calculorum in pulmonibus est materia, facitque ad concretionem etiam exsiccatio & pulmonum caliditas. Vnde Fernelius, *lib. 5. de part. morb. & sympt.* c. 10. inuenit in dissectis grandines alios veteris casei consistentia incipientes, alios gypsea pituitæ duritie. Verum etiam interna vis ad coagulandum tendens, quæ in aliarum partium calculis generan

*De grand. calc. & verm. in Pulm. gen.* 231  
nerandis concurrir, & hîc admittenda est de quo alibi  
diximus.

Vermium quoque caussa, quæ in aliarum partium ver-  
mibus concurrir, vt in Institut. diximus, etiam hîc lo-  
cum habet.

*Signa diagnostica.*

Calculus & vermes in pulmonibus hærentes, difficul- *Signa.*  
ter omninò cognosci diximus *capite præcedente*; & vix cer-  
tò cognoscuntur, nisi tussî reiiciantur. Præcedit tamen ple-  
rumque hæc mala tussis diuturnior, quæ nullis, etiam effi-  
cacissimis, remediis tollitur.

*Prognosticum.*

Rarò autem hisce mali, correpti conualescunt, sed ple- *Progno-*  
rumque pulmones à calculis & vermibus, tum à conatu *sticum.*  
in tussî, quæ ad ea reiicienda requiritur, læduntur, vnde  
phthisis & tandem mors sequitur, vt ex historiis antea al-  
legatis videre est.


*Curatio.*

Res istæ cùm sint toto genere præter naturam, à corpo- *Curatio.*  
re emotionem indicant, quod quomodo fieri debeat, por- *grandinis*  
rò videndum. Quomodo enim qui grandines & calculos *& cal-*  
è pulmone reiiciunt, curandi sint, Galenus & Alexand. *culorum*  
Trallianus dissentiunt. Galenus, 4. *de loc. affect.* c. 8. medi- *pulmo-*  
camentum in potu dedit, quod asthmaticis exhibetur, vnde *nis.*  
æger minorem quidem grandinem expuit, atque in  
longiore, quam antea, interuallo post plures tandem an-  
nos mortuus est. Trallianus verò *loc. all.* Galenum repre-  
hendit, quod refrigerantia neglexerit, & calida adhibue-  
rit, Mithridatium, Athanasiam, theriacam, & similia acria  
& extenuantia medicamenta. Verùm in eò quidem fallit-  
tur Trallianus, quod scribit, Gal. Mithridat. Athanasiam, &  
theriacam illis, qui grandines reiecerint, exhibuerit; cùm  
ad vlcus pulmonis ea adhibuisse, ad grandines verò ea  
quæ asthmaticis cocueniunt. Rem tamen ipsam quod atti-  
net, ea, quæ simpliciter calefaciunt, non ad eò conuenire  
videntur in grandine & calculo iam factò in pulmonibus  
cùm exsiccando duriores efficerent; nisi peculiarem vim  
calculus frangendi habeant, præsertim si adhuc materia

in iis contineatur, quæ calefacientium & exsiccantium v-  
su potius indurari possit. Sed solum conueniunt materiæ  
grandinem & calculos fracturæ, modò non iam concre-  
cere incipiat. Dodonæus vt *obser.med. c.43.* docet, feliciter  
vsus est syrupo hoc modo parato.

*℞. Adianti veri, adianti albi, id est, rut. murar. an. ʒ. j.*  
*℞. glycyrrh. ʒ. rad. rusci, asparag. an. ʒ. j. sem. melon. 3. ij.*  
*aq. pur. lb. iv. Coqu. ad remanentiam lb. ij. Colat. adde*  
*Sacchari ʒ. xij. mell. aq. byssop. an. ʒ. iv. Coqu. ad syrups*  
*consistentiam.*

*Curatio*  
*caruncu-*  
*larum &*  
*vesicu-*  
*larum*  
*in pul-*  
*mone ge-*  
*nitaram.*  
*Vermiū.*  
*Pulmo-*  
*nis morbi*  
*in humo-*  
*re defi-*  
*ciente.*

Si carunculæ & vesiculæ è pulmonibus reiiciantur, ex-  
hibeatur loch sanum & expert. de pulmon. vulpis cum  
flore vel lacte  ris.

Ad vermes in pulmonibus genitos utilis est succus mar-  
rubij cum melle mistus, quem æger sæpius lambat.

*Morbi pulmonis in numero deficiente.*

Aliquando vnus pulmo deest, idque vel ab ortu, vt ob-  
seruauit Columbus, *lib. 15. anat.* vel vbi post abscessus &  
vulnera corrumpitur. Verùm mala hæc incurabilia sunt.

~~~~~

## C A P V T VIII.

### *De tuberculis Pulmonis.*

**T**UBERCULUM inflammationem pulmonis, de qua supra  
dictum, quæ fit ex materia in pulmonis substantiam  
imbibitâ, & in totum viscus dispersa, etiam tubercula in  
pulmone generantur ex materia collecta in vna parte, &  
inde extuberante, de quibus agit Hipp. *l. 1. de morb.* & hoc  
loco agendum videtur. Sunt autem illa tubercula alia cru-  
da, quorum *c. 4.* etiam mentio facta est, quæ ex materia, quæ  
nunquam suppuratur, generantur, quorum meminit Hipp.  
*lib. 3. de artic. text. 9.* & Galenus, *in comm. & 4. de loc. aff. c.*  
*vlt.* in historia Antipatri, & *6. aphor. 45.* quæ nunquam ad  
suppurationem deducta & nulla febre comitante sola ma-  
gnitudine, cum admodum adaucta est, exclusis in totum  
spiritus viis, ægrum interimunt: alia quæ suppurantur, de  
quibus præcipuè, *alleg. modo loco Hippocr.* agit,

*Tubercu-*  
*la pul-*  
*monis.*

*Cruda.*

*Suppu-*  
*rata.*

Generantur autem ista dupliciter : vel per affluxionem materię, vel per congestionem : & per congestionem rursus dupliciter, dum materia in vna aliqua parte solũ, sed & sine vesiculã conclusa colligitur, aut materia in cisti peculiariter efformata coaceruatur. Materiam verò tuberculorum in pulmone Hippocrates duplicem statuit, bilem & pituitam, id est, humores calidos & frigidos. Proueniunt verò præcipuè ab externã aliqua violentia, vt Hippocrates, *lib. de salubri diætã* docet his verbis: *Quibuscunq; autem dolores sunt ex visceribus, siue ex exercitiis, siue ex aliquo alio labore, his quiescere conducit cibis abstinentes : potatione autem utantur, quæ quàm paucissima in corpus assumpta plurimum urinae ducat, quò venę visceribus insertę non distendantur repletę. Ex talibus enim tubercula oriuntur & febres.* Hęc Hippocrates. Etenim siue ex causã interna siue externa venę violenter distendantur, progerminant, & simul materiam loco distento subministrant, seu sanguinem naturalem seu humores vitiosos, è quibus formantur tubercula.

Absurdum tamen non videtur, etiam sine externa violentia à causã interna talia tubercula fieri posse. Si enim tumores alij maiores, in quibuscunque corporis partibus, nulla externa violentia concurrente, excitari possunt, cur non etiam tubercula hęc eodem modo generari possunt?

#### *Signa diagnostica.*

Tubercula hęc cognita sunt difficilia. Sic affecti tamen subliuido ferè sunt faciei colore, iisque lingua lentore quodam est oppleta, maximè cùm longè à cibo absunt, & corporis agitatione, aut potu cibõve calidiore vrina facile tingitur, & pulsus citatur, citra tamen vllam spirandi difficultatem. Interdum verò post concitatiorem corporis motum pilulę parvę & globuli instar pisi exigui redduntur è pulmone membranula inclusi, qui contriti digitis pus reddunt interdum foetidissimum. Aliàs tubercula cruda, & quę non suppurantur, cognitione difficilia sunt, & non nisi, cùm ad tantum incrementum peruenerint, vt spirationem lædant, cognoscuntur. Reliqua quod attinet,

si hæc tubercula sint in arteriis læuibus, vel in parte arterias læues comprimente, mutantur pulsus in ordine, & inæquales in magnitudine, celeritate, & frequentia fiunt; quæ inæqualitas, in dies pro ratione augmenti tuberculi augetur, vt quândoque pulsus intermittentes intercidat. Si fiant in pulmonum substantia, tussim siccam & leuem quandam spirandi difficultatem excitant, quæ prout tuberculum augetur, & ipsa augetur. Si in arteriis asperis tuberculum tale generetur, statim tussis molesta & spirandi difficultas excitatur, ac pro morbi incremento tussis fit grauior & spirandi difficultas sæpe tanta, vt æger erecta ceruice respirare cogatur, & suffocatio impendeat, tandêmque æger suffocetur.

Præterea si tubercula sint vel in asperis arteriis, vel in externa pulmonum superficie protuberantia, dolor quidam leuis ægros continuò affligit, & imprimis, vbi vehementius & concitato motu mouentur, vbi & spirandi difficultas simul inualefcit.

Si autem tubercula sint vel in arteriis læuibus, vel in pulmonis substantia, nullus dolor percipitur.

Si verò res iam eò redeat, vt suppuratio expectanda sit, febris accidit, nisi materia tuberculi proprio folliculo sit inclusa; tum enim putridi vapores ad cor exhalare, & febrem accendere nequeunt. Inualefciente iam putredine, omnia accidentia fiunt maiora, dolores maiores, tussis vehementior, quæ non amplius sicca est, sed humida, refuldante aliqua materiæ particula. Et quidem dolores sunt vel antè vel retrò, prout tuberculum vel ad anteriorem, vel ad posteriorem partem vergit. Nam dum tubercula ista fiunt, & suppurari incipiunt, in membro sensum non habente dolorem non pariunt; dum verò suppuratione facta extrà prominent, & membranam pulmonis distendunt, dolorem excitant.

Pertinet huc & locus Hippocratis, *lib. 2. de morbis*. Si tuberculum, inquit, in pulmone exortum fuerit, tussis detinet, spirandique difficultas, quæ non nisi erecta ceruice obitur, dolor acutus pectus & latera occupat, & ad decimum quartum diem ita afficitur. Plerique enim tot diebus inflammationem concipit,

concepit, sed & caput, & palpebras dolor vexat, videre nequit, corpus subfulvum evadit, & pustulis velut ex igne rubentibus completur.

Tubercula autem, quæ folliculo suo includuntur, cognoscere difficile est; quia febris hic nulla excitatur; cum materia in folliculo suo conclusa ad cor vapores mittere non possit. Quo pertinet aphorismus Hippocrat. 41. sect. 6. *Quibus suppuratio in corpore abdita non innotescit, ob crassitudinem vel puris vel loci se non prodit.* Hinc interdum nonnulli, qui nulla febre laborarunt, disrupto tali tuberculo, vel sani evaserunt, pure salubriter reiecto, vel à pure erumpente statim suffocati sunt.

*Prognostica.*


1. Ut æger ex hoc malo conualescat, quinque conditiones requirit Hippocrates, loco allegato, 1. est, ut suppuratio citò fiat, ut facta suppuratione pus citò erumpat, 3. ut non ad inferiora, sed ad superiora erumpat, & per tussim reiiciatur, 4. ut totum pus euacuetur, 5. ut venter, id est, cavitas illa, in qua pus continebatur, perfectè agglutinetur. *Prognostica.*

2. Si verò aliqua ex hisce conditionibus desit, æger non conualescit. Si enim pus non erumpat, æger tandem præcedentibus doloribus vehementibus, inedia, tussi, feбри vt plurimum interit. Si verò tardè erumpat, ægrique viribus iam deficientibus, iisdem de causis æger moritur. Si verò pus non per tussim reiiciatur, sed ad inferiora convertatur, morbus fit vel difficilis vel lethalis. Dum enim tuberculo rupto pus in pulmonem & supra septum transversum effunditur, si à natura id euacuetur integrè, & locus, in quo in pulmone pus continebatur integrè coalescat, evadunt quidem ægri, sed cum difficultate. Si verò pus non statim euacuetur, vel ægrum suffocat, vel dum supra septum transversum moram agit, id. prava qualitate inficit, & tandem corrumpit atque exulcerat, vnde mors sequitur. De quo Hippocrat. 7. aphor. 8. *à tuberculè intus eruptione exsolutio, vomitus & animi defectio fit.* Si enim tuberculum subito rumpatur, vapores ex pure subito ad cor penetrant, vnde fit leue animi deliquium, & hinc

hinc vomitus vel syncope. Vomitus quidem, si pus extra prorumpit & excernitur (per vomitum enim intelligit omnem per os subito factam euacuationem) synope autē, si ad interiora pus vergat, & ad ea corruat. Si verò pulmo non exactē sanetur & cavitās, in qua pus continebatur, non agglutinetur, vlcus paulatim inde generatur, & tandem fit phthisis.

*Curatio.*

Cū spes salutis vnica in hoc morbo sita sit in puris citā & perfectā euacuatione & pulmonis agglutinatione: id partim fit à natura, partim ab arte. Suppuratio & puris per tussim reiectio quidem à natura instituitur; vt autem pus, totum & perfectē expurgetur, naturæ ars succurrere potest. Ita etiam si agglutinatio pulmonis naturæ opus sit; tamen & hic ars naturam adiuuare potest, & quidem iis medicamentis, quæ postea *de vlcere pulmonis* proponuntur. Vt autem pus sursum vel deorsum erumpat, id prouenit ex situ tuberculi, quā in re ars naturam nihil iuuare potest.



C A P V T I X.

*De hydropē & hydatidibus pulmonis.*

*Hydrops  
pulmo-  
nis,*

**N**onnunquam, & forsan sæpius, quā vulgò putatur, aqua in pulmone colligitur, quod malum hydrops pulmonis appellatur, quod descripsisse putatur Hippocr. 2. de morb. his verbis: *Febris & tussis tenet, & acernatim respirat, & pedes tument, & ungues contrahuntur, & patiuntur talia, qualia is, qui suppuratus est, sed debilius & diuturnius. Et si quia infundas, aut fotum, aut suffitum adhibeas, pus non sequitur, atque, ex hoc sanè cognoueris, non pus, sed aquam intus esse. Et si multo tempore aure ad latera adhibitā audire tentaueris, ebullit intus veluti acetum, & hoc quidem aliquando patitur, postea erumpit ad aluum, & statim quidem sanus esse videtur ac à morbo liberatus. Verū progressu temporis aluus incenditur, eadēque illa patitur, & adhuc amplius. Aliqui etiam intumescunt, ventre, scroto & facie. In quo loco*

*hoc*



hoc notandum, etsi in editionibus omnibus legatur ζῆδ, olet, & ita etiam Foësius hunc locum verterit: quia tamen odor aure non percipitur, rectè vertit Ian. Cornarius, bullit intus, & legendum procul dubio ζῆτ. Verùm pulmo vix solus hydropem patitur, sed hydrops pulmonis & thoracis ferè concurrunt, atque hic ipse locus Hippocratis, quem pro hydropis pulmone allegant, potius de hydrope pectoris loqui videtur. Ideoque mali huius hoc loco saltem mentionem facere voluimus. Postea verò de hydrope pectoris seu thoracis plura hac de re dicentur.

## Hydatides pulmonis.

Cognatum hydropi malum sunt hydatides pulmonis, vesicæ scilicet aquâ plenæ, quæ externam eius superficiem occupant, quæque oriuntur ex seroso & tenui humore, qui raram pulmonis substantiam pertransit, & sub membrana eius, quæ densior est, hæret & subsistit. De quo Hippocr. l. de intern. affect. *Fic enim hydrops, si tubercula in pulmone fuerint enata & aqua repleta & in pectore rupta. Quod autem fiat à tuberculis hydrops, testimonium habeo in bone & in cane & in sue. In his quadrupedibus maximè sunt tubercula in pulmone, quæ aquam habent. Si enim diffeceris, cito cognosces. Nam fluet aqua.* Hæc Hippocr.

Hydatides pulmonis.

## CAPVT X.

## De Pulmonum cum latere coalitu.

**N**ON NVNQVAM etiam pulmones cum membrana costas succingente coalescunt. Hippocr. vel quicumque autor fuerit, pulmonis ad latus prolapsum appellat, & de malo hoc agit, lib. 2. de morb.

Pulmonum cum latere coalitus.

## Causæ.

Ortum habet hoc vitium à causâ vel interna vel externa. A causâ interna interdum à primo ortu & mala conformatione hoc accidit; interdum postea membranæ thoracem inuestienti pulmo agglutinatur, cum pituita aliqua viscida

Causæ.

Interna.

vifcida & tenax inter pulmonis lobos & thoracis membranam inhæret, partefque has duas infarciens implicat, ac veluti colligat.

**Exter-** A cauffa verò externa malum ortum habet, cum conf-  
**84.** foffo aut vulnerato thorace, aut empyemate per fectionem curato, pulmo membranæ huic, agg'utinatur. Quod etiam post pleuritidem fieri impoffibile non eft. Vt enim aliæ partes vulneratæ, vel exulceratæ, fi non rectè tractentur, coalefcere poffunt; ita & pulmo membranæ thoracem inueftienti agglutinari poteft. Hippocrates, de locis in homine addit exiccationem à fiti, dum fcribit: *Lateralis morbus ficcus citra fluxionem oritur, cum ex vehementi fiti pulmo admodum reficcatus fuerit, gracilis euadit & impotens redditur, & latus præ impotentia inclinatur, ipfūque contingit, eoque contacto cum humidum exiftat, ei adhærefcit, & morbum lateralem facit.*

*Signa Diagnostica.*

**Signa.** Si, vt Hippocrates habet, pulmo ad latus prolapsus fit, tuffis tenet, & erecta ceruice fpiratio (nam pulmo non integer, fed ex altera tantum parte liberè moueri poteft) & falua tuffi reiicitur alba (nam pituita peccat, iisque humor folū ad afperas arterias refidet) & dolor ad pectus aut dorfum emergit, & incumbens pulmo impellit, & graue quid in pectore incumbere videitur, & dolores acuti pungunt (nam ex pulmonis motu ea parte, qua pulmo membranæ cohæret, dolor percipitur, & membrana reliqua huic membranæ confentit, dolorque is propter membranam affectam eft pungitius) & fanguis ftridet veluti pellis, & fpirationem prohibet. (fanguis nimirū in vasis thoracis exiftens commotus edit fibilum illum, quem lora emollita & aqua macerata excitant, fanguisque ad intra ex difficili refpiratione commotus, & in anguftias redactus, fibilum quendam edere videtur, qui tamen non nifi ab ipfo ægro percipitur.) Et ad affectum quidem latus decubitum fufinet, non autem ad fanum, verū veluti graue quiddam ipfi de latere dependere videtur, & per pectus fe transpirare putat. Etenim dum æger in latere affecto decumbit, pars affecta in proprio loco quiefcit, dum autem in oppofitum fe conuertit, quafi

pars affecta distrahitur, & pulmo à latere, cui cohæret, quasi auellitur, vnde veluti pondus quoddam ex eo latere dependere videtur.

*Prognostica.*

1. Malum hoc etsi lethale non fit; tamen molestiam & dolorem non paruum exhibet. *Prognostica.*
2. Si à primo ortu sit, incurabile est.
3. Coalitus ex siccitate periculosus non est. Intra septimum diem enim coalescit. Hippocrates, *de loc. in homine.*

*Curatio.*

In hoc affectu curando, si malum ab interna causa, pituita scilicet, ortum habeat, ea præparanda & euacuanda, vt *cap. 4.* dictum. Reliquam curationem quod attinet, Hippocrates, *loco alleg. tria* instituit. 1. est, vt materia concoquatur & leniatur, qua de causa bis de die calida multa lauare iubet. 2. Pituitam & materiam, quæ pulmones cum costis connectit, exsiccat & absomit, in quem finem à balneo vinum album modico melle admixto, & dauci & centaurij minor. feminibus tritis additis exhibet. 3. Vt pulmo cohærens lateri laxetur, & à membranis thoracis separetur, vesiccam bubulam aquâ tepidâ semiplenam lateri apponit & alligat. Quia tamen idem Hippocrates, *6. epidem. sect. 8. text. 48.* eum qui apex epatis complicatus erat, concussione corporis sanauit: eadem & hic, vt pulmo à latere separetur, vsurpari potest. Alimenti verò loco prisanæ succum tepidum & vinum aquosum suprabibendum præbet.

*Curatio  
mali à  
caussa  
interna.*

Si verò à causa externa hoc malum proueniat, aut cum quis purulentus factus fuerit. Hippocrates mox duplici auxilio utitur. Primò inter os vulneris immittit vesiccam fistulæ alligatam, quâ per flatum immissum possint prædictæ partes separari: Deinde penicillum stanneum indit, ac vterius propellit, quò pulmo à cohærente membrana separatur.

*A causa  
externa.*

~~~~~

## CAPVT XI.

## De Pulmonis vulneribus.

Pulmo-  
nis vul-  
nera.

**S**I thorax, de cuius vulneribus postea dicetur, à re ali-  
qua secante vel perforate vulneretur, ita vt vulnus ad  
interiora penetret, sæpe pulmo simul cum suis vasis vul-  
neratur.

## Signa diagnostica.

Signa.

Vulnerati autem pulmonis signa, vt Celsus lib. 5. cap. 26.  
& Paulus Ægineta, lib. 6. c. 88. docent, sunt, si cum penetran-  
te thoracis vulnere adfit respirationis difficultas, tussis as-  
sidua, & spumans ex ore sanguinis cum tussi reiectio, & ex  
pectore rubens spumansque sanguis sine dolore effluat.  
Cervicis venæ turgidæ sunt, linguæ color mutatur, facies  
modò rubicunda, modò pallida apparet, & si profundum  
sit vulnus, tandem pallida remanet.

Signa  
vasorum  
pulmonis  
vulnera-  
torum.

An verò vasa an potius substantia pulmonis sit vulne-  
rata, etiam signis quibusdam cognoscitur. Vasorum vulne-  
ratorum signa sunt sanguis spumofus, interdum niger ru-  
bicundus, interdum effluens, perpetua tussis, sicca vel hu-  
mida nisi virium imbecillitas aut pulmonum oppressio, à  
sanguine adfit, aut nisi superficialium ac leue sit vulnus.

Signa  
carnis  
pulmonis  
vulnera-  
ta.

Cùm caro pulmonum vulnerata est, nec cruenta exspui-  
tio, nec tussis vlla vrget, quia sanguis in cauum thoracis  
destillat: sed respiratio est difficilis, vicissitudo caloris &  
frigoris propter halitus è corde, qui statim discutuntur,  
crebra faciei characteris mutatio.

Historia  
vulnera-  
ti pul-  
monis.

Post signa hîc meritò recenseo historiam sequentem,  
quæ de viis etiam, quibus materia è pectore euacuatur, co-  
gitandi ansam præbet. Studiosus quidam anno 1613. mense  
Iulio noctu vulnus accepit in pectore, gladio non lato in  
dextra parte circa costam tertiam propè alam in pectus  
adacto, & è regione propè spinam exeunte, vt de læso pul-  
mone nihil dubitatum fuerit, cùm & spiritus cum sono ma-  
gno è vulnere exierit, & maxima sanguinis copia è vulne-  
re effusa fuerit. Conquerebatur simul de dolore summo &  
contra

contractione abdominis, quæ procul dubio à conuulsione partium membranarum abdominis erat, orta à consensu membranarum thoracis cum membranis abdominis, & procul dubio à tendinibus musculi thoracis quarti læsis. Accedebat & hoc, quod inter musculos & cutem, præcipuè circa diaphragma, magna sanguinis copia colligebatur, imò collum etiam occupabat, ut manifestè intumesceret. Primò die sanguis satis copiosus è vulnere effluxit, postea verò nullus: post octo dies tamen è vulnere in dorso pus satis copiosum effluxit aliquot diebus. Tussit verò nihil, neque sanguinem per tussim aliquius momenti eiecit: per dies tamen aliquot sputum album satis copiosum, cum sreatu potius, quàm tussis; unde tumor in collo euauit. Tumor ille, qui ad musculos erat circa diaphragma, ubi humoris sub cute collecti fluctuatio etiam digitis percipiebatur, suprà & infra diaphragma cataplasmatibus discutientibus adhibitis euauit. Primis diebus semel atque iterum etiam aliquid sanguinis per aluum deiectum est. Ex quibus apparet, ad humorum translationem non semper viis manifestis opus esse, sed sufficere etiam Hippocratis occultam *ἑρπύπια*.

*Prognostica.*

1. Magna pulmonis vulnera, & præcipuè si vasa magna *Prognostica.*  
& bronchia læsa sunt (cum tum sanguinis vix sisti possit) *sttica.*  
plerumque lethalia sunt.

2. Parua verò, & ubi insignia vasa non sunt læsa, etsi satis periculosa sint, sæpe tamen curantur, cuius rei observationes passim extant. Et ille Studiosus, cuius modò mentionem feci, integrè ante finem mensis potionibus ex plantis vulnerariis & pectoralibus, aliisque conuenientibus medicamentis conualuit, & nunc etiam anno 1629. benè valet.

3. Refert etiam Andr. à Cruce, *lib. 4. Chirurg. sect. 1. c.*  
4. etiam pulmonum lobis, qui per thoracis vulnera prominebant, abscissis ægrum sanatum fuisse.

4. Si pulmonis vulneri accedit inflammatio; exigua spes est de eius curatione; quia pus, quod generatur, sine tussi expurgari non potest, qua vulneris conglutinatio impeditur.

Indica-  
tiones, &  
Curatio.

In pulmonis vulneribus danda opera, vt primùm sanguinis profusio, quæ ob insignia pulmonis vasa accidere solet, sistatur, & inflammatio, cui pulmo obnoxius est, sistatur, tandèmque vulnus glutinetur; sanguis verò, qui in cauitatem thoracis effusus est euacuetur. Itaque vt inflammatio præcaueatur, nisi antea nimia sanguinis profusione vires deiectæ sint, vena aperienda. Si vulnus sit angustum, vt sanguini exitus non pateat, scalpello ampliandum. In operatione verò æger spiritum emittat, quo pulmones collabantur.

Deinde medicamenta adstringentia & emplastica adhibenda, quæ & sanguinem sistunt, & inflammationem prohibent & vulnus glutinant.

Sunt autem illa medicamenta alia topica, quæ in cauitatem thoracis induntur & infunduntur; alia interna quæ ore sumuntur.

Topica autem eligenda talia, quæ minimè mordicant, neque malignam aliquam qualitatem obtinent. Atque ob id metallica ferè omnia & salinas qualitates obtineant, etsi alis vulneribus commoda sint, in vulneribus pulmonis omittenda.

Commoda ergo hîc sunt: *bolus Armenus, terra sigillata, thus, mastiche, balaustia, acacia, tragacantha, gummi Arabicum, & alia*, quæ nullum visceribus internis damnum inferunt.

Fiat ergo puluis ex thure, mastich. & bolo Armen. part. æqual. qui vulnere, seu per cannulam infletur, seu vino nigro austero, aut decocto plantag. rosar. rubr. misce, dissolutus immittatur. Postea verò puluis pulm. vulnerato applicetur, iubendum vt æger spiritum attrahat, quo pulmones inflentur, spiritumq; eo vsque contineat, quo puluere vulnus conspersum sit.

Est & hoc in pectoris vulneribus vtilissimum:

℞. Rad. consolid. maior. caryophyll. an. ʒ. β. rosar. rubr. m. β. mastich. fol. oliuæ, an. ʒ. ij. myrrh. aloës, an. ʒ. j. Coq. in aq. hordei Colaturæ ℞. ℥. j. syr. myrtin. de rosis siccat. an. ʒ. j. mellis rosarj colati, ʒ. ij. M.

Interna autem, & per os exhibentur; parantur ex herbis vulnerariis dictis, atque è quibus potiones vulnerariæ parari solent, de quibus in Institut. dictum: è quibus eligantur ea, quæ simul thoraci, pectori & pulmoni parata sunt, aut hæc iis misceantur.

Parantur nimirum ex *fragaria*, *veronica*, *scabiosa*, *alchymilla*, *virga aur. sanicula*, & aliis huiusmodi. E. g.

℞. *Fragar. sanic. scabios. pulmonar. utriusque* an. ℥. ss. *alchymill. flor. rosar. rubr. scabiosæ*, an. P. ij. *iuiub. N. x.* Coq. in f. q. aquæ hord. f. Colaturæ ℥. ℥ss. j. adde *iulebi rosar.* ʒ. ij. Misce.

Vel ℞. *Achillææ, peruinæ, veronicæ, fragar. pulmonar. Gallic. tussilag. au. m. j. fol. labri Veneris, prunell. agrimon. scab. aster. Attic. sanic. arnog. an. m. j. rad. ang.* ʒ. j. Concisa infundantur in vini albi aqu. *scabios. tussilag.* an. ʒ. xxxij. *sacch. feni*, ʒ. iiij. Coq. in vase duplici oris, vj. Colentur. Dosis ʒ. ij. manè & vesperi.

Vel hoc, quod etiam in sclopetorum vulneribus commendatur.

℞. *Pulmonar. m. iij. artemisiæ, consolidæ acutæ*, an. m. j. *Ade sacch. opt.* ʒ. iiij. Coq. in vini & aq. ℥ss. ss. in vase duplici.

Vel ℞. *Hordei mundi*, m. j. Bulliat ad crepaturam. Postea adde *Herb. tussilag. veronic. scabios. pulmonar. maculosæ & quercin.* an. m. ss. *sanguisorb. consolid. Saracenic. alchymill.* an. P. ij. *cinamomi*, ʒ. iiij. *iuiubarum*, N. vj. *passul. vino ablut.* ʒ. ss. Coq. & colentur.

Commendatur in hunc usum etiam medicamentum, quod diaspermaton appellatur, & Galeno frequenter in usu fuit in vulneribus pectoris, 5. *meth. med. cap. 8. & 13.* Verùm quale illud fuerit, apud Galenum reperire non potui. Etiam si enim apud antiquos quædam diaspermaton descriptiones exstant, tamen huic scopo non planè satisfaciunt. Quia verò Galenus id medicamentum exhibuit, ut somnum conciliaret, & sensum doloris leuaret, nonnulli eius loco electuario Diacodion vtuntur, utpote quod, ut Galenus. *lib. 7. de comp. med. sec. loc.* docet in his, qui somno indigent, & quibus à capite in asperam arteriam

riam fluxiones fiunt, vtile est. Sed quia medicamento diacodium variæ exstant descriptiones, hanc huic affectui magis conuenire experientia comprobauit.

*℞. Capit. papauer. albi, N. x. nigri, N. v. iuiub. sebest. an. N. v. sem. lactuc. malu. an. 3. j. scariol. 3. ij. cydon. 3. j. s. Contusa infundantur, in aq. tb. s. vel s. q.*

Hinc coq. ad tertiæ partis consumptionem. Colaturæ adde *Myrrh. croci, hypocist. ataciæ, an. 3. s.* Atque iterum coqu. ad tertiæ partis consumptionem. Postea adde *Diatragacanth. albi, 3. ij.*

Tandemque add. vel mellis tb. s. & coqu. ad mellis consistentiam ac colentur, fiatque eclegma, vel decocto colato & ad mellis consistentiam cocto add. sacchari q. s. & fiat confectio in rotulis.

Æger in latere affecto decumbat, vt sanguis, qui in thoracem effusus est, per vulnus effluat commodius.

Si aliqua pars pulmonis è vulnere emineat, & liuescere ac nigrescere incipiat, atque ita corruptionis notas exhibeat, ea ferro abscindenda.

#### *Dieta.*

*Dieta.*

Victus primò sit tenuis, vt bona nutritio, etiam in pulmone procuretur. Abstineat æger ab acidis, acribus, salis, pinguibus. Utatur cibis boni succi, qui mediocrem vim adstringendi & emplasticam habent, ex ptisana, oryza, amylo, cydoniis, amygdalis. Vinum parum commodum est, nisi forsan virium debilitas id requirat. Æger tussim, quantum fieri potest, præcaueat, nec multum loquatur, nec magna respiratione utatur, nec rideat. Etiam sanatus motum vehementem caueat, & propterea non statim vel curru vel equo vehatur, vitet iram, clamores, Venerem.



## CAPVT XII.

## De ulceribus Pulmonum, &amp; phthisi.

**Q**UAM post vasorum pulmonis apertionem, vt & vulnera pulmonis sæpè vlcus pulmonis sequatur, restat tandem, vt inter morbos pulmonis de eius vlceribus dicatur. Quæ autem de vlceribus pulmonis dici possunt, plerique in capite de phthisi tradere solent; cùm vlcera pulmonis phthisis ferè sequi soleat. Quapropter & nos hoc capite aliquam phthiseos mentionem faciemus. Etsi enim ipsa phthisis non pulmonis, sed totius corporis affectio sit, causa tamen eius à pulmone prouenit.

*Φθισις*, quam Latini Tabem appellant; vocabulum in genere pro omni totius corporis extenuatione, & immutatione, quacunque de causa, & occasione orta accipitur, ita vt sub ea comprehendatur non solum ea corporis extenuatio, quæ ab vlcere pulmonis prouenit, sed & *ἀτροφία*, in qua corpus non satis nutritur, ob alimenti defectum, & *σύντηξις*, hoc est, colliquatio totius corporis, quæ in febribus quibusdam ardentibus, vt & hecticis diuturnis accidit, vt & *μεγαλομαθία*, seu immodica corporis totius ariditas & consumptio. Imò Celsus, l. 3. c. 42. ad tabem in genere dictam etiam refert Cachexiam. Nam etsi in hac corpus vniuersum laxum & humidum conspicitur, & propterea non extenuari, sed potius augeri videtur. tamen in ea verum augmentum non est, sed potius musculosarum partium ab humore aquoso & pituitoso repletio, partes enim ipsæ secundum suam essentiam alimento bono destituuntur. Vnde etiam vbi tandem malum in hydropem degenerat, partes superiores extenuantur, etsi abdomen aqua repletum tumeat.

Verum vsus obtinuit apud Medicos, vt in specie & frequentissimè *Φθισις* vocabulum de ea corporis totius extenuatione sumatur, quæ ab vlcere pulmonis prouenit, & Græcis aliàs *ιδίως*, & propriè *Φθίς*, vt ex Galeno 7. aphor.

*Definitio.*

16. & definit. medic. apparet, vt & πύλιν nominatur, vt Aretæus 1. de causis. & sign. diuturn. cap. 8. scribit. Quomodo phthisin definimus, quod sit totius corporis extenuatio & macies, à febre putrida & lenta, quæ ab vlcere pulmonis prouenit, ortum habens.

*Subiectū phthisis.*

Occupat nimirum hoc malum totum, & Phthisis totum corpus subiectum est, quomodo à priuata quarundam partium extenuatione differt.

*Phthisis causa.*

Extenuatio autem hæc prouenit à febre putrida, lenta & tandem etiam interdum hectica, quæ concoctionem alimenti in toto corpore impedit, & calore illo præternaturali id, quod concoctum & appositum est, absument. Febris autem ea ortum habet à putridis vaporibus ex vlcere pulmonis ad cor continuò exhalantibus, calorémque præternaturalem in eo accendentibus, qui per arterias cum sanguine & spiritibus in totum corpus diffusus totum corpus calefacit. Febris hæc continua est, lenta & putrida, id quod cum alia, tum vrinæ satis testantur. Accidere tamen potest, vt cum lenta ista febre aliæ febres complicentur, aliàs erraticæ, aliàs tertianæ modo inuadentes. Nam humores intra venas contenti à calore febrili à pulmonis vlcere excitato accensi, putrescentes sui generis febrem sæpè excitant, vnde etiam deliria ante mortem aliquoties obseruauimus, & pro cacochymia reliquum corpus occupantis ratione, paroxysmis quibusdam interdum ex interuallis, seu certis, seu incertis redeuntibus, phthisicorum febres exacerbantur. Id quod etiam in epidemiis constitutionibus accidere potest, vt ex Hippocrat. 1. Epidem. comm. 1. in fine videre est. Febres enim, quæ tanquam populares ex coeli statu, quem ibi describit ortum habuerunt, tabidos non minus, quàm alios homines corripuerunt. Accidere tamen etiam potest, vt calor ille lentus tandem hecticum sibi adsciscat & inducat.

*Causæ.*

*Vlceris pulmonis causæ. Proxima.*

Vlceris verò pulmonis, de quo hic agere præcipuè propositum, causæ sunt, quæcunque vel acrimonia vel putredine pulmonis substantiam erodere & corrumpere possunt. Præstantque hoc causæ vel proximæ vel mediæ

ta; internæ vel externæ. Interna & quidem proxima causa est humor acris seu naturâ suâ, scilicet biliosus & serosus; vel ratione acquisitæ putredinis talis, sanguineus nimirum vel humor pituitosus putrescens. Ersi enim si pituita sit dulcis & non nimis copiosa, in pulmone facile non putrescit, sed in sputum naturale abit: tamen si maiore copia ad pulmonem defluat, & bronchia pulmonis obstruat, ipsiusque substantiam humidiorē reddat, atque ibi diutius hærens idēdō non satis vētilari possit, putredinem & acredinem concipit: imprimis si natura iam aliquid acredinis participet.

Materia ista vel in ipso pulmone colligitur & gignitur, vel aliunde influit. In ipso pulmone ortum habet, cū aut in eo humores vitium contrahunt, aut ē vase eius seu rupto, seu eroso, seu vulnere aperto & omninō post sanguinis sputum, sanguis effusus putrescit, vnde Hippocrates, 7. aphor. 17. scribit: à sanguinis spūto, spūtum puris malum est: aut à peripneumonia aut pulmonis vomica introrsum rupta, aut à variolis vlcus in eo relinquitur.

Interdum verō aliunde in pulmonem influit, cū scilicet ex vicinis partibus, inflammatis, pleura, mediastino, diaphragmate, aspera arteria materia eō fertur, vt & dum in empyemate pus pulmonem corrumpit, de quo Hippocrates, 5. aphor. 15. Qui ex pleuritide empyj fiunt, si à ruptione empyematis intra aies quadraginta repurgantur, liberantur, alioquin transeunt in tabem. Imprimis cū à capite catarrhi frequenter ad pectus defluunt, quorum materia nunc naturâ sua acris est, nunc cū in pulmonibus corrumpitur, acrimoniam acquirit, de quo Hippocrates, 7. aphor. 38. destillationes in ventrem superiorem ad suppurationes perueniunt intra dies viginti.

Pertinet huc pulmonis à primo ortu vitiosa constitutio, quando pulmonis substantia vitio seminis parentum mollis est, & ad corruptionem propensa, vt sensim ætatis decursu flaccescat & spontē corrumpatur. Nam vt liberi parentibus similes sunt quoad externa lineamenta; ita & quoad partes internas. Vnde in quibusdam fami-

liis tanquam morbus hæreditarius grassatur phthisis, nulla etiam humoris ad pulmones destillatione aut transmissione accedente. Et Galenus, 4. de loc. affect. cap. ult. scribit nonnullos citra manifestum pulmonum vlcus phthisicorum more decessisse, qui primum flaua quædam non acria, deinde purulenta, tandem etiam pulmonis particulas expuerunt, sine omni cruore, aut hoc admodum exiguo. Hos simili affectu laborasse censet, qualis in externis partibus aliquando conspicitur, vbi cum putrescente humore pars corumpitur & pus aut sanies ab ea emittitur, nullo cruore mixto. Etsi enim in talibus neque vas vllum ruptum sit, neque aliunde etiam humor in pulmonem effundatur: tamen ob innatam debilitatem acris humor colligitur in eo, qui tandem pulmonis substantiam corrumpit, & vlceri simile quid inducit, vnde meritò ad phthisin hic effectus refertur. Hos Hippocrates *φθισιδες* & *πλησυσιδες*, appellat 3. epidem. text. 70. de quibus postea dicemus.

*Externa.*

Inter causas externas, quæ proximæ & solæ pulmonem corrumpere & in eo vlcus excitare possunt, est primò contagium; vnde rectè ab Aristotele, 7. problem. 4. & à Galeno, 1. de differ. febr. cap. 2. phthisis inter morbos contagiosos refertur, nec tuta satis cum phthisicis conuersatio habetur, cum *μιάσμα* illa, quæ phthisici exhalant, ab aliis cum aëre in pulmonem attracta similem in eo dispositionem inducant, & hinc vlcus ac phthisin excitare valeant. Deinde lepus marinus, & si quæ sunt alia venena, quæ occulta proprietate pulmonibus aduersa sunt, eosque exulcerare possunt.

*Mediana.*

*Interna.*

Reliquæ causæ omnes siue int. siue externæ mediatae & remotiores vlcer. pulmonis causæ sunt. Inter mediatas seu antecedentes vlceris pulmonis causas, sunt humores vitiosi in corpore collecti, qui vbi postea vel à capite, vel aliunde ad pulmones confluunt, vasa in iis aperire pulmonesque exulcerare valent. Pertinent huc & menses suppressi, de quibus Hippocrates, lib. 1. de morbis mulier. Nonnullis mulier. cum sint menses duorum mensium spatium in utero existerunt, vbi intercepti fuerint ad pulmo-

nem feruntur, eadēque omnia his contingunt, quæ in tabe dicta sunt. Quod facit corporis constitutio ad phthisin procliuis, qualis est illorum, quos Hippocrates, *Πρωΐδες & Ἀποπρωΐδες*, appellat 3. *epidem. comm. 3. text. 70.* qui ut Galenus in *comment. & 1. epidem. comm. 1. text. 18. & 2. de temperam. c. 6.* explicat, adeo angusto sunt pectore ac restricto, ut à tergo in morē alarū promineant operta scoptula. Præsertim si ob substantiæ mollietis & hæreditariam constitutionem vitiosam, de qua antea diximus, plurimum in ipsis excrementi colligatur. Sunt etiam ad phthisin procliues, quibus caput faciliè impletur, quodque ad spiritus organa multas destillationes demittit. Atque hæ duæ causæ si in unam coeant, thoracis scilicet figura & capitis imbecillitas, eo facilius iis, quibus obtigerunt, tabem inducunt.

Externæ sunt aër vel nimis calidus, resoluens materiam acrem in capite, ut ad pectus defluat; vel frigidus cōstringens & exprimens, aut vasa pulmonis densando & angustiora reddendo, ea ad rupturam aptiora efficiens, aut etiam tussim vehementem, qua vasa pulmonis rumpuntur, excitas. Imprimis verò aër autumnalis, qui sua inæqualitate frigoris & caloris acutas & falsas destillationes mouet, & ad phthisin propensos insigniter offendit. Vnde Hippocrates, 3. *aph. 10.* scribit: *Autumnus tabidis noxium esse, & ibidem aphor. 13. Aestate sicca & aquilonia, autumno pluuioso & australi vehementes capitis dolores in hyemem & tusses & rauitates & grauedines; nonnullis etiam tabes expectanda: & 22. autumno æstiuos etiam multos morbos & febres quartanas & erraticas, aquam inter cutem, phthisin fieri.* Quod pertinet & regionum constitutiones, quæ frigida & humida, huius effectus germanæ sunt, ut Aretæus, *lib. 1. de sign. & caus. diurn. cap. 8.* loquitur; fumi metallorum, & mora in specubus subterraneis. Deinde cibi potusque acres & falsi, & qui caput vaporibus eiusmodi replent, & alia omnia, ob quæ excrementa acria in capite generantur & pulmōni communicantur. Præterea causæ omnes quæ vasa pulmonis rumpere & aperire possunt, thoracis contusio, vocis nimia intentio, & similes, thoracis vulnera penetrantia.

Vnde Hippocrates, *lib. de aëre & aquis & loc.* tabem etiam frequenter à partu contingere scribit. Violentiâ enim rupturis & vulneribusprehenduntur.

Pertinent huc aphorismi Hippocratis, 3. *Aphorism.* 29. *ναίοντος sanguinis exspuitiones, tabes, febres acutæ, aliq̃ morbi, sed præcipuè nunc dicti.* Per *ναίοντος* autem & adolēcentes & iuuenes intelligit, vt ipse 5. *aph.* 9. explicat, dum scribit: *Tabes iis maximè ætatibus fit, quæ sunt à decimo octauo ad tricesimum quintum.* Non quidem, vt Galenus, in *comment.* explicat, secundum ætatis naturam, sed ex accidenti ipsius quopiam, quia scilicet vel vulnus acceperint, vel contusi sint, vel saltauerint, vel vehementius & contentius vociferati vel refrigerati fuerint, vel humi cubauerint, vel plenitudine nimia aut eiusmodi occasione aliqua in sputum sanguinis inciderint. Ad sanguinis verò sputum tabes censequitur. Quibus & hoc addi potest, quod hac ætate sanguis abundat & à calore funditur, humorēque acres cumulantur, vnde sanguis abundans & calidus vasa rumpere, & humores acres à capite in pulmones elapsi eos erodere possunt.

#### Differentiæ.

Differē-  
tia phthi-  
sis.

Differentias tabis quod attinet, eas quidem nonnulli plures recensent: verum propriè & in specie dictæ tabis, de quâ hîc nobis sermo, tales differentiæ non sunt, quæ omnem corporis contabescētiā, extenuationem & ficitatem, à quacunque causâ profectam, comprehendit. Ob curationem tamen non prætereunda videtur differentia, quod phthisis alia ortum habet à catarrho à cerebro ad pulmones defluente; alia citra hunc ex vasorum pulmonis ruptione, erosione, vel pulmonis aut pleuræ inflammatione suppurata.

#### Signa diagnostica.

Signa  
phthisis  
incipien-  
tis.

Signa & notas huius mali quod attinet, cum vlcus pulmonis & phthisis saltem in principio curationem suscipiat, confirmata verò & inueterata non curetur, & incipientis & perfectæ ac desperatæ phthiseos notas perspectas habere vtile est. Incipientis autem phthisis signa sunt, tussis diuturna & sputum rotundum diutius apparens, quod

quod materiam crassam à calore excedente in pulmone condensari indicat, quæ temporis tractu acredine acquisita pulmonem exulcerat, ut ex Galeno, 6. epidem. comm. 3. t. 36. videre est. Interdum aliquid cruenti reiicitur, & hoc subsistente sordidum & purulentum aliquid. Corpus totum extenuatur, & nullum post cibum sumptum corpori robur accedit, febris adest lenta & continua. Quæ signa omnia confirmantur, si phthisis, illa corporis dispositio, de qua supra dictum, adsit, aut familia illa phthisi obnoxia sit, parentesque vel fratres aut sorores phthisi perierint. Præcesserunt causæ, quæ pulmonem exulcerare possunt, sputum sanguinis, destillatio acris & falsa diu perseverans, & aliæ causæ supra propositæ.

Perfecta autem Phthisis ex iisdem signis cognoscitur, sed iam evidentioribus & augmentum fumentibus. Si quis enim vel plebeius hominem viderit pallentem, imbecilem, tussientem, macie confectum, hunc vera phthoe laborare pronunciat, ut Aretæus 1. de sign. & caus. diuturn. c. 8. scribit. Cognoscitur nimirum perfecta phthisis ex pulmonum ulcere, febre lenta, continua & hinc sequente totius corporis macie & extenuatione, ac difficili respiratione.

Ulcus autem pulmonis signum est pus per tussim reiectum. Ulcere enim serpente ac sordescente pus excernitur, ac sputa sordida reiiciuntur, quorum, ut Aretæus, loco alleg. loquitur, infinitæ propè sunt species, lividorum, acrorum, purorum ac sincerorum, aut pallido alboque, aut albo & viridi mixtorum, latorum, rotundorum, durorum, glutinosorum, aut variorum diffluentium, aut odore carentium aut fædè olentium. Quia verò pituita crassa & ipsa puri similis est, imò catarrhi interdum in pectus delapsi, præsertim in iuuenibus, deducuntur ad quandam consistentiam puri similem, unde ob putredinē fiunt febres, & corporis macies sequitur; phthisis tamē reuera non est, cum caro aliqua regeneretur: affectus hinc à vera phthisi discernendus est. Vulgò docetur, pituita à pure duobus discerni, primò, quòd pus vel per se vel certè igni & carbonibus iniectū foetidū odorē reddat, qui in pituita non deprehendatur. Deinde quòd pus in aquam tepidam proiectum descendat, quod pituita cruda non

non faciliè faciat; agitatum quoque faciliè dissoluatur, quod à pituita è capite delapsa, & in pectore concocta non accadat, quæ ob lentorem non faciliè dissoluitur.

Verùm Aretæus, *loc. alleg.* hanc explorationem non ita necessariam esse existimat, scribitque, *Quicumque aut igne, aut aquâ humiditates hinc explorat, ac notat, hunc videri haud ita multum phthoen dignoscere.* Nam, vt addit, visio quolibet alio sensu certior est, non modò iis, quæ reiciuntur, intuentis, sed & ægrotantis specie consideranda. Si quis enim, vt antea dictum, vel plebeius hominem viderit palentem, imbecillum, tussientem, macie confectum, hunc reuerà phthoe laborare pronunciat. Neque vt in aliis etiam partibus, omne pus foetidum est, sed in vlcerebus saltem fordidis. Ideoque Hippocrates non omni phthisi sputum grauitè olens tribuit, sed læthali saltem ac perniciosæ, §. *aphor.* II. Sunt tamen graueolentiæ quidam gradus. Rarò omnis foetor à vera phthisi abest, quod vel anhelitus foetidus testatur, ipsique ægri expuentes ferè grauem odorem percipiunt: maior tamen est graueolentia in lethali phthisi. Febris est continua, lenta, putrida, vt suprâ dictum, quæ tamen noctu exacerbatur & emicat. Totum corpus absumitur & extenuatur. Quibus accedunt & alia: Tussis est molesta, quæ qualia memorauimus reiciuntur. Respiratio est difficilis, non solùm ob facultatis imbecillitatem, sed & quia bronchia pulmonis obstruuntur, tum ob puris copiam, quæ ab vlcere in ea transmittitur, tum ob multa excrementa, quæ in pulmone debilitato colliguntur. Quibus accedit quod ipsum viscus vlcere debilitatum & sæpè magna ex parte consumptum materiam collectam satis reicere non potest. Pulsus inæqualiter sese habent, modò sunt languidi, modò sunt celeres, nunc duri, nunc molles: molles quidem ob materiam humidam arterias humectantem, duri autem vbi calor exsiccauit. Sæpius etiam subdunt phthistici, ob facultatis naturalis debilitatem, quæ & naturales humores & excrementitios retinere nequit. Malo tandem confirmato inueteratoque pus in dies magis foetidum redditur, & sæpè putris pulmonum portio, & bronchiorum



ac vasorum pulmonis ramenta aut crustulæ quædam tussim reiciuntur. Fauces, ut Hippocrat. *l. de intern. affect.* habet, sono implentur & veluti per arundinem sibilum reddunt. Tandem capilli desluunt, ob alimenti corruptionem & penuriam. Ungues incuruantur, absumpta carne, quæ in summis digitis existerat, unguësque firmabat. Mæliæ liuescunt, nisi quod post sumptum cibum sit, vaporibus sursum eleuatis, rubescant. Pediculi copiosè generantur ob alimenti corruptionem. Extrema & pedes calore languesciente intumescunt. Superuenit denique his omnibus diarrhœa ex retentricis ventriculi & intestinorum imbecillitate; imò & humorum corruptione. Nonnulli etiam ante mortem mente vacillant, sed sine aliqua furoris commotione. Atque ita tandem ob febrem, sudores, alui profluuium, consumpto toto corpore, sputoque ob virium imbecillitatem retento, mors sequitur.

## Prognostica.

I. Omnis Phthisis grauis & periculosus morbus est, *Prognostum* ob causam, vlcus scilicet pulmonis, quod curatu *astica.* est difficillimum, tum ob symptomata & quæ id consequuntur, febrem, totiusque corporis consumptionem. Est verò vlcus pulmonis curatu difficile, non tam ob pulmonum motum continuum, quàm quòd sanies & pus in molli & spongiosa illa carne hærens citra tussim expurgari nequit, quâ pulmones in dies magis læduntur. Quibus accedit, quod medicamenta integris viribus tanto intervallo ad pulmones non perueniunt. Reddit quoque febris adiuncta & hanc sequens corporis consumptio curationem difficilem. Febris enim & macies corporis humectantia requirunt, quæ vlcери nocent: contrà vlcus detergentia & siccantia postulat, quæ adiunctæ febre & corporis consumptioni non conueniunt. Hinc Gal. *5. meth. med. c.* 8. concludit, quòd rupto in pulmone vase, nisi statim, antequam phlegmone accedat, vlcus sanetur, exigua sanationis spes supersit. Licet enim diligentia adhibitâ vlcus interdum siccetur, & labris eius nonnihil induratis, & quasi callo obductis spes aliqua affulgere videatur: tamen leui occasione callo decedente malum recrudescit, ut idè *4. de l. aff. c. 5.* docet.

2. Etsi verò phthisis, si vlcus sit profundum & diuturnū, planè incurabilis, quæ verò ab vlcere iparuo & non diuturno prouenit, & ipsa curatu difficilis est: non tamen planè incurabilis est, si maturè ei conuenientia remedia adhibeantur, & passim exempla cūratorum phthysicorum à Medicis annotata reperiuntur, quorum aliqua collegit Ioh. Schenck. *l. 2. obseru.* 144. 145. 146. de qua re infra in quæstione dicetur.

3. Est præterea phthisis sæpe malum diuturnum & quod in multos annos protrahitur. Refertque Auicennas, *lib. 3. fen. 10. tract. 5. c. 18.* se vidisse mulierem phthysicam vixisse circiter viginti tres annos: & Matth. de Gradibus, *in 9. Rhaf. cap. 54.* aliam mulierem phthysicam, quæ circa furnum & ignem quotidie occupabatur, plus viginti octo annis vixisse scribit. Cuius rei exempla alia apud alios Medicos occurrunt.

4. Phthisis ex vlcere, ex erosione in pulmone facto, ferè insanabilis est. Nam longiore tempore ad hoc vitium corrigendum opus est, vt Galenus, *5. meth. med. c. 8. & 24.* docet. In tempore autem longo alterum duorum fiat necesse est. Vel enim, si vlcus vehementer exsiccare conamur, antequàm acrimonia humoris satis obtusa sit, id non consequimur; vel si humoris acrimoniam corrigere studemus, fordidum interea fiet vlcus & incurabile.

5. Hippocrates, *2. prorrh.* sex signa proponit, quæ in conualituro apparere debent. Eum, inquit, qui probè liberari volet, oportet facile sputum per tussim reiicere, idque album & æquale & eiusdem coloris & ἀφλίγματος. Quod verò à capite defluit, oportet ad nares conuerti, (ne scilicet malum ex affluente in pectus humore augeatur.) Febrè autem non inuadere (putridam scilicet noctu) quæ coenam prohibeat; neque sitim faciat. Alius autem quotidie deiciat, & id, quod egerit, durum sit, (seu consistentia mediocri non fluidum) copia iis, quæ assumuntur, respondens. Hominem verò ipsum quàm minimè extenuari conuenit. Pectus autem quadratum & hirsutum, cuiusque cartilago exigua & admodum carnosæ est. In quæ hæc omnia inueniuntur, maximè superstes erit: Qui verò

verò nihil horum habet, interitui proximus est.

6. Nimirum sputum, quod phthifici expuunt, vel per se, vel carbonibus iniectum grauiter olet, & capilli desluunt, periculosum signum est, 5. aphor. 11. quod magnam corruptionem in substantia pulmonis, & alimenti penuriam vel corruptionem significat. Superueniente autem alui fluxione tabidi moriuntur, & in propinquo mors est, *ibid.* aph. 11. quam & facies Hippocratica dicta, 1. progn. descripta denotat.

Quod idem docetur, lib. 2. de morbis. Siquidem inquit, autumnus, iam capilli ex capite huic desluunt, caputque velut ex morbo nudatur, & super prunas expuente sputum grauiter olet, hunc intra breue tempus periturum asseritur, & ex alui profluvio periturum. Vbi enim iam pus circa cor computruit, id prunis impositum nidorem exhalat, & vna incalescens cerebrum salsuginem emittit, quæ aluum ciet; cuius rei indicium est, quod capilli è capite desluunt. Hunc, cum ita habuerit, non curato. Quo loco Autor fluxus alui phthificis superuenientis vnicam causam ponit humorem salsuginosum è capite desluentem; Verùm frequentior huius symptomatis causa est virium naturalium summa imbecillitas, & interdum etiam acris sanies & pulmonibus vlceratis resultans.

7. A puris sputis phthisis & fluxio: cum verò sputum retentum fuerit, moriuntur, 7. aph. 16. Tandiu enim, vt Galenus, in comm. addit, phthifici viuunt, quamdiu extussire, & per sputa pulmonem expurgare possunt. Vbi verò intus ipsa remanent, respirationis obstruuntur viæ & ægri suffocantur.

#### Indicationes.

Cum ergò phthisis malum tam periculosum sit, mature ei occurrendum. Et quamuis incurabilis plerumque videatur, tamen ægri sine auxilio non sunt relinquendi: cum non solum, quod Auerroes dixit, quandoque monstra in Medicina fiant, & qui desperati videbantur, sanitati restitutos fuisse, sed etiam nonnullos, licet non planè conuauerint, adhibitis idoneis medicamentis, vitam diu protraxisse, historię medicæ passim annotatæ testentur.

Indicationes.

Atribus autem hæc Indicationes sumuntur, ab vlcere pulme

pulmonis, à febre, quæ coniungitur, & à corporis totius macie & consumptione. Indicatio autem præcipua in phthisi ab ulcere pulmonis, ut fonte & causa huius mali, petitur, quo sanato & febris evanescit, & corpus iterum incrementum sumit. Vlcus autem abstergendum, substantia pulmonis regeneranda, tandemque vlcus consolidandum. Febris refrigerantia & humectantia indicat. Corpus tandem exsiccatum & extenuatum humectandum & nutritione instaurandum. Quæ indicationes cum sint contrariæ, ita moderandæ, ne dum vni attendimus, alterum negligamus. Et quidem si spes sanandi ulceris adhuc supersit, cura præcipuè ad vlcus dirigenda. Quod si res iam planè deplorata & nulla spes ulceris curandi amplius supersit, humectantibus solùm, refrigerantibus & nutrientibus corpus extenuatum reficiendum. Sic enim vita aliquandiu protrahitur. Quo in casu etiam medicamenta, quæ ulceri conueniunt, & corpori extenuato profunt, ita misceri & temperari possunt, ut medicamenta vna parte vlcus purgent, abstergant & siccent, altera verò corpus reficiant.

*Curatio.*

Primò ergò ulceris curationem quod attinet, etsi plerumque hunc scopum, ut difficiliorem minus accuratè persequuntur: tamen cum reliqua curatio, febris puta & corporis extenuati instauratio, fieri non possit, nisi vlcus sanatum fuerit, omninò de ulceris curatione diligenter dispiciendum. Etsi autem ulceris consolidatio naturæ opus sit: tamen Medicum remouere oportet impedimenta, quæ naturam in opere suo remorari possunt.

Primò nimirum humores siue in toto corpore, siue in capite consistentes & ad pectus affluentes, sunt euacuandi, & corpus à cacochymia liberandum. Si enim cacochymia in toto adsit, & humores affluentes malum augeant, & foueant, febrémque ipsam grauiorem reddant, tabésque ipsa nondum confirmata sit, lenia purgantia, quæ simul thoraci & ulceri prodesse, & fluxionem humorum auertere possint, exhibenda. Tale medicamentum est *Rhabarbarum cum infusione rosarum & sere caprino datum*. Item *rhabarbarum cum passulis maioribus sumptum*, aut *conserua*

ros. cum rhabarb. data: syrup. item ros. solut. ius galli antiqui, in quo manna dissol. fit. Potest & cassia usurpari.

Ius galli antiqui sic paratur :

℞. Gallum antiquum, & in ventre eius ponantur sequen- *Ius Gal-*  
tia. *li.*

℞. Passul. mundat. part. xx. iuinb. sebesten. an. N. x. medullæ sem. cartbami, ʒ. vj. Coq. in aqu. fʒ. vj. ad consumptionem tertiæ partis. Utatur manè iusculo. Potest & manna ʒ. j. vel ʒ. ij. addi.

Vel ℞. Decocti scabios. tussilag. sem. melonum. trium fl. cordialium, an. ʒ. iv. In quibus dissolue, manna, ʒ. j. β. syr. viol. ʒ. j. Misce. Vel ℞. Flor. cassiæ, ʒ. j. pulv. glycyrrh. ʒ. j. Cum saccharo Fiat bolus.

Vtiles sunt & Clysteres lenientes, qui excrementa non solum euacuare possunt, sed & corporis caliditatem, & siccitatem emendare. Validioribus verò purgantibus medicamentis hîc nullus locus est, vt & sanguinis missioni: cum corpus extenuatum & consummatum, virēsque deiectionem non admittant. Et licet Hippocrat. 5. epidem. & Galen. 6. epidem. comm. 3. t. 29. tabidis seu extenuatis venam cum commodo aperuerint: phthistici tamen ij non fuerunt, sed graciles & extenuati, vel ob calorem sanguinis nimium, vel ob eiusdem euacuationem suppressam. Et licet etiam nonnulli purgantibus fortioribus, vt pilulis cochliis & similibus vtantur: id tamen potius imminente, & præsertim ob catarrhum, phthisi, quàm iam præsentem locum habet. Imprimis verò videndum an malum adhuc à catarrho à capite destillante foueatur. Tum enim danda opera, vt is quamprimum sistatur & à pectore auertatur. Nam frustra in curatione ulceris pulmonis tempus teritur, nisi fluxio prius cohibita vel alio conuersa fuerit. Qua ratione autem hoc præstandum sit, ex doctrina de catarrho patet. Et si fluxio sit diuturna, nullo tutiore inter initia remedio materia aliò auertitur, quàm fonticulo in altero vel vtriusque brachio aperto. In morbi verò progressu æger iam imbecillior frustra cauteriis vel fonticulis cruciatur.

*Curatio  
mali à  
catarrho.*

Deinde ipsum vlcus pulmonis quod attinet ad eius *ipsius*

*ulceris  
pulmonis  
curatio.*

curationem duo medicamentorum genera requiruntur, abstergentia & consolidantia. Primò ergo adhibeantur ea, quæ vlcis deterfioni inferuiunt, & quod deterfum est, tussi & sputo leniter educere valent ( expectorantia vocant ) ne sordes in pulmone subsistant eúmque amplius corrumpant. Huic vsui inferuiunt *aqu. saccharata* & *aqu. malsa*. Nam mel crudum valdè abstergit, Fortiora sunt, *succus caulium*, *tussilago*, *capill. Vener.* *hyssopus*, *scabiosa*, *marrubium*, *agrimonia*, *radix iridis*, *aristolochiæ*, *helenij*, *terebinthina* & ex his parata medicamenta.

Vt *℥. Marrubij m. j. hyssopi, scabiosæ an. m. ℞. Coq. in aqu. ℥. iij. ad tertiæ partis consumptionem, adde mellis, ℥. ℞. Iterum ebulliant & despumentur.*

Vel *℥. Butyri recent. s. sale ℥. ij. terebinthina abietis pelliculæ ℥. j. mel. el. ℥. iv. M. F. bolus.*

Postquam vlcus deterfum est, glutinationi incumbendum. Inter glutinantia autem medicamenta facilè primas obtinent *rosæ*, *bolus Armenus*, *terra sigillata*. Quibus addi possunt *lapis hematit.* *radix symphiti maj. consolidamedia*, *plantago*, *scabiosa*, *pulmonaria*, *pulmonaria Gallica tenuifolia* *Tabernæ montani*, nonnullis herba *costa dicta*, quæ species *beracij* est, *veronica*, *hedera terrestris*, *botrys*, *ros Solis*, *sanic. flores hyperici*: è quibus varia medicamenta parantur, quibus etiam *Pulmo vulpis*, & alia peculiariter pulmonis dicata admisceantur. Auicennas, *lib. 3. sen. 10. or. 3. c. 6.* Miris modis commendat conseruam rosarum, refertque mulierem quandam phthisicam & morti destinatam eius vsu ita curatam fuisse, vt non solùm sana, sed & pinguis redderetur. Idem Mesueus, *τ. de phthisi*, & alij medici testantur. Vis enim abstergendi & consolidandi rosis inest, saccharumque etiam abstergit, simulque nutrit. Sunt tamen quædam conditiones in vsu conseruæ rosarum obseruandæ. *Prima* est, vt *Mes. loc. all.* monet, vt abstergentia & mundificantia præmittantur, ac proinde initio conserua ros. recens, quæ plus succi, ac proinde vim abstergendi maiorem habet adhibeatur. *Secunda*, vt magna quantitate exhibeatur, & quotidie, imò cum pane & cibo ac potu sumatur. *Tertia*, vt si ob eius vsum sputum retineatur, & difficilis

facilis respiratio reddatur, syrupus de hyssopo, vel alia expectorantia per intervalla exhibeantur. Vtilis est & conferua pilosellæ.

Conferuæ rosarum & alia enumerata medicamenta commodè miscentur, vt terra sigillata, bolus Armenus, syrupus vel puluis symphyti maj.

Vt ℥. Conferu. ros. ʒ. iij. pulu. rad. consolid. ʒ. j. B. bol. arm. pulm. vulp. an. ʒ. iij. cum syr. myrt. F. electuarium.

Vel ℥. Conf. rosar. ʒ. iv. loch de pulm. vulp. ʒ. j. spec. diatr. frig. ʒ. ij. boli Armeni, terr. sigill. lap. hæmat. rad. symphyt. 2n. ʒ. j. cum syr. myrtino F. Linctus.

Vel ℥. Radic. rormentill. m. j. Coq. in vino ad consumptionem tertiæ partis. Adde conf. ros. antiq. ʒ. iij.

Vel ℥. Millefol. vulgaris. m. iv. millefol. purpurei m. ij. herb. & radic. torment. pimpinell. an. m. j. Contusis adde conf. ros. antiq. ʒ. iv. Affunde aq. symphyt. plantag. an. ʒ. xxxij. tormentill. pinpinell. an. ʒ. xvj. Coq. in vase duplici Colentur.

Vel ℥. Pulu. pulmonar. aurea ʒ. j. conferu. ros. antiq. ʒ. iv. Cum syr. myrtino. F. Electuarium.

Langius aquam hederæ terrestris cum sacch. ros. ant. nouem diebus potam laudat.

Pertinent huc & aquæ, quæ ex pulmone & epate vituli destillantur.

Vt ℥. Veronica, hederæ terrestris, botryos, saluæ, pulmonarie aurea, pilosellæ, an. m. j. radic. tussilag. ʒ. j. Infundantur in aq. hederæ terrestris, pimp. vini albi, an. lb. j. B. horis 24. addito pulmone & epate vituli conciso. Postea destillantur. Potest & conf. rosar. addi, vel in destillato dissolui.

Vel ℥. Cancror. N. LX. Coq. in lacte caprino. Postea ℥. pulmones & epar vituli, similiter decoquantur in lacte caprino & probe contundantur, iisque adde fol. saluæ minor. passul. minor. an. ad pondus cancrorum & pulmonum M. Postea ℥. Glycyrrh. lb. B. fol. scabios. cum flor. quart. j. hyssopi lb. B. Agitentur probè & destillantur per Alembicum. Aqua seruetur in vitro, cui iniice Manus Christi perlat. q. v. Dosis manè, in meridie & vesperi cochlear. ij.

Mercatus hunc syrupum commendat.

*℞. Hordei torrefacti ℥. iiij. cancrorum fluuiatilium bene lotorum & crasso modo contusorum N. xij. capill. Veneris. polyt. an. m. ℞. parietariae, hyssopi, helen. verbenae. verbasci, sol. vrtic. an. m. j. baccar. lauri sem. papau. albi, an. ℥. ℞. iuiubar. sebest. passular. an. ℥. j. carnis testudin. prius lotae vino albo, ℥. ij.*

Bulliant omnia ad perfectam coctionem. Col. *℥. ℞. iiij. sacch. albi, ℞. ij. F. syrupus, de quo æger sumat manè ℥. ij.*

Insignem quoque Phthysicorum vlcera curandi vim habet decoctum ligni Guaiaci, & à plurimis doctissimis Medicis, Franc. Arcæo, *lib. de vulneribus & febribus cur.* Thoma Erasto, *in consiliis à Scoltizio collectis consil. 88.* atque aliis commendatur. Est & utile decoctum rad. *Chine.* Quanquam enim ista decocta corpus exsiccare videantur: tamen commodum, quod ex vlcere pulmonis sanato prouenit, longè maius est. Cum enim macies illa corporis ex vlcere pulmonis ortum habeat: decocta talia causam extenuationis corporis tollendo, vitiosos humores absumendo, & vlcus curando, faciunt, vt corpora extenuata iterum benè nutriantur, & pingua reddantur: id quod ipsa experientia sæpè docuit. Febris tamen ratio habenda. Nam si hectica coniungantur, ab his abstinendum. Veteres valde exsiccantibus utebantur, quibus callus vlceri pulmonis induceretur, vt *iberiacâ, mithridatio.* Galenus, *5. meth. med. cap. 6.* ad sputum sanguinis ex erosione, vt materia purulenta in vlcere absumatur, vlcusque claudatur *pastillus Pasionis, Andron. Polyidæ* vitur. Dioscorides sulphur vinum exhibet. Hinc Chymici commendant contra phthisin è sulphure parata medicamenta, vt *sulphuris flores, balsamum, & lac. E. gr.*

*℞. Lactis sulphur. ℥. ℞. magister. corallor. perlat. an. ℔. ℞. emuls. sem. melon. cum aq. tussilag. vel veronic. factæ, ℥. ij. iuleb. rosar. ℥. vj. aq. cinamomi, manus Christi. perl. an. ℥. ij. M.*

Non solum autem ad exsiccationem vlcerisque glutinationem interna medicamenta faciunt, sed & externa vtilia sunt, si scilicet eorum vapor & halitus per os, vel per nares inspiratione attrahatur. Quod vel aer docet, de quo infra in diæta dicetur. Per os vt attrahantur, medicamenta idonea in vino vel liquore conueniente coqui, &

eorum



eorum vapor excipi atque attrahi potest, vel pulvis conueniens ex *thure, mastiche, rosis, myrrha, benzoe carbonibus*, aut ferro candenti inspergi, idemque fumus spiritu attrahi potest. Dioscorides etiam suffitus sulphuris utitur.

Per nares quæ attrahuntur sunt suaueolentia, quorumque vapor inspiratione attractus vlcus exsiccare potest. Talia describit Aëtius, *tetrab. 4. serm. 4. c. 113. 114. & 115.* ad quorum imitationem & alia componere licet ex *thur. myrrha, rosis, ladan. benzoe. santalis, cinam.* Recentiores commendant suffitum ex *nicotiana* seu *tabaco*. Habentque hæc, quæ cum aëre attracto miscentur, suffimigia & odoramenta præ reliquis hanc prærogatiuam, quod vlcus siccant, reliquum tamen corpus non ita afficiunt. Aëtius, *tetrab. 2. serm. 4. c. 67.* etiam topica applicat in phthisi. Initio quidem, dum materia præparatur ad educationem per tussim, cataplasma ex *alibea & sem. lini contusis & cum decoctione mali. & sænigraci, & cum oleo & melle mixtis.* Dum tussi expurgandum est, epithema ex *terebinthina, oleo irino, butyro, medulla cerui, adipe tauri, farina iridis, æsipo, partibus equalibus mixtis.* Dum cicatrix inducenda est, *oleo rosar. myrtino cum acacia, malicorio, hypocistide, alumine scissili, gallis, sumach,* additis, postulante usu, quoque aliis, sicut apud ipsum videre licet. In concoquentibus tamen & tussi expurgantibus ea cautio adhibeatur, ne intempestiuo illorum usu exulceratus pulmo magis offendatur. Tutius *καλλυγῆς & ἐπωλεπικῆς* suo tempore utimur.

Corporis extenuationem & maciem ac febrem quod attinet, illi per ea, quæ ad corpus nostrum instaurandum faciunt, succurrendum; hæc per refrigerantia & humectantia tollenda. Ad corpus instaurandum faciunt, quæ alimentum boni & multi succi præbent, quæ ex pulpis carniū gallinarum, caponum, phasianorum, perdicum, cancrorum, fluuiatilium vel nostrorum gammarum sumuntur, de quibus postea in diæta dicetur. Et commodissima hic sunt iura instaurantia seu consummata dicta. Vtilis sunt & alij cibi, ut & medicamenta; quæ parantur ex *hordeo, amygdalis dulc. pineis, pistaceis, seminibus 4. frig. maj. excorticatis, amylo, tragacantha, gummi Arab. saccharo penid.* Hinc ex-

hiberi potest cremor hordei vel auenæ cum emulsione amygdal. dulc. cui aliquid pulueris Hali, de quo postea, cum conseru. rosar. addi potest.

Commodissima autem hîc sunt medicamenta, quæ omnibus scopis satisfaciunt, vlcus nimirum consolidant, corpus emaciatum instaurant, caloremque febrilem mitigant. Inter quæ primas facillè lac tenet, & quo, vt Galen. 3. de med. facult. cap. 16. de cibis boni & mali succi c. 4. 5. meth. med. c. 16. 7. 2. meth. med. cap. 6. docet, curandis phthificis vix quid præstantius datur, vt postea de diætâ dicetur. Et vt efficacius sit lac, virisque medicamentosas, quæ expetuntur, acquirat, potest animal, cuius lac expetitur, in conuenientibus pascuis nutriri, qualem ad pascua locum describit Galenus, 5. meth. med. cap. 12. & 10. meth. med. c. 11. vel capris plantæ phthificis conuenientes loco pabuli præberi possunt. Vtile est & hoc.

℞. Oxygalæ seu lactis, è quo butyrum sit separatum, lb. 8. Stet nocte vna sub dio, & postea fortiter agitetur, & spuma detrahatur. Postea adde Conseru. rosar. 3. 8. Boli Armeni, 3. j. M.

Commendatur à plurimis etiam puluis Haly Abbatis, l. 6. præf. c. 11. descriptus.

℞. Papau. alb. 3. x. gummi Arab. amyli, an. 3. iij. sem. port. maluæ. althææ. an. 3. v. cucurb. cucum. citrull. cydonior. an. 3. vij. spody, glycyrrhiz. tragac. an. 3. iij. F. puluis.

Valescus de Taranta addit sacchari penidij ad pondus omnium. Atque isto puluere & sequente electuario Valescus de Tarant. monachum phthificum iam deploratum se curasse refert.

℞. Corall. rubr. carabe, lycij, terræ sigill. hypocistid. amyli, spody, glycyrrhiz. & succi eius, sem. 4. frigid. maj. min. gumm. Arabic. tragacanth. rosar. rubrar. an. 3. j. pinear. mundat. pistacior. amygdal. dulc. an. 3. ij. Torrefiendâ torrefiant & F. puluis.

Pulueris huius ℞. 3. j. 8. sacchar. q. s. conseru. capill. veneris, symphyt. testudin. an. 3. 8. Misce. F. electuarium.

Rondeletius puluerem istum hoc modo præstantiorem fore scribit.

℥. Sem. papau. albi, 3. ℞. gummi tragacanth. farinae orobi, an. 3. j. ℞. sem. althææ, portulacæ, cucumer. melon. citrul. bomcac. an. 3. iij. ℞. cineris cancrorum fluuiatilium, corall. alb. præp. succ. glyc. an. 3. j. ℞. sacch. ros. tabul. ad pondus omnium. F. puluis.

Dentur 3. ij. cum syrupo de papauere, vel iuinbino. Est & sequens vtile.

℥. Nuc. Indic. pistacior. sem. 4. frigid. maior. amygd. dulc. an. 3. j. sacch. penid. 3. ℞. gummi Arabici, 3. ij. sem. malu. lactuc. an. 3. iij. tragac. sem. cydonior. macis, garyophyll. an. 3. ℞. anisi, 3. j. glycyrrhizæ rasæ, 3. j. ℞. cinam. 3. ij. carnis testudinis vel pulpæ phasianii aut caponis, 3. vj. sacch. op. lb. iij, aq. ros. opt. q. s.

F. morsuli vel panis Martius. Plinius etiam libr. 28. cap. 17. medicamenta quædam ad phthisin habet.

Nonnulli etiam balnea aquæ dulcis tepida adhibent ad corpus humectandum. Verùm id potius hecticis simpliciter, quam phthificis conuenit. Et in phthificis, etsi ad hecticam declinent, non habet locum, nisi vlcus ab omnibus sordibus repurgatum & consolidatum sit, corpusque siccatum balneo ad alimentum rectius suscipiendum præparandum sit.

#### Dietæ.

Phthifici omnem aëris in calore & frigore excessum nimium, subitâsque eius mutationes, vt & aërem pluuiosum vitent. Siccus verò aër ad vlcera pulmonis sananda vtilissimus est, siue naturâ talis, siue arte comparatus. Antiqui hâc de causâ suos phthificos ad Tabios mittebant, monticulum inter Surrentum & Neapolim, locum nonnihil calidum, & præcipuè siccum ob Vesuuij montis, instar Æthnæ perpetuò flammam euomentis, vicinitatem, quem describit Galenus, 5. meth. med. cap. 12. Commodum quoque est hac de causâ loca piceis & similibus arboribus abundantia incolere. De quo Plinius, libr. 24. cap. 6. constat, inquit, illum cæli aëra plus ita, quam navigationem Aegyptiam proficere, plus quàm lactus herbidos per montium æstiuâ potus.

Possent ergò etiam ligna hæc resinosa in conclavi haberi vel incondi. Et quantum aër siccus in phthisi curanda possit, testatur trita illa mulieris historia; quæ cum annis aliquot ad furnum artem pistoriam exercens versaretur, sicco aëre inspiratione attracto, & vlcere ita exsiccato vitam diu protraxit.

Quod tamen intelligendum est, vbi spes aliqua sanitatis recuperandæ superest. Si enim de vlceris curatione desperatur, ægërque ad extremam maciem iam sit deductus, aër talis vlcus non sanabit, ægro verò mortem accelerabit. Celsus hac de causa navigationes longas præcipit, iis quidem, qui tam robusti adhuc sunt, vt peregrinationem suscipere possint, cum, vt Aretæus de curat. morb. diuturn. lib. I. c. 8. scribit, *pulmonis vlceribus quiddam siccum marina salsedo communicet.* Eadem de causa ex Italia in Ægyptum nauigare suadebant. Aliàs æger ab omnibus animi, & corporis moribus vehementibus sibi temperet.

*Cibus.*

Cibi sint boni succi, faciles coctu & multi nutrimenti, cuiusmodi parantur ex hordeo, auena, amygdalis, vt & alica, amylo & oryza. Et quidem in principio cibi abstergendi vim habeant, hinc glutinandi & consolidandi. Parentur igitur in principio ex hordeo hinc alica, amylo, & oryza. De alica tamen, amylo, oryza & eiusmodi cibus notandum, quod etsi mali succi non sunt, succum tamen præbent lentum & crassum, ideòque sola & sine præparatione non sunt exhibenda, sed aliis coctu facilibus admixtis, & quidem in forma forbili, & propterea cum iusculis bonarum carnum præparanda. Quomodo & reliquis cibus vim meliùs nutriendi imprimunt, & à calore debili faciliùs concoquuntur. Id quod Galenus, 7. meth. med. cap. 6. docet, dum scribit. *Nec planè, quod maximè nutriat, optimum est iis corporibus, quæ refici magis egent, utpote quibus concoquendi facultas non est, neque etiam quod facillimum concoctu est, cum scilicet ipsum nequeat esse maximè nutriens.* Cum igitur hæc duæ indicationes ex aduerso pugnent, committendum non est, vt dum alteri nimium sis intemptus, alterius omninò obliuiscaris, sed utriusque memor, quoad liceat, utrumq; misceas.

Et

Et quia phthifici multo nutrimento indigent, ob caloris verò natiui debilitatem multum cibum vnâ vice concoquere non possunt, ideò sæpè cibos, sed eius parùm vnâ vice præbendum.

Inter alimenta autem præcipuè, vt suprà etiam dictum, primum locum lac obtinet. Optimè enim corpus nutrit, sanguini bonam materiam præbet, acrimoniam vitiosorum humorum temperat, parte serosa vlcus abstergit, caseosa consolidationi inferuit, butyracea humectat & corporis exsiccationi resistit. Imprimis autem laudatur lac muliebre, quod naturæ corporis nostri maximè cognatum est. Asininum est, tenuius & serosius & ad vlcus abstergendum commodius. Inter hæc medium locum habent caprinum & vaccinum. Ne autem lac in ventriculo coaguletur, aliquid sacchari vel mellis admisceatur. Dandum etiam vacuo ventriculo & mundato ventre: alioquin faciliè acefcit & corrumpitur. Ea etiam quantitate dandum, vt à ventriculo bene ferri, & concoqui possit. Ideoque à minori quantitate ad maiorem ascendendum & primò quotidie semel, deinde bis de die dandum. Post lac sumptum æger non statim dormiat, nec alium cibum, præsertim vinum capiat, ne lac ventriculo corrumpatur. Si tamen adsit febris manifestè affligens, dolor capitis, vasorum, obstructions, & flatus, à lacte abstinendum. Potest lac etiam hoc modo præparari.

*℞. Lactis caprini vel vaccini mensur. iij. Adde aqu. fontan. puræ mens. j. sacch. alb. ʒ. ʒ. Coq. lento igne ad aquæ consumptionem.*

Lac hoc modo præparatum vel potandum datur, vel pani albo trito affundatur, & comedatur.

A plerisque maximè commendatur caro cancrorum & cochlearum, quæ scilicet propter substantiæ crassitiem vlcus consolidare possit. Verùm enim verò hac de re dubitatur; cùm hæc animalia sint crassæ & terreæ substantiæ, & proinde non nisi crassum, terreum, & vitiosum succum generent, difficilimè coquantur & maximè excrementosa sint. Ideoque non nisi parce aliis cibis admiscenda, vt reliqui cibi cum iis permixti solidius alimentum præ-

beant. Aut potius ius eorum, quàm substantia, præbendum, & pars quædam in limacibus, quàm *μύκαρα*, id est, papauer, Aristoteles, 4. de *hisor. animal.* c. 4. nominat, quæ non difficulter coquitur. Ideoque nonnulli cancros & côchleas in lacte coquunt, & postea ius saccharo condiunt, vel etiam farinam hordei & lac amygd. dulc. addunt. Vide infrà *quæst.* 2. Vel hoc modo præparetur.

¶ Cochleas, quæ separatim excrementis omnibus inciduntur, & in vase vitreo optimè clauso coq. in balneo. Liquorem per setaceum traiecit, traiectum lento igni exponit, ut omnis pars aquosa resoluatur, & remaneant partes solidiores, sed in liquorem reductæ. Hic liquor pro cibo dari poterit, qui si alteretur cichoraceis vel similibus, euadit medicamentosus & refrigerabit & humectabit.

Potus, ubi abstergendum, sit *aqua mulsæ bene diluta vel aqua hordei cum pauco melle.* Cum glutinandum, *aqua hordei, in qua saccharum rosar. dissolutum sit.* Vino tamen etiam locus est, sed sit illud debile ac modica quantitate exhibeatur. Commodum etiam potum præbent *cereuisiæ hordeacea & triticea.*

*Peculiaria pulmonis ulcera, sphacelus, & cancer.*

*Peculiaria pulmonis ulcera.* Facienda sub finem huius capitis & aliorum ulcerum, quæ phthisin tamen non introduxerunt, & sphaceli ac cancri pulmonis mentio.

Interdum enim apostemata in pulmonibus reperiuntur, quæ nullam febrem coniunctam habent, nec tussim. Ita refert Nicolaus Massa, in *Introductorio anat.* f. 57. se anno 1533. quendam secuisse, & in substantia pulmonis in parte sinistra vlcus magnum concavum & putridum ad quantitatem multò maiorem, quàm sit dimidia pars corticis vnius oui gallinæ cum sua profunditate, in qua cavitæ fuit sanies multa & praua, deprehendisse: cum tamen iste, quem bene nouerat Massa, nunquam conquestus sit de aliquo dolore, neque tussiuisset. Sed procul dubio iste tuberculum habuit, quod tandem in pus mutatum est.

*Sphacelus pulmonis.*

Post sanguinis sputum pulmonis partem quandam nigricantem & sphacelo correptam, & in ea profundum finum,

finum, sine vilo pure & sanie inuentam fuisse refert Dodo-  
næus, *obfer. cap. 24.*

Refert etiam Iacotius, *comm. 1. in lib. 5. sect. 2. aph. 67.* *Cancer*  
*Coac. Hippocr.* interdum partem superiorem pulmonis in *pulmo-*  
cancrum abire, atque ad iuguli partem superiorem trahi, *nū.*  
vt sub alis lateat, vnde compressa aspera arteria stertor  
quidam obauditur, non à puris multitudine, aut alterius  
humoris, sed ab angustia & interceptione meatus, in quo  
refractus & agitatus humor aliquis in gutture fuerit.

## Q V Æ S T I O I.

*An vlcera pulmonis sint sanabilia?*

Vlcera pulmonis satis periculosa esse, & paucissimos, *An vl-*  
quibus pulmones exulcerati fuerint, euadere, ipsa expe- *cera pul-*  
rientia testatur. Imò nonnulli in ea sententia sint, nullos *monis*  
planè è pulmonis vlceribus euadere, ea de caussa, quòd *sint sa-*  
pulmo in perpetuo motu sit, atque ita labra vlceris, vt & *nabilia.*  
vulneris, coalescere non possint. Quam rationem etsi Gale-  
nus, *5. meth. med. c. 8.* reprehendit, & reuera motus ille pul-  
monis naturalis in respiratione tam vehemens non sit, vt  
sanationem impediat, & vulnera pulmonis sanari posse  
experientia testetur: tamen aliam caussam, *loco allegato*, Ga-  
lenus affert, nimirum tussim. Cùm enim vlcus nullù possit  
sanari; nisi à pure prius mundatum fuerit; pus verò è pul-  
mone sine tussi euacuari non possit; facilè hinc patet, mo-  
tu illo, qui in tussi est vehementior, vlceris labia iterum la-  
cerari. Quibus accedit & hoc, quod idonea vlceri sanando  
medicamenta adhiberi non possint. Nam illud, quod recta  
in pulmones ex ore destillat, exiguum est: quod verò in vè-  
triculum descendit, non nisi per longas ambages & altera-  
tum atque imminutum ad pulmonem peruenit. Hinc &  
Galenus, *5. meth. med. cap. 12.* omnes illos, qui sanguinem è  
pulmonibus expuentes primo die se curandos ei tradide-  
runt, quosdam etiam post duos aut tres dies se sanasse  
prædicat. Quotquot autem phlegmone sic occupauit, vt  
iam febricitarent, horum nullum in totum per sanatum  
esse scribit.

Alij contrà vlcera pulmonis sanabilia esse statuunt, adducuntque primo auctoritatem Hippocratis, qui 6. aphor. 8. vesicæ quidem, cerebri, cordis, diaphragmatis, intestinorum tenuiorum, ventriculi, epatis vulnèra mortem afferre docet, pulmonum verò vulnèrum non meminit. Franciscus Arcæus, de febribus, cap. 8. à vulnèribus argumentum petit, & cum pulmones transossi, quod sæpè fit, feliciter curentur, etiam vlcera pulmonis sanari posse putat, idque se felicissimè præstitisse affirmat, & quidem vsu decocti ligni guaiaci: quod & Philippus Ingrassias & Thomas Erastus se factitasse scribit. Conserua etiam seu saccharo rosarum phthificos curatos referunt Auicennas, lib. 3. fen. 10. tract. 5. cap. 5. Mesues, capite de phthisi, Valescus de Taranta, lib. 3. cap. 2. Valeriola, lib. 5. obs. 5. Crato, in consil. Mont. 152. P. Forest. lib. 16. obs. 58.

Et omninò cum experientia rem definiat; disputatione multa opus non est. Rarò tamen hoc accidit, non quidem ob naturalem illum pulmonis motum, sed ob sanie, quæ pulmones corrumpit, & non nisi tussis, & vix tutò eiici potest, vnde pulmones lacerantur, & quòd medicamenta ad pulmones viribus integra vix perueniunt, vnde si quid præstare debent, continuàda & in magna copia medicamenta talia vsurpanda sunt, sicut Montanus retulit, phthificum quendam Venetiis nihil ferè aliud comedisse, quàm saccharum rosarum, vt pharmacopolæ Veneti id amplius ipsi vendere nollent.

Quomodo  
vlcera  
pulmonis  
insanabilia  
dici  
possint?

Notandum tamen hic, etsi suo modo sanabilia pulmonis vlcera dici possint: suo modo tamen etiam rectè dicuntur insanabilia, dum insanabile sumitur pro eo, quod ad pristinum statum reduci nequit. Etsi enim callus quidam obducatur: tamen perfectà ea sanatio non est. De quo Galienus, 5. meth. med. cap. 14. Sed qui postea, inquit, sic per omnia præsidia ritè transferunt, vt siccaretur vlcus, y tantum saltem lucrifecerunt, vt illud nec ultra progredetur, nec maius fieret, sed siccatum ac callo duratum longiore vita frui hominè liceret. Et 4. de loc. aff. c. 5. Quæ verò in pulmone iam permanserunt, quâuis aliquândo curentur, relinquitur tamè in eo res quædà callosa fistulosâque, quæ tractu temporis à leui occasione excoriatur.

Deinde



Deinde & hoc ij monendi sunt, qui sæpius se ulcera pulmonis & phthificos sanasse dicunt, vt attendant, ne decipiantur, & pulmonem exulceratum putent, cum tamen thorax saltem laborauerit; aut catarrhus & pituita in pulmonibus in similem puri substantiam illæsis pulmonibus mutatus sit.

## Q V Æ S T I O II.

*An in phthisi cochleæ utiles sint?*

Antiquiores equidem, qui de natura & facultatibus limacum scripserunt, Dioscorides, Galenus, Aëtius, P. Ægineta, Oribasius, non meminerunt, quod phthificis prosint: Recentiores tamen, & superiorum sæculorum Medici eas phthificis & hecticis commendarunt, adducti procul dubio auctoritate Galeni, qui 3. de aliment. facult. cap. 3. limacum carnem potentissimè nutrire affirmat.

*An cochleæ phthificis utiles sint?*

Verum enim verò, cum, vt *ibidem* Galenus & res ipsa docet, caro cochlearum sit difficilis coctionis, & succum non adeò bonum præbeat, facilè hinc patet, cochlearum carnes phthificis pro cibo non cōuenire. Cum enim phthifici febre lenta putrida laborent, & propterea vis naturalis in ventriculo, epatè, imò toto corpore sit debilis, cibum difficilis coctionis rectè cōcoquere non potest, atque hinc multa excrementa cum alibi, tum in pulmonibus etiam colligi necesse est; imprimis cum ex se succum bonum nō præbeant. Ideoque, quod in vulneribus accidit, quod nimirum, si ægri cibis mali succi vtantur, copiosior fanies generatur: idem in pulmonis ulceribus euenire credibile. Cum verò ob pus imprimis phthifici periclitentur, limacū etiam vsum iis potius nocere, quàm prodesse vero consentaneum est. Et quanquam iuscula ex iis parata, & pars illa, quam Aristoteles, lib. 4. de histor. animal. cap. 4. *μύκων*, id est, papauer appellauit, dentibus statim cedens, & caseosæ substantiæ paulò magis duratæ, siue factæ nuper è fauis ceræ non absimilis faciliùs concoquatur: tamen saltem respectu aliarum cochleæ partium est facilioris coctionis: absolutè verò & simpliciter facilis coctionis non est;

est; succi verò, quàm aliæ cochlearum partes, est melioris,  
& crassum ac melancholicum nutrimentum præbens.

~~~~~

## C A P V T XIII.

### *De Mediastini inflammatione.*

*Inflam-  
matio  
Media-  
stini.  
Causa.*

**M**EDIASTINUM seu septum, quod pulmonis lobos disiungit, & ipsam inflammationem interdum patitur, oriturque ea præcipuè à sanguine, eoque plerumque bilioso. Ideoque causæ, quæ peripneumoniam & inflammationem pulmonum excitare solent, & hic locum habent.

#### *Signa diagnostica.*

*Signa.*

Febris adest continua & ardens, cum cor ob inflammationem vicinam valdè incalescat, quam magna inquietudo, sitisque inexhausta comitatur. Respiratio est frequens & celeris, & in thorace maximum incendium, unde calidum spiritum efflant ægri, & frigidi aeris inspirationem desiderant. Dolor est exiguus, & saltem molestia quædam in inspirando ad sternum percipitur. Etsi enim locus affectus sit pars membranosa, tamen dolor non est pungens, ut in pleuritide, quoniam non ut pleura ita in costis firmatur, sed in laxa parte thoracis consistit: ad sternum saltem dolor quidam percipitur, quoniam ibi alligatur hæc membrana. Tussis in principio in quibusdam est sicca, post humida, & rubra quædam ac flava reiciuntur, plurima tamen flavi coloris, paucissima rubri, verum non ad modum copiosa, quia inter duplicem quasi membranam materia colligitur, unde non facile nisi eâ erosâ evacuetur. Pulsus qualis pleuriticorum, durus & inæqualis, non tamen æquè manifesta inæqualitate, sed aliquanto maore.

Si in pericardio affectio fuerit, aderit æstuatio, & phlogosis maior, ad syncopen laborans facile & frequenter accedit. *L. Mercat. lib. 2. de morb. int. c. 6. p. 158.*

#### *Prognosticum.*

*Prognosticum.*

Plerique hoc malo correpti moriuntur. Estq; hic morbus

bus, quàm pleuritis vehementior, cum locus affectus cordi sit vicinior. Et si protrahatur, ægri phthisi correpti tandem moriuntur.

*Curatio.*

Curandi ratio eadem ferè est, quæ inflammationis pulmonis & pleuræ. Sanguis nimirum & humores ad mediastinum fluentes euacuandi, reuellendi, repellendi, & per sputum euacuandi. Ideoque statim in principio vena aperienda, & sanguis satis copiosè euacuandus, & venæsectio, si vires ferant, vel eadem vel sequenti die repetenda, cum venæsectio non saltem euacuet, sed & reuellat & refrigeret. *Curatio.*

Venæsectione autem adhibita, eâ pectori applicanda, quæ feruorem humoris mitigant, sanguinemque aliquo modo reprimunt, medicamenta scilicet, quæ frigida quidem potentiâ sunt, sed astrictione carent, ut facilius penetrare possint. Quem in usum commodissimè adhibetur oleum violaceum, quo tepido totum pectus inungatur, vel panni eo imbuti pectori imponantur.

Si tempus æstium sit, & inflammatio erysipelatodes, etiam actu frigidum adhiberi potest. Etsi enim frigida aliâs thoraci sint inimica, & in pleuritide frigida actu non adhibeantur: tamen quia hic incendium magnum est, & inflammatio est in penitioribus thoracis partibus, frigida non facile ad locum affectum penetrant. Oleo violaceo admisceri potest lac recens & aqua endiuix, vel paretur cataplasma ex farina hordei, cum succo endiuix, & lactuc. & oleo violarum.

Vbi incendium nonnihil remisit, ol. chamæmel. admisceatur, ut & mucilagines, sem. althææ, malu. foenic. & similes.

Interim etiam propinentur ad materiam alterandam & expectorandam aqua vel decoctum hordei, violar. de iuiub. de glycyrrhiz. de tussilag. Syrupi tamen in minore quantitate admisceantur, cum saccharum facile bilescat. *Externa.*

Tandem etiam ad reliquias materiæ discutiendas extrâ applicetur cataplasma, ex rad. althææ, violar. scabios. caryopht. Quibus coctis & contusis addatur farina sem. lini sanigræc.

*grac. pulu. flor. chamemel. & cum oleo chamemelino & amygdalar. dulc. F. cataplasma.*

Quod si materia hoc modo euacuari vel absumi non posset, non planè incommodum esset, perforato sterno materiam purulentam extrahere, quod etiam Columbus, *lib. II. anat. c. 3.* monuit.

*Diatæ.*

Diatæ ratio sit eadem, quæ in peripneumonia & pleuride.

~~~~~

## C A P V T XIV.

*De Diaphragmatis tumoribus, & primò de inflammatione.*

*Diaphragmatis inflammatio.*

**D**IAPHRAGMA etiam interdum tumoribus corripitur, & quidem nunc calidis & inflammatoriis, nunc frigidis & diuturnis.

Inflammationem diaphragmatis quod attinet fit ea à sanguine calido & bilioso eo modo & iis de causis, ut aliarum partium inflammationes. Crassior enim in membranam densam sese non facile penetrat.

*Signa Diagnostica.*

*Signa.*

Coniungitur autem cum hac inflammatione febris continua & acuta non solum ratione humoris calidi, qui tumorem hunc excitat, sed ob viciniam cordis & connexionem cum eo per arteriam magnam. Adest dolor & respirandi difficultas, ac respiratio est parua & frequens, antequam delirium accedit, ut & pulsus, ut docet Galenus, *lib. 5. de loc. affect. c. 3.* Præcordia tenduntur nullo tumore in hypochondriis apparente, ad locum diaphragmatis apparet interdum quædam palpitatio vel saltus quasi, ut docet Hippocrates, *3. prognost. t. 91.* Galenus *in comm. & 1. epid. comm. 3. t. 18.* Procedente malo, quia cerebrum à diaphragmate, quod membranatum est, in consensum trahitur, delirium continuum excitatur; qua de causa veteres etiam diaphragma *φθέραι*, appellarunt, quod eius inflammatio mentem turbet, & delirium excitet. Respiratio est inæqualis, modò parua, modò magna, modò frequens, mo-

dò

dò rara. Solent etiam nonnunquam accedere conuulsiones, vt Gal. 4. *de pulsibus, de pulsu inflammatorio* docet. Et tum pulsus fit durus, paruus, creber.

*Prognosticum.*

Inflammatiò hæc pleuritide adhuc periculøsior est, & *Prognosticum.* plerumque ægrum ad mortem deducit, ob connexionem & consensum, quæm hæc pars habet cum corde, cerebro & epate. Vnde acutissimus hîc morbus est, & ægrum citò in summum vitæ discrimen adducit, curationemque reddit difficiliorem, quòd ægri delirant, nec facîle Medicis in sumendis medicamentis obtemperant.

*Curatio.*

Communes inflammationes curandi leges & hîc locum habent, & ferè eadem huius inflammationis curandæ est ratio, quæ peripneumonix & mediastini inflammationis. Itaque statim in principio aluo clyster emolliens & refrigerans iniiciatur, & hinc vena brachij dextri aperiat, ac si vires tolerant, vel eodem, vel sequenti die, venæsectio repetatur. *Curatio.*

*Externa.*

Externa thoraci ad locû diaphragmatis apponantur ea, quæ feruorem humoris mitigare, sanguinemque effluentem repellere possunt, potentia sunt frigida, actu verò subcalida. Igitur inungatur locus oleo rosaceo; vel fiant epithemata ex decocto herbarum refrigerantium, viol. end. lactuc. & similibus. In progressu morbi addatur oleo ros. chamæm. & epithem. malu. alth. chamæm. melil. sem. lini, foen. Ob delirium lotiones extremorum ex refrigerantibus herbis instituantur, quæ actuali caliditate reuellere à capite & potenciali frigiditate humores demulcere possunt. Syncipiti, temporibus & fronti etiam ea applicentur, quæ somnum conciliandi vim habent, ex suprâ l. i. p. i. propositis.

*De tumoribus diaphragmatis frigidis.*

Generantur hi tumores à materia cruda & tenui. Crassa enim & viscida non possunt in diaphragma ob eius densitatem penetrare. Dantque occasionem materiæ collectioni percussio vel compressio diaphragmatis, qualis etiam fieri potest, si quis inter scribendum vel legendum mensæ sæpe pectore innitatur. *Tumores diaphragmatis frigidi.*

*Signa diagnostica*

*Signa.* Si tumor sit frigidus in diaphragmate, malum est diuturnius, adest tensio hypochondriorum, nullo apparente in his tumore ad tactum, & spirandi difficultas, pulsus est durus & paruus, dolor adest, sed non ita magnus, abest febris, aut si febris accidit, non est acuta, delirium etiam abest, & non nisi morte instante interdum accidit.

*Prognostica.*

*Prognostica.*

1. Si morbus sit recens & adhuc in fieri, ægri interdum sanari possunt.
2. Si verò malum sit diuturnius, ægrum ad tabem deducit.

*Curatio.*

*Curatio.*

Principio ne maior materiæ fiat affluxio, materiâ affluens debito modo præparanda & euacuanda, ut cum materiâ ista sit pituita aquosa & serosa, medicamentis, quæ pituitosum & serosum humorem euacuant, agarico, mechoacanna, turbith & similibus vtendum. Et si quæ causâ adsit, ob quam talis materiâ in visceribus generetur, ea tollenda, & viscerum debilitas, vel obstructio corrigenda.

Vniuersali corporis euacuatione præmissa materiâ discutientia simulque emollientia, ( nam sensibilibus eam euacuantia hic locum non habent ) vsurpanda, ut butyrum recens, pinguedo gallinæ, anseris, medulla vitulina, ceruina, omnes recentes. Progressu autem temporis validiora discutientia adhibenda, ut oleum chamæmel. anethin. vel sem. lini, fœnigræci, quibus aliquid terebinth. vel ammoniac. addi potest. Vtile est & emplastrum de meliloto. Vel ℞. *Maluæ, althææ, betonic. organ. ana m. j. sem. anisi, fœnicul. carui, an. 3. j. flor. chamemel. verbasi, ana m. ss.*

F. sacculi duo ex linteo albo, qui coquantur in vino, & expressi ac calidi alternatim pectori imponantur.

Intrò exhiberi possunt digerentia & discutientia ex rad. tussilag. helen. capillo ♀, marrubio, hyssopo, scabiosa, sem. vrticæ & simil. Vel exhibeatur decoctum sarsaparillæ cum

cum pectoralibus. Non tamen nimis tardè, vbi humor iam indurari cœperit. Ita enim tenue discuteretur, crassum verò magis induraretur. Sensibilis verò euacuatio, vt dictum, hic sperari non potest: cum diaphragma à parte superiore pleuræ à parte inferiore peritonæo cingatur & inuestiatur. Nisi forsàn abscessu rupto in cavitatem thoracis effundatur, & inde per tussim eiiciatur. Quod si fiat, malum reliquum vt empyema curandum est.

Victus ratio sit attenuans, non tenuis; cum morbus *Dieta.* sit diuturnus. Cibus sit boni succi, facilis coctionis: alvus sit laxa, ac si subsistat, sæpe clysteres iniiciantur.

## C A P V T X V.

## De vulneribus diaphragmatis.

**E**VM diaphragma vulneratum est, ponderis sensus *Vulnera* eo loco molestus est, tussis & dolor eò loci percipi- *diaphrag-* tur, vt sæpe delirium accedat. Risus adest cum perturba- *gmatis.* tione; ilia sursum conuellantur adeò, vt respirandi vehementia contingat. Aliquando ventriculus & intestina per vulnus in thoracis cavitatem rapi solent. Cuius rei historias duas recenset Ambrosius Paræus, lib. 9. chirurg. cap. 30. Memorabile & singulare huius rei exemplum etiam annotauit Dominus D. Andreas Schato p. m. Socer meus, quondam Academix huius Professor. Est autem tale. Anno 1582. die 20. Septembris Studiosus quidam Henricus Buscherovius, Riualiensis Liuonus, cum melancoliâ variisque tentationibus vexatus esset, ante portam oppidi huius proprio gladio se confodit, vulnere intra quartam costam in thorace adacto, & sub nona costa in tergo gladio penetrante: quod vulnus tamen intra duos menses sanatum fuit, vt æger satis bene sibi habere videretur. Verùm accidit, vt post menses aliquot iterum absurdis cogitationibus vexaretur, & postea 28. Aprilis, Anno 1583. malè habere inciperet, & seqq. diebus mense Maio nigra quater, eaque magnâ copiam vomitu reiiceret, cum sudoribus frigidis

*Historia  
diaphrag-  
matis  
vulnerati.*

gidis & lipothymia, tandèmq; post vltimum vomitum exspiraret. Corpore aperto deprehensum est vulnus per diaphragma & pulmones penetrasse, & quidem diaphragma transossum fuit in ipso nerueo circulo. Pulmonis ferè nihil repertum est in sinistro latere confosso, cum proculdubio is correptus cum pure reiectus fuerit. Exigua saltem particula aderat costis adnata. Ventriculus totus ascenderat in sinistrum thoracis latus, & cor cum capsula sua depulerat in dextrum latus, vbi & viuus ille post acceptum vulnus iubebat obseruare pulsum cordis. Cor aridum & tabefactum erat, copiosa autem aqua in capsula cordis. Omentum & pancreas totum & ferè circa ventriculum computruerat.

Diaphragmatis  
vulnera  
quomodo  
sint sanabilia.

Habentur autem diaphragmatis vulnera sanabilia, si saltem pars carnosà diaphragmatis sauciata & perforata fuit, etsi conglutinatio sit difficilis ob perpetuum motum diaphragmatis. Si verò in neruosâ eius parte vulnus sit, insalubre habetur. Verùm Galenus, 6. aphorism. 18. docet etiam neruosarum partium vulnera, si non sint magna, quandòque sanari posse, & proinde & diaphragmatis vulnus in parte neruosa, si magnum non sit, consolidari aliquando potest.

Exemplum talis vulneris est apud Hippocratem, 5. epid. Cùm enim Tychon in oppugnatione circa Datum catapulta vulnus in pectus accepisset, paulò post paruus risus ei aderat cum perturbatione. Videbatur autem Medicus, cum lignum eximeret, circa septum transuersum hastilis partem aliquam reliquisse. Primam noctem implacide egit, sub diluculum melius habere visus est. Prædictum est, conuulsione accedente celeriter periturum. Posterâ die implacidus insomnis egit, & sub tertij diei exortum conuulsione tentatus tum temporis mortuus est.

Ratio curandi eadem est, quæ pulmonis & mediastini vulnerati.



## CAPVT XVI.

De Pleuritide, seu inflammatione pleurae & musculorum thoracis.

**I**NFLAMMATVR sæpè & pleura seu membrana costas succingens, musculique intercostales; quod malum Græcis pleuritis dicitur, & pleuritici, qui inflammatione pleurae laborant. Βληθῶι, etiam antiquis dicuntur qui ex lateris aut pulmonis inflammatione, repente difficultate spirandi suffocati latera liuida habent, tanquam plagâ percussi aut siderati. Hippocrat. 1. de rat. victus in acut. aphor. 35. & in Coctis ultra dimidium. In pleuriticis enim, si subito difficultate spirandi suffocentur, ut in peripneumoniacis sanguine inflammationis in cutem diffuso liuor fit, totumque latus, in quo fuit inflammatio, post mortem liuescit, eodem modo sicuti in apoplecticis & epilepticis idem interdum accidere videmus.

Est videlicet pleuritis, eaque vera & exquisita (nam dari & notham infra de dolore lateris dicetur) inflammatio membranae costas succingentis, quæ quandoque pulmoni communicatur, ex affluxu sanguinis per ramos seu venæ caux ascendentis seu ἀξὼν, eo impulsu ortum habens, cum febre continuâ acuta, dolore lateris pungente, tussi, pulsu duro, celeri ac frequenti & difficultate spirandi. An verò pleuritis etiam fieri possit, sine notabili, & manifesta inflammatione pleurae, dicetur infra questione 1. Sub pleuritide rectè etiam comprehenditur inflammatio musculorum μεσπλείων, præsertim internorum, ob pleurae ex vicinia consensum.

Datur deinde & notha pleuritis alia quædam, quodammodo talis, sed & ipsa vera inflammatio, ratione situs, & partis affectæ saltem notha, quando sanguis, per ramos venæ axillaris in extrema thoracis sparsus, in musculos illos externos, qui costis & musculis μεσπλείων, extra incumbunt, illabitur, quæ ob communitatem propaginum ve-

Pleuritis.

narum externarum & internarum, (cùm interiorum venarum extrema foràs emergant, & externarum ora intrò subeant) sæpè in pleuritidem veram permutatur.

*Qua pars  
afficiatur  
in pleu-  
ritide.*

Quæ autem pars in pleuritide afficiatur, an solâ scilicet pleura, an verò etiam pulmo, & antiqui & recentiores dubitarunt, diceturque de eo infra, *quæstione 2.* Ut rem hic breuibus complectamur, statuimus, non quidem in omni pleuritide necessario pulmonem affici, semper tamen ferè hoc accidere, vbi superior pleuræ pars afficitur. Est enim pleuræ cum membrana pulmonis communio, & præcipuè versùs collum, & circa exortum asperæ arteriæ per fibras multas cùm pleura pulmo coheret, Imò, vt supra c. 10. dictum, scribit Nicolaus Massa, *in suo introduct. anat. c. 29.* se ferè semper inuenisse adhærentiam pulmonis cum pleura, & non sine difficultate partes superiores pulmonis à pleura separari. Itaque faciliè fieri potest, vt si sanguis in pleuram præter naturam influat etiam simul in pulmonem effundatur. Atque tum sanguis & sputum, quod tussì reicitur, non tam à pleura, quam à pulmone simul affecto prouenit. Si verò inferiores pleuræ partes afficiantur, non necessarium est pulmones simul affici, cùm ibi nulla pleuræ & pulmonum sit communio.

*Causa  
proxima.*

*Causa.*

Est autem inflammationis pleuræ, vt omnium aliarum inflammationum, causa proxima sanguis, siue sincerus & purus sit, siue humores alios admixtos habeat, qui è vasis thoracis loca hæc nutrientibus, ex furculis scilicet & ramis venæ cauæ ascendentis, per ramum subalarem, venasque mammarias, quibus nutriuntur costæ quatuor superiores, vel ex *alijis* ramis, quibus reliquæ octo costæ inferiores nutriuntur, eò effunditur. Refert tamen Vesalius, *lib. 3. c. 7. de fabrica corp. humani*, se in quibusdam corporibus talem constitutionem venæ *alijis* repperisse, vt omnes thoracis costæ ab eius ramis nutrimentum accipere potuerint. Sed & pleuritidem nonnunquam à sanguine ex arteriis (quibus membranam hanc destitui non rectè sentit Mercatus) quæ venas hæc comitantur, in membranas effuso excitari posse à vero alienum non videtur. Frequentius

quentius tamen humores calidi, tenues, biliosi & acres sanguini permixti pleuritidem pariunt, aut aliorum humorum sunt vehiculum; cum vasa quæ membranam hanc pertingunt, sint parua, ipsaque membrana densa. A sola vero bile, pituita vel melancholia pleuritis non generatur.

Est enim pleuritis inflammatio cuius causa proxima est sanguis, & proinde sine sanguine reliqui humores pleuritidem non excitant, etsi sanguini pleuritidem parienti admisceri possunt, ut ita sanguis inflammationem producat modò purus sit, modò bilem, vel pituitam, vel melancholiam admixtam habeat. Quamquam verò Gal. 3. aph. 33. scribit, pleuritidem aliâ cum flauis & tussis sputis esse, eamque ex biliosis humoribus ortum habere; aliam cum spumeis, eamque ex pituitosis prouenire; aliam cum nigris, eamque ex melancholia, aliam cum cruentis, eamque ex sanguine: tamen id saltem accipiendum est de humore vitioso sanguini permixto, cuius signa ex sputo deprehenduntur. Postquam enim ubi pleuritis coqui incipit, non sanguis crudus, sed alteratus & in substantiam albam redactus reiicitur: Si sanguis is laudabilis sit, copiamque potius quam qualitate peccet, in principio quidem sputum tenue rubrum reiicitur, paulò post verò album. Si verò alius humor admixtus sit, quem natura ut mox dicitur, præcipuè expellere nititur, non planè album, sed flauum vel alterius coloris, pro humoris peccantis ratione.

Causas remotas quod attinet, aliæ materiam suppeditant, aliæ eam vomunt, ut ad pectus fluant, faciunt. Antecedens causa materiam suppeditans est cacochymia, vel plethora seu in toto, seu in parte aliqua.

Et quidem frequentet pleuritis generatur, cum vitiosi humores in venis febres continuas accendunt, quorum pars ad thoracem effusa pleuritidem facit. Natura enim animalis salutis intentata non solum perfectâ coctione humores vitiosos e corpore expellit, & perfectas crises instituit, sed quandoque etiam vel copia, vel prauitate humorum stimolata initio tales humores aggreditur.

Et quidem rectissimè agit, dum tales humores planè eiicit atque exterminat. Si tamen quacunque de causa id

*Bilis, pituita vel melancholia sola pleuritidem non generat.*

*Causa remota.*

præstare nequeat, à conatu suo non statim desistit, sed ut vasa communia & cordi vicina, regiam quasi corporis sedē & vias publicas, ab humoribus vitiosis repurget, ad minores venas & partes priuatas ac remotiores eos depellit: quæ si sint ignobiliores, ut glandulæ sub cute & ipsa cutis, ea suum finem assequitur, & id in ægri commodum cedit. Si verò quacunque de causa in partem aliquam nobiliorem, aut quæ nobilem in consensum trahere possit, materiam detrudat, sine suo frustratur, & febris inde non leuior, sed grauior ac periculosior redditur. Qua de re insignis est locus apud Hippocratem, lib. 4. de morbis. *Quicquid, inquit, in morbo copiâ abundat, dum turbatio in principiis contingit, ad locum fertur, in quo plurimum superat. In turbatione autem amplam capacitatem natum secretum voluitur, & corpus calefacit, aut in aliqua corporis parte adhaerescens vnâ cum alio humore, qui in alio loco, est dolorem & calorem exhibet. Quod verò incalescit, reliquum etiam corpus calefacit, ex eoque febris contingit, ferèque ex bile, pituita & sanguine ortis, quæ calidissima existunt. Et si quid horum in aliquam corporis partem incubuerit, plerumque inde morbus nominatur, & appellationem habet.*

Febres  
pleuritico-  
rum  
quales?

Itaque etsi antiqui febres, quæ pleuritidem, ut & anginam, peripneumoniam & similes partium internarum inflammationes coniunctas habent, pro symptomaticis agnouerint, ut symptomatum more inflammationi, ut morbo primario, succrescere crediderint, adeò quidem, ut referente, 4. apb. 73. eos, qui propter lateris aut pulmonis, aut alterius eiusmodi partis inflammationem febricitarent, iam non febricitantes appellauerint, sed pleuriticos aut peripneumonicos, aut similibus aliis nominibus nuncupauerint; tamen si quis re diligenter perpendat, animaduertet, non febres ab hisce inflammationibus, sed potius inflammationes istas à febribus eo, quo dictum, modo suam originem habere. Experientia enim testatur: quod pleuritis & eiusmodi aliæ inflammationes non præcedant febrem; sed febris inflammationem, aut certè febris simul cum inflammatione incipit, animaduertimusque materiam inflammationis cussam non in parte inflammata si-

nam consistere & calorem p. n. à se diffundendo febrem accendere, sed sæpè vagam & quasi turgentem hinc inde vagari: id quod ex morborum, qui febres hæc comitantur, commutationibus patet, quod ex pleuritide & peripneumonia angina fit, ex peripneumonia phrenitis, materia ex vna parte in aliam translata, vt ex 5. *aph.* 10. & 7. *aph.* 11. & 12. videre est. Atque hinc sæpè accidit: vt inflammationes tales aliarum febrium acutarum more per vniuersales euacuationes & crises soluantur, & coctionis humorum signa in vrina conspiciantur.

Et tales pleuritides sunt plerumque eæ, quæ aliorum epidemiorum morborum more plurimos corripunt, & cū malignitate coniunctæ sunt, & quæ à causis communibus & malignis ac contagio ortum habent. Vt enim venena alia aliis partibus infesta sunt: ita materia maligna, quæ morbos epidemios parit, nunc huic nunc illi parti magis infesta est, & nunc pleuritidem, nunc anginam, nunc phrenitidem, nunc dysenteriam, nunc alios morbos gignit.

Ad pleuritidem autem excitandam, facere possunt omnes causæ, quæ ad plethoram & cacochymiam generandam faciunt, vt suppressæ sanguinis consuetæ euacuationes per nares, menses, hæmorrh. item humorum vitiosorum qui ad articulos depelli vel per vlcera inueterata euacuari solebant, retentio & alui fluxus intempestiuus detentio, sicut ex dysenteria intempestiuè suppressâ pleuritidem excitatam fuisse sæpius obseruatum est. Et in summa sex rerum non naturalium vsus immoderatus, qui plethoram & cacochymiam excitare valet, huc pertinet.

Vt autem seu sanguis abundans, seu vitiosi humores ad pectus fluant, & actu ad pleuritidem excitent, facit pectoris debilitas ad materiam affluentem facile suscipiendam apta, vel à primo ortu, vel à morbo aliquo contracta; calor aut dolor attrahens. Huc faciunt, quæ sanguinis ad latus affluxum concitare valent, ictus, casus, contusio pectoris, vehemens exercitiū, æstus humores fundens, frigus exprimēs, vini meraçioris ingurgitatio, potus frigida præcipuè post exercitia, flatus Aquilonij post Austrinos, 3. *aphor.* 5. corporis post sudorem in aëre frigido denudatio.

## Differentia.

*Differen-* Pleuritidis differentia à nonnullis plures recensentur,  
*tia.* præcipuæ, & quæ ad curationem aliquid faciunt, sunt, quæ  
 sumuntur à loco affecto & causis. A loco affecto & do-  
 loris situ ex 2. de rat. victus in acut. t. 10. & 11. diuiditur  
 pleuritis in ascendentem, cum dolor ad superiora & iu-  
 gulum versus extenditur, & descendentem, cum versus  
 hypochondria vergit. Nonnunquam etiam versus dorsum  
 magis tendit, cuius mentionem facit Hipp. lib. 3. de morb.  
 nunc magis versus anteriora.

Ratione causæ secundum sanguinis inflammationem  
 parientis varietatem est differentia. Sanguis enim modò  
 purus est, modò ei bilis, quod plerumque accidit; modò  
 pituita, modò melancholia admiscetur.

Est tamen illa differentia notatu digna, quod pleuritis  
 alia dicitur sicca, in qua nihil, vel parùm omnino & nul-  
 lius momenti exspuitur, non solum in morbi principio,  
 sed etiam in eius progressu; quod vel ob humoris crudita-  
 tem, vel eiusdem crassitiem & visciditatem, vel facultatis  
 imbecillitatem, vel doloris vehementiam, vel propter  
 bronchiorum obstructionem accidere potest: alia verò  
 humida, in qua sputum mox circa principium apparere  
 incipit, 1. de vict. rat. in acut. 21. & 23.

## Signa diagnostica.

*Signa.* Signa pathognomonica, quæ in omni pleuritide ani-  
 maduertuntur, ipsiusque ideam complectuntur, & à Gal.  
 5. de loc. aff. c. 8. 1. aph. 12 & de constit. art. med. c. 15. recensentur,  
 sunt. 1. dolor lateris acutus, qualis membranæ fieri so-  
 let, à sanguine in eam effuso ortus, qui & ad vicinas partes  
 nunc versus iugulum, nunc versus hypochondria extendi-  
 tur, quod membrana hæc totam thoracis cavitatem inue-  
 stiat. Atque doloris ratione peripneumonia à pleuritide  
 discernitur, & in peripneumonia sola lateris dolor est exi-  
 guus vel nullus; quod tamen tùm solum verùm esse putat  
 Platerus, cum pulmonis interna magis quàm externa in-  
 flammantur. Si enim ad externa vsque extendatur inflam-  
 matio; non solum fibris, quibus succingenti membranæ  
 annectuntur pulmones, contractis, sed & inflammatione  
 succin

succingenti membranæ communicata dolores in latere excitari existimat.

2. Febris continua acuta, ex phlegmone in loco cordi vicino accēsa, sæpè verò ex natura sua talis & ante phlegmonem orta, quæ tamen accedente pleuritide & inflammatione rursus ab ea incrementum sumit atque augetur. Atque febris hæc plerumque tertianæ typum observat, quod frequentissimè pleuritides à sanguine bilioso ortum habeant.

3. Respiratio difficilis, frequens, parua, quia ob inflammationem & dolorem instrumēta respirandi satis distendi nequeunt. Itaque cum vsui magnitudine satisfieri non possit, defectum in magnitudine per celeritatem & frequentiam natura compensare studet. Et ob dolorem natura cogitur, ut ad secundam respirationem statim pergat, cum primâ, utpote nimis parua, vsui satisfactum non sit. Nam velocitas non ita dolorem parit, sicut dilatationis magnitudo; cum hæc motus vehementia partem dolentem distendat, illa brevi tempore motum efficiens ad quietem festinet.

4. Pulsus est durus, parvus & frequens, ob tensionem arteriæ, & quia membrana dura & densa inflammata non permittit arterias ita distendi, quemadmodum calor & vsus id requirit. Ideoque pulsus fit celerior & frequentior, atque ea pulsus differentia oritur, quæ à Medicis ferrina nominatur, eò quòd, dum pulsus tangitur, ferræ dentes repræsentat, cum alia pars attolli, alia non attolli videatur.

5. Tussis ægro valde molesta est: quæ accidit tum ob tumorem, membranam, quæ costas succingit, occupantem, qui cum minus liberum spatium, in quod distendantur, spirandi organis permittat, natura ad expellendum id, quod impedimento est, insurgit; tum quia portio aliqua materiæ pulmoni communicatur, quæ cum sputo per tussim excernitur. Et quia initio à loco inflammatio parum exit, plerumque initio tussis sicca est, postea humida, materia copiosiore penetrante, sputumque coloratum & cruentum apparet. Quando autem pulmones simul inflammantur,

magna

magna materiæ pars è pulmone prouenit. Quod autem sputum à pleura in asperam arteriam proueniat, & hinc per tussim excernatur, de eo dicetur infra, *quest. 3.*

*Vera & notha pleuritidis differentia.*

Atque qui hæc signa pathognomonica diligenter in conspectu habet, facile veram pleuritidem ab aliis affectibus omnibus, qui cum ea similitudinem habere videntur, discernet. Neque enim vlllo alio morbo omnia hæc simul reperiuntur. In notha quidem pleuritide, quæ fit ab inflammatione musculorum intercostalium & externæ partis thoracis, febris vel nulla adest, vel non adeò acuta: tussis, nisi forsan aliquid à capite destillet, est nulla, & nil, præsertim cruenti, excernitur. Pulsus non percipitur adeò tensus & durus: dolor est mitior, iisque pulsans, non pungens, & neque ad iugulum, neque ad inferiora extenditur, locusque manu pressus dolet; nonnunquam & dolor foris apparet, qui suppuratus per cutem erumpit, teste Galeno, *5. de loc. affect. c. 3.* Quandoque tamen accidit, ut in vera pleuritide phlegmone versus exteriores musculos ob magnitudinem tendat, ac dolor etiam extrà percipiatur, atque ita pleuritidis nothæ speciem præ se ferat; cum tamen internæ inflammationis saltem incrementum sit. Itaque ad alia signa, ne fallamur, simul respiciendum.

*Pleuritidis & peripneumonia differentia.*

Si dolor à flatibus inter musculos intercostales & membranam conclusis ortum habet, & si aliquis sensus punctationis adfit, nulla tamen adest febris, nulla tussis, nulla ferè respirandi difficultas, dolorque ferè est vagus, neque perpetuus, sed per interualla recurrens, & sæpe de vna parte in aliam transit.

*Inflammationis diaphragmatis & pleuritidis differentia.*

Inflammatiō verò pulmonis, seu peripneumonia valdè similis est pleuritidi; nullus tamen, si solus pulmo inflammetur, dolor in eo percipitur, vel exiguus, & nullo modo pungens, isque non in lateribus, sed in medio potius thoracis; pulsus etiam non est durus, sed laxus & vndosus; difficultas spirandi maior, ut ægri sæpè rectâ ceruice spirare cogantur.

Ab inflammatione diaphragmatis differt, quod dolor in latere non vrget, sed extrema costarū ad finē sterni dolēt, ventrisq; pars, vbi diaphragma est, turget, delirūq; adest.



In mediastini inflammatione dolor non ita in lateribus percipitur, neque est extensus.

Inflammatio epatis, quæ etiam habet quandam cum pleuritide similitudinem, ita ut Siculus Medicus, ut refert Galenus, 5. de loc. affect. cap. 3. dum eam experiretur, pleuriticum se factum existimarat, à pleuritide differt loco doloris, qui perpetuo est in dextro latere, & circa dextrum hypochondrium collectus, neque is pungens est, sed grauians, tumorque infra costas nothas percipitur pulsus est undosus, non tensus, tussis est minor & sicca, respirandi difficultas quoque minor; vrina est citrina, nigra, alui excrementa sanguinolenta.

*Epatis  
inflama-  
tionis à  
pleuriti-  
de diffe-  
rentia.*

Quis autem humor pleuritidem pariat, tum ex signis humorum vniuersalibus, tum ex iis, quæ pleuritidem comitantur, & præcipue sputo cognoscitur, cum quo tussi reii-  
citur pars eius humoris, qui inflammationem excitat. Si videlicet sanguis purus pleuritidem pariat, adest repletio & tensio venarum; maxime circa tempora & frontem, cum sensu grauitatis circa oculorum cauitates, & capitis anteriora, rubor faciei, sputum est rubrum & malum mitius. Si bilis adsit, sputum est subflauum, dolor admodum pungens, febris est acuta & ardens, quæ fere typum tertianæ seruat, sitis est vehentior, pulsus durior & velocior, vigilia & anxietudo maior, oris amaritudo, vrina citrina tenuior. Si pituita admiscetur, sputum albicat, viscidum & glutinosum est, febris est mitior & minus acuta, quæ fere typum quotidianæ obseruat & circa vespèram exacerbatur. Si melancholicus, sputum ad nigrum & liuidum tendit, nisi insignis corruptionis & pleuritidis lethalis sit iudicium, quod accidit, si præcessit sputum rubicundum, & postea nigrum sequitur.

*Signa  
humorū  
pleuriti-  
dem pa-  
riētium.*

Si malignus humor, sputum plerumque è malo coloratum, adest magna virium deiectione, pulsus est languidus, & alia febrium malignarum symptomata apparent.

Tempora morbi huius ex sputo præcipue cognoscuntur, ut docet Galenus, lib. de cris. cap. 18. Si enim sputum sit nullum, vel paucum, vel crudum, & cum difficultate reii-  
ciatur, morbus adhuc in principio est. Postea ubi spu-  
tum

*Tempora  
pleuriti-  
dis.*

tum copiosius nonnihil & post tenue crassius expuitur, idque facilius incrementum est. Quod si sputum iam coctum, id est, album, leue, æquale, consistentiæ mediocris, & quod faciliè reiicitur, apparet, idque copiosius expuitur, status est. Declinatio tandem, vbi post copiosius sputum paucius reiicitur, & febris dolor, & omnia symptomata remittunt. Cum verò febris, quæ pleuritidi coniuncta est, non raro sit primaria, non symptomatica, coctionem humorum etiam ex vrinis animaduertere licebit.

*Differē-  
tia ra-  
tione sub  
iecti.*

Rondeletius etiam, capite altero de pleuritide, signa, quæ ratione pleuritis ratione subjecti differat, proponit, quæ lectori perpendenda relinquimus. *Pleuritis*, inquit, duplex est, altera quæ extenditur per partem internam omnium costarum. Altera verò, quæ costam undique inuestit, tanquam periostium costarum, & in utraque membrana sit inflammatio. Distinguitur autem species ex decubitu. Nam si æger in partem affectam decumbere potest, & non in oppositam, argumento est, affectum esse in membrana extensa, quæ hyposcota dicitur, & hoc fit, quia cum in oppositam partem decumbit æger, pondere materiæ collectæ illa membrana distenditur magis, & diuellitur à costis. Illa autem, quæ fit in periostio, contrario modo se habet. Nam in oppositam partem dormire possunt, in affectam verò minimè. Sed quia hæc nota communis est pleuritidi veræ & non veræ, ob id aliam notam adiungere oportet ad distinctionem harum. Nam si affectus sit in musculis externis, si digito premantur, dolorem sentiunt. Quod non accidit his, qui inflammationem in periostio habent, nisi supra modum comprimatur costa. Fit etiam pleuritis in musculis intercostalibus, quæ species pulsatione deprehenditur. In multa enim inflammatione costarum arteria comprimitur, præterquam in inflammatione musculorum intercostalium. Hac nota certissima deprehenditur, & in utrunque latere dormire possunt. Conueniunt omnes in dolore punctorio, in pulsu duro, in difficultate anhelandi; febre verò & sputo distinguuntur. Nam omnes inflammationes internæ febrem habent, sed dolor lateris sine febre, & materia frigida vel statulenta excitari solet. Nulla tussis, nulla expuitio sequitur, quia materia in parte externa continetur. Omnibus aliis difficultas spirandi est maior, & dolor magis purgens,

pungens, sputio magis sanguinolenta, vel flava, vel spumosa. In inflammatione membranæ internæ semper adest pauca, aut multa in morbi processu. Nam in salubribus tantum mox apparet sputum. Verùm in inflammatione muscutorum intercostalium minor fit resudatio, ob id expuitio minor. In ea parte, quæ est in periostio, ferè nulla apparet, & resolvitur per insensibilem transpirationem & sudorem, modò missio sanguinis prohibuerit incrementum. Nam talis inflammatio à pauca materia fit.

## Prognostica.

1. Euentus pleuritidis triplex est: vel enim ad salutem, *Prognostica.* vel ad mortem terminatur, vel in alium morbum commutatur. Vt autem, quis euentus futurus sit, sciamus, vires naturæ & morbi componere conuenit. Vires corporis ex actionibus corporis vitalibus, naturalibus & animalibus cognoscuntur. Quo enim ipse actiones rectius sese habent, eò maius naturæ robur significatur. Morbi conditiones autem etsi plurima signa ostendant; tamen inter ea in pleuritide signa coctionis & cruditatis sputi primas obtinent.

2. Hinc crudæ pleuritides morbi diuturnitatem vel mortem; coctæ breuitatem & salutem ostendunt. Salutem quidem ostendit coctio; quatenus coctio; breuitatem verò, quatenus hoc vel illo tempore apparet. Nimirum in omni pleuritide salubri sputum maturè coctionem recipere, & in calore ac substantia sese bene habere, ac facile & promptè excerni debet: & quò meliora coctionis signa adsunt, & quò citius sputa apparent, eò citius morbus terminabitur. De quo Hippocras. i. aph. 12. In pleuritide si sputum statim appareat in initio intra tertium diem, breuem morbum indicat; sin verò posterius, longum.

3. Periculosissima verò pleuritis est, in qua nihil expuitur: (nisi tamen ita leuis sit, vt insensibiliter vel per sudorem discuti possit.) Secundum locum obtinet, atque ita leuior est, in qua ichores tenues saltem expuuntur: tertio loco est, in qua crassiora apparent; quarto, in qua sputum pefectè coctum apparet. Quod si circa tertium vel quartum diem contingat, morbus vltra septimum non extendetur.

4. De sputi conditione passim extant aphor. apud Hippocratem. Flauam bilem sputo admodum permixtam apparere intra initia, bonum est; si multò post apparet, malum: quia naturam nihil aduersus morbum rebellem tentare significatur, 2. *pregnost. t.* 44. & 45.

5. Sputum flauum sincerum, aquositati multæ permixtum periculosum est; album verò, glutinosum ac rotundum inutile, 2. *progn. aph.* 46. Et 1. *de rat. victus in acut. t.* 37. sputum glutinosum κενερόν, pleuritidis signum habetur; cum ex igneo calore materiam adurentem lentor & visciditas contrahatur: idque propterea alibi κενερόν λιοχαινίον ὀνόματι nominat, id est, admodum glutinosum sine coctione. Quod enim coquitur, modicè glutinosum euadit. Hoc verò saltem ab adustione lentorem contrahit.

6. Malum quoque est χλωρόν, id est, æruginosum, vel admodum viride, & quod spumofum excernitur, 2. *prognost.* 47.

7. Sputum nigrum sincerum pessimum est, 2. *prognost.* 48. Indicat enim & humoris prauitatem, & caloris natui extinctionem.

8. Nimirum quò humor mitior est, à quo pleuritis provenit, eò & ipsa mitior est. Mitior est, quæ à sanguine cum bile mixto excitatur. Contumax & diuturna est, quæ à pituitoso humore. Pessima, quæ ab humore melancholico & maligno provenit.

9. In pleuritide, ubi exsecratio dolorem, tussim ac spirandi difficultatem non sedat, malum. Copia enim vel malignitas materiæ, vel expultricis debilitas significatur.

10. Qui pleuritide laborant, nisi intra 14. dies supernè per sputum repurgentur, iis in empyema fit transmutatio, 5. *aphorism.* 8. Aretæus tamen hic interdum vigesimum diem terminum constituit: & Galenus, in *comment.* non solum empyema, sed quamlibet in pus mutationem intelligit.

11. Materiam autem ad suppurationem tendere dignoscitur ex eo, quod sputum parcius eiicitur, nec expectorandi finis est intra decimum quartum. Et cum fit suppuratio, omnia symptomata ingrauescunt, dolor, febris, lingua

guæ siccitas, difficultas respirandi, sæpè etiam accedunt deliria.

12. Qui verò ex pleuritide empyici fiunt, si in 40. diebus repurgentur à die, quo ruptio facta est, liberantur; alioquin in tabem transeunt, 5. aphor. 12.

13. Pleuritis maximâ ex parte die decimoquarto terminatur, aut si non hoc, saltem vigesimo, & quidem si quarto die exspuat æger album, læue, æquale, idque ter vel quater tussiendo, in septimo terminabitur. Si in septimo tale sputum primum appareat concurrentibus alijs bonis signis, morbus vltra vndecimum & decimum quartum diem non extendetur.

14. Si tardiùs æger spuerè cœperit, tardior etiam morbi solutio erit. Contrâ quo citiùs signa mala apparent & ingrauescunt, eò citiùs æger moritur.

15. Præterea sunt & alia signa, quæ ad euentum huius morbi significandum faciunt. Maximum indicium exitialis pleuritidis est, si pulsus summopere durus sit, & præterea etiam paruus, atque ob calorem frequentissimus. Pleuriticus enim cum tali pulsu nullus sanatus fuit, vt Galenus, 4. de præsag. ex pulsu cap. 5. scribit.

16. Quicumque dolor circa thoracem & pulmonis sedem affligens neque sputi expurgatione, neque alui deiectione, neque sanguinis missione, neque medicamentis, neque victus ratione definit, eum in empyema conuerti sciendum est, 2. prognost. 52. si tamen nulla signa lethalia apparent; aliàs mors expectanda.

17. Ad salutem enim terminatur pleuritis vel materiæ *Pleuritidis salutaris terminatio.* excretione, atque excretionem per sputum, quæ ratio frequentissima est & tutissima; vel *Ἀπορροή*, atque discussione, cōturbatūque est, pleuritidem biliosam septimo die iudicatam fuisse per icterum, vel euacuatione materiæ per hæmorrhagiam narium, vrinam, aluum, sudorem; vel permutatione in empyema; vel, quod rarissimū est, per *μυρμήκων* materiæ ad articulos & glandulas, vel parotidas, aph. 38. f. 2. lib. 5. Coacar.

18. Hinc fluxus sanguinis è naribus signum bonum est in pleuritide, vt & hæmorrhoidum & mensium fluxus. Et

præcipuè si fluxus sanguinis in die critico fiat, & post signa coctionis accidat, bonum præfagit, nec inhibendus, nisi vires ad extremum deiiceret. Si verò in principio contingat ex multitudine materiæ à natura gubernatæ, & anheli tus difficilis inde minuatur, & febris vehementia cesset, utilis quoque est. Si contrarium verò eueniat, & sympto- mata non alleuientur, contingit plerùmque ægrum mori in quarto.

19. Diarrhæam quidem, quando superuenit pleuritidi vel peripneumoniæ, malam esse, 6. *aph.* 16. scribit Hippocrates: sed hoc intelligendum de pleuritide, in quâ inflammatio tanta est, ut epate & ventriculo in consensum tracto, nutrimentum non benè concoquatur. Si verò pleuritis non adeò grauis sit, nec epar, nec ventriculus in consensum trahatur ob malî grauitatem, aliquando bonum signum est, materia per aluum euacuata; maxime si coctionis signa adsint, nec fluxus ab alia causâ existat, cuius rei historia habetur apud Valleriolam, *lib.* 1. *obseru.* 4.

20. Pleuritidi si peripneumonia superueniat, malum, 7. *aph.* 11. Fit enim translatio materiæ ad membrum mobile. Pulmonis tamen inflammationes, quæ ex morbo laterali permutationem accipiunt, iis, quæ ab initio fiunt, securiores esse, in *Coacis comm.* 1. *lib.* 5. *sect.* 2. *aph.* 43. apud *Hollerium* scribitur. Quod cur fiat, parum constare scribit *Hollerius*. Desiderius Iacotius verò locum hunc corruptum & pro *ῥοιδοῦν*, legendum esse *ἐμπροσθεν*, putat. Forſan verò hoc loco Hippocrates non instituit collationem pleuritidis cum peripneumonia, sed peripneumoniæ, quæ per se incipit, cum ea, quæ pleuritidi succedit. Etsi enim bonum non sit, pulmonem inflammari sanguine à latere ad eum delato: tamen adhuc periculosius est, si *ἐξ ἀρχῆς*, & per se peripneumonia incipiat. Tum enim toto impetu materia ad solos pulmones ruit. Si verò materia prius ad pectus feratur, in plures partes diffunditur, nec tanta inflammatio inde excitatur. Quando verò transit pleuritis in peripneumoniâ, dolor lateris cessat.

21. Si pleuriticus dolor ex sputis biliosis absque ratione euanuerit, ægri in delirium incidunt, 3. *prorbet.* 1. 5.

Humor

Humor enim biliosus sursum in caput trahitur, & tum vrina tenuis atque alba redditur.

22. Quando pleuritis accidit pręgnantibus, periculosum est, sicut & senibus, cum in his ob virium imbecillitatem & caloris naturalis inopiam materia non concoquatur: vtrique verò phlebotomiam & victum tenuem, quę in pleuritide maximè necessaria sunt, non facillè ferāt.

23. Pleuritis post alium morbum diuturnumque plerumque lethalis est. Periculosa, quę in corpus cachecticum incidit.

24. Densa & exercitationi dedita corpora citiùs ex morbo laterali & pulmonis inflammatione intereunt, quàm quę sine exercitatione degunt. *in coactis.*

25. Quibus in morbo laterali plurimus ex sputo strepitus in pectore sonat, & vultus demissus est, oculusque aurigine suffusus & caligine obductus, in his mors expectanda. *ibidem.*

26. Quibus in morbo laterali lingua circa initia biliosa est, hi intra septimum indicantur: quibus verò tertio, aut quarto die, circa nonum.

27. Et vt signa reliqua etiam, quę pleuritidi cum aliis morbis communia sunt, coniungamus, & quid de euentu pleuritidis sperandum sit, in summam quasi contrahamus, ægrum conualesciturum hæc significant. Leuiter & moderatè morbum perferre, corpus esse æqualiter calidum, ac *Signa salutis.*  
molle, vrinas & alui deiectiones, somnumque rectè sese habere, sitim esse moderatam, facillè respirare, dolorem esse sedatum, sputum facillè ac maturè excerni, idque in substantia & colore sese bene habere.

28. Contra mortem significant, grauiter ac cum anxietate morbum perferre, corpus inæqualiter affici, vt si thorax & venter vratur, extrema frigeant, alui deiectiones, sudores non benè sese habere, non dormire, siti ardere, dolorem non sedari, nihil aut paucum & cum maximo conatu excerni. Delirium si accedat, cum septo affecto hoc contingere soleat, mortale est signum. Si vrina tenuis & subtilis fuerit, nec habens aliam malitiam, indicat materiam raptā esse ad locum inflammatum, & plerumque mortem notat.

*Signa mortis.*

Propria tamen signa maioris momenti sunt, & plus ad mortem significandam vnum signum proprium, quàm ad salutem plurima communia faciunt.

*Indicationes.*

*Indica-  
tiones.*

Cùm pleuritis sit inflammatio, quæ ex affluxu sanguinis fit, ex, quas inflammatio suppeditat, indicationes & hinc dantur. Humores videlicet affluxuri & affluentes reuellendi, fluentes intercipiendi, repellendi, deriuandi; quod denique affluxit, & in parte inflammata hæret, discutiendum, aut quoquo modo è parte tollendum. Repellentibus tamen hinc & intercipientibus locus non datur; cùm per ea materia ad interiora repelli & inflammatio augeri possit. Ideoque in pleuritide materia saltem affluxura & affluens reuellenda: & quæ quidem influxit, in venis tamen partis adhuc fluctuat, nondùmque impacta est, deriuanda, & quod influxit discutiendum, aut si fieri non potest, maturandum, concoquendum, & curandum, vt quàm primùm tussiac sputo reiiciatur atque euacuetur.

Deinde dolor, si magnus sit, & ad sanguinis missionem non leniatur, mitigantia indicat.

Tertiò cùm febris, quæ pleuritidi coniungitur, sæpè sit primaria, ea non negligenda, sed ei necessaria remedia adhibenda. Tandem quod in omni morbo fieri debet, virium habenda est ratio, & cõueniens victus præscribendus. Quæ omnia quomodo expedienda sint, iam dicendum.

*Curatio.*

*Curatio.*

Atque à quo auxiliorum genere curatio inchoanda sit, an à fomentis discutientibus, an à purgatione, an à venæsectione, inter autores non conuenit. Hippocrates quidem, *1. de rat. victus in acut. t. 1.* scribit: *Lateris dolorem, si is per exordia fuerit, siue postea abortus sit, tentare medicamentis dissoluere, non absurdum est.* Aliis tamen hoc tutum non videtur; cùm eiusmodi calefacientibus auxiliis facilè maior humorum affluxus concitari, atque ita inflammatio augeri possit. Verùm enim verò non loquitur Hippocrates eò loci de pleuritide, seu inflammatione pleuræ in specie, sed in genere de lateris dolore, qui ab aliis etiam caussis, & quæ fomentis discuti possunt, non solùm ab inflammatio-



ne pleuræ ortum habere potest, vt infra, *part. 3. cap. 6.* dicitur. Ideoque in vena pleuritide vix venæsectio, si vires eam *Venæsectio.* ferant, differenda, & fomenta præmittenda sunt. Nisi forsitan planè, vt Galenus, *6. epid. comm. 3. text. ult.* scribit, pleuritidis exigua & levis sit, neque à magno humorum affluxu *Fomenta.* oriatur, & fomenta ad humorem discutiendum sufficere videantur. Tum enim leuius fomenta adhibere conuenit, præsertim si à causâ externa, vt aëre frigido pectus lædente, dolor excitetur, absque sanguinis in reliquo corpore abundantia.

Non fomenta duo commoda habent, & per ea mater- *Fomentorum du-* riæ pars euacuatur, parsque affecta propterea minùs di- *rum duplex co-* stenta mitiùs dolet. Ita Galenus, *loco modo allegato*, cuidam *modum.* pleuritide laboranti venam non aperuit. Atque his fomentis si dolor mitigetur, signum est, nullam adesse plethoram, aut pleuritidem potius notham esse, quæ à flatibus ortum habuerit. Itaque audaciùs tunc fomentis, vti licebit, quibus hoc, quod inflammationem aut dolorem parit, discutitur. In fomentis tamen illis adhibendis cauendum, ne nimis calida & discutientia sint, sed planè lenia adhibenda. Vnde etiam Hippocrates aquam calidam & milium applicat. Et applicamus ista, vt & lac commodissimè in vesica, quæ pondere latus non grauat, vt vasa ænea. Videndum etiam, ne quæ calida admouentur, refrigescant: vnde linteis calidis fouenda. Si verò dolor augeatur atque acerbior euadat, indicio est, plethoram subesse, quam ad se trahant partes calefactæ, aut omnino, si signa adsint certi sanguinis affluxus, tunc statim à fomentis desistendum, vel etiam fomenta planè omittenda, & aliqua euacuatio instituenda.

Vtra autem præmittenda sit, venæsectio aut purgatio, *Vtra præ-* etiam ab auctoribus in controuersiam trahitur. Quæ præ- *mittenda* cipuè orta est ex loco Hippocrat. *2. de rat. victus in acut. t. sit in* 10. & 11. vbi ita scribit: *Si dolor ad clauiculam pertigerit, aut pleuriti-* molesta sit vel brachio, vel māmæ, vel partibus septo transuerso *de, venæ-* superioribus grauitas, internam cubiti venam secare expedit. *sectio, an* Si verò eas, quæ sub septo transuerso sunt, partes dolore infe- *purga-* stat, nullum ad clauiculam signum fecerit, ventrem vel nigro *tio?* vereiro vel peplio mollire oportet. Præterea, vt alibi etiam di-

ctum, pleuritidis & talium inflammationum causa principalis est plerumque cacochymia, quam natura in principio febrium talium è corpore depellit, aut certo ad exteriora protrudere conatur.

Verùm Galeno, in comment. cui & Paulus Aegineta, lib. 3. cap. 33. Rhases & alij Medici assentiuntur, tutius videtur in utròque casu sanguinem primò mittere. Est enim pleuritis inflammatio cum febre acuta, in qua secundùm Hippocr. 1. aphor. 24. rarò purgandum, & quidem in initio & cum ingenti præmeditatione; cum sine omni periculo sanguinem mittere liceat. Et sit, vt in pleuritide etiam purgatione opus sit; venæsectio tamen præmittenda, vt Hippocrat. 4. de rat. victus in acutis, t. 21. & Galenus, 6. epidem. comm. 1. t. 6. docet. Venæsectione verò peractâ tutius medicamentum purgans exhiberi potest, si cacochymia magna sit, & illa præsertim in prima corporis regione contineatur, aut eo vergat, quod ex vomitu, alui excrementis liquidis, anxietate & circa ventriculum grauitate cognoscitur. Et Hid. loc. all. non loqui videtur de pleuritide propriè dicta, sed vt modò dictum, de dolore lateris in genere, qui non solum ab inflammatione pleuræ, sed & ab aliis causis ortum habet, quod etiam Rondeletius, lib. 2. c. 15. animaduertit. Etenim dolor, qui sub septo transuerso est, non est in pleura, & intelligit proculdubiò Hippocrat. alium dolorem, qui prouenit ab affectu aliquo in ventre inferiore eius partis, quæ cum intestinis consensum habet. Qua de causa etiam purgantia exhibet. Et Hippocratem de flatulento aliquo affectu potiùs loqui, quàm de vera pleuritide, patet ex eo, quòd daucum, fœseli, cuminum & anisum veratro nigro, & peplio addit.

*Venæsectio tutissimum pleuritidis auxilium.*

Tutissimum ergo & maximè necessarium pleuritidis auxilium est venæsectio, quæ etiam summum ægro commodum affert: modò sanguis per venas affluat. Maximas enim, vt etiam Heurnius existimat, pleuritides etiam nasci sanguine ex arteria aorta affluente verò consentaneum est. Et tum non satis iuuat venæsectio. Virium tamen habenda est ratio, & an illæ venæsectionem ferant, videndum. Et cum quædam sint, quæ vires robustas vel debiles indicant, quæri

curari hic solet, an pueris & senibus pleuritide laborantibus, vena aperienda sit? Item an grauidis pleuritide correptis venam aperire liceat? & an mulieri, si sub ipsū mensium fluxum pleuritide corripiatur, sanguis mittendus sit.

Et primò pueros quod attinet, etsi Averrois referat, quod Avenzoar, maximus apud Arabes nominis Medicus, filio suo trimo venam aperuerit, alique idem sexto anno & octauo fecisse legantur; tamen non facillè id tentandum, & vix ante annum 14. vena aperienda, cum vires ea ætate debiles sint, & ob molliem ac raritatem aliàs insignem dissolutionem patiatur. De qua re etiam in *Instit. lib. 5. part. 2. f. 1. c. 17.* & de febribus *lib. 2. c. 5.* dictum. Si tamen morbus valdè vrgeat, & puer sit pleno corporis habitu, ac sanguine redundet, corpusque non sit nimium molle, circa annum ætatis nonum vel decimum hirudines venis apponere licet. Ægyptiis hodie crurum scarificationem in talibus etiam in pueris in usu esse, in *Instit. lib. 5. part. 1. sect. 2. c. 7.* ex Prospero Alpino dictum. Senibus autem, si adhuc validi sint, sanguinei, carnosique venam aperire nihil impedit, cum vires non annorum numero, sed robore ac corporis habitu æstimandæ sint.

An verò grauidis & sub ipsum mensium fluxum foeminis pleuritide correptis venam aperire fas sit, de eo in *Instit. loc. prius all.* dictum.

Quæ autem vena & quo in latere aperienda sit, non ita planum est ob plurimas & grauissimas hac de re motas controuersias. Non enim solum antiqui (puta Græci, & Arabes) non planè inter se consentire videntur, sed superiore etiam sæculo hac de quæstione variè disputatum, atque vt Thaddæus Dunus *lib. 2. de art. ven. c. 4.* hac de re scribit, acerrimè in hac controuersia altercatum; ac doctiores quique Medici, Itali, Galli, Hispani (adde & Germani) plurimum sunt commoti, ita vt ad magistratum ea res delata fuerit, quo Principis autoritate & gladio tumultuosæ istæ disputationes sedarentur, qua de re infra pluribus quæst. 4. dicetur; hic saltem veriorem quam putamus, sententiam proponemus.

In pleuritide, vt in aliis inflammationibus, reuulsionem,

*Ante annum 14.  
vena  
vix aperienda.*

*Quæ vena  
na &  
quo in  
latere aperienda.*


quæ sanguinem affluxurum, aut etiam, qui iam affluit, à parte inflammata, quantum fieri potest, longissimè aduertat, atque ita incrementum inflammationis prohibeat, necessariam esse, tentandùmque eam mox esse in principio, dum fluxio humorum adhuc durat, & inflammationis incrementum metuitur, extra controuersiam est. Materiam autem, quæ ad vicinæ inflammationis loca iam influit, aut etiam in partem inflammatam iam influxit, nondum tamè in ea impacta est, deriuationem requirere etiam extra dubium est, sicut & illud, reuulsionem, ad contraria, deriuationem ad vicina, & utràmque *¶* *¶*, seu secundùm rectitudinem fieri debere. Hoc autem iam in controuersia est, an reuulsio, vena in latere affecto aperta, fieri, & an vnà & eadem venâ apertâ, simul reuulsio & deriuatio fieri possit; & an rectitudo saltem secundùm latitudinem consideranda sit. Nihil horum concedimus, statuimûsque præsentè plenitudine venâ in eodem latere apertâ sanguinem potius ad partem affectam attrahi, quàm ab eo reuelli, & quòd reuulsio, vbi utròque auxilio opus est, tempore præcedere debeat deriuationem, neque utrâque eadem venâ aperta peragi possit, asserimus. Etsi hoc non negamus, quod plethora etiam in eodem latere venâ apertâ demi, atque ita morbus aliquando præcaueri possit. Veruntamen commodius est, si in latere opposito vena aperiatur, quâ & sanguis minuitur, & à loco affecto reuellitur. Statuimus hinc *¶* *¶*, non solùm secundùm longitudinem corporis, sed etiam secundùm latitudinem considerari posse.

Primum quod attinet, cùm focus & fons quasi, è quo sanguis affluit ad partem affectam in pleuritide, non sint venæ brachij in latere affecto, sed truncus venæ cauæ, à quo vtriusque brachij venæ originem habent, & plus sanguinis sit inter latus oppositum & locum affectum, quàm inter locum affectum & brachium loco affecto vicinum, si in principio, præsentè adhuc plenitudine, vena in eodem & parti affectæ vicino brachio aperiatur, facillè fieri potest vt sanguis, qui post venæ sectionem ratione vacui ad brachiû, in quo vena aperta est, fluere debet, ad part. inflammatam, vtpote debilem, dolentem & calentem præt. nat. ruat,

riat & trahatur, atque ita inflammatio augeatur. Præcipue si fluat sanguis per ramum subclauium, aut mammarium, aut thoracicum, Tum enim vena in eodem latere secta non conciliatur motus contrarius, sed augetur influxus.

Sit enim a a. ramus subclauius, b b. vena mammaria, c c. thoracica, d d. cephalica, e e. basilica, f. truncus venæ cauæ. Secetur eiufdem lateris cephalica vel basilica, manifestum est, motum contrarium hoc modo non conciliari. Ex fonte enim f. seu trunco venæ cauæ, dum vena d. vel e. aperitur, simul fluit versus a. b. c. Neque etiam, si per intercostalem venam sanguis influat, tunc in eodem latere vena aperitur, cum, ut Hipp. *de ossib.* docet; danda sit opera, ut quàm maximè procul à locis, in quibus dolores fieri & sanguis colligi solet, sectiones faciamus.

Contrà verò si in opposito brachio vena aperiatur, sanguis, qui ad affecti lateris venas & per eas in partem affectam fluxurus erat in contrarium trahitur & sine yllò periculo.



Et licet è venis eiusdem lateris, vtpote quæ parte affecta in pleuritide superiores sunt, sanguis fluat; tamen venæ illæ reuera fons non sunt, è quibus sanguis fluit, cum is ex internis & maioribus venæ cauæ ramis ad hos & per has ad partem affectam mittatur. Et quævis eadem vicinitas est vtriûsque brachij cum vena caua, tamen, vt dictum, si venæ in latere affecto aperiantur, facillè fieri posset, vt cum maiore impetu ad locum vicinum affectum fluat. Et confirmat ipsa experientia, quod rectè fiat, si in opposito brachio vena aperiatur. Per tot enim annorum sæcula, quibus Arabes & post hos Barbari, vt ob stylum nominantur, Medici in pleuritide in initio morbi in opposita parte venam aperierunt, nihil incommodi ex eo Medici illi non imperiti perceperunt, nihilque damni ægris ex venæ sectione hoc modo administrata inferri animaduertunt. Imò Matth. Curt. vt postea in. 4. dicetur, cum ipse pleuritide corripere, & à Medicis quos in consilium vocauerat, rogaretur, an secundum suum dogma in brachio lateris affecti, an verò in opposito secundum Arabum doctrinam venam sibi aperiri vellet: in opposito latere venam sibi secari maluit, proculdubio non ignarus, quod aliis etiam eadem sinè incommodo, imò cum vtilitate aperta esset.

*Vlla vena aperta reuulsioni & deriuationi inservire non potest.*

Neque ex vnâ venâ aperta simul reuulsio & deriuatio fieri potest. Cum enim reuulsio fiat ad remota & contraria, deriuatio ad vicina; vnâ & eadem pars remota ac vicina esse non potest, atque eodem tempore vtramque fieri non posse clarè docet Galenus, *de cur. rat. per sanguin. missionem* cap. 19. *Vt summam dicam*, inquit *incipientes inflammationes reuulsione curare oportet, quæ verò iam inueteratæ sunt, ex ipsis, si fieri potest, partibus. Quod si fieri nequeat, saltem ex vicinis.* Ideoque cum Hipp. & Gal. in eodem latere venam aperire præcipiunt, id non reuulsionis, sed deriuationis gratiâ fecerunt, quod vel ex eo apparet, quod eo vsque sanguinis missionem continuari voluerint, donec color mutaretur, qui sang. è part. aff. iam affluentis signum est, reuulsio verò è parte affecta non euacuat.

*Tò igitur*

*Tò igitur* verò & rectitudinem quod attinet, quamvis

in opposito latere vena aperiatur, nihilominus secundum Hipp. & Gal. præceptum sit κατ' ἕξιν καὶ ἐνθυσίαν. Neque enim κατ' ἕξιν, observatur solum secundum longitudinem corporis, sed & secundum latitudinem; id quod clarè docet Gal. in comm. ad lib. Hipp. de fract. l. 10. κατ' ἕξιν, inquit, semper pro ex directo ponit, aliquando per longitudinem corporis, aliquando per latitudinem. Et idem Gal. 2. ad Glaur. c. 2. vno crure laborante ex altero sanguinem mittere iubet. Non enim requiritur, ut vena, quæ reuulsionis gratiâ aperitur, communionem cum parte affecta habeat, id quod in deriuatione est necessarium; sed cum parte mittente communicare debet. Nam cum deriatio est parte affecta, aut certè vicinis euacuare debeat, necesse est, ut per venas, quæ cum parte affecta communionem habent, fiat, & quidem vicinas. Cum verò reuulsionis finis sit, sanguinem ad partem affluxurum aut iam affluentem ab ea ad contrarium auertere, necessarium est; ut per eas venas fiat, quæ cum parte mittente communionem habent, à parte verò recipiente seu affecta remotæ sunt. Quod in pleuritide optimè fit in latere opposito. Cum enim è trunco venæ causæ sanguis ad latus affectum effundatur: vena in brachio opposito aperta habet cum venæ causæ trunco, utpote à quo oritur, communionem, remotior verò est à loco affecto, quàm venæ eiusdem lateris.

Quæ cum ita sese habeant, & medicinæ fundamentis consentanea sint, si Medicus mox in principio ad ægrum vocetur, & plenitudo corporis insignis adsit, & vehemens ad partem affectam affluxus, virèlque venæ sectionem ferant, in opposito brachio vena aperienda est, longinquo-  
ris reuulsionis gratiâ; & ne, corpore adhuc pleno & durante humorum affluxu, secta in eodem latere vena affluens humorum copia ad latus inflammatum moueatur. Postea verò in eodem latere deriuationis gratia vena aperiri potest. Et in primis id fieri debet in iis region. & homin. qui largam & repetitam sanguinis missionem faciliè ferunt.

Neque refert, quod ubi vena in opposito brachio aperitur, euidens auxilium non statim inde percipiatur. Enim nemo primo die vel moritur, vel sanatur, & satis est, si postea

postea commodum ex ista venæsectione percipitur, quod satis magnum est, dum à loco inflammato sanguis, qui inflammationem aucturus erat, auertitur, & ex deriuatione plus postea commodi percipitur, si reuulsio præmissa sit.

Si verò, quod sæpè fieri solet, Medicus non statim in primo morbi principio vocetur, & sanguinis, qui morbi vehementia, febrili calore & inedia minui solet, non adeò magna sit abundantia, nec magnus etiam amplius affluxus, aut si pleuritis sit mitior, sanguinisque nec copia magna, nec magnus affluxus, & vires etiam iteratam sanguinis missionem laturæ non sint, statim in loci affecti latere venam aperire licet. Nam si initio pleuritidis, in qua magnis humorum affluxus non est, solùm fomentis curari potest, cur non etiam in tali miti pleuritide, aut in qua non est amplius magnus humorum affluxus, solùm eiusdem lateris venam aperire sufficiat.

*Mulieribus mensium suppressione laborantibus quam venam secanda in pleuritide.*

Cæterum & hoc in controuersia est, vtrum mulieribus mensium aut hæmorrhoidum suppressionem patientibus & pleuritide correptis vena in brachio an verò in poplite aut pede aperienda sit. Arabes quidem nonnulli etiam aliàs à vena in pede secta fecerunt initium, & sentiunt nonnulli, morbos à menstruorum in foeminis & hæmorrhoidum in viris & foeminis suppressione originem trahentes venarum in crure sectione tantùm sanandos esse, id quod in morbis diuturnis, & qui dant inducias, faciendum esse, libenter concedimus. In morbis verò acutis, qualis est pleuritis, non semper in poplite aut pede vena aperienda est, sed distinctio adhibenda. Nam si in talibus euacuationibus, quæ statis temporibus fieri solent, repente omninoque suppressis, sanguinis ad superiora motus & in latus affluxus manifestè deprehendatur, à venæ poplitidis, vel tali sectione curatio omnino inchoanda est. Si verò suppressio iam antiqua sit, per quam paulatim plethora vel caco-chymia aliqua & humorum abundantia in superioribus partibus cumulata sit, neque etiam tempus mensium instet, tum à venarum brachij sectione curatio inchoanda. Acutus enim morbus id requirit, nec moram fert, donec

rursum



rursum vel menses, vel hæmorrhoides prouocentur, fierique potest, vt, dum in mensibus vel hæmorrhoidibus prouocandis laboratur, æger vehementiâ morbi iuguletur. Mensium verò & hæmorrhoidum suppressio moram fert, eiusque postea, cum acuti morbi periculo æger liberatus est, ratio haberi, & vt sanguis suppressus prouocetur, opera dari potest.

Nec hic prætereundum, cum pleuritis non rarò febrem & morbum primum sequatur, vel comitetur, quæ sæpè malignitatem insignem coniunctam habet, id quod frequenter in pleuritide epidemia accidere solet, diligentertum malignitatis esse habendam rationem, & an ea venæsectionem ferat, attendendum esse. Mentionem facit Gesnerus, lib. 1. *epist. p. 19.* cuiusdam epidemix malignæ, & contagiosæ pleuritidis, quâ multi perierunt, & in qua venæsectio in brachio nihil profuit, sectio verò ad malleolos & in principio sudor ab antidoto aliquo plus opis tulit. Et omninò in talibus malignis primò malignitas expugnanda, & hinc reliqua, quæ opus peragenda.

Tempus quod attinet, cum sanguis vel reuulsionis vel *Quando* deriuationis gratia mittatur, & reuulsio humori fluëti de- *secanda* beat, fluxio autem fiat in principio, sâguis statim reuul- *fit vena.* sionis gratiâ in initio morbi quacunque diei hora mittendus, neque venæ sectio hic diu differenda, vt postea deriuatio fieri possit. Veteres, teste Galeno, 3. *epidem. comm. 3.* non mittebant sanguinem post quartum diem. Verùm certus dierum numerus hîc definiri non potest, sed interdum post quartum diem sanguinem mittere non licet, quandoque & octauo licet. Nam si quartò die iam materia concoqui, & per sputum expelli cœpit, ne natura sua ab hoc suo opere auertatur, post quartum diem venam secare faciliè non licet. Si tamen corpus sit valdè plethoricum, tutiùs id facere licet, vt natura oneris parte leuata reliquum faciliùs concoquat. Si verò tale quid non obseruetur, etiam post quartum diem venam secare fas est, quod & Hipp. 1. *all.* fecit qui Anaxioni venam aperuit octauo die, vel quod citiùs non fuerat vocatus, vel quod in pleuritide crudissima, quæ vndecimo die vix coqui cœpit, morbus inducias tulit.

Quantum

*sanguinis  
sit mit-  
tendum.*

Quantum sanguinis mittendum sit, ex eius copia & virium robore æstimandum est. Ita etiam vires docebunt, vtrum confertim & vna vice; an verò partitis vicibus sanguis mittendus sit. Hippocrates 2. *de rat. viñt. in acut. t. 10.* vacationis modum statuit esse coloris in sanguine mutationem, si scilicet à crudo etiam aquoso rubicundus vel flauus fluat, aut à rubicundo vel flauo liuidus vel niger ob aduñtionem. Indicio enim est, sanguinem ex ipsa phlegmone, vel vicinis huic venis, alteratum, & transmutatum iam euacuari, qui ob calorem & aduñtionem ibi colorem mutauit. Verum id tantum locum habet, cum in eodem latere deriuationis gratiâ sanguis mittitur, non verò, cum in opposito reuulñionis gratiâ.

Neque tamen, cum in eodem latere vena aperitur, illam coloris mutationem semper expectare licet, sed prius cessandum est, cum scilicet aut vires infirmæ sunt, ægerque habitu corporis molli teneroque est, qui facile resoluitur, aut tempus anni admodum calidum, aut inflammatio ita praua, vt de impacto ei sanguine nihil emittatur.

Antiqui etiam ad lypothymiam vsque sanguinem mittebant. Verum corpora nostra talem venæsectionem, præcipue in pleuritide, non facile ferunt, cum propter dolorem febrem, tussim, viribus opus sit, quæ constare nequeunt, si initio statim sanguis tam copiose euacuetur.

*Cucurbitula.*

Vicariæ phlebotomiæ in corporibus infirmis & materiæ copia non magna sunt cucurbitulæ cum scarificatione infernis lumbis vel partibus inferioribus appositæ.

#### *Purgatio.*

*Purgatio.*

Postquam sanguinis missione impetus eius aliquo modo conquieuit, & pars aliqua humoris inflammationem parientis euacuata est, si ex missi sanguinis colore & aliis signis cacoçhymiam in corpore subesse, quæ malum foueat, augeatque, Medicus coniciat, ad purgationem accedendum est, in primis si eam ad primam capitis regionem vergere ex ventris murmure, vomitu, excrementis alui liquidioribus, anxietate circa ventriculum cognoscatur. Atqui id maturè faciendum, Autor quidem, *lib. 4. de rat. viñt. in acut. aph. 6.* diem quartum simpliciter purgationi determi-

nat. Verùm rectè scribit Galenus, *in comm.* talia ægro secū-  
dum numerum dierum simpliciter iniungi non posse; sed  
quod Hippocrates statuit, esse sequendum, ideoque statim  
initio medicandum, vel postea, quando ad maturitatem  
perducti sunt humores; quam ob causam & prima inter-  
dum die; & secunda & quarta, & interdum quinta se pur-  
gans medicamentum dedisse scribit. Ideoque humores, qui  
in communibus ductibus redundant; & facile ad partem  
affectam confluunt, initio, quo tempore auersio maximè de-  
sideratur, purgandi; postea verò vbi morbus viget, & hu-  
mores à natura concoquuntur, melius est quiescere.

Exhibenda verò talia medicamenta, qualia sunt apta ad  
euacuandum humorem; qui in corpore abundat, & in la-  
tus iam fluere cupit, vel saltem ad fluxionem paratus est,  
modò illa mitia sint & lenia, qualia sint tamarindi, manna,  
cassia, syrupus rosar. & viol. solut. & rhabbari, mechoacan-  
næ, fol. senæ, agarici, vel fortiorum aliquid addi potest, dia-  
prunum, diacatholicum.

A fortioribus verò purgantibus medicamentis abstinē-  
dum, ne commoti ab his humores maiori impetu in par-  
tem affectam ruant.

E. g. ℞. *Decocti st. & fruct.* ʒ. ij. in quibus dissolu. *mann.*  
*el.* ʒ. vj. *cassie extr.* ʒ. ʒ. *diapruni simpl.* ʒ. iiij. *extr. rhabarb.*  
*ʒ. j.* *spir. vitriol.* ʒ. v. M.

Nonnulli quocunque humore redundante exhibent o-  
leum amygdal: dulc. recens, per quod facile sine molestia  
alius mouetur. Cui quidam aliquid visci querni vel den-  
tis apri addunt. Conradus Gesnerus *loc. alleg.* in pleuritide  
illa epidemia oleum lini propinatum fuisse, & aluum co-  
piose mouisse scribit.

Alterantia quoque febris, & humoris peccantis causâ  
exhibenda, humorque si nimis calidus, acris, tenuis, aut  
contrà crassus sit, aptis medicamentis alterandus & corri-  
gendus. Quæ tamen etiam commodè cum illis, quæ hu-  
morem iam in latere hærentem respiciunt, misceri possunt;  
vel ex alterantibus ea eligi, quæ simul peculiari propieta-  
te causam morbificam respiciunt. Et si coniiciamus, fe-  
brem illam quæ pleuritidi coniungitur, esse malignam,  
qualis

*Oleum  
lini in  
pleuriti-  
de epide-  
mia al-  
uum mo-  
uit.  
Alteran-  
tia.*

qualis fermè semper in pleuritide epidemia, vtile, imò necessarium est, vt statim in itio etiam medicamenta sudorifera exhibeantur, qualia aliàs febribus malignis dicata sunt; quæ tamen ita parari debent, vt simul peculiari vi hunc morbum respiciant.

*Duo medicamentorum genera in pleuritide.*

Vniuersalibus euacuationibus hoc modo præmissis, ad ipsam continentem causam, & humorum inflammationem excitantem curatio dirigenda est. Vbi duo imprimis medicamentorum genera requiruntur. Alia proprietate & vi peculiari pleuriticis vtilia; alia expectorantia & exspuitionem faciliorem reddentia, vel materiam insensibiliter discutientia.

*Specificæ.*

Priora quod attinet, etsi inflammatio morbus notus sit & propterea medicamēta occultâ vi agentia requirere non videatur; tamen causis, quæ eam excitant, plerumque peculiaris malignitas inest, quæ propterea etiam medicamenta occultâ qualitatē agentia requirunt. Talia sunt, flor. papauer. errat. seu rhæados siue per se sumpti, siue illorum succus, siue aqua, siue syrupus. Nonnulli flores istos recentes in succo betulæ, inspersis aliquot guttulis spirit. sulphuris acidi per campanam facti, ad gratam conciliandam acredinem, non secus quàm rosas aut violas macerant, atque inde ter aut quater reaffuso recentibus floribus diluto cum saccharo serapium rubicundissimi coloris conficiunt, quo postmodum prospero successu in pleuritide suo tempore vtuntur. Nam non solum impetum humoris tenuis affluentis refrænât, ardorēque & ebullitionem sanguinis compescit; verum etiam acutæ febris præfens est auxilium. Huc referuntur carduus Mariæ & præcipuè semen, carduus bened. scab. radix lappæ maior. seu bard. rad. aristol. cortex auellan. rubrar. oculi cancrorum, vel eorum magisterium, dens apri, castor. lign. visci querni, mandibulæ lucij cum dentibus, oculi item lucij & cruces in capite eius inuentæ, lapis carptionum, percarum, priapus tauri, cerui, talus leporis, capreoli, sperma ceti, corallia rubra, quorum 3. j. vel etiam plus cum aqua conuenienti; exhiberi potest, millefolij item radix confusa, & cum aceto exhibitæ; succus pimpinellæ Italica, seu sangu

sanguisorbæ; aqua prunorum sylvestrium, sal hyperici, quæ imprimis iuuant, si post eorum risum sudor excitetur. Id eòq; Chymici & alia sudorifera exhibent, vt bezoarticum minerale, ☿ diaphoreticum, & spiritum illum iuniperi compositum. Peculiariter etiam è nonnullis commendatur ius pauonum pingue.

De horum autem viribus, & quomodo pleuriticis profint; alij aliter disputant. Nobis probabile videtur, ea imprimis ratione pleuriticos iuuare, quod vim humores dissipandi & discutendi habent, & ex iis etiam quædam malignos humores expellunt, ac cum pectore peculiarem cognationem habent. Vnde pleraque ex iis lapsis & contusis ad sanguinem concretum dissoluendum exhibentur, quædam in malignis febribus vsurpantur. Sicut nimirum venena alia aliis partibus nocent: ita & humores vitiosi alij ad alias partes à natura seu protruduntur, seu ruunt, & vt cancer, erysipelas, similisque tumores non in omnibus æquè partibus excitantur, & humor qui dysenteriam excitat, intestinis peculiariter infensus est: Ita & humoris pleuritidem excitantis ea plerumque natura est, vt ad pleuram, non ad alia membra tendat. Hinc etiam sicut dysenteria, ita & pleuritis nonnunquam est epidemia. Medicamenta ergo, quæ peculiari vi pleuritidi profunt, occultam illam humoris vitiosi qualitatem expugnant. Quapropter etiam commodissimè dantur initio, vt scilicet malignum illud, quod naturam stimulat, & huius fluxionis causa est discutatur.

Vt *℥. Fl. pap. err. m. j.* Infunde in *aq. scab. card. Mar. an. ℥b.* *℞.* Colentur, & cum *sacch. cand.* dulcorentur. F. iulebus.

Vel *℥. Card. Mar. ℥. ij. flor. pap. errat. ocul. cancr. an. ℥. j.* F. puluis qui detur cum aqua endiuivæ.

Vel *℥. Unicornu, C. C. præpar. margaritar. corallior. rub. ocul. cancr. mandibular. lucij, lapid. percar. an. 3. j.* F. puluis. Detur 3. *℞.* in *aqu. prunor. sylvest.*

Vel *℥. Carduiben. cort. auellana. rubr. an. ℥. ij. ocul. canc. mandibul. lucij, corallor. alb. an. 3. j.* F. puluis.

Vel *℥. Rasura dentis aprugni 3. iij. ℞. ligni visci querc. rad. bardanæ, an. 3. j. ℞.* F. pulu. tenuissimus.

Vel ℥. *Sem. cardui Mar.* 3. j. *℞. card. ben.* 3. ℞. Cum aq. card. Mar. 3. ij. *card. ben.* 3. j. F. emulsio, cui adde syr. viol. pap. errat. an. 3. ℞. M.

Vel ℥. *Sem. melon.* 3. ij. *papau. albi.* 3. j. *cardui bened. cardui Mariæ* an. 3. j. ℞. aq. scabios. *cardui ben.* an. 3. ij. *hyssopi,* 3. j. F. emulsio in qua dissolu. *mandib. luc. vslar. rasur. dentis apri* an. 3. j. *cryst. præp.* 3. ℞. syr. de *althæa,* 3. ij. *manus Christi perl. cum aq. rosar.* 3. ℞. M.

Vel ℥. *Succi sanguisorb. syr. papau. errat.* an. 3. j. *aqu. card. Mariæ,* 3. ij. vel ij. M.

Vel ℥. *Dent. apr.* 3. j. *flor. papau. errat.* 3. ij. *syr. papau. errat. capill. Vener.* an. 3. j. Misce.

Vel ℥. *Aq. scabios. xvj. pimpinell. sanguisorb.* 3. viij. *flor. papau. errat. sicc. m. j. sacch. penid.* 3. ij. Ebulliant in vase duplici clauso & colentur.

Vel ℥. *Aq. chærefol. cardui Mariæ, papau. errat.* an. 3. ij. *ocul. lucy,* 3. ℞. *matris perlar. præp. succini albi præp.* an. 3. xv. *extr. enulæ,* 3. v. *syr. de hyssopo,* 3. ℞. *de succo violar.* 3. ij. *essent. papau. errat.* 3. j. M. de quo die noctûque per quatuor vices tria cochlearia calidè propinentur.

Vel ℥. *Aq. cardui ben. scabiosæ,* an. 3. j. ℞. *papau. errat.* 3. ij. *ocul. cancri præp. C.C. præp.* an. 3. j. *syr. de succ. violar. de iuiubis,* an. 3. ℞. *de althæa,* 3. ij. *spir. sulphur. acidi,* 3. ij. M.

Quod verò medicamenta, quæ ad materiæ per sputum sensibilem euacuationem faciunt attinet, pro humoris & temporis morbi ratione hæc nonnihil variant. Cùm enim humores ad exspuendum aptissimi sint, ubi mediocritatem quandam obtinent inter crassum & tenue: medicamenta ita comparata esse debent, ut eam humoribus inducant. Humores enim tenues, & qui pro tenuitate aëris tussi expulsi impetum effugiunt, ab initio incrassantibus ad mediocritatem reducendi, & ad exscreationem aptiores reddendi sunt. Crassos verò attenuare, viscidos incidere, adhærentes abstergere & abluere, simulque vias expulsionis aptas reddere conuenit.

Incrassant *rad. althæa, flor. violar. bugloss. iuiubæ, sebest. gummi tragac. amyllum, papauer, syrup. violar. iuiubæ. de papau. diatod. diapenid. diatragac. frig. loch de psyllio, decoctum pe-*  
torale

*Florale*, quod ex *hordeo*, *passul.* *iuiub.* *glycyrrhiz.* ac 4. *sem.* *frigid.* maior. conficitur.

E. gr. ℥. *sacch. penid.* ʒ. j. *rotul. diaireos* s. *diatr. frig. an.* ʒ. iij. *passul. enucl.* ʒ. ʒ. *sem. malu.* ʒ. j. *papu.* ʒ. ʒ. Cum f. q. *syrup. viol.* M. in formam linctus.

Vel ℥. *Syr. violar. de iuiubis capillorum Veneris*, conseru. *violar. sacch. candi, amyli, an.* ʒ. ʒ. M.

Vel ℥. *Amygd. dulc. contusar. pinear. in aqu. bordei infus.* & cont. an. ʒ. j. *sem. melon. cucurb. excortic.* an. ʒ. ij. *sacch. candi* ʒ. ʒ. *syr. capill.* ʒ. i. *iuiub. an.* q. s. F. *lohoh.*

In crassa verò materia conueniunt *hydrom. oxymel, hyssopus, capillus* ʒ. *ris, scabiosa, tussilago, syrupus capill. Veneris, de glycyrrh. de farfar. de hyssopo, de prassio, de scabiosa, loch de farfara, de pino, de prassio, de scilla, diatragac. calid. decoctum pectorale ex passul. sebest. iuiubis, dactil. caricis, bord. glycyrrhiz. capill. Vener. hyssopo paratum.*

Vt ℥. *Syr. capill. Vener. de glycyrrhiza, an.* ʒ. j. *de tussil. oxymel. s. an.* ʒ. vj. M.

Vel ℥. *Lohoh de penid. de farfar.* ʒ. ʒ. *spec. diaireos.* s. ʒ. j. Cum *syrupo de glycyrrhiza* F. *lohoh.*

Vel ℥. *Ol. amygd. dulc. vel lini vel utriusque oxymel. s.* ʒ. ʒ. *sacch. penid. q. s. F. lohoh.*

Bottonnus Medicus Italus, sequenti eclegmate feliciter vsus est.

℥. *Ol. amygd. dulc.* ʒ. ij. *oxymel. scillit. sacch. cand. an.* ʒ. j. *succi cepar.* ʒ. j. M. de quo sæpius *cochl. ʒ. propine-* tur.

Verum medicamenta, quæ ad crassos humores temperandos adhibentur, non sine omni distinctione vsurpanda cum crassum sit varium. Crassum enim aliud naturâ suâ tale est, aliud ob coctionem. Primo conueniunt incidentia & attenuantia; crasso ex coctione, quæ abluunt & abstergunt; adustis ea quæ humectant. Si materia sit cruda & contumax, & febre remittente non cedat materiæ exscretio, validioribus vtendum, vt loh de caulibus, de farfara, sano & experto & aliis, quæ pulmonem à pituita, & pure expurgare possunt. Atque medicamentis reliquis acetosi aliquid interdum addere licet, ad maiorem incisionem

*Crassum  
duplici  
modo ac-  
cipitur.*

sionem, & vt ad tussim æger nonnihil stimuletur. Aliàs beccchicis non vtendum, nisi cùm facultas languida est, vt satis non expellat, cùm ipsa caussa naturam satis ad ipsam tussim irriter.

Antiquis in omni vera pleuritide in magno vsu erat oxymel, sed dilutius, de quo Hippocrates 1. *de rat. vict. in acut. tom. 43. & 3. de ration. vict. tom. 4. & seq. videatur.* Dictum etiam de eo in *Instit. lib. 5. part. 3. f. 3. c. 4.*

Atque ex enumeratis hætenus plerumque parantur medicamenta, quæ plures fines respiciunt. Nimirum quæ simul habent vim feбри, cuius ferè soboles est pleuritis, vt & malignitati, si quæ adsit, resistendi, materiæ perspurum reiectionem adiuuandi & pleuritidi peculiariter resistendi.

Vt ℥. Loboh de farfar. ʒ. j. spec. diatr. s. ʒ. β. ocul. cancr. ʒ. β. Conseru. violar. ʒ. β. Cum syrupo papauer. errat. F. lo-  
hoh.

Vel ℥. Rad. fenicul. tussilag. an. ʒ. iiij. spec. decoct. pectoral. ʒ. vj. Coq. in suffic. quant. aquæ simpl. Col. ℥. lb. j. β. Adde syrup. acetos. s. pap. errat. violar. an. ʒ. j. M.

Vel ℥. scabios. P. j. card. Mar. m. β. iuiub. ʒ. β. rad. glycyrrh. sem. melonum, cardui Mar. an ʒ. ij. Coq. in s. q. aq. hordei, Colaturæ ℥. ʒ. vij. syr. papau. errat. ʒ. j. violar. ʒ. vj. M.

Vel ℥. Rad. glycyrrh. ʒ. vj. flor. violar. papau. errat. an. P. j. iuiub. sebesten. an. N. vij. passul, ʒ. j. ficuum, N. vj. sem. card. Mar. melon. an. ʒ. ij. Coq. in aq. hordei, Col. ℥. lb. ij. dulcoretur sacch. cando.

Vel ℥. Fol. farfare, m. ij, fragor. violar. an. m. j. rad. be-  
len. ʒ. ij. glycyrrh. ʒ. j. sem. fanicul. ʒ. j. caricar. N. iiij. passul. ʒ. ij. Coq. in aq. hordei mensur. iiij. ad tertię part. consumptionem. Detur manè & vesperi haustus.

Vel ℥. sem. fenig. ʒ. j. lini, ʒ. β. iuiubar. N. vij. dactyl. ficuum, an. N. iv. passul. exacin. ʒ. β. rad. glycyrrh. ʒ. iiij. Coq. in aq. hordei s. pro ʒ. viij. Quibus adde pulu. rad. bardanæ, ʒ. j. spec. diatr. frig. ʒ. β. liquor. visci. querc. ʒ. xiiij. sal. carduiben. ʒ. j. syr. de iuiub. de althæa, an. ʒ. β. M.

Ad dolorem mitigandum, materiam euacuandam, in-  
flammatio



flamationem resoluendam, sudorem eliciendum, vt admirabile præsidium aq. è flor. chamæmeli destillata commendatur, cuius ʒ. iv. cum sacchar. ʒ. β. vel ʒ. j. exhibentur.

Neque solum interna medicamenta post vniuersalia *Externa.* illa præmissa necessaria sunt, sed & externa quædam medicamenta adhibentur, quæ materiam insensibiliter resoluunt, simulque dolorem leniunt, ad materiæ concoctionem faciunt, pectusque vt ægri facilius expuere queant, dilatare possunt. Quorum alia sunt mitiora, vt *Mitiora.* sponsia, vel linteam madefactum in aqua dulci tepida, vel lacte, aut vesica his repleta: Item ol. dulc. viol. amygdal. dulc. mucilag. sem. alth. cydon. adeps suillus, gallin. butyr. omnia recentia, vnguen. dialth. Alia mediocria, quæ vim aliquam discutiendi & aperiendi habent, vt chamæmel. anethum, hyssopus, origan. melilot. sem. lini, foenigr. flor. cheiri, & olea ex his composita. Alia fortiora, vt sal. dictamn. Cretic. ruta, galbanum, lepidium, sinapi. Et quidem mitiora in corporibus mollioribus, vt pueris & foeminis, locum habent, & initio morbi sufficiunt, vt dolorem leniant, quos sedato influxus sistatur. Validiora viris & robustioribus *Fortiora.* admouenda; sicut & thorace à materia per expectorantia maximâ ex parte expurgato ad fortiora ascendendum. Atque ex his variæ medicamentorum formæ componuntur: fomenta, inunctiones, cataplasmata, emplastra, sacculi, sed sicca & arida veræ pleuritidi minus quam nothæ conueniunt. Atque in maiore dolore mollioribus; vt fomentis & illinitionibus vtendum. Vbi verò dolor non est adeo vehemens, cataplasmata, cerata, emplastra adhibere licet.

Vt ʒ. Mucilag. sem. althæe, psyllij, cydon. an. ʒ. iij. ol. viol. amygd. dulc. an. ʒ. β. ceræ parum. F. vnguentum.

Vel ʒ. Ol. amygd. dulc. chamæmel. lilior. albör. vnguent. dialth. an. ʒ. iij. pingued. gallin. butyri recent. non saliti, an. ʒ. j. β. ceræ parum. F. Linimentum. Vel ʒ. Vnguent. dialth. ʒ. β. pulv. rad. ireos, ʒ. β. ol. amygd. dulc. medull. crur. vituli an. q. s. F. Lin. Vel ʒ. Rad. alth. ad mollit. coctar. & per setac. transm. lb. β. farin. fabar. sem. lin. fænig. an. ʒ. β. pulv. fl. chamæm. ʒ. iij. pingued.

*pingued. gallin. anserin. an. 3. R. vitell. ouor. duor. croci 3. j. M. F. Cataplasma.*

Vel *℞. Rad. lilior. albor. alb. an. 3. j. malu. violar. flor. hyperici, consolid. regal. an. m. j. Coq. ad mollitiem, & per setaceum traiciantur, deinde adde *farin. sem. lini, fenigræc. pulu. flor. chamæm. an. 3. j. ol. amygdal. dulc. vel butyri recentis sine sale q. s. F. Cataplasma.**

*Aëtius tetrab. 2. ferm. 4. cap. 68.* post septimum diem, si dolor persistat cucurbitam lateri affigere & cutim scarificare iubet, manifestissimamque in pleuritidis utilitatem ex cucurbitulæ appositione percipi scribit. Vulnusculis verò scarificati loci salem aut nitrum inspergere, si sustinere queant; in aliis linteolum oleo madefactum, ac sale conspersum imponere præcipit; sequenti deinde à scarificatione die rursum cucurbitam affigere iubet, quâ sanguis saniosus ex vulnusculis extrahatur. *Paul. Ægineta lib. 3. c. 33.* post quartum etiam diem vitur cucurbitulis. Commendat *Trallianus, lib. 6. cap. 1.* hoc auxilium, ut quod cum admiratione dolorem licet vehementissimum leniat, ve neq; fomentis, neque alio auxilio opus sit. Verum enim verò validum hoc est auxilium, & quod vel insignè commodum vel damnum afferre, & à paucis tolerari potest, præsertim si ad *Aëtij* præscriptum adhibeatur. Quapropter usurpandum cautè & cauendum, ne vel nimij dolores, vel noua fluxio concitetur, tum scilicet cum affectus diuturnior causæ potiùs parti impactæ contumaciam, quàm multitudinem præ se fert, & cum venæ sectione & purgatione adhibitâ dolor eodem modo intensus non ad septimū solum diem, sed ad vndecimum etiā & decimum quartum perseverat, & neq; manifestè euacuantibus, neq; resoluentibus cedit; nulla tamen plenitudinis & cacoehymia in corpore relicta suspicio reliqua est.

*Vigilæ.*

Vigilæ si vrgeant, hisce subuenitur illis, quæ affectui quoque conuenire possunt, ut lacte amygdal. cum emulsione sem. papauer. & croco dato, vel syrupo de papaure, & c. Tandem si materia non reiicitur, nec villo modo à parte amoueri potest, sed phlegmone in pus mutatur, curandum, ut quamprimum maturetur, & abscessus rumpatur

rumpatur. Ad maturationem tale habet emplastrum Bened. Fauentinus, quod & Forestus commendat, lib. 16. obseru. 40. pag. 60.

℥. Fol. malu. cum radic. violar. an. M. ij. rad. alb. mund. Matu-  
 3. ij. lilior. alb. 3. j. emulæ, 3. B. flor. chamæmel. meliloti, <sup>rantia.</sup>  
 an. m. j. Bulliant omnia in l. q. aq. ad mediet. Colat. adde  
 farin. sennigrec. frumenti, an. P. j. fermenti 3. ij. pingued.  
 porci, butyri. an. 3. B. ol. amygdal. dulc. communis, an. q. l.  
 ad impinguandum emplastrum, cui adde croci 3. B.

Vt vero abscessus rumpatur, æger voce intenta loqua-  
 tur, de latere in latus voluatur, tussi aut cum conatu. Rum-  
 pitur etiam abscessus, si vomitus aut sternutatio excitetur. <sup>Ruptio</sup>  
 Ad quod etiam faciunt becchica adhibita, commendan- <sup>abscessus.</sup>  
 tique scabiosa, prassium, carduus bened. & aquæ ac sy-  
 rupi ex his compositi.

Vel ℥. Radic. alb. helenij, an. 3. j. iuiubar, sebesten. an.  
 N. xv. glycyrb. passul. an. 3. j. B. dactylorum, ficuum. an.  
 N. vj. Coqu. in aq. fb. ij. ad tertiæ partis consumptione-  
 nem.

Colat. adde sacch. q. l. Fiat Iulebus. Vel ℥. Fermen-  
 ti tritici quant. vol. Et Fiat puls cum decocto ficuum, & e-  
 datur.

Vel panis bene fermentatus in aqua mulsa macere-  
 tur.

Extrâ cataplasmati adiiciatur aliquid stercor. Colum-  
 bini, & galbani.

℥. Radic. lilior. alb. contusar. 3. iv. ficuum N. x. fimi co-  
 lumbini, 3. ij. fermenti. 3. iij. axungia porci, butyri an. 3.  
 ij. F. Cataplasma.

Quæ si non prosint, nonnulli partis affectionem sua-  
 dent. Sed rarò tumor extrâ vergit.

Abscessus ruptus detergendus hydromelite, decocto  
 pectorali. Ad consolidandum utilis est conferua rosar.  
 mediæ ætatis, thus, bolus, terra sigillata, Omnes verò in-  
 tentiones complet lac chalybeatum, nisi febris eius vsum  
 prohibeat.

Cùm verò abscessus ad interiora ruptio in pleuritide <sup>Sectio.</sup>  
 periculum faciat, & suffocatio vel phthisis ex eo immi-

neat, suadent nonnulli, vt extrà aperiatur abscessus. Neque abs re hoc fore videtur, modò locus, in quo vomica contineatur, certò & exactè cognosci possit. Neque enim eo loci, quo in empyemate & pure iam in thoracis cavitae collecto sectio fieri solet, de quo postea dicitur sectio tum instituenda, sed ex pondere, dolore, & calore diligenter locus, in quo vomica hæret, inuestigandus, atque is intra duas costas aperiendus leniter & paulatim, donec pus exeat, cauendùmque ne simul tunica interior perforetur. Verùm nisi planè exactè locus perspectus habeatur, sed is incertus sit, aut vires debiles eam non ferant, sectio non instituenda.

Iacobus Fontanus *med. pract. lib. 2. cap. 3.* refert interdum malignas & vulgares pleuritides grassari; qualem Anno 1598. vidit, quæ generabatur ex humore tenui virescente, & omnibus qui ea corripiebantur, ferè læthalis erat. In cadaueribus dissectis sub mammis reperiabatur vomica plena virescente liquido humore. Huic pleuritidi in sectione est vnicum remedium. Cùm enim in humore prauo nulla sit coctionis & mitigationis spes, materia sectione ne vt extrahatur, necesse est.

*Diuretica.*

Si materia ad vias vrinæ vergat, diuretica exhibeantur.

Vt *℞. Radic. aperientium in vino maceratar.* an. *℥. j. glycyrrh. ℥. j. sem. 4. frig. maior.* an. *℥. ℞. adianthi m. j. cicer. rubr. m. ℞. Coq. in f. q. aq. puræ,* ad dimidiæ partis con-

*Clysteres.* sumtionem. Colatura saccharo dulcoretur.

Si ad intestina vergat, clysteres abstergentes & abluentes exhibeantur, & ne dysenteria excitetur etià syrupi nō nihil astringentes propinentur.

*Dieta.*

*Dieta.*

Cùm pleuritis ex acutorum morborum numero sit, victus rationem accuratam & qualis acutis conuenit, requirit; de qua pluribus Hicpocrates 1. *de rat. viñ. in acut.* vbi pleuritidem exempli loco tractat, & Gal. *in comm.* Itaque in principio ad dies 4. si ægri vires ferant, tenuissimo victu vtendum, Veteres tenuem victum præscribebant ex melicrato primùm, postea ex cremore ptisanæ hordeaceæ vsque ad septimum vel nonum diem, vbi integrā ptisanam aut oua aut carnis aliquid exhibere licebat. Et om-

ninò accurati erat antiqui in præscribendo pleuriticis vi-  
ctus habeturque, *ibid.* t. 32. & 33. dolorem in pleuriticis au-  
geri, si ægro ptisana detur aluo retenta & non priùs aper-  
ta; imò ægrum ad mortem præcipitem agi, si dolore non  
remittente sputoque retento ptisana præbeatur, non præ-  
missa euacuatione corporis, siue per venæsectionem, siue  
per alui subductionem.

*Veteres  
accurati  
in præ-  
scriben-  
do victu  
pleuriti-  
cis.*

Nostri tamen homines tenuissimæ illi victus rationi non  
ita assueti sunt. Itaque ægris præberi possunt sorbitiones  
ex cremore ptisanæ primùm spontè colato, postea expres-  
so. Ptisanæ enim hordeaceæ cremor in pleuritide præ-  
stantissimum alimētum est. Nam eius viscositas lævis, con-  
tinua, iucunda, lubrica, & mediocriter humens sitim mi-  
nimè infert. Et si quid ablui vel excerni debet, probè ab-  
luit, vt Hippocr. habet, 1. de rat. vict. in acut. t. 28. pituitam  
dissoluit & abstergit, atque per superiora, quæcumque du-  
ci possunt, absque dolore educit, aluūque facilem reddit,  
ad deglutendum facilis est, dolorem & calorem mitigat,  
maturat & omnia emollit. Vtilis est & emulsio amygdal.  
dul. cum aqu. hordei facta, addito saccharo. Licet quoque  
amygdalas cremori ptisanæ miscere; biliosi tamén cremor  
ptisanæ commodiùs solus exhibetur. Addi etiam possunt  
ad refrigerationem sem. 4. frig. maiora. Morbo cedente pa-  
natella dari potest ex iure gallinæ cum oui luteo & iura  
carnium tenuia: Cibi item ex amygdal. & pineis parati.  
Tandem ad oua, carnes coctas & assas pullorum ac galli-  
narum & pisces bonos transeundum.

Potus sit aqu. hordei cum pauxillo cinamomi & passul.  
item glycyrrh. item oxymel aquosius vel decoctum pecto-  
rale ex iuiubis passul. glycyrrh. & hordeo.

Vel ℥. Aqu. coctæ lb. ij. mellis, aceti, an. ʒ. ss. saccha-  
ri ʒ. ij. M.

Via abstinendum, & quanquam æger auidissimè id  
appetat: tamen ei non est concedendum; cum ante morbi  
declinatione pleuriticis instar veneni sit. Ideo ante 14. diē  
raro vinum concedi potest. Potus, qui assumitur, non sit  
actu frigidus, ne sputum; & quod insensibiliter transpirare  
debet, retineatur. Videntur in cibo & potu omnia acida,  
falsa,

falsa, fauces exasperantia & adstringentia. Compertum enim, nonnullos pleuriticos à lenticularum cum aceto ac fassamentorum piscium vſu & à frigida liberali potu extinctos fuiſſe. Aër temperatus ſit. Motus animi & corporis vehementes caueantur, ita vt æger quoque parum loquatur. Alius lenientibus clyſteribus aperta ſeruetur.

## Q V Æ S T I O I.

*An in omni pleuritide detur inflammatio pleuræ?*

*An in omni pleuritide detur inflammatio pleuræ.* Vt hîc dubitare quis poſſit, anſam præbuit Heurnius, qui *cap. proprio* ſcribit hanc membranæ ametriam & dyſcrasiam oculis non ſemper in cadaueribus ſectis patere; ſe ſecuiſſe pleuriticum immani delirio abreptum, cui nihil in menynge, nihil in cerebro, nihil in toto corpore *παρα φύσιν*, notari potuit.

Verum diſtinguendum eſt inter pleuritidem ſeu inflammationem pleuræ, & dolorem lateris ſeu pleuræ. Neque enim, vt infra dicetur, omnis dolor lateris eſt ab inflammatione pleuræ, ſed etiam ab aliis cauſſis ortum habere poſteſt. Et memini, in morbilis infantes quândoque acutiſſimos lateris dolores paſſos eſſe, antequam morbili erumperent, à materia maligna & acri pleuram vellicante. Dolorque hîc, vt rectè Heurnius, *ibid.* ait, à materia mole ſæpè non magnâ ortû habere poſteſt. Ac proinde ille, què mortuû ſecuit Heurnius, non fuit propriè pleuriticus, ſed febre acutâ maligna laborauit, in qua pars materiæ malignæ & febrilis ad pleuram effuſa dolorem ibi excitauit, pars in caput elata delirium procreauit.

Atque talis proculdubio fuit ille dolor peſtoris, cuius Quercetanus meminit, quanquam falſò pro pleuritide eſſe habuit, qui à vermibus & malignis vaporibus ex iis adſcendentibus ortum habuit, & tales dolores ſcabioſis etiâ ſæpè accediſſe animaduerti. Talis eſt etiam, qui ſcorbuticis accidit, & proinde pleuritis vera non eſt. Si tamen talis dolor diutius duret, & affluxus humorum cauſſa ſit, pleuritis inde & quidem notha, ſed vera excitari poſteſt.

## QVÆSTIO II.

*An in pleuritide sola pleura, an verò simul pulmo inflammetur?*

De loco in pleuritide affecto & antiqui & recentiores dubitarunt, an scilicet in pleuritide sola pleura, aut musculi intercostales, an verò simul etiam pulmones afficiantur? Membrana equidem costas succingentem inflammari in pleuritide, ut pote quæ à parte affecta nomen habet, dubium nullum est. Cum enim dolor sit adeò vehemens, ut ægri quasi terebrâ latus perforari conquerantur, neque costas, quæ omni sensu destituuntur, neque earum membrana, quæ ob nimiam tenuitatem ac venarû paruitatem, atque exilitatem tantam inflammationem suscipere non potest, neque ipsis musculis, qui sensum adeò exquisitum non habent, neque soli pulmoni, qui ipse non sentit, nisi parû ratione membranae ambientis, is competere potest, sed in membrana costas succingente eum consistere necesse est. Hoc tamen negandû non est, interdum musculos intercostales simul in cõsensum trahi, cum membrana costas succingens, & hi musculi adeò connexi sint, ut vnum sine altero affici vix possit.

De hoc verò quæstio maxima est, an solùm membrana costas succingens, an verò simul pulmones in pleuritide afficiantur. Nostro sæculo Felix Platerus, vir ut in re medica peritissimus, semper simul pulmones inflammari, ex exsectione pleuritide mortuorum se deprehendisse, scribit. Idem Ioh. Zecchius, in consult. Medic. cons. 26. in appendice, sentit; dum scribit, semper se fuisse in ea sententia, quod lateris dolor magna ex parte ad pulmones pertingat, raro autem ad membrana costas succingentem, cum in pluribus corporibus post mortem dissectis ægrotantium, qui communiter ac certè pleuritide periisse iudicabantur, non membranam affectam fuisse, sed pulmones observavit cû sua membrana laceratos & corrosos. Deinde & experientia & rationes pro sua statuenda sententia adducit Platerus. Neque enim sanguinem, quæ tam citò exscreant, ab unica succin

*An sola pleura in pleuritide inflammetur?*

succingente membrana inflammata, tam subito præsertim, ad pulmones prouenire, eiusque vasa ad exspuitionem permeare, nec suppuratione facta pus ex eo loco transitum sibi per pulmones, illis non læsis & exulceratis, facere, & sic ad excretionem usque peruenire minimè posse, sed potius, si inde emaneret, in thoracis cauitatem defluxuram materiam, & inde empyema facturam existimat. Et licet concedat, succingentem tunicam quandoque solam inflammari: tamen talem pleuritidem inde fieri non concedit, in qua cruenta & purulenta exspuuntur; cum succingens membrana sese eò exonerare non possit; sed si inflammatio suppuratur, extrinsecus potius, quàm intrinsecus vergat, vel si intro rumpatur, pus in cauitatem pectoris potius, quàm in pulmones effundatur.

Verùm enim verò equidem negandū non est, sæpe cum pleura pulmones etiam inflammari, & vero valdè consentaneum videtur, tandem copiam sputi ac materiæ, quæ à pleuriticis sæpe tussi reiicitur, pulmonis saluiis vix eiici posse. Atque id accidit, cum superior pars pleuræ afficitur. Cum enim illa cum membrana costas succingente communionem habeat, & circa partem superiorem pulmones cum pleura connectantur, dum sanguis præter naturam in pleuram influit, facile etiam simul in pulmones illabi potest. Contrà tamen etiam negandum non videtur, solam membranam costas succingentem aliquando inflammari, & veram pleuritidem, quæ propterea à pleura nomen habet, inde generari posse; cum membrana hæc inflammationis capax sit, utpote quæ duplex est, interior & exterior, inter quas venæ arteriæque præterlabuntur, ac sanguine præter naturam affluente ipsa adeò in tumorem nonnunquā attollitur, excrescitque, ut decuplo crassior, quàm cum sana est, euadat, ut ipsemet Platerus obseruauit, & lib. 2. de corp. hum. structura pag. 168. annotauit. Atque id accidit, cum inferior pars pleuræ inflammatur, quæ cum pulmonibus non connectitur. Neque planè impossibile est, sanguinem & pus è membrana succingente per superiora eiici: quamuis facile concedam, id in tanta copia non exspui, ac cum pulmones simul sunt affecti. Et si enim antiquæ



antiqua dubitatio sit, vt ex 1. de l. aff. c. 5. videre est, quomodo sanguis & pus è thoracis partibus in pulmonem eiusque asperas arterias penetrare, & tandem tussi reiici possit: tamen id fieri posse, plurima experimenta ostendunt. Si enim aqua mulsæ in cauitatem thoracis, in vulneribus & vlceribus eo vsque penetrantibus, infundantur, tussiendo reiicitur, & æger aquæ mulsæ saporem deprehendit. Conglutinatis quoque extrâ vulneribus, antequam intus perfectè sanantur, cruoris & saniei è vulnere in cauitatem thoracis effluentis nothæ in sputo apparent. Et empyicos pus tussi reiicere notissimum est. Quandoque tamen suppuratam inflammationem pleuræ empyema sequitur, vt ex Hippocrat. 5. aph. 8. & 1. de morb. p. 9. in codice Foësijs videre est. De qua re mox etiam, in quæst. 3. dicetur.

## QVÆSTIO. III.

*Per quas vias materia in pleuritide ad asperam arteriam perueniat, & inde tussi eiiciatur?*

Per quas vias sputum in pleuriticis in asperam arteriã perueniat, & inde tussi eiiciatur, & excernatur, non ita planum est. Si pulmones simul afficiantur, res manifesta est. Si autem sola pleura afficiatur, res dubia est & obscura, de quâ prolixè agit & contra Erasistratum disputat Galenus, 5. de loc. affect. c. 3. qui hac de re videatur. Galenum plerique Medici sequuntur, & statuunt, per pleuram materiam transfudare, aut ea pertusa, erosa, vel quouis modo rarefacta in thoracis cauitatem peruenire, atque inde, tussi thorace compresso & pulmone dilatato, in asperas arterias, quarum orificia in pulmonis ambitum tenui tunica obducta desinunt, cogi, primò quidem in minores, hinc maiores, donec tandem per canalem amplissimum trachæ è faucibus tussi eiiciantur.

Verùm enim verò etsi non negandum sit, tenuius quid, quale mulsæ est, quam exempli loco affert Galenus ad probandum, humores in cauitate thoracis contentos in pulmonem penetrare, & si quid tenuius è plura transfudat, &

*Per quas vias materia in pleuritide ad asperam arteriam perueniat & inde tussi eiiciatur.*

& illud à pulmone imbibì pòsse : tamen non credibile est, materiæ tantam copiam, qualis sæpe à pleuriticis per tussim reiicitur, per pleuram transsudare (neque enim in principio vel augmento pertusa esse potest, ) & quidem eam tam crassam sæpe per angustos illos meatus è thoracis cavitatè in pulmonis substantiam penetrare pòsse. Neque etiam credibile est, mox in principio sanguinem purum, qualis sæpe à pleuriticis tussi eiicitur, è pleura in thoracis cavitatem effundi; cùm id in aliis inflammationis fieri non videamus, neque densitas membranæ id faciliè admittat. Atque hoc modo etiam omnes pleuritici fierent empyici. Ideoque ubi sputum magna copiâ tussi reiicitur, pulmonem simul affici, credibile est. Et præcipuè verò non est còsèntaneum, sanguinè, qui in principio pleuritidis purus planè reiicitur, per pleuram transsudare in cavitatem thoracis, & à pulmonibus imbibitum fuisse, nullam tamen in iis alterationem accepisse : sed vero magis còsèntaneum est, è vasis, quæ asperæ arteriæ nutrimentum aduehunt, quæque partes illas, quæ in parte superiore pulmones lateri annectunt, nutriunt, hiantibus ob copiam sanguinis in pleuram vicinam ruentis, effundi.

## Q V Æ S T I O. IV.

*Quæ vena in pleuritidis principio aperienda sit?*

*Quæ vena in pleuritidis principio aperienda sit? Diverse Autorum opinioniones.*

*Hippocrates. Archigene.*

De vena in pleuritidis principio aperienda magna verborum contentione superiore sæculo pugnatum est, aliique Græcos, alij Arabes secuti sunt; alij suas peculiare opinioniones proposuerunt. Ideoque etiam hanc quæstionem plenius explicare, & totam huius certaminis historiam & præcipuorum Medicorum sententiam, secundùm ordinem temporis, quo vixerunt, proponere libet. Hippocrates, 2. de rat. victus in acut. t. 10. in pleuritide aperire iubet cubiti venam, verùm non addit, in vtro brachio : Id verò 4. de rat. vict. in acut. t. 13. declarat : ubi eo in latere venam aperire præcipit, quod æger laborat.

Archigenes, vt ex Actio & etrab. 2. serm. 4. c. 68. videre est, ex

ex opposito brachio sanguinem mittit. In his, inquit ex Archigene Aëtius, qui acuto morbo infestantur, siquidem circa mammas aut claviculam hæret dolor, venam incidere oportet in brachio, non eo, quod rectâ ab inflammato latere procedit, sed opposito.

Galenus cum Hippocrate consentit, scribitque, lib. de Galenus. curand. rat. per sang. miss. c. 16. Pleuriticis, quæ è directo lateris laborantis adhibita fuit sanguinis missio, clarissimam sæpè utilitatem attulit, quæ verò ex brachio opposito, aut omnino obsecram, aut post temporis intervallum.

Galeno assentitur Oribasius, dum, lib. 1. synopsis. cap. 10. Oribasius. & lib. 7. collect. c. 5. Galeni modò allegata verba recitat. Aëtius etiam, tetrab. 1. serm. 3. c. 12. in pleuriticis venam è directo lateris affecti secare iubet.

Cælius Aurelianus ex alio latere, quod fuerit dolenti lateri contrarium, sanguinem mittere iubet. Cælius Aurelianus.

Celsus, lib. 2. c. 30. vñ se docuisse scribit, ex longinqua & opposita sanguinem mittendum esse. Celsus.

Si ad Arabes veniamus, Serapion, qui antiquissimus inter eos habetur, tract. 2. c. 21. secatur primò & materia fluente basilicam oppositi lateris, tum si adhuc materia fluat, in loco contrario ei ex dorso ad longitudinem, id est, saphe-nam eiusdem lateris, ut plerique interpretantur: quod si malum confirmatum est, & non ampliùs materia fluit, venam in brachio eiusdem lateris. Serapion.

Rhases non idem sentire videtur. Nam, 9. ad Almanf. c. 57. Rhases. si dolor vsque ad claviculam perveniat, sanguinem ex axillari lateri dolentis mittere iubet, ni forsan sanguis in toto abundet. Tum enim in opposito brachio venam aperire iubet. In opposito verò latere lib. diuis. cap. 54. venam aperire præcipit, postea tertio die ex latere dolente, 5. autem contin. initio ex brachio lateris oppositi, tum ex saphe-na lateris affecti, tandem ex brachio lateris dolentis sanguinem detrahit.

Auenzoar etiam primò venam basilicam oppositi lateris aperuit. Auenzoar.

Hali Abbas, qui cum Isaaco idem Autor censetur, præf. Hali Abbas. lib. 6. cap. 13. primò lateris oppositi basilicam, at si malum pro

Alzaharavicius.

Auicennas.

procefferit, eiusdem lateris venam secare præcipit. Idem facit Alzaharavicius.

Auicennas, *lib. I. fen. 10. tr. 5. c. 1.* præcipuit primò sectionē saphenæ oppositæ secundum longitudinem. i. e. eius lateris, non, vt Capiuaccius interpretatur, oppositi; deinde nigram, id est, medianam oppositi brachij, aut hac non apparente cephalicam; tandem & post aliquot dies venam brachij in latere opposito aperit.

Auen-  
Reis.

Mesues.

Auen-Reis, *7. collect.* venam in parte opposita aperit.

Mesues idem facit. Si tamen magna sit plethora, saphenam lateris oppositi, exempli gratia, saphenam pedis finistri, si dextrum latus afficiatur, primùm aperit.

Cum verò postea ab Arabibus ad Gallos & Italos cum aliis artibus Medicina perueniret, & iis sæculis Græcorum de Medicina libri penè omnes in tenebris delitescerent, aut, quos habebant, ex Græco in Arabicū versos legerent, & hinc Latinos redderent, Medicinamque præcipuè ex Arabum libris discerent & docerent; Medici illi, qui post Arabes in Italia & Gallia de Medicina Latinè, seu potiùs Latinobarbarè scripserunt, plerique etiam Arabum opiniones secuti sunt. Atque ita post Arabum tempora ferè ad annum Christi M.D. Medici omnes, Gentilis, Arnòld. de villa noua, Gordonius & ipse Gallus, & apud Monspelienses Medicinæ Professor, Valescus de Taranta, Petrus Apponenfis cognomento Conciliator, dictus Nicolaus Florentinus, Matthæus de gradibus Mediolanensis, Antonius Guainerius & Gattinaria, Ticinenses Medici, Alexand. Benedictus Veronensis; Iohan. Arculanus & plurimi alij, omnes initio pleuritidis aut saphenam aut basilicam oppositi lateris aperuerunt. Nemo autem inter omnes repertus, qui initio morbi in affecti lateris brachio venam aperire auderet. In morbi verò progressu venam eiusdem lateris aperuerunt.

Circa tamen annum Christi 1500. de vena initio pleuritidis secanda factio quædam inter hos ipsos medicos extitit, dum Veneti initio pleuritidis saphenam aperirent, Medici verò Bononienses ac Florentini basilicam oppositi lateris. Circa illa tempora bonæ literæ renasci cœperunt,

perunt & Græcorum libri vel Græci, vel in Latinum melius conuerſi in manus Medicorum peruenerunt, vnde nonnulla Arabum dogmata, quos antea vnanimiter ſecuti fuerant Medici, à nonnullis in dubium vocata ſunt. Atque inter ea etiam ſententia de venæſectione in pleuritide.

Ita Matthæus Curtius, Ticinenſis Medic. Profeſſor, in pleuritidis initio venam cubiti eiufdem lateris aperiendam ſtatuit. Ipſe tamen pleuriticus factus contrarium in ſe fieri voluit, maluitque vitam ſibi ſeruari, quàm libri ſui, quem de venæſectione in pleuritide ſcripſerat, fidem.

Eandem opinionem ſecutus eſt Petrus Briſottus, Medicus Pariſienſis. Eandem ſententiam in Germania defendit Leonhardus Fuchſius, etſi non ſemper eodem modo. Petri Briſotti, vt magiſtri ſui, ſententiam ſecutus eſt Martinus Acakias. Matthiæ Curtio & P. Briſotto ſeſe oppoſuit Andreas Thuri-  
*Matth. Curtius.*  
*Petrus Briſottus.*  
*Leonhardus Fuchſius*  
*Martinus Acakias.*  
*Andreas Thuri-*  
*nus.*  
*Leonhardus Iac-*  
*chinus.*  
*Iohannes Manar-*  
*duſ.*  
*Benedictus Fa-*  
*uentinus.*  
*Iulius Caſar Scaliger.*  
*Veſalius.*

Andreas Veſalius, vir rei anatomicæ peritiſſimus, peculiarem hac de re opinionem defendit. Is enim, in epiſt. ad Nicolaum Florenatem, ſcripta, ſiue dextrum ſiue ſiniſtrum latus afficiatur, ſemper in dextro latere venam aperiendam cenſet: niſi coſtæ tres ſuperiores ſiniſtri lateris afficiantur. Tum enim in ſiniſtro latere venam aperiendam cenſet, qui hoc modo τὸ κατὰ τὸν, Hippocratis & præterea etiam

fibrarum rectitudinem obseruari statuit, idque ideò, quòd vena  $\alpha\zeta\upsilon\gamma\theta$ , à caua exorta prope cor per latus dextrum excurrens & dextri & sinistri lateris octo costas inferiores nutrit, vt ita, etiamsi sinistrum latus labore, vena in dextro brachio, ad quod magis pertinet vena  $\alpha\zeta\upsilon\gamma\theta$ , aperta sanguis commodissimè trahi possit. Si tamen sinistri lateris costæ superiores inflammantur, cùm eæ non à ramis venæ  $\alpha\zeta\upsilon\gamma\theta$ , sed à ramis, qui à caua statim exoriuntur, nutriantur, etiam in sinistro brachio venam aperiendam esse statuit, atque ita Græcorum doctrinam sequi voluit. Hanc tamen suam sententiam non constanter defendit, dum *lib. 3. c. 5. & 7. & lib. 5. cap. 9.* nihil interesse scribit, dextrine an sinistri cubiti vena secetur in laterali morbo.

Ferne-  
lius.

Iohannes Fernelius, *l. 2. therapeut. cap. 5.* reuulsionem esse tractum in contrarium concedit, non tamen dextra sinistris, sinistra dextris aut alio modo opposita contraria esse statuit, sed fibrarum hic ductum præcipuè attendendum existimat, quarum recto cursu hic opus sit. Ideoque etsi, cum vnum cruris laborat, in altero venam commodè aperiri posse statuit, quia communis & directa sit venarum ob fibras societas: tamen idem in pleuritide non fieri posse putat, quòd hic fibrarum communio & venarum societas desit.

Iohan.  
Bapti-  
sta Mon-  
tanus.  
Diuersio  
duplex.

Iohan. Baptista Montanus obscure satis hac de re loquitur; vt ex commentario in *sen. 4. Canonis Auicennæ*, edito Venetis anno 1556. p. 247. & *comm. ad apb. 21. lib. 1. Hippocratis* ibid. anno 1555. edito patet. Diuidit enim phlebotomiã diuersam vniuersalem in simplicem & compositam. Simplicem vocat, quam solum impetus nobis indicat; compositam, quando simul cum impetu plethora consideratur. In diuersione simplici considerandos esse duos terminos docet, ad quem, seu locum affectum, & terminum à quo, seu fontem, vnde materia transmittitur. Terminum à quo esse nunc totum corpus, seu totum venosum genus, nunc partem aliquam corporis determinatam. Si igitur in dextram succingentem materia comunicetur à capite, ratione vnius diametri sanguis deorsum ruens sursum trahendus esset. Verùm quia supra caput nihil, & ita altera diame

diametrus, qua scilicet inferna superioribus respondent, deest, mittendū censet sanguinem ab opposito latere; quia saltem habemus vnam diametram, quæ est inter dextrū & sinistrū. Ita si ab epate cōmunicetur materia, venā non in brachio aperiendā censet, (ita n. traheretur ad partem affectam) sed potiùs saphenā aperiendam, vt sanguis ad inferiora reuellatur. Si verò membrū mandans seu fons sit totus ambitus venarū, tantū determino ad quem sollicitū esse iubet, quia fluit à singulis materia; seruandūmq; debitū spatium & rectitudinem, non tantū respectu viarum, sed & qua sanguis commodè potest progredi; vnde tunc venā aperiendam in eodem, v g. dextro latere. Nam hīc quantò magis seruamus ductum rectæ lineæ, tantò cōmodiùs sanguis euacuatur; quia in angulis sequitur impedimentū sanguinis. Si v. diuersio sit composita, i. e. cum impetu simul cōsideretur plenitudo, tunc semper ab opposito latere ducendus; quia si in eodem latere vena aperiretur, & quidem copiosè sanguis efflueret, & vsque ad syncopen, homo moreretur, vel fieret peripneumonia; si parum, æger suffocaretur. Vnde Auicennas primò aperit saphenam ad euacuandam multitudinem, deinde in opposito brachio, vltimò eodem latere.

Marcus Antonius Montifianus Geminianensis cōclusiones de sanguinis missione in morbo laterali conscripsit, & Florentiæ an. 1556. edidit, in quibus Curtium & Thurinum ambos sibi familiares, vt & Manardū & Brissoltum hīc indè perstringit. Statuit autem 1. incipientem in regione costarum phlegmonem, quam appellamus pleuritim, reuulsu primo curandam esse, nisi nos interpellat plenitudo, illa scilicet, quæ vasa respicit, 2. Reuulsionem nihil aliud est, quàm humorum in partem aliquam influentium ad sibi oppositam maximèque distantem retractionem. 3. Opposita in corpore humano tria esse, superius scilicet, & inferius, dextrum & sinistrum, antè & retrò, siue intùs & extrà. 4. Omnem reuulsionem fieri aut à superioribus ad inferiora, aut contra fluentem (hoc est, vt ipse postea explicat, à sinistris ad dexteris secundum modò dictas oppositiones) materiam reuocando. 5. Licet longitudinis,

Marcus  
Anto-  
nius Mo-  
tifianus.

latitudinis & altitudinis extrema reuulsionem respiciant, non pari tamen vtilitate in hac passione reuellere.

Vnde Auicennam quidem non damnat, quod incipiente phlegmone in opposito latere venam secuit : vrgere enim rationes : quia sinistro, nihil aliud opponitur, quàm dextrum, & contrà. Pari ratione non arguendum esse Galenum & Hippocratem, si in eodem latere venam secuerunt. Nam si materia superiora petit, ad inferna esse trahendam, quod optimè fiat secta vena in eodem brachio : maximo-perè verò approbandam & præferendam hanc illi, quæ est in opposito latere ; quia prior manifestum auxilium & statim affert, altera non nisi post interuallum. Quia igitur conueniant cum Græcis Arabes in oppositorum ratione, in reuulsionem, & in exacta ferè lateris morbi curatione, sola in oppositione altera dissidentes, non insudandum esse putat, inter Galenum & Auicennam hanc litem componere, vt Thurinus voluisse visus est. Irritum enim esse laborem, inter illos concordiam meditari, qui consultò volunt esse discordes.

*Hollerius.*

Hollerius ex basilica eiusdem lateris sanguinem mittendū statuit, nisi suppressa sit aliqua, quæ per partes inferiores fieri solet, euacuatio, vel adsit insignis plenitudo, vel materia maligna, aut eā statim ad caput rapiatur. Tum enim in cruribus venam aperiendam esse censet.

*Rondeletius.*

Rondeletius basilicam vel medianā eiusdem lateris aperit, & inde sanguinem vsque ad eius mutationem & doloris mitigationem extrahit, aut si dolor non remittat, venæ sectionem iterat, idque ideò facit, non quod fibrarum seu villorum rectitudinem obseruandam putet, sed quia naturam incitandam censet, quæ solet facere suas excretiones secundum rectitudinem.

*Thaddæus Duns.*

Thaddæus Duns, Medicus Tigurinus *libris 4. de arte reuellendi simplicitér quæ euacuandi per venæ sectionem scriptis, & epistolica cum Leonhardo Fuchsio concertatione*, ferè Vesalijs sententiam sequitur, & in omni pleuritide, vt *lib. 3. cap. 7.* scribit, & laborantibus costis seu dextri, seu sinistri lateris, semper internam cubiti dextri venam aperiendam censet. Cum enim à vena sine pari tam dextri quàm sinistri late-



ris partes nutrimentum accipiant, exceptis tribus costis superioribus; vena verò sine pari cum dextri cubiti venis maiorem consensum habeat: etiam in dextro cubito venam aperiendam putat. Venarum verò rectitudinem & consensum ideò spectandum esse docet, quod per rectas fibras, quæ in venis sunt, sanguis ab vna parte in aliam celeriter & copiosè trahatur, si venarum fibræ connexionem habeant, & ea vena, quæ secatur, & quæ membrum alit, fibris conueniant. Si tamen contingat id quod tamen vel rarò, vel nunquam fieri statuit, vt tres costæ superiores primaria affectione teneantur, sinistram axillarem secare concedit. Cùm enim à vena sine pari non nutriantur, sed ab alio ramo paulò suprà illius exortum enato ex sinistro magnæ venæ latere, cum axillari sinistra fibris suis multò magis proculdubio consentire, quàm cum dextra, imò cum hac nullum prorsus habere consensum statuit.

Atque hæ sunt præcipuæ præcipuorum medicorum de venæsectione in pleuritidis initio sententiæ, quas postea alij Medici recentiores etiàm secuti sunt, & omninò omnes sententiæ ad tres classes redigi posse videntur.

Alij enim Græcorum opinionem sequuntur, qui *κατ' ἕξιν*, venam secandam, atque in eodem latere aperiendam censuerunt. Nonnulla hic tamé inter eos occurrit differentia, quòd alij simpliciter *κατ' ἕξιν* seu *ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ*, & rectitudinem, alij etiam fibrarum rectitudinem obseruandam censent. Et Mercatus hic statuit, aliud esse in aliarum partium inflammatione sanguinem mittere reuulsio-  
nis gratia, aliud in pleuritide & membrorum principa-  
lium inflammatione. Nam in aliarum partium affectibus ob partis naturam & securitatem fieri posse reuulsio-  
nem ad partem oppositam citra vitæ periculum aut aliud  
damnum statuit; pleuritidem verò periculosam esse, at-  
que illud omninò, quod in parte affecta colligitur, etsi  
paucum sit, tantum tamen periculi minari, vt subitum au-  
xilium postulet. Ideòque pleuritidis grauitatem omninò  
requirere, vt à parte affecta fiat sanguinis euacuatio, per  
quam à parte affecta & reuulsio & deriuatio fieri possit.  
Idem ferè Platerus sentit, qui in pleuritide, quia latus  
dolet,

*Omnes  
hactenus  
proposita  
sententiæ  
ad tres  
classes  
redigen-  
da.  
Primæ  
classis.*

dolet à brachio eiusdem lateris sanguinem detrahere, quàm ex opposito vtilius censet, non tam rectitudinis vatorum occasione, sed quod in pleuritide ob dolorem dolentis lateris venæ magis, quàm sani lateris venæ impleantur. Quo nomine si in dextro latere dolor sit, in dextro brachio venam aperire multas vtilitates asferre scribit, si in sinistro, propter affluxum sanguinis à dolore concitatum ab ea parte sanguinem reuellere conuenientius putat. Nonnulli tamen ex iis, qui in eodem latere venam aperiendam censent, aliquos casus excipiunt: vt si suppressa sit aliqua per inferiores euacuatio; si adsit insignis plenitudo; si materia sit maligna, vel ad caput tendat.

*Secunda  
classis.*

Alij Arabes sequuntur, & quidem nonnulli primò saphenam, alij verò statim venam oppositi brachij reuulsionis gratia aperiendam censent, postea ad deriuationem eiusdem lateris.

*Tertia  
classis.*

Alij tandem Vesalius secuti sunt, & semper in dextro latere in pleuritide venam secandam censent; cum, si fibrarum rectitudo spectetur, longè maior sit inter dextram axillarem, regionemque costarum quamcunque consensus, quàm inter eundem locum affectum & sinistram axillarem. Cum enim vena sine pari à dextro cauæ latere enascatur, & axillaris dextræ similiter huius & illius fibra quàm plures, quæ secundum longitudinem corporis ipsarum sunt porrectæ, inuicem consentiunt, rectoque tramite mutuo se respiciunt.

*Decisio  
contro-  
uersia.*

Verùm si ista omnia diligenter perpendamus, & fundamenta supra proposita, vbi de venæ sectione egimus, diligenter attendamus, non ita difficulter ex hac obscura & tot annorum seculis agitata controuersia nos expedire poterimus. Primò rationes omnes eorum, qui statim venam in brachio lateris affecti secare iubent, siue id fiat ob fibrarum communionem, siue saltem ob *obvaciū* & rectitudinem, quam natura in suis euacuationibus obferuare solet; siue ob dolorem, qui valdè vrget, eò tendunt, vt monstrent, commodius per venam, è directo lateris apertam è loco affecto materiam euacuari, quàm ex opposito brachio. Verùm cum venæ sectio in pleuritide

tide reuulsionis gratia instituaturs; in reuulsione autem non requiratur è parte affecta euacuatio, sed deriuationis hoc sit: Reuulsio saltem prohibet, ne pars affecta amplius sanguine repleatur, & id agit, vt sanguinem eò, vnde fluit, retrahat, eique contrarium ei, qui est ad partem affectam, motum versus fontem, à quo fluit, conciliet. Atque ideò commodissimè in latere opposito in principio venam aperiri censemus, vtpote quæ contrarium motum sanguini conciliat, & cum à parte affecta auertit, quod vena è directo lateris affecti aperta præstare non potest. Et id rectè fieri primò experientia confirmat, cum per aliquot annorum secula, quibus Arabum secta floruit, vena semper in opposito brachio aperta est; & si aliquid incommodi ex eo accidisset, id Medicos illos aliàs diligentes non latuisset. Ipse etiam Iulius Cæsar Scaliger, hac de re suas obseruationes annotauit, vt ex eius *commentar. in libros Hippocratis, de somnis* videre est. *Fidem, inquit, in quem intendimus, hunc esse par est, prohibere sanguinis copiam, ne ad malè affectum concurrat locum. Ergò ab opposita parte sanguis detrahendus. Nam si dolor in latere sinistro: aperta indidem vena plus trahit à dextro in sinistrum, quàm dextra incisa in sinistrum. Plus enim humoris est inter circumferentiam dextram, & doloris locum, quàm inter eundem locum & circumferentiam sinistram. Vnum habent, quò profugiant: non prodesse, quoniam nulla sit, vt appellant, colligantia. At nos dicimus non nunc agere, vt quod fluxit, detrahamus: neque enim magni momenti est: neque quisquam prima statim die mortuus est, sed post multam affluxionem, quam tollit vena contraria remota: vena autem eiusdem lateris non solum non tollit, sed etiam trahit ad locum malè affectum. Itaque toto post facto fluxu, ex eadem parte nos quoque detrahimus. Ac de ratione quidem hæc, de experientia quid dicamus, facile in promptu est. Iam duodeviginti annos, nonnisi vnum vidimus, ex eadem parte incisa vena euasisse. Et sanè corpus erat athleticum, vt etiam magis miraremur. Verùm scimus multos etiam sine phlebotomia sanos factos. At plus octoginta redigimus in commentarium quinto ab hinc anno;*

qui omnes eo curandi genere sint extincti: cum plus quingentis  
 his duodecim annis euasissent, quibus in aduerso cubito vena  
 aperta fuerat. Hæc Scaliger. Et ipse Galenus, lib. de cur.  
 rat. per sanguin. mission. cap. nullam in pleuriticis ex vena  
 in latere opposito secta detrimentum, sed vtilitatem  
 prouenire statuit, etsi obscuram & post temporis  
 interuallum.

*Causa  
 missionis  
 sanguinis  
 in  
 pleuritide.*

Deinde rationes satis firmæ idem suadent. Nam licet  
 etiam venæsectio simpliciter euacuationis gratiâ institui  
 possit: tamen ea quacunque etiam vena aperta fieri potest.  
 Neque de vena euacuationis gratiâ aperienda hic tantum  
 quæstio est, sed de vena ad reuellendum & deriuandum  
 apta. Nam præter euacuationis scopum duabus de causis  
 præterea, vt etiam in aliis inflammationibus sanguis in  
 pleuritide mittitur, reuulsionis scilicet & deriuationis  
 gratia. Illa debetur sanguini ad locum affectum affluenti vel  
 affluxuro; hæc sanguini, qui in venis parti affectæ vicinis  
 continetur. Vtraque autem hæc euacuatio, reuulsio scilicet  
 & deriuatio, ita institui debet, vt partium consensus  
 obseruetur, vt vena vnius partis secta, altera & quæ cum  
 illa consensum habet, euacuetur, & consequenter humor  
 vel reuellatur, vel deriuetur.

Aliter verò omnino se habet hic consensus in reuulsione,  
 aliter in deriuatione. In reuulsione enim cum id agatur,  
 vt sanguis, qui ad partem affluit, vel affluxurus est, ad  
 fluxionis initium & fontem reuocetur, vena, quæ reuulsionis  
 gratia aperitur, cum fonte, vnde fluxionis initium,  
 si vena eo loci aperiri non possit, cum venis initio fluxionis  
 vicinis consensum habere debet, ita vt vena hac aperta  
 sanguis, qui ad partem affectam fluere coepit, iam amplius  
 eò fluere desinat, & in contrarium trahatur. In deriuatione  
 verò ea vena aperiri debet, quæ cum parte affecta  
 consensum habet, & ab ea vel locis vicinis euacuare possit.  
 Igitur quò propius fonti & initio fluxionis vena  
 aperitur, eò rectius & propriè magis reuelli dicitur; quò  
 verò magis à fonte fluxionis recedimus, & vena affectæ  
 parti propinquior aperitur, eò minus propriè reuellere  
 dicitur.

Notandum tamen hîc, quod nonnullos turbauit, & eo adduxit, vt statuerent, non semper ad originem fluxionis effereuellendum, per originem fluxionis non intelligendam esse causâ fluxionis procatarcticam, puta calorem & dolorem, quæ sæpè est in parte affectâ, sed fontem & locum, à quo sanguis ad partem affectam fluit. Ad eum enim sanguis, quantum fieri potest, retrahendus. Interim non incommodum est, vt causâ illa fluxionem irritans & sanguinem attrahens in parte affectâ mitigetur vel tollatur. Locus verò, in quo instituitur venæsectio reuulsionis causâ, nunquam vicinus esse potest, sed remotus sit necesse est. Docet hoc clarè Galenus, 4. meth. med. cap. 6. Si, inquit, perpetuum est, quod ab eo didicimus, incipientem fluxionem ad contraria trahendam esse, fixam verò iam in laborante particulâ vacuandam esse, vel ab ipsâ particulâ, quæ affligitur. vel à maximè vicinâ, in promptu nobis de sanguinis detractio-  
ne colligere est, quod in principio hæc à longinquo, postea ab ipsis laborantibus partibus sit instituenda. Quod & alibi passim docuit.

Itaque cùm in pleuritide fons & principium fluxionis non sint pedes, vel caput, vel brachia, vel venosum genus, seu venæ cauæ rami maiores, naturâque hoc obseruare soleat, vt partes principes, quantum fieri potest, tueatur, & publicam corporis regionem à prauis humoribus liberare, eosque propterea ad extremas partes protrudere soleat, ac verò in principio pleuritidis non deriuare, sed reuellere animus sit: facile hinc apparet, non venam loco affecto vicinam eligendam esse, cùm facile fieri possit, vt in loco vicino venâ apertâ sanguis maiore cum impetu ad partem dolentem & calentem ruat, sed quæ à loco affecto remota sit, & cum parte mittente consensum habeat, sanguinisque ad partem affectam ruentis impetum sistere, eumque ad contrarium reuocare possit, quod fit commodissimè venâ in brachio opposito apertâ. Neque enim datur vlla vena, quæ à parte affecta remotior sit, cum parte tamen mittente, seu epate & venâ cauâ, maiorem consensum habeat. Neque est, vt quis cum Matth. Curtio, Manardo & aliis ad imaginariam quandam oppositionem confugiat, quæ  
X 5 etiam

etiam in brachio eiusdem lateris fieri possit, quando scribunt, dum inciditur vena eiusdem partis, primum adesse oppositionem intus ad extra, quatenus sanguis extra emititur; deinde oppositionem à dextra ad sinistram pro vario brachij situ; rursus oppositionem in longitudine; quatenus humor sursum trahitur, qui deorsum vergebat. Non enim sufficit hæc imaginaria oppositio, sed talis requiritur, quæ ad fontem, unde fluit sanguis, quantum fieri potest, eum retrahat. Hoc optimè præstat vena in latere opposito aperta, etsi id videre non potuerit Argenterius. Hæc enim vena ex axillari sanguinem primò euocat, hinc ex vena caua, atque ita sanguis non amplius tam copiosè confluit. Arabes quidem nonnulli, ut supra dictum, ut planè ad remota reuellerent, venam in pede primò aperuerunt; sed locus iste ab epate nimis remotus est, neque facilè motus sanguinis, qui per venæsectionem in pede concitatur, usque ad sanguinem, ad latus affectum fluentem perungere potest, quod venâ in brachio apertâ optimè fieri potest. Etsi verò mensibus & hæmorrhoidibus suppressis plethora vel cacoehymia cumulata sit; tamen si suppressio antiqua sit, non sperandum vnicâ ista venæ saphenæ sectione eos reuocari posse. Interim morbus acutus non fert moram, sed subitum auxilium requirit. Atque in hac sanguinis missione, quæ fit in brachio opposito, non opus est coloris mutationem expectare. Neque enim eum euacuare animus est, qui iam in parte affectâ mutationem accepit, sed eum, qui ad locum affectum affluit.

*Vesalij opinio examinatur.*

Vesalij tandem opinionem, quia peculiaris est, ut seorsim perpendamus, si reuulsionis gratia in dextro brachio, sinistro latere affecto instituitur, commodum id sanè est. Verùm si dextrum latus laborat, in eo reuulsionis gratiâ vena aperiri non potest; cum facilè hac occasione maior ad partem affectam affluxus fieri possit. Si verò, quod sentire videtur, deriuationis aut euacuationis gratia ex parte affecta venæsectionem instituit, via illa nimis longa esset, si è latere præcipuè sinistro, sanguis in venam sine pari refluere atque in cauam venam & dextrum brachium retrahi deberet. Imò sunt, qui nullo modo ex vena sine pari, ad

ad venam cauam sanguinem refluere posse statuunt. Scribitque Hollerius, *libr. 1. de morb. intern. capit. 27. in schol.* venam sine pari sanguinem, quem à vena caua accepit, non amplius ad eam remittere posse; valuulas enim habere, sicut vesicam & cor, idque eo probat, quod si quis venam cauam in parte superiore secet, & fistula immissa in inferiorem partem, sufflet, totam ipsam venam cauam in parte inferiore secemus, immissâque fistula ore ventum sursum impellamus, venam cauam non inflari, quod aer in vena sine pari contentus exire non possit. Unde concludit, si aer à vena sine pari ad cauam non penetrat, multò minus sanguis refluere poterit. Eadem penè omnia proponit Amatus Lusitanus, *centur. 2. curation. 52. in schol.*

Verùm istam de valuulis venæ sine pari doctrinam Gabriel Fallopius, *in obs. anat.* irridet, & Thaddæus Dunus risu & sibilis potiùs explodendam, quàm refutandam censet; cùm nemo peritissimorum etiam anatomicorum eas inuenire potuerit. Et quod experimentum illud de inflatione venæ cauæ attinet, id ita refutat Thaddæus Dunus. Venam cauam, inquit, prius secuit, vt ex ea ἀέρι inflaret; postea ἀέρι quoque secuit, vt inflaret cauam. Mirum autem non est, cauam non potuisse intumescere, siquidem dissecta erat. Neque enim spiritus non penetrauit ad eam; sed non continebatur ea reclusa. Vinculum igitur iniiciendum erat venæ cauæ.

Atque hæc de valuulis venæ ἀέρι controuersia ab Anatomicis variè agitata est, necdum tamen satis discussa, dum alij dari aiunt, alij negant, etsi eas diligentissimè inquisuerint. Et qui eas dari affirmant, inter quos Riolanus *in sua anthropographia* non tamen eodem modò quo Hollerius & Amatus Lusitanus dari statuunt, sed ita sitas esse, non vt recurrenti sanguini obsisterent, sed potius, vt impetum affluentis sanguinis sustinerent. Neque vlla valuula est in venis, quæ totam cavitatem occludit, sed ferè saltem dimidiam partem occupant, vbicunque sunt, eoque sine factæ sunt, vt sanguinis fluxum & motum moderarentur.

Sint ergo valuulæ, vel non sint in vena sine pari, & si sint, tales, vt sanguinis recursum impedire non possint: tamen non ideo vena dextri brachij semper aperienda est, deriuationis & euacuationis ex parte affectâ gratiâ. Via enim hæc nimis longa esset, & datur breuior, si vena lateris affecti aperiatur, vt iam dicitur.

Et si ergo initio pleuritidis vena in brachio lateris oppositi commodissimè reuulsionis gratiâ aperiatur, tamen cum postea etiam deriuatio è loco vicino requiratur, post reuulsionem in latere opposito factam, vena etiam in latere eodem aperienda est; quod etiam faciendum, si tardiùs Medicus ad ægrum vocetur, morbùsq; iam progressus sit, & tempus reuellendi, sanguine iam in loco inflammationis maximâ ex parte recepto, præterierit.

Et si verò, quod præcipuè Vesalius mouit, saltem superiores tres costæ ramis è vena axillari enatis nutriantur, reliquæ costæ inferiores ramis venæ *ἀξὺρ*: tamen vena in brachio lateris affecti aperta sanguis è latere inflammato vbicunque etiam inflammatio consistat, satis commodè euacuari potest. Et de costis quidem superioribus tribus nullum dubium est. Annotauit tamen Gabriel Fallopius & alij etiam Anatomici diligentiores, consensum axillaris cum vena sine pari, docentque ab axillari prodire venam, cuius tres, vel ad summum quatuor rami aliquando iungantur cum tribus aut quatuor propaginibus venæ sine pari, videlicet inter tertiam & quartam, quartam & quintam, quintam & sextam, & inter sextam & septimam. Imò interdum etiam in sinistro latere truncus inuenitur. Et Columbus annotauit, peculiarem ramum qui à dextro trunco, dum reflecti incipit, exit, adscendensque ramos mittit superioribus interuallis supremarum costarum alendis dicatos, neque solam in dextris, sed etiam in sinistris.

Montani  
sententia  
exami-  
natur.

Montani sententiam quod attinet, rectè ille quidem monet ad fontem respiciendum esse, vt & ad sanguinis copiam, ne si sanguis sit valdè copiosus in latere affecto venam secemus, metu maioris affluxus ad partem affectam. At in eo fallitur, quod vbi venosum genus (quod vt plurimum si non semper accidit) fons est, ex eodem brachio detrahit. Nam



& in opposito latere seruatur recta linea respectu venæ ca-  
uæ. Est enim eadem latitudo. Si verò rectitudinem res-  
pectu partis affectæ intelligit, confundit deriuationem, seu  
euacuationem potius & repulsionem.

Marcus Antonius Montisianus eodem in errore est, dum  
per venam in eodem latere reuulsionem instituit; cùm me-  
ra sit euacuatio, vt supra dictum. Magis adhuc errat, quod  
fectâ venâ in eodem brachio ad inferna trahi scribit.

Atque hæc euacuatio, cùm etiam à loco affecto sit non-  
nihil remota, à Galeno quandoque etiam reuulsio appel-  
latur, sed minùs propriè, vt ex 2. de rat. vict. in acut. t. 10. &  
præcipuè 6. epidem. comm. 2. t. 32. patet, vbi diuersionem, quæ  
ab oculis ad palatum fit, reuulsionem appellat.

Atque vt hæc tandem concludamus, hanc venam secan-  
di rationem in pleuritide obseruârunt, vt dictum, Hippocr.  
& Gal. Quanquam enim de mente Hipp. & Gal. nonnulli  
variè disputent, & iis quæ lib. de rat. vict. in acut. habent-  
tur, vni in eodem latere venam secare iubent, alia ex Galen.  
loca opponant, vbi in principio inflammationum in parte  
opposita venam aperire præcipit: tamen, quod Mercato &  
aliis etiam placere diximus, Hippocrates & Galenus in a-  
liis quidem inflammationibus, in quibus in mora nullum  
periculum, in opposito primò latere venam aperiunt; in  
pleuritide verò, vbi dolor valdè vrget, statim in directo la-  
teris affecti venam aperiunt, ac vnicam venæsectionem in-  
stituunt; quod & nos, si târdiùs, & post morbi principium  
ad ægrum vocemur, imitari possumus. Sanguinem autem  
largius, & ad coloris mutationem miserunt; & vnâ venæse-  
ctione tantum sanguinis detraxerunt, quantum Arabes ge-  
minâ. Verùm cùm non solùm tutius sit sanguinem bis e-  
uacuare, quàm semel copiosa sanguinis missione vires de-  
licere, sed etiam alias quas supra proposuimus, rationes  
suadeant, commodissimum esse in principio sanguinem in  
loco & parte affecta remoto euacuare, rectissimè primò in  
brachio opposito instituitur venæsectio; ita tamen, vt pòst  
etiam in eodem brachio deriuationis gratiâ vena aperia-  
tur.

Marcus  
Anton.  
Monti-  
siani o-  
pinio e-  
xamina-  
tur.

## QVÆSTIO V.

*Per quas vias è thorace materia ad aluum & vesicam  
peruenire, & hinc euacuari possit.*

*Per quas  
vias è  
thorace  
materia  
ad aluū  
& vesti-  
cam per-  
uenire &  
hinc e-  
uacuari  
possit?*

Sanguinem, vt & pus, non solum per tussim, sed & per vesicam cum vrina ex thorace quandoque excerni, Galen. 6. de loc. affect. c. 4. docet, & se vidisse testatur, quod & alij Medici plures, Græci, Arabes & Latini obseruauerunt. Scripsit etiam nuper ad me amicus quidam, quendam in sinistro latere thoracis vulneratum fuisse gladio, super costas nothas sursum adacto, ita vt vulnus vnus & dimidij digiti longitudinem æquaret. Vulneratus etsi de dolore nullo conquereretur, tussi non affligeretur, nihilque sanguinis expueret, vt inde colligi potuerit, tantum externos thoracis musculos fuisse vulneratos: tamen accidit, vt sequenti nocte difficultate meendi corripereetur, post quatrimum verò copiosum sanguinem emingeret, partim grumofum, partim floridum, quæ sanguinis mistio ad duas septimanas durauit, donec æger conualuit.

Per quam autem viam istæ euacuationes fiant, non ita planum est. Et cum materia in thoracis locis consistere possit in pulmone, in lateribus seu musculis thoracis, & in cavitare thoracis, de singulis seorsim inquirendum, & per quas vias materia è pulmone, è lateribus, è cavitare thoracis cum per vrinam, tum per aluum euacuari possit, explicandum. Pulmones primò quod attinet, Gal. 6. meth. med. c. 4. leuem arteriam pulmonis, quantum puris exrupta vomica suscepit, id ad sinistram cordis sinum deferre statuit, quod inde in magnam ipsius arteriam incidens per renes transeat ad vesicam. Verum viam hanc alij reiciunt, & inter eos Andreas Matthiol. qui lib. 1. 1. Epist. ad Iul. Ale. xand. scribit, credibile non esse, vt pus, quod foedus & corruptus sanguis est, non solum transeat per arterias, in quibus vitales spiritus continentur, sed & sinistram ventriculum cordis vbi vita humana & sanguis ille purissimus cum spiritu vitali continetur, qui in grauissima symptomata adeoque ipsam mortem inferat; quod pluribus ibi probat.

Ipsè verò putat, transmitti pus ad venam sine pari; vel ad alias fortasse, quæ circa pulmones vel thoracem habentur, & inde in cauam, in fenes, & vesicam.

Iulius Alexandrinus *in epist. responsor.* Galenum tueri conatur, scribitque aliud longè esse, si quid naturaliter fit, atque quod præternaturaliter; cùm à facultate quadam, atque cùm ab affectu; cùm pars valet atque imbecillis est; cùm expellitur noxa, atque cùm recipitur. Ideoque licet in syncope, tremore cordis, pestilente aëre attracto cor valde afficiatur: tamen si valida expultrice facultate utatur; longè venientem noxam repellere. Idque tum etiam facere naturam, cùm pulmonis abscessus ruptus est. Tum temporis enim robore suo constat cor, spiritibusque præditum validis cum aliis vna insurgere ad rei noxiæ celerissimam quandam expulsionem. Deinde Matthioli sententiam improbat, statuitque longè faciliorem è pulmonibus esse materiæ transitum in asperas, leuésque arterias, quàm ut primùm in pectoris cauitatem è pulmone effundatur, & hinc venæ sine pari exiguis osculis sese insinuet, quod omninò fieri debet, si materia è pulmone à vena sine pari recipi debet.

Verùm enim verò sit sanè cor validum, & quamprimùm affluentem, à pulmone materiam à se repellere conetur, tamen id sine grauibz symptomatibus, palpitatione cordis, lipothymia & similibus fieri non posset, cùm videamus saltem flatus ex hypochondriis ascendentes talia symptomata excitare, licet cor aliàs saluum, & validum sit. Nisi forsan quis hoc pus non confertim, sed sensim ad cor deferri; neq; id adeò malignum, sed à natura satis elaboratum esse statuatur. Ideoque non quidem planè nego per hanc viam naturam pus quandoque euacuare: cùm constet, eam interdum miras vias quærere, & Nicol. Massa anno 1533. ut *in introduct. anat. f. 56. & 57.* refert, obseruauit abscessum in cuiusdā dextro ventriculo cordis & auriculam sinistram vlceratam totā cum sanie manifesta, qui tamen sanus visus fuit, & Beniuen. *obs. 89.* repetit abscessum in sinistro cordis ventriculo pituita redundantē in quodā, qui egregius fur fuerat: Veruntamen non puto naturam faciliè hanc affectares: cùm tutiores habeat, ut mox dicetur.

Nonnul

Nonnulli ad vias quidem nobis occultas & ignotas, naturæ tamen cognitæ, & illam Hippocratis in *lib. de alimentis*, *ὑπόπταιν* & *ὑπόπταιν* confugiunt. Verum non est opus ad occultas vias confugere, cum manifestæ dentur.

Viam autem manifestam vt dictum, Matthiolus & alij statuunt esse per venam *ἄστυν*. Verum non videtur de nihilo, quod Matthiolo obiicit Iul. Alexandrinus, difficilem satis esse transitum, si materia primum è pulmone in pectoris cauitatem deberet effundi, atque ibi empyema efficere, deinde demum sese exiguis venæ sine pari ramis insinuare, & quidem per membranam adeò densam, quæ thoracem intus succingit.

Itaque aliæ manifestæ viæ quærendæ, per quas etiam ex ipsis pulmonibus materia ad renes & vesicam peruenire possit. Viarum autem istarum prima est arteria venosa, vt Bauhinus, *lib. 2. theatri Anat. c. 26.* docet, quæ per pulmones distribuitur, si per eam ad ventriculi sinistri principium, non verò in ipsum sinistrum ventriculum cordis deferatur, & deinde per eius ramum peculiarem & insignem, quem *c. 22.* describit ad emulgentes, indeque ad renes, & vesicam deferatur. Altera via in quibusdam est vena pulmonaria, quæ à venæ cauæ trunco non procul ab exortu venarum diaphragmaticarum ad pulmonem in nonnullis corporibus mittitur. Obseruauit hanc venam superioribus annis Nicolaus Sanmichelius Nouocomensis, vir suo tempore in disseccandis corporibus exercitatissimus, qui in cadaueribus quibusdam venam magnam, vbi diaphragma excessisset, priusquam in cor se insinuat, ramulum quendam rectâ ad pulmones misisse obseruauit, vt refert Iohan. Costæus, in *annot. in Auicenn. lib. 3. fen. 10. tr. 4.*

Si autem iu latere contineatur materia, quod in pleuritide accidere solet, viæ manifestæ ad renes sunt, primò vena *ἄστυν*, per quam sanguis, vel pus in venam cauam effunditur & hinc in renes ac vesicam, porro transmittitur, & cum vrina euacuatur, obseruatúmque est à recentioribus Anatomicis, à sinistro ramo venæ *ἄστυν*, interdum ramulum ad venam emulgentem rectâ ferri. Deinde materia è thorace peruenire potest ad renes & vesicam ex intercostalibus

Observatio Nicolai Sanmichelij de ramulo venæ cauæ.

costalibus arteriis ad arteriam magnam deducta, & hinc ad renes transmissa. Tertiò etiam materia per phrenicum venæ cavæ & ductum arteriæ à Bauhino descriptum ad vrinæ vias pervenire potest; Atque per has vias materia cum è pulmone, tum è lateribus cum vrina euacuari potest.

Per aluum autem puris euacuationem quod attinet pleurique hinc ad occultas vias, quas sibi natura quærit, confugiunt: sed & hinc manifestæ dantur. Et primò quidem vias è pulmone ad aluum quod attinet potest è pulmone materia euacuari per aluum, primò per ramum illum arteriæ venosæ, modò dictum, & à Bauhino descriptum, siue delata in arteriæ magnæ ramum coeliacum, qui ad ventriculum effunditur, & ab hoc in intestina, siue feratur per arteriæ magnæ ramum alterum mesentericum dictum, qui supra emulgentes ad mesenterium & intestina mittitur.


Alij volunt, quòd materia per venam arteriosam in dextrum ventriculum cordis, & ex hoc in truncum venæ cavæ, & inde per epar ad ramos venæ portæ transmittatur, tandèmq; per ramum mesentericum in intestina perveniat. Verùm etsi per hanc viam euacuationem fieri non impossibile sit, longa tamen est, & per ambages.

Tertiò si vena illa pulmonaria à Nicolao Sanmichelio observata adsit, per illam etiam è pulmone ad aluum mediante vena portæ pervenire potest.

Puris autem in pleuritide & lateribus affectis per aluum euacuationis via manifesta est, primò per venam sine pari, per quam in venam cavam & hinc in portam transire potest. Deinde per truncum arteriæ magnæ transire potest, si scilicet materia ex ramis intercostalibus in aortam, & hinc siue per ramum coeliacum, siue per mesentericum ad intestina mittatur. Neque impossibile per arterias materiam, præcipuè natura id agente, euacuari posse, cum aliàs etiam arteriæ in morbis ab humoribus vitiosis non semper planè immunes videantur.

Si verò materia in thoracis cavitate contineatur verisimile est, eam potiùs in pulmones, quorum membrana rarior est, penetrare, & hinc seu per vrinam, seu per aluum per vias modò dictas euacuari, quàm per membranam den-

fam in latus sese insinuare. Et obseruatum est, materiam interdum satis crassam è cauitate thoracis in pulmonem receptam & hinc per tussim reiectam fuisse; sicuti historia habetur apud Guillelm. Fabricium, *cent. i. obs. 46.* de quodam, qui cum in pectore vulneratus esset, duas turundas, quæ ex incuria per vulnus in cauitatem thoracis illapsæ erant tussi reiecit.



## C A P V T X V I I.

### *De Thoracis vulneribus.*

*Thoracis  
vulnera.*

**T**HORACIS vulnera alia sunt non penetrantia, in quibus scilicet membrana succingens adhuc integra est; alia penetrantia, in quibus non solum muscoli thoracis, sed & pleura perforatur: vt ita vulnus in ipsam thoracis cauitatem penetret. Penetrantia rursum sunt vel sine partium in thorace contentarum læsione, vel cum earum læsione, puta pulmonis, mediastini, pericardij, cordis, venæ cauæ, arteriæ aortæ, asperæ arteriæ, gulæ.

#### *Vulnera thoracis non penetrantia.*

*Vulnera  
thoracis  
non pene-  
trantia.*

Si thoracis vulnera sint simplicia, neq; in cauitatem eius penetrent, & nullus alius affectus coniungatur, eandem, quam alia vulnera, indicationem habent. Itaq; i. sanguis sistendus, si opus sit, modo in aliis vulneribus vsitato, vulnusq; fasciâ ligandum, quæ talis sit, vt tutò contineat, nec tamen tam alta, vt premendo dolorem excitet. Et si vulnus paruum sit, breui temporis spatio sanari solet. Quod si amplius sit, digestiuium aliquod vnguentum imponendum, quem in vsum terebinthina clara odorata præcipuè utilis est. Partes vicinæ oleo chamæ. ros. inungendæ. Tandem vbi in vulnere coctio apparet, emplastrum aliquod conueniens, vt barbarum, Basilicon Mesue, aut diapalma imponatur.

*Vulnera  
penetrã-  
tia.  
Signa.*

### Vulnera penetrantia.

#### *Signa diagnostica.*

Vbi verò vulnus profundius est, primò diligenter inquirendum,

rendum, an penetret vsque ad cavitatem thoracis, an non. Cognoscitur autem hoc visu in magnis vulneribus; in aliis tactu, specillo scilicet, seu stylo exploratorio, vel candelâ cereâ immisâ, item auditu, dum aër per vulnus cum strepitu exit. Aëris tamen per vulnus exitus, qui penetrationis signum est, aliis etiam modis explorari potest: Si nimirum penna, vel lanæ floccus vulneri imponatur, vel candelâ accensâ admoueaturn & retento aëre inspirato atque ore & naribus clausis æger efflare conetur. Tunc enim exeunte aëre lana moueri, & flammâ ventilari ac moueri solet: Hæc autem per aërem egredientem exploratio fallere potest, si vulnus obliquum aut tortuosum sit, aut costâ aliqua fractâ, vel depressâ, aut musculi intercostales situ hominis ab eo, quem habebat, dum vulnus acciperet, euariant, vulnusque tegant, vel pars externa vulneris, quod turunda non immisâ sit, conglutinata sit. Tum enim aër egredi non potest, imò nec specillû vel stylus adigi. Ideoque ægrû, dum vulnus explorare volumus eo situ collocare debemus, quo erat cùm vulnus acciperet. Ex instrumento quoque, quo vulnus inflictum est, aliquo modo profunditas vulneris agnosci potest. Angustiora enim instrumenta penetrationis suspicionem præbent, præsertim si vulnus extrâ nonnihil latum sit. In penetrantibus quoque & amplis thoracis vulneribus respiratio interdum læditur, & voce æger priuatur patente vulnere; vulnere verò clauso respiratio & vox redit. Postea & alia signa accedunt, dum sanguis aut pus in pectore cumulantur. Tussis est molesta, sputum fit cruentum vel purulentum, lateris dolor grauitas ac pondus circa costas nothas percipitur. Febris sæpè accedit, & vbi æger se in ægrum latus conuertit, fluctuatio in thorace percipitur, si sanies eo continetur.

De pulmonis & mediastini vulneribus iam dictum; de cordis & œsophagi vulneribus suo loco dicetur.

Si vena caua in thorace vulnerata sit, magna sanguinis crassi copia effluit, virésque validè deiiciuntur, facies pallet, & paulò post mors sequitur.

Si arteria magna vulnerata sit, sanguis clarus & tenuis,

copiosus ac cum saltu exit, si ei via pateat. Pulsus tremulus adest, vires collabuntur, syncope accedit, & paulò post mors.

Si aspera arteria sit vulnerata, parùm sanguinis effluit, dolor in dorso percipitur, vox fit rauca, & tussis acris.

*Prognostica.*

*Prognostica.*

1. Vulnèra hæc, quàm non penetrantia, longè sunt periculosiora; etiam ubi viscera interna non sunt læsa, quia aër externus per vulnus non alteratus ingreditur, internasque partes offendit, & aëre interno & calore expirante virtus debilitatur. Et cum vulnus penetrare non possit, nisi pleura perforetur, illa verò densa, sensu exquisito prædita sit: ac reliquis thoracis partibus communis, dolores, tussis inflammationes; febres hinc excitantur.

2. Præterea nisi vulnèra hæc diligenter curantur, facile in empyema & fistulas degenerant. Quod ubi accidit, sæpè pus foetidum redditur, tandèmq; ægro mors attrahitur.

3. Interdum accidit, ut licet externum vulnus conglutinetur & consolidetur, in sputo tamen adhuc notæ sanguinis appareant, quod accidit, quia partes internæ non sunt consolidatæ, è quibus cruoris aliquid & saniei in cavitatem thoracis emanat, unde empyema generari potest.

4. Si simul quidem tum interna tum externa parte sanescat, cicatrix autem intus debilis, aspera & liuida existat, quandoque refricatur, eoque modo purulentus euadit. Iterum verò etiam exulceratur, si quis plus iusto laborarit & extenuatus fuerit, pituitaque & bilis ad cicatricem affligatur, & si morbo alio detentus extenuatus fuerit. Hippocrates lib. 1. de morb.

5. Vulnèra hæc in dorso periculosiora sunt, quàm in parte anteriore; quia ibi plures & maiores nervi ac tendines sunt, ibique transit vena caua, arteria magna, aspera arteria, gula, & omnia spiritualia organa dorso alligantur. Cauæ autem venæ & aortæ arteriæ vulnèra lethalia sunt, ex sanguinis, qui vitæ thesaurus est, profusione, qui eo loci sisti non potest, solèntque varia praua symptomata superuenire.



6. Si autem praua symptomata non superueniant, sanitatis recuperanda spes est. Vnde de thoracis vulneribus Albucasis scripsit; Si prætereat dies tertia vulneris, & non accedat infirmo spasmus vel tremor cordis malus, vel structura anhelitus, & vides eius dispositiones bonas, tunc scias vulnus esse sanum, & virtutem fortem, cui nihil impossibile.

## Curatio.

Indicationes quidem vulneris, quatenus tale, eadem *Curatio.* sunt, quæ vulneris non penetrantis: quia verò sanguis in cavitatem thoracis effundi solet, & humores vitiosi e corpore reliquo ad vulnus affluere; danda opera ut sanguis sistatur, humorum ad vulnus affluxus. Prohibeatur & sanguis, qui in thoracem effusus est, saniesque, qui ibi colligitur, euacuetur.

Itaque 1. ut sanguis sistatur, turunda oui albumine & aliis medicamentis sanguinem sistentibus illita immittenda. Quod si non efficiat, etiam per os medicamenta sanguinem sistentia exhibenda, ut conserua rosarum, bolus armenus, terra sigillata; succus portulacæ, trochisci de carabe, terra sigillata & similia: de quibus in sputo sanguinis dicitur.

Deinde, si graua symptomata metuenda sunt, & sanguis non valde affluerit, sanguis e latere opposito vacuandus, aut corpus si cacochymicum euacuandum.

Tertiò, ubi magna vasa non sunt vulnerata, sanguisque in pectus non multus effusus, vulnus statim consolidandum, ne ab aëre externo in vulnus sese insinuante, pulmones lædantur. Aliàs etiam obseruandum, ut vulnus quoties opus est, celeriter obligetur, ne aër per vulnus patens in thoracem transeat. Si verò de sanguine in thoracem copiosè effuso suspicio sit (quod cognoscitur, si Medicus anatomix peritus ex loco vulneris perspiciat, an magnæ vel paræ venæ vel arteriæ vulneratæ sint) vulnus turundis apertum seruandum, dandaque opera ut sanguis quamprimùm effluat, ne intus corrumpatur. Vbi notandum, ut turundæ filo alligentur satis longo, ne in cavitatem thoracis decendant, sicut in obseruat. Guillelmi Fabricij, *eent.*

1. *obseruat.* 46. habetur, quidam duas turundas in pectus delapsas; ac post tres menses tussi reiectas fuisse. Est & adhuc obseruandum, ne turundæ nimis sint longæ, ne pulmōnes lædant. Vt etiam facilius sanguis effluat, iaceat æger super latere vulnerato. Et si sanguis in thoracem effusus non sponte effluat, extrahendus instrumento, quod Græci *πυλωγός* nominant. Et si vulnus nimis angustum sit, aut obliquum, paululum dilatandum cute sectâ, aut si æger sectionem admittere nolit, turunda ampliandum. Si accepto vulnere nullus sanguis effluat, isque in pectore detineatur, æger granum vnum moschi sub lingua teneat. Ita enim statim sanguis fluere incipit, quod nonnulli pro secreto habent.

Si etiam ob materiæ copiam in thorace contentam æger malè habeat, vt materia continuò effluat, nec ibi putrescens, febrem, anhelitus difficultatem & tussim excitet, cannulam plumbeam vel argenteam pluribus in locis perforatam, extra verò alis munitam, immittere decet quæ digestiuo medicamento prius illinenda est.

Si sanguis sit concretus, vt exire non possit, attenuandus & incidendus liquore conueniente in cauitatem pectoris infuso. In quem usum commodum est melicratum, quod ex vna parte mellis & duabus partibus aquæ ad tertiæ partis consumptionem coctis, vel mulsam, vel mel rosatum, in aqua hordei aut consolidæ; aut veronicæ vel agrimonix dissolutum. Et si materia sit viscida & tenax, aliquid oxymelitis addere vtile est. Liquor autem hic tepidus iniiciendus; vt & topica omnia medicamenta, hic calida vsurpanda, cum frigus sit pectori inimicum.

Extra verò applicentur medicamenta vulneri idonea, exsiccandi vi prædita; humectantia verò & oleosa vitanda. Valdè in hisce vulneribus commendatur sequens vnguentum.

*℞. Resinæ pini rec. claræ & odorat. ℥. xij. ol. lauri puri terebinth. an. ℥. ij. gummi elemi puri, ℥. iij.*

Resina & gummi super igne liquefcant, deinde addantur olea & terebinthina, parum bulliant, donec vnguenti crassitiem acquirant, tandem colentur.


Et ne partes vicinæ in consensum trahantur, & dolore afficiantur, loca vicina ætate oleo rosaceo, hyeme chamæmelino inungenda sunt. Interna etiam medicamenta vsurpentur thoraci dicata, quæ materiam exsiccant, eius corruptionem prohibent, & si ad pulmones quid perueniat, quæ ad eius expectorationem profunt, vt syrupus è iuiubis, capill. Veneris, de glycyrrhiz. scab. cum aqua scabiosf. tussilag. veronic. capill. Vener.

Tandem etiam medicamenta, quæ intus conglutinationem adiuuant, vsurpanda, vt syrupus myrtinus, conserua rosarum, mel rosatum, consolida, plantago, bolus Armenus & similia. In tota verò curatione omnia metallica hic omittenda, cum valdè noceant.

Sæpè verò accidit, vt vulnus extra conglutinetur, antequam intus planè exsiccatum & consolidatum sit. De quo Hippocrates, in *Coac. lib. 6. sect. 2. comm. 1. aphorism. 5. secundum Hollerij distinct.* Quicumque vulnerati in thorace externa vulneris parte sanati, interna verò non periclitantur, ne empyici fiant; ac quibus interna parte infirma cicatrix obducta, vulnus ea parte refricatur, rupta cicatrice. Ideò quod supra etiam dictum, danda opera vt vulnus probè mundetur, & intus insuper consolidetur, antequam extra fiat consolidatio. Si verò tale quid accidat, ægri vt empyici curantur. Si per vrinas materia & pus euacuetur, adiuuanda vrinam mouentibus.

#### Dieta.

Aër sit temperatus & potius ad calidum, quàm frigidum declinet. Victus sit initio tenuis; donec inflammationis terminus præterierit. Cibi in principio adstringentes vitentur, ne sanguis concretus in cavitare thoracis detineatur. Conueniunt in cibis, amygdalæ, passulæ, hordeum. Æger quiescat, nec moueatur, vel inultum loquatur; caueat quoque iram, & alios affectus nimios.



## CAPVT XVIII.

## De Fistulis thoracis.

**Fistula thoracis.** **N**ONNUNQUAM post tumores aut vulnera thoracis malè curata fistulæ in pectore excitari solent, quæ difficilis sunt curationis, præsertim si ossa, sternum, spina dorsæ, aut costæ simul afficiantur.

**Differentia.** Sunt autem fistulæ, aliæ penetrantes, aliæ non penetrantes.

**Signa.** **Signa diagnostica.** Cognoscuntur facilè, & oculis patent, & si penetrent, stylo vel aëris egressu cognoscuntur.

**Prognostica.** 1. Fistulæ hæc curatu sunt difficiles; cum partes hæc non solum perpetuò moueantur, sed etiam, præcipuè si penetrent, multæ superfluitates in iis colligi soleant.

2. Quæ in dorso sunt fistulæ, periculosiores sunt, ob maiorum neruorum copiam & spinalem medullam vicinam, ac raro curantur. Quæ in musculis sunt circa magna vasa, non satis tutò curantur.

**Curatio.** Ideoque Medicus certus sit, quæ vasa circa fistulam ducantur; ne curatione venas, arterias, neruos lædat, ægroque noceat. Ac proinde vbi dilatatio fistulæ requiritur, turundis illa tutius, quàm ferro peragitur.

**Externa.** Cæterum medicamenta quod attinet externa, quæ in fistulam iniiciuntur, parantur ex hydromelite, vel mulso, decocto rad. caryophyllat. gentianæ, ireos, aristolochiæ, veronicæ, valerianæ, saluiæ, millefolij hyperici, rosar. caudæ equinæ, pilosellæ. Quæ in vino coquantur & colaturæ mel clarum addatur. Potest & thus ac myrrha addi.

Vt ℥. Hyperic. flor. ros. rubr. caudæ. equinæ. centaur. minor. an. m. j. rad. caryophyllatæ, aristoloch. ireos, an. ʒ. j. Coq. in vino. Colaturæ ℥. lb. j. mell. opt. ʒ. iij. Dissolue iburis, myrrh. an. ʒ. j. s.

Decoctum hoc vel simile toties in vlcus iniiciatur, donec mundum fuerit.

Post iniectiones tales, tale vel simile medicamentum cum turunda immitti potest.

*℞. Terebinth. ʒ. j. sarin. lupinor. ʒ. ʒ. fabar. ʒ. ij. succi apy, agrimon. plantag. an. ʒ. j. mellis ʒ. j. ʒ. myrrh. mastich. thuris, ana ʒ. ij. Misce super igne. F. vnguentum.*

Vlcere mundato, iniectiones & vnguenta exiccantia & conglutinantia, vt in aliis vlceribus, adhibenda ex rosis, radicibus consolidæ, balauistiis, sumach, myrrha, thure, mastiche, aloë, radice ireos, terebinthina & similibus.

Dum verò externa adhibentur, intus etiam vsurpentur *Interna.* medicamenta ex iis, è quibus potiones vulnerariæ parari solent, nimirum ex agrimonia, plantagine, veronica, scabiosa, hyperico, betonica, sanguisorba, hedera terrestri, saluia, rosis. *℞. Fol. scabios. m. ij. agrimon. caryophyllatæ, sunicula, veronica, ana m. j. russilag. pulmonar. lingue ceruinæ, ana m. ʒ. rad. caryophyllatæ, ʒ. j. vincetoxici, ʒ. ʒ. Coqu. in vini albi & aqu. fontana, an. lb. j. in vase duplici. Colatura saccharo dulcëretur.*

## C A P V T . X L X .

### De Empyemate.

**P**LEVRITIDEM, peripneumoniam, & alios *Empyema.* thoracis effectus non raro sequi solet malum, quod Græcis *ἐμπύημα*, appellatur, quo qui laborant, *ἐμπύοι*, & *ἐμπύησι*, suppurati & purulenti, dicuntur. Et si enim, si nominis proprietatem spectes, *ἐμπύημα*, omnem suppurationem & puris collectionem significat: vsus tamen obtinuit, vt in specie id suppurationi seu purulentia in thorace tribuatur.

Est ergo *ἐμπύημα*, puris in cauitate thoracis collectio. Solent quidem nonnulli empyema appellare, cum non solum in cauitate pectoris, verum etiam inter pleuram vel costas, aut in pulmone pus colligitur: verum magis pro-

priè & specialissimè solet empyema nominari, cum tantum in cauitate thoracis fit puris collectio.

*Causse.*

*Causse.*

Colligitur autem pus in cauitate thoracis ex præcedente aliqua, & in abscessum mutata ac rupta partium vicinarum inflammatione, vt pleuritide, peripneumonia, anginâ, interdum & rupto tuberculo ad spinæ partem interiorem. De quo Hippocrat. 5. aph. 10. *Quibus ex angina in pulmonem mali fit conuersio, ij intra septem dies moriuntur. Si verò hos effugiunt, purulenti sunt.*

Nonnunquam etiam sine inflammatione pus in pectore colligitur, quod fit, quando sanguis è vasis suis in cauitatem thoracis effusus, ibique detentus putrescit, & in pus mutatur. Et quidem si post venam in pulmone ruptam vlus sequatur, quod còtinuo saniem in thoracem effundat, verum fit empyema. Si verò sanguis copiosus effusus in loco alieno corrumpitur, materia illa pus minus propriè dicitur. Plerique addunt destillationem è capite, de qua Hippocrates, 7. aph. 38. *Destillatio in ventrem superiorem ad suppurationem peruenit intra dies viginti.* Nonnulli tamen pituitam in pectore immutatam minus propriè pus appellari censent. Est enim hæc purulenta materia non merum pus. Nam hæc est ex humore excrementitio; cum merum pus ex nutrititia materia fiat.

Omnes autem modos, quibus pus in thoracem effundi potest, prolixa oratione descripsit Hippocrat. lib. 1. de morb. qui hac de re videatur. Cuius summa hæc esse potest: Empyema verù esse, quando in ipsa thoracis cauitate pus continetur, idque quatuor modis fieri. 1. Ex pleuritide non satis expurgata. 2. A pituita ad cauitatem thoracis à pectore defluente. 3. Ex vena in thorace rupta. 4. Ex vena in pectore aperta. Non verum autem empyema esse, cum non in cauitate pectoris, sed in pulmone materia hæreat, idque etiam quatuor modis fieri. 1. In peripneumonia suppurata & non expurgata. 2. ex pituita è capite descendente & in pulmone putrescente. 3. ex vena rupta in pulmone. 4. ex varice in pulmone generato & rupto.

*Disse*

## Differentiæ.

1. Pus interdum totam thoracis cauitatem occupat, interdum eius alteram partem, dextram vel sinistram. *Differentia.*
2. Ex differentia materiæ datur empyematis differentia, quæ nunc benigna est, nunc acris & foetida.

## Signa diagnostica.

Signa quod attinet, quæ inflammationem aliquam in thorace in abscessum, è quo post empyema futurum est; mutari significant, si pleuritis & peripneumonia, vel alia in pectore inflammatio, remediis idoneis adhibitis non cessat, ac præterea rigores & febres subsequuntur & grauitas: morbum in empyema mutari indicio est. Si enim materia intra dies quatuordecim non expurgatur, in pus mutatur. Rumpitur verò vomica circa diem vigesimum, interdum trigesimum aut quadragesimum. Hippocrates, 2. *prognost. aphor.* 48. Rigor verò fit, dum à pure genito vicina membranosa corpora vellicantur. Ponderis verò & grauitatis sensus in thorace pro dolore percipitur, quod humor, qui ante in partem inflammata dispersus erat, in vnum locum iam totus colligitur. *Signa.*

Signa verò iam facti ex vomica rupta empyematis proponit Hippocrates, 2. *progn.* 60. & 61. Et quidem recentis ac nuper facti empyematis signa sunt eadem, quæ inflammationis suppuratæ modò esse diximus, quibus difficilior respiratio accedit. Quamuis enim rupto abscessu dolor sedetur, & hinc diaphragma & musculi thoracis liberiùs moueri possint; tamen quia pulmo à circumfuso pure grauiatur, vt liberè moueri non possit, & præterea aliqua puris pars à rara pulmonis substantia imbibitur, & hinc pulmo humidior & grauior redditur, bronchiæque eius à pure imbibito obstruuntur, respiratio redditur difficilior. Galenus, 4. *de loc. affect.* cap. 9. addit fluctuationem. Nam, inquit, vbi quis subitò à decubitu transmutatur, idque maximè si ab vno latere in aliud se conuertens defluere aliquid sentiat, puris multitudinem ibi contineri haud dubia coniectura est. Quin etiam in his fluctuatio sæpenumerò haud obscurè auditur. Nisi forsan puris crassities aut copia, quæ omnem penè thoracis capaci

capacitatem implet, impediat fluctuationem illam au-  
d ire.

Diuturnioris autē empyematis signa sunt, quod febris  
quidem mitior redditur; sed lentè, partim putrida, partim  
hectica perpetuòque infestat, quæ de die quidem mitior,  
sed circa vesperam exasperatur, & noctu vehementior est.  
Tussis est perpetua, sputumque tandem fit purulentum,  
adest anxietas & cibi fastidium ex vapore putrido orta,  
sudores multi superveniunt, sed inutiles & non copiosi,  
sed frequentes ob virium imbecillitatem. Eæ enim debi-  
les alimentum etiã non in nimia quantitate sumptum  
superare & rectè apponere non valent. Tandem oculi  
fiunt caui, maxillæ ruborem contrahunt, ob vapores puris  
acres calidòsque faciem ipsam calefacientes, pustulæ cir-  
ca pectus erumpunt, subtiliore ac acriore puris parte ad  
extremam cutem penetrante, pedes intumescunt.

Signa differentiarum quod attinet, primò locum, in  
quo pus continetur, ita nosse docet Hippocrates, 2. *progn.  
aphor. 50.* Si empyema in altera parte tantum existat, hos  
convertere & discernere oportet, doleantne in latere, &  
an alterum altero calidius sit, atque cubantem supra la-  
tus sanum interrogare, an sibi videatur onus aliquod de-  
super suspendi. Si enim ita est, in quodcumque latus pon-  
dus insit, in altero suppuratio existit. Quemadmodum si  
vtrinque calor & pondus sentiatur, in tota thoracis cavi-  
tate pus continetur. Avicennas, hoc, quod habet ex Hip-  
pocrate, lib. 3. *de morbis*, addit: Applicetur, inquit, lin-  
teum madidum thoraci secundum vtramque partem dex-  
tram & sinistram: citius enim exciccatur illud, quod supra  
partem pus continentem appositum est.

Puris verò conditio, si reiiciatur, ex foetore & aliis qua-  
litatibus cognoscitur.

*Prognostica.*

*Prognostica* empyematis recensuit Hippocrates, 2. *pro-  
gnost. 63.*

i. Si cum abscessus ruptus est, febris eadem die dimi-  
serit (id est, ita mitis reddita fuerit, ut si precedenti ve-  
hementiæ conferatur, propemodum pro nulla habeatur:

nam



nam planè non cessat) æger cibum appetat, siti careat, (nam vapores foetidi ac tetri à thorace ascendentes ad linguam ac palatum ob communem tunicam simul orificium ventriculi afficiunt, & hinc appetitus deiicitur, sitisque excitatur. Quapropter si breui tempore post eruptionem hæc symptomata remittant, puris ex quâ quantitas, idque benignius significatur. Si verò hæc symptomata non remittant, puris ingentem copiam & prauitatem significant) venter exigua & consistentia deiiciat, pus leue, album sit & æquale, & pituita vacans, absque dolore, & valida tussi expurgetur, ægrum euasurum spes est.

2. Si verò contrarium accidat, & horrores post puris eruptiones maneant, febris non desinat, aut cum videtur desinere, recrudescat, ægerque sitiat, nec cibum appetat, alius sit humida, sputum sit parvæ substantiæ, vt & coloris mali, flauum, viride, nigrum, foetidum, pituitosum, inæqualis substantiæ: pereunt, quibus hæc omnia adfunt. At quibus alia adfunt, alia non, horum quidam moriuntur, quidam in multo tempore euadunt.

3. Plerumque verò empyema in phthisin transit, & tum collum ac tempora valde extenuantur, pedes intumescunt, ungues curuantur. Etenim qui seruantur, vbi pleuritis vel peripneumonia in empyema transit, intra dies quadraginta pus per sputum eici debet, quod si non fiat in phthisin transit, 5. aph. 15. Non quidem opus est, vt quadagesimo die æger planè ab omni pure liberatus sit, sed sufficit, si eo tempore tanta eius copia reiecta sit, vt reliquæ exiguæ, quæ supersunt, faciliè postea euacuari possint, cuius euacuationis non ita certus terminus definiri potest. Nam vitra diem quadagesimū mollis & rara pulmonis substantia pus sine damno vix sustinere potest. Ideoque opus est, vt intra eum terminum maxima eius pars reiiciatur.

4. Quibus in magna puris copia intra thoracem & pulmonem collecta totus thorax in respiratione attollitur, celerrimè suffocantur, Galenus, de loc. affect. cap. 7.

5. Malum periculosius est, si pus totam cavitatem thoracis occupet, quam si in altero solum latere contineatur.

6. Empyema tamen, quod vnum saltem latus occupat, pericu

periculosius est, si sinistrum latus occupat, quàm quod dextrum; quia sinister cordis ventriculus, vt nobilior, tum magis afficitur.

7. Quicumque empyi vruntur aut secantur, si album pus effluat, euadunt, si verò subcruentum & foetidum, pereunt, 7. *aph. 44.*

8. Quandocunque empyi vruntur aut secantur, si pus aut aqua vniuersum effluerit, certò moriuntur. Hippocrates, 6. *aph. 27.*

9. Purulentos moderatius habentes si sputa graueolentia consequuntur, recidiua interimit. *in Coacis.*

10. Quibus specillum à pure velut ab igne coloratur, ij ferè moriuntur. *in Coacis.*

11. Ex suppurationibus, quas pulmonum morbi excitant, ferè senes moriuntur, ex cæteris verò iuuenes. *ibid.*

12. Inflammatio lateris aut pulmonis in suppurationem versa, quandoque sursum rumpitur, id quod periculosius est. Si enim pus quàm citissimè per sputum non reiiciatur, tabidi fiunt. Quandoque verò per aluum & vesicam euacuatur, id quod cum minore periculo cõiunctum est, Paulus Aegineta & Aëtius. Cùm enim vt æger citò à pure liberetur euacuatio per tussim ac sputum non sufficiat; si quidem per eam sensim & lentè pus euacuatur, & interea temporis à pure in thorace & pulmone moram trahente substantia pulmonis facilè corrumpatur: commodior est, & minore cum periculo coniuncta, per aluum vel vrinam puris euacuatio.

#### *Curatio.*

*Curatio.* Si prohiberi à Medico nequit suppuratio, adiuuetur moderatè calidis & humidis cataplasmatibus & emplastris impositis, de quibus in pleuritide dictum. Maturato abscessu vt maturè rumpatur, opera danda, ne pus partem ampliùs corrumpat, forti locutione, sternutatione irritata.

Rupto abscessu, vt is abstergetur & consolidetur, materia verò euacuetur, danda opera. Euacuatur autem materia vel sensibiliter, vel insensibiliter. Sensibiliter rectius & commodius euacuatur, & quidem frequentius ac tutius per sputum vel thoracis perforationem, vel per aluum, vel per

per urinam. Itaque considerandum, quò materia vergat.

Si tussis urgeat, ut per sputum expurgetur, detergunt aqua saccharata, hordei, hydromel & prisana cum melle, quæ ut alimentum medicamentosum, & medicamentum familiare in omni empyematis genere ac quouis tempore conuenit. Radix iridis cum mulla, hyssopus, decocti glycyrrh. syrup. de prass. capill. ♀. Imprimis efficax est aqua mulla, in qua lota sit terebinthina, vel cremor terebinthinæ. Vel ℥. Succi hederae terrestris ʒ. iv. prassij ʒ. ij. thuris, myrrh. an. ʒ. j. diapenid. ʒ. ʒ. F. Lohoh. Vel ℥. Ruberrima recentis brassicae folia concisa. Coqu. in Balneo vase clauso. Li-  
quor saccharo dulcoretur, & manè ac vesperi bibatur.

Materiae tamen expectorandæ in delectu medicamen- *Medica-*  
torum habeatur ratio. Si enim pus fuerit biliosum, acre *mentoriũ*  
& erodens, eligenda & vsurpanda, quæ acrimoniam eius *delectus.*  
mitigant & leniunt, ut *bordeum, iuiuba, passula, sebest. gly-*  
*cyrrh. amygdal. dulc. pinea, violar. capillus* ♀, *semen mat-*  
*ue, syrup. violar. capillorum* ♀. *rotula diatragacant. frigid.*  
*diatreos simpl.* Si verò pus non acre, sed crassius sit, at-  
tenuantia, incidentia & abstergentia vsurpanda, ut *hyssopus,*  
*tussilago, radic. helen. semen carthami, anisi, feniculi, ca-*  
*rica, syrup. de hyssop. de glycyrrh. de tussilag. lob sanum &*  
*expertum.*

Si verò pus nimium crassum sit & pituitosum, vali-  
dius incidentia & attenuantia vsurpanda, sed modera-  
tè, & cum arteriacis ac thoracis lenientibus miscenda;  
quo modo & pus crassum incidetur & attenuabitur, &  
humectatione diluetur, & ad exspuitionem aptius red-  
detur.

Si verò ad vias urinæ vergat, ea, quæ extergendo vri-  
uæ meatus purgant, vel quæ serosam humiditatem suppe-  
ditant, medicamenta exhibeantur, ut decoct. ex rad. ape-  
rientibus, gran. Alkekengi, ciceribus rubris, capill. Veneris  
sem. 4. frig. maior. Ut ℥. Radic. aperientium maceratarum  
in vino albo, glycyrrh. an. ʒ. j. sem. 4. frig. maj. ana ʒ. j. ʒ. ʒ.  
adiant. M. j. cicerum rubror. M. ʒ.

Coq. ad dimidias. Aromatisentur cum radic. ireos ʒ. ij.  
& dulcorentur saccharo.

Si verò

Si verò ad intestina feratur exhibeatur ius galli decrepiti, decoct. betæ, caulium graminis, prass. cassiæ, quæ thoracem lenire & aluum mouere possunt, vt & terebinthina: vel clysteres abstergentes iniiciantur. Tandem syrupus aliquis abstergens & adstringens nonnihil adhibeatur, quæ intestinorum exulcerationem prohibeat, vt syrup. de rosis simpl. infus. de rosis siccis cum decocto plantaginis. Vel etiam ad prohibendam intestinorum exulcerationem clysteres ex lacte, furfuribus & semine psyllij iniiciantur.

*sectio & vstio.*

Si verò tanta puris copia in thorace collecta sit, vt neque tussi, neque per aluum aut vrinam expurgari possit, vel etiam natura eas euacuationes non tentet, aut suffocationis periculum immineat, vt maxima adsit difficultas respirandi, thorax aperiendus. Id quod fit non solum sectione, sed & vstione, vt ex Hippocrate, 6. aphor. 27. patet. Per vstionem autem hic ab Hippocrate non talem intelligi putat Mercatus, quæ ad pus vsque penetret, sed solum efficiat exterius vlcuscula manantia, per quæ pus sensim expiret. Verùm aliud ipse textus Hippocratis docet, qui ita habet. *Quicunque empyici aut hydropici vruntur aut secantur, si pus aut aqua vniuersim effluerit, omnino moriuntur.* Si enim vstione saltem talia vlcuscula parari deberent, per quæ pus sensim exspiraret, nullo modo semel conferatim euacuari & inde mortis periculum attrahi posset. Accusat verò hic Rondeletius, lib. 2. cap. 15. timiditatem Medicorum assistentium & ægrotorum, scribitque, se vstione liberasse iuuenem, qui per annum pus in thorace collectam post pleuritim gestarit, & multos alios, quorum nomina supprimat. Verùm sectio non solum tutior est, sed & minore cum dolore & ægri consternatione coniuncta.

*Cautio in sectione instituenda.*

Verùm in hac re cautione opus est, vt primò attendatur, an vires ægri istam operationem sustinere possint; deinde an aliquod commodi æger ex sectione illa percepturus sit. Etenim si pulmo respirationisque organa ita corrupta sint, vt nulla conualescentiæ spes adsit, frustra æger sectione cruciatur. Itaque maturè & ante diem 40. & prius

priusquam pulmones à pure corrumpantur, sectio instituenda. Quæ ratione autem ea fieri debeat, dictum in instit. lib. 5. part. 1. s. 2. cap. 7. de sectione thoracis, & dicetur etiam de eo in fine huius capituli, quæst. 2.

Columbus, lib. 11. c. 3. etiam inter mediastinum, id est, duplicem pleuram, thoracem in duo secantem materiam aliquam colligi posse statuit, quæ perforato sternò tuto factis extrahi possit, à diligenti chirurgo, reique Anatomicæ peritissimo.

Thorace aperto pus non confertim, sed sensim euacuandum; cum si confertim euacuetur, æger moriatur, ut modo ex Hippocrate dictum. Et si sufficit, si primò th. j. ß. extrahatur, postea singulis diebus paulò minus. Pus sensim euacuandū.

Si denique neque per tussim, neque per urinam, neque per aluum materia euacuetur; neque etiam æger sectionem admittat, vel tolerare possit, vix euadet, sed phthisi morietur. Nonnulli tamen suadent, ut materia insensibiliter discutiat & absumatur decocto ligni guaiaci, farsæparillæ, chinæ & similibus, extra verò impositis emplastris & fomentis discutientibus: Et tentari potest illa curatio, sed vix ægrum liberabit. Si tamen experiri libeat, potest fieri tale fomentum. Insensibiliter discutientia.

℞. Rad. aristol. rotund. ireos, an. ʒ. j. acori veri, althææ, an. ʒ. vj. hyssop. origan. prass. scabios. an. m. j. flor. melil. chamem. an. m. 3. agaric. ʒ. ij. Coqu. & decocto spongia imbuatur & thoraci imponatur. Post fomentationem pectoris regio inungatur oleo nardino, irino, anethino: Vel imponatur hoc emplastrum.

℞. Empl. diachyl. magni de melilot. an. ʒ. j. ß. ol. irini, ʒ. vj. pulu. rad. ireos, spicæ, puleg. an. j. ceræ q. s. F. emplastrum. Vel ℞. Cortic. radic. ulmi, radic. lilior. albor. an. ʒ. iiij. malu. violar. hyperici, chamemeli an. m. j. Coq. & contendantur. Adde fermenti ex atro pane ʒ. iiij. farin. sem. lini, sænigræci, an. ʒ. j. ß. ol. amygd. dulc. vel butyri s. sale, ol. violar. an. ʒ. ij. F. Cataplasma.

#### Dieta.

Curationem non parùm diæta adiuuat. Sit nimirum vi- Dieta.  
ctus ratio siccans, attenuans, & abstergens. Ideoque

cibi condiendi hyssopo, fœniculo. Vtiles sunt amygdalæ, pinæ: optima est ptisana cum melle, si ad aluum vergat materia. Vtilis est & beta & brassica cum butyro cocta. Si ad renes, ius cicerum cum petroselino. Abstineat æger à leguminibus, fructibus. Potus conueniens est hydromel, præcipuè hyssopo conditum. Vinum oligophorum etiam concedi potest, nisi febris sit magna.

## QVÆSTIO. I.

*Qualisnam sit febris, quæ empyemati coniungitur.*

*Qualis-* Febrem empyemati coniungi certum est. Vapores enim  
*nam sit* putridi ex pure cordi vicino communicantur, quod inde  
*febris* incalescit, calorémque p.n. in totum corpus diffundit. Ve-  
*quæ em-* rùm qualisnam sit febris illa, non eadem videtur esse om-  
*pyemati* nium sententia. Nos suprà diximus esse illam lentam pu-  
*coniun-* tridam, quæ interdium mitior est, circa vesperam exaspera-  
*gitur.* tur, & noctu est acerbior, tandémque hecticam inducere potest; quod iam porro explicandum.

Nonnulli quidem febrem istam saltem hecticam planè esse putant. Verùm putridæ notæ satis adsunt, & inter reliquas etiam circa noctem exacerbatio. Galenus equidem, 1. *differ. febr. c. 9.* empyicorum febrem etiam ad hecticas refert; quod verò interdium minus, noctu magis infestat, ad alimentum assumptum & vaporem ex eo ad solida membra calentia distributum refert, 2. *prognost. t. 60.* Verùm etsi non negemus, si febris empyicorù hecticam tandem cibi adsciscat, post sumptum cibû ob causam modò dictam exacerbari posse, tamen si illud hac saltem de causa fieret, non solùm vesperi post coenam, sed etiam de die post prandium, & ita bis, non verò præcipuè sub noctem, exacerbari debet.

Alij hæc fieri dicunt, quia pus propius ad sanguinem pituitosum (pituita autem circa vesperam mouetur) quam alium quemuis humorem accedat. Verùm pus ad naturam pituitæ non accedit, sed potiùs à calore p. n. fiat, & in thorace detentum incalescit. Ideoque aliqui id ob humores adustos & melancholicos accidere existimant, qui

qui cum vesperi & noctu moueri soleant, non mirum esse putant etiam febris empyicorum exacerbationem vesperi incipere & noctu durare. Quod cuilibet perpendendum relinquimus; cum & alij morbi, qui non sunt melancholici, noctu exacerbari soleant, scribitque Hippocrates, *lib. 3. de morbis*: *In omnibus lateris morbis dolores ferè interdiu, quàm noctu, leuiores sunt.* Cuius rei causa, saluo cuiusque iudicio, & hæc esse posse videtur, quòd nocturno tempore pus magis elaboratur, secundum Hippocratem, *2. aph. 47.* *Dum pus sit, dolores ac febres magis sunt, quàm confecto.* Cum enim nocturno tempore calor & spiritus ad interiora vergant, natura eo tempore ad concoquendam materiam magis apta videtur. Etsi verò in empyemate pus iam confectum sit: tamen quia natura nunquam est otiosa, ea materiam purulentam, quamdiu in corpore hæret, magis magisque elaborare nititur.

## QVÆSTIO. II.

*Quo in loco sectio thoracis in empyicis instituenda sit?*

Quo in loco sectio thoracis in hoc morbo sit instituenda, non omnes idem docent. In Instit. *l. 1. p. 1. sect. 2. cap. 7.* inter 5. & 6. costam sectionem faciendam esse diximus, fecimusque id autoritate Pauli Æginetæ, *lib. 6. cap. 4.* & Hieron. Fabric. ab Aquapend. *de operationibus chirurgicis, cap. de thoracis sectionibus*, qui pluribus ibi hac de re agit, & consuli potest. Alij tamen aliud sentire videntur. Hippocrates, *2. de morbis*, de suppuratione ex peripneumonia agens, si utròque in latere pus sit, sinistrum latus eligit, quòd eo loci minùs lethalis sit operatio, propterea proculdubio, quod epar gibba sui parte diaphragma sursum eleuat, & ut locus magis tumidus est & dolet, sectionem instituit, sed locum determinatum seu costam ibi non desinit. Alibi verò, *in lib. de intern. affectibus*, cutem & carnem usque ad tertiam costam ab vltima secat, & postea terebrâ cauâ costam perforat.

Guido de Cauliaco, *Chirurg. suæ doct. 2. cap. 5.* apertionem thoracis fieri iubet inter 3. & 4. costam; securiùs tamen in-

*Quo in loco sectio thoracis instituenda.*

inter 4. & 5. Amatus Lusitanus, *cent. 5. curat. 61.* etiam inter 3. & 4. costam sectionem feliciter institui docet, idque in Anatomia Ferrariae se deprehendisse. Scribit imò etiam si intra 2. & 3. costam sectio instituatur id sine læsione septi transuersi fieri posse, aliosque, qui loco altiore sectionem instituunt, reprehendit. Henricus Smetius *miscellan. lib. 7. p. 355. & lib. 10. p. 533.* sectionem inter 10. & 11. costam notham, seu proximè & contiguè vndecimæ, hoc est, inter penultimam & antepenultimam costam à iugulo deorsum numerando, seu inter secundam & tertiam sursum ab vltima costa notha numerando sectionem feliciter, & cum ægri commodo ac salute instituisse refert.

*Duo in locis le-  
ctione ob-  
seruanda.*

Ex hoc dubio vt nos expediamus, sciendum, duo in loci electione attendenda esse: primum vt operatio tutò instituatur, id est, nihil in thorace, vnde ægro aliquod periculum imminere possit, violetur, pericardium scilicet, pulmones, diaphragma, venæ item & arteriæ insignes ac nerui; secundò, vt per locum, in quo sectio instituitur, pus commodè euacuari possit. Ne ergo pericardium violetur, thorax neque in anteriore, neque in posteriore parte perforandus est, sed in latere. Ne autem violetur diaphragma, sectio in loco non nimis humili peragenda est, ne diaphragma, quod pleuræ annectitur, & quod in respirando eleuatur, vulneretur. De quibus prolixius agit Hieronymus Fabricius, *loc. alleg.* Vt autem pus commodè effluere possit, sectio loco non nimis alto instituenda, è quo pus non facile effluere possit.

*Decisio  
questio-  
nis.*


Ex quibus decisio huius quæstionis facile patet. Ij enim qui inter 5. & 6. costam, aut certè inter 4. & 5. sectionem instituunt, tutissimum locum eligunt. Aliàs enim si loco humiliore instituatur sectio, metus est, ne simul diaphragma lædatur, quod non fit sine periculo, cum pars sit nervosa. Quod ipsum etiam præcaueri iussit Hippocrates, 3. *de morbis*: *Quod si, inquit, præ crassitudine humor non fluctuet, vix spiritum frequenter trahat, & pedes intumescant, & iussicula aliqua adsit, ne te decipiant hæc, sed thoracem pure plenum esse probè noris, proinde in terra Erytriade liquida, vel trita ac tepida linteum tenue tingito, eoque thoracem circum-*

*circa*



*circa integro, & quâ parte primùm resiccatum fuerit, eâ secato auturio quàm proximè ad septum transversum, cauendo tamen, ne hoc ipsum lædatur.* Qui verò inter 3. & 4. inter 2. & 3. costam sectionem instituunt, locum ad puris euacuationem commodissimum eligunt. Quo enim foramen propius est diaphragmati, pus faciliùs effluit, sicut videmus, ex dolio liquorem omnem faciliùs effluere, si versus fundum proximè foramen fiat. Itaque vt hæc concludamus, consultissimum est, Hippocratis consilium, in 3. de morbis, sequi, & explorare, quo loco pus maximè hæreat, & in eo sectionem instituere, quàm proximè ad septum transversum, cauendo tamen, ne id lædatur. Et credibile est diaphragma à puris copia deprimi, vt non tantum eleuetur, quantum in homine sano; & proinde loco etiam humilior sectione sine periculo & læsione diaphragmatis institui possit. Si verò de hoc dubitetur, & proinde quis tutò omninò agere velit, & Paulum Æginetam ac Fabricium ab Aquapend. sequi, is ægrum postea ita locare debet, vt pus commodè effluere possit.

De thoracis etiam in empyemate sectione videatur Vesalius, in opusculo hac de re edito, quod allegat Schenckius lib. 2. obs. 131.



## C A P V T X X.

## De Hydrope Pectoris.

**E**MPIEMATI cognatus affectus est, quem *ŭdēpos* & hydropem pulmonis ac pectoris nominant. Vt enim in empyemate pus in thoracis cauitate colligitur: ita in hydrope pectoris aqua & serosi humores in cauitate thoracis colliguntur; quibus & ipse pulmo sæpè repletur. De quo Hippocrat. 2. de morb. quem locum suprâ, c. 9. adscripsimus. Et aliquot morbi huius historias ex variis auctoribus collegit Schenckius, lib. 2. obs. 52. & seqq. Vnum etiam exemplum habet Dn. D. Gregor. Horstius, in epistol. Medic. sect. 11. pag. 44. annotauitque etiam similem obseruationem Dn. D. Doringij, lib. 2. de febr. cap. 12.

Cum autem affectus hic, etsi forsan satis frequens, cognitu sæpè satis sit difficilis, ac plerumque mali causâ in obstructa pulmonis vasa solum referatur, vnam atque alteram eius historiam è Caroli Pisonis, *lib. de morb. ex illuvie serosa*, addere libet. Primò refert Nobilem virum annos octoginta iam excedentem sensim graui difficultate spirandi opprimi cœpisse, & ea quidem, quæ de nocte potissimum ei negotium exhiberet sub primum somnum. Tum enim suffocationis periculum subito somnum interrupisse, vt è lecto surgere & ad fenestras liberiores aërem captare cogeretur, & spiritum altum traheret, nullibique locorum consistere placidè posset: Quæ angustia sensim die proueniente remittebat, & sub noctem iterum urgebat. In mortui cadauere repertus pulmo & præcordia in plurima aqua sepris thoracis interclusa innatantia.

Alius nobilis cum inueterata orthopnæa multis annis ac febre laborasset, morbi vi tandem subito iugulatus est. In eius cadauere, præter inflammatorium in epate tumorem repertus hydrops thoracis, sed in vno dumtaxat latere, & pulmo vesicis humore consistente, lentoque, ac pellucido instar albuminis oui prægnantibus repletus.

*Causæ.*

*Causæ.*

Statuunt quidem nonnulli, etiam à cerebro par asperam arteriam serosam illam materiam descendere. Verum probabile non est, tantam copiam à cerebro defluere; & si id fieret, in pulmones destillaret, & diuturna tussis præcessisset, de qua tamen, qui hoc malum incurrunt, sæpè conqueri non solent. Credibile magis est, humorem serosum vel colligi primario pulmonis vitio, dum is frigidus est & debilis, & alimentum suum non benè concoquit, sed in aquosum humorem mutat, vel in toto corpore, vel, ac præcipuè, circa epar & lienem in abdomine colligi, atque inde aut cum ipso sanguine ad pulmonem mitti, aut abdominis cavitatem cæcis ductibus in thoracem penetrare, quod in hydropicis sæpè animaduersum. Hinc accidit vt malum quandoque in thorace initium sumat, & tandem in hydropem degeneret: & contra sæpè euenit, vt in hydropi

dropicis humor serofus ex abdomine in cauitatem pectoris penetret. Per quas vias autem humor serofus in cauitatem thoracis penetret, non aded planum, & potest id forsan variis modis accidere. Nam vel vaporis specie humor in cauitatem thoracis penetrare potest, ibique rursus condensari; quod facillè fieri potest, cum membrana thoracem intus succingens satis densa sit: vel etiam serum sub propria forma è vasis thoracis, in quibus abundat; vt in ventre inferiore in abdomen: & vt Hippocrates, 6. *epid.* loquitur, ἀνευ εἰσόδου φέρονται αὐτῇ τῆς ἐφ' ὧν ἔστι ἐν Ἀσθμασιν, Inuenit natura etiam sine ratione sibi ipse vias.

Et plerumque in ventre inferiore causa mali hæret, ac nutritionis viscera scirrhusa, aut vesicis aqua plenis repleta deprehenduntur: vnde etiam pedes intumescunt, facies pallet, & cachexiæ signa adsunt. Accidit autem hoc malum præcipuè iis, quibus thorax, ac pulmo vel à primo ortu, vel ab occasione aliqua debilis est, & ad recipiendos superfluos humores aptus. An verò etiam à corde vel pericardio humor hic prouenire possit, considerandum lectori relinquo. Semper enim humor aliquis in pericardio reperitur, qui præter naturam etiam augeri potest, cum sanguis arteriosus admodum serofus sit, & hinc ad thoracem penetrare. Videatur etiam Columbus, *lib. 5. anatom.* de hydropica, in qua epar & lien saluus inuentus fuit, abscessus verò & putredo in corde. Et Dodonæus in *anatom. cap. 35. obs. Beniuen.*

### Differentiæ.

Differentia præcipua est, quòd aliquando aqua in toto thorace continetur, aliquando in altera saltem eius parte. Differe-  
rentiæ.

### Signa diagnostica.

Percipitur in thorace dolor grauans ob materiæ aquosæ abundantiam, & plerumque sonitus aquæ fluctuantis, dum æger corpus mouet, deprehenditur. Tussis est sicca. Etsi enim materia multa in pectore abundat: tamen natura eam nec coquere, nec ob tenuitatem expellere potest. Respiratio est difficilis, frequens & parua, ægérque quasi suffoca- Signa.

suffocari videtur, ob organorum respirationis angustiam, & diaphragmatis à materia incumbente compressione; & in primis illa in respirando difficultas, & crebritas somni primo tempore ægrum subito inuadit. Sitis est molesta, ob pulmonem exsiccatum. Et si enim aqua in thorace abundat, ea tamen falsa est. Appetitus deiicitur: accidunt interdum animi deliquia & palpitatio cordis, color faciei pallidus est, & palpebræ ac pedes intumescunt: latus intrinsecus acetum olet, non tamen semper, si scilicet materia in thorace moram trahat & corrumpatur. Accedit interdum etiam febris, cuius quoque Hipp. *alleg. loc.* meminit. Materia enim ista serosa in thorace moram trahens acrimoniam acquirit, tandemque putrescit & febrem accendit.

*Prognosticum.*

*Prognosticum.*

Malum est curatu difficile, & raro sanatur. Vt hydrops ex caloris natiui viscerumque debilitate prouenit, ita & hic ex eadem causa ortum habet. Et licet quandoque morbus spontè solui videtur, erumpente ad aluum aqua: tamen paulò post malum, & quidem grauius, recrudescit, & incrementum paulatim sumit, tandemque in hydropem vertitur, ægerque suffocatur.

*Indicationes & Curatio.*

*Indicationes, & Curatio.*

Materia aquosa pectus & pulmones replens euacuanda, eiusque generatio, vnde cunque etiam proueniat, præcauenda. Et quia humor hic coctionem nullam recipit, eam etiam expectare opus non est, sed statim eum euacuare conuenit iis medicamentis, quæ aquas è corpore educere solent. Vt viæ tamen, per quas effluere debet, aperiantur, commodum fuerit. Hinc etiam Autor libri, *de morbis, loco supra cap. 9. alleg.* scribit, si materia ad aluum erumpit, ægrum statim sanum & à morbo liberatum videri. Et obseruatum, morbum hunc permutatum fuisse in herniam aquosam, simulque per aluum effluxisse aquam, & sic euasisse ægrum, & integrè restitutum fuisse. Id quod accidit ubi non ex toto materia ad pectus fertur, nec viscera naturalia, nec pulmones infiniter læsi sūt. Secus enim si res se habeat, temporis progressu aluus incendetur, eademque illa, vel adhuc

adhuc amplius patietur æger, vt idem autor ibidem loquitur.

Vtilia autem hîc sunt in primis mechoacanna, radix gialapa, gummi gotte, succus radicum sambuci ad ʒ. j. vel ʒ. j. ʒ. sumptus, succus radicum ireos, elaterium ad ʒ. iij. exhibitum. Educenda est autem materia paulatim & medicamenta purgantia repetenda sunt; Hippocrates & antiqui etiam sectionem thoracis instituebant, de quâ capitè præcedente dictum. Verùm cùm ea præsentem solum materiam exhaustiat, futuræ autem regenerationem neutiquam prohibeat, si pulmones vel viscera sint corrupta, omninò inutilis est, & Medico ignominiam parit.

Potest tamen etiam serum per vrinam euacuari. Atque ab hoc auxilio Cæsar Maximilianus II. plurimum commodi sensit, qui cum pectoris hydrope cum cordis palpitatione ad annos viginti laborasset, vno interdum die ad sex libras minxit, cùmque motus ille materiæ impeditus esset, suffocatus est, vt refert ipsius Medicus, Ioh. Crato, in epistol. à Scoltæio collect. epistol. 137. Diuretica autem talia proponuntur de hydrope.

Diuretica  
vtilia  
sunt.

Est etiam utilis aqua hæc D. Doringij.

Aqua D.

ʒ. Rad. calam. aromat. emphani marini an. ʒ. iij. rusci, ʒ. j. cortic. & sem. ebuli, an. ʒ. ʒ. agrimon. m. j. Incisa & commixta cum epate & pulmone vituli Infundantur hor. 24. in aq. apij, cotula fetida, an. lb. iij. vini Rhenani lb. ij. Fiat f. a. destillatio suspensâ in alembico cortic. citri siccor. in nodulo ligat. ʒ. ʒ.

Doring.

Verùm etsi modis his omnibus materia quandôque euacuari possit: tamen id semper tentare adeò tutum non est; cùm à calore medicamentorum agitata materia difficilem respirationem, suffocationemque excitare possit. Ideoque tutissimum videtur, vt materia sensibilibiter euacuetur aperto thorace. Et quidem maturè id faciendum secundùm præceptum Hippocratis, 6. epidem. sect. 7. ὁδὸν ἀδύνατον εὐακῶσαι, ne ab aqua pulmones corrumpantur. Materiâ euacuatâ danda opera, vt eius generatio prohibeatur, viscerumque morbi, intemperies, obstructio, schirrus medicamentis, de quibus in doctrina de hydrope dicitur, emendetur.


Cautio.

emendetur. Et cum materia serosa facillè rursus generetur, eius purgatio per intervalla repetenda.

*Cauteria.*  
*Diata.*

Cauteria quoque in cruribus præcipuè, & fonticuli excitandi, per quos semper materiæ aliquid euacuetur.

Victus ratio sit, qualis hydropicis præscribitur.



## C A P V T X X I.

*De vertebrarum dorſi luxatione, & gibboſitate.*

*Vertebra-  
rum dorſi  
luxatio.*

**S**PINA dorſi è multis vertebriſ componitur, quæ peculiari articulatione inter ſe cohærent & conſtituntur vt ad inflectendum, in anteriora præſertim, apta ſint, in quo motu ne ſedibus ſuiſ excidant, vertebræ multis & variis ligamentis firmatæ ſunt. Quandoque tamen cauſarum præternaturalium violentia è ſede ſua exturbantur, & quidem nunc totæ, quæ luxatio eſt, nunc ex parte ſaltem, quæ ſubluxatio nominatur.

*Prima  
vertebra  
luxatio.*

Et quidem primæ vertebræ caput inſidet, è qua tamen quandoque verſus poſteriora etiam excidit, quo fit, vt ſpinalis medulla comprimatur, mentumque ad pectus ſteſtatur, vnde & eloquendi & ſpirandi potentia tollitur, homoque ſubito iugulatur.

*Cervicis  
verte-  
brarum  
luxatio.*

Cervicis verò vertebræ & luxantur & ſubluxantur. Et ſi integrè luxantur celeriter homo interit. Etenim ſpinalis medulla in prima origine & nerui ab ea oriundi comprimuntur, vnde ſpiritus animales, in membra inferiora influere non poſſunt, & ipſa reſpiratio tollitur. Subluxatio verò fit in partem anteriorem, & tum collum diſtorquetur, caput moveri nequit, facies liuet, locus affectus dolet, & ſpirandi ac loquendi difficultas aſeſt. Malum tamen minus periculofum eſt, quàm luxatio. Statim verò iſ occurrendum. Quod fit, ſi æger in humili ſella ſedeat; Chirurgi verò miniſter toto corpore ſcapulis & humeris ægri incumbat, Chirurgus autem caput utrimque ad aures comprehenſum concutiat, & in omnem partem moveat, donec vertebra ſuo loco reſtituatur. Quod vbi factum, dolor ſtatim

*Sublu-  
xatio.*

statim remittit, capútque iterum moueri potest.

Frequentissima verò luxatio dorsi est, quæ in genere *Gibbositas* nominatur, & qui ea laborant, *Gibbi* dicuntur. Luxatio autem ista non est eiusdem generis. Luxantur enim vertebræ vel extra vel intrò, vel ad latus alterutrum. Et quidem ad latera id fit frequenter, extra frequentissime; intrò rarissime, eâ de causâ, quia in spinæ parte, quæ cavitatem thoracis spectat; inter vertebrae est cartilago multa & crassa, quæ prohibet, ne spina facile versus anteriora luxari possit, in reliquis verò positionibus nullum adest impedimentum.

Cùm versus exteriora vertebræ luxantur, & sedibus suis excidunt, tumor in dorso apparet, malumque hoc propriè Græcis *κύρσις*, *κύβσις* & *ὕβσις*, Latinis *Gibbositas* *Κύρσις*, *κύβσις* & *ὕβσις* nominatur. Si verò versus anteriora fiat luxatio, cavitatis in dorso apparet, tumor verò ante & circa sternum, & tumor *λόρδωσις* appellatur, quod verterunt repanditatem, recuruitatem & gibbositatem ad interna. Si autem in latus alterutrum fiat luxatio, dicitur *σκολίωσις*, obliquatio & tortuositas. *λόρδωσις*, seu *repanditas*, *σκολίωσις*, seu *obliquatio*.

Galenus 3. de artic. text. 2. & 6. aphor. 46. quartum ad huc vitium vertebrarum spinæ dorsi adiungit, quod *σῆσις*, id est, quassationem nominat, quando vertebrarum iunctura & compages dimouetur, vertebræ tamen in sede sua *σῆσις*, seu *quassatio* manent. Quod malum aut certè huic cognatum, forsan est illud malum, quod Germani *das Vvebethun* appellant, & quod nonnulli frequenter pati dicuntur. Conqueruntur hoc modo affecti de dolore dorsi & circa ventriculum, appetitus deiicitur, nonnulli vomunt, caput dolet, nonnullos etiam & præcipuè infantes calor quasi febrilis corripit, imò sæpè febris satis magna, quæ ob symptomata coniuncta malignam quandòque simulat. Atque hoc sibi accidere dicunt, cùm graue onus aliquod sustulerunt, vel alio modo vehementer & inordinatè spinam dorsi mouerunt aut inflexerunt.

Curandi rationem hanc habet. In infantibus candelam ceream accensam vmbilico applicant, & ollulam imponunt, eamque instar cùsurbitæ affigunt & adhærere permittunt, *Curatio*.

mittunt, donec spontè decidat. In adultioribus verò quasi luxationem hoc malum curant, atque alij aliter. Plerique brachia decussatim pectori iniiciunt, manibus interdum reflexis, quas alius à tergo sedens & genua sua dorso applicans apprehendit, ægrumque hoc modo concutit, donec quidam strepitus audiat. Tum enim vertebri suam compagem restitutam esse dicunt. Exhibetur etiam cum commodo *unguentum rubrum potabile oculi cancerorum* & similia, quæ lapsis & percussis exhiberi solent medicamenta. Mulierculas etiam sæpè falsò ad hoc malum præcipuè in infatibus recurrere scio, & licet infatès febribus laborèt, id huic malo imputant. Si quid tamen tale seu infantibus, seu adultis reuera accidit, causa est *oñis*, seu quassatio vertebrarum ex causa aliqua violenta, & quidem vndecimæ, vel vicinæ alicuius vertebræ, vbi orificium ventriculi dorso alligatur, è cuius & membranarum id dorso annectentium extensione præter naturam ista symptomata oriri credibile est.

*Curvitas  
decrepiti-  
torum.*

Nonnulli adhuc quintum genus addunt. curuitatem scilicet, quæ decrepitis accidit, quod tamen potius incuruitas, vt dixi, quàm gibbositas nominandum; cum iis, qui corpore sunt procero, in decrepita ætate corpus in anteriora incuruetur, vertebri quidem non luxatis, sed totâ spinâ incuruatâ.

#### *Differentia.*

*Differen-  
tia.*

E quibus, quæ luxationis vertebrarum sint differentia, patet. Addo & hoc, quod aliquando ea accidit in thorace, aliquando sub diaphragmate.

#### *Causæ.*

*Causa  
externa.*

Causæ à quibus vertebræ loco suo dimouentur, sunt vel externæ, vel internæ. Externæ sunt casus, percussio, inflexio nimia, & similes causæ violentæ. Quò pertinet etiam nutricum imprudentia, quæ infantes fasciis nimis arctè aut inæqualiter constringunt, aut in brachiis gestant, antequam spina tam firmata est, vt erecti sedere possint, aut si, dum infantes è cunis eleuant, dorsum manu alterâ non fulciunt. Huc referenda est & vestium nimia constrictio, ob quam causam puellæ gibbosæ interdum

*Nutrici  
incuria  
in infan-  
tibus fas-  
ciis con-  
stringen-  
dis.*



ſunt, dum matres, vt eas iunccas reddant, thoracem artius & violenter conſtringunt. Conſuetudo etiam frequenter corpus in partem anteriorem vel latera flexendi malo huic materiam præbere poteſt.

Cauſæ internæ ſunt, primò natiua & vitioſa in vtero *Interna.* conformatio, vnde etiam ſæpè hæreditarium malum eſt. Deinde humores vitioſi, qui ligamenta ſpinalis medullæ laxiora reddunt, ſiue aliunde affuant, ſicut id à capite factum eſſe annotauit Guillelmus Fabricius, *cent. 1. obſer. 45.* ſiue circa ſpinam à natiua vel adſcititia earum partium imbecillitate colligantur. Quo facit maximè ligamenti neruoſi, quo vertebræ connectuntur omnes, debilitas. Id enim cū tenaci & glutinoſo humore ob motus vertebrarum commoditatem circumfuſum ſit, ei nonnunquam alius frigidus craſſus humor per catarrhos commiſcetur, vnde ligamentum hoc & nexus vertebrarum laxior redditur, vel tumor excitatur. Tertiò tumor intus ad ſpinalem medullam natus, de quo Hippocrates 6. *aphor. 46.* Talia enim tubercula, vt & muſculi adiacentes, ſi intumeſcant, vertebras loco ſuo dimouent. Trahuntur autem & dimouentur à talibus tumoribus vertebræ nunc intrò, nunc extra, pro ſitu tumoris. Si enim tumores duo obſideant ligamenta interna duarum aut plurium vertebrarum, inter quas vna, duæ vel plures interiectæ ſunt vertebræ nullo tumore occupatæ, tum vertebræ à ſuis ligamentis tumentibus trahuntur, compelluntque vertebras, quæ ſunt intermediae, à ſuo loco dimoueri, & fit *κνίσις*, perinde ac ramus viridis, ſi eius duo extrema in ſe cōtrahantur, in medio curuatur. Si verò vnus, vel duo, vel plures tumores, inter quos nulla interiecta eſt vertebra adſint, ligamenta, quæ occupant, ad ſe trahunt in partem interiorem; & ſic ſimul vertebra intrò trahitur & fit *λειτουργία*.

*Signa diagnōſtica.*

Malum hoc viſui & tactui patet. Et quod vertebræ ſuo loco motæ ſint, & quo in loco viſu & tactu explorari poteſt. An etiam vertebræ verſus interiora, vel exteriora, vel ad latera luxatæ ſint, viſu dignoſcitur. Symptomata tamen etiam prouenientia mali eius qualitatem edocent.

*Signa.*

cent. In *κνέσις* vertebrarum thoracis spiritus difficulter & cum sono trahitur, sternum fit strictius. In *λερδωσις* maxima adest spirandi difficultas, mouendique in partibus inferioribus impotentia. In *σκολιόσις* plerumque excitatur paralyfis in parte luxata, & conuulsio in opposita. Quibus spina ad lumbos gibba est, renum & vesicæ vitia superueniunt, & plerumque sunt infœcundi. Ad paralyfin tamen partibus inducendam in primis, modus luxationis multum potest. Si enim luxatio fiat repente & sit magna, compressa spinali medulla & nervis inde oriundis accidit paralyfis. Si verò sensim vertebræ luxentur, interim spinalis medulla, quæ mollis est, extendi potest, vnde nihil mali patiuntur. Qua de re videatur Galenus, 4. *de loc. aff. cap. 3.* Symptomata, quæ ex luxatione duarum vertebrarum lumborum ex lapsu ab arbore superuenerunt, recenset Guil-  
 elmus Fabricius, *cent. 5. obs. 65.* Post casum, inquit, superuenit dolor acerbissimus, qui longum tempus durauit, cibum indigestum euomuit, nihilque cibi & potus per aliquot dies retinere potuit. Febris quoque ardentissima, sitis in exhausta, vigiliæ, inquietudo, ariditas linguæ, tandemque delirium superuenit. Statimque post casum inferiores partes corporis ab vmbilico paralyfi correptæ fuerunt; quapropter nec excrementa alui, nec urinam continere potuit. Gibbis plerumque anhelitus foetet; quia ut Aristoteles docet, thorax est angustior, quam ut pulmones satis dilatari possint, vnde humores & vapores in eo corrumpuntur.

*Prognostica.*

*Prognostica.*

1. Morbus hic est curatu difficilis, præsertim si malum amplius non sit recens, & sæpè est incurabilis.
2. Hæreditaria, & quæ à primo ortu, & conformatione obtingit, gibbositas incurabilis est.
3. Quæ à causa externa fit gibbositas sæpè est sanabilis, at quæ ab interna, vix vnquam sanatur.
4. Si plures vertebræ ordine sese consequentes simul luxentur, minus periculosum malum est, quam si vna saltem luxetur. Vna enim vertebra si saltem luxetur, cum in acutum angulum desinat, spinalem medullam comprimit,

&

& eam valdè lædit. Si verò plures vertebræ simul luxentur, & obtusum angulum efficiant, minus spinalem medullam comprimunt.

5. Luxatio integra longè periculosior est, quàm subluxatio; quia grauiora symptomata infert.

6. Luxatio introrsum facta ferè habetur pro incurabili ab Hippocrate *libr de art.* Paulo Ægineta, *lib. 6. cap. 117.* Auicenna; *lib. 4. fen. 5. tract. 2. cap. 21.* Quomodo enim quis ab anteriore parte per ventrem coactionem facere possit? Guillelmus Fabricius tamen *cent. 5. obs. 69.* id non planè pro impossibili habet, & modum curandi ibi proponit, vt infra dicetur; sed videtur difficilis, modò non sit planè impossibilis.

7. Quicunque Gibbi ex asthmate vel tussi fiunt, ante pubertatem moriuntur. Hippocrates, *6. aphorism. 46.* Calor enim circa annos pubertatis auctior maiorem & liberam respirationem requirit: Ipsa quoque viscera in thoracis cauitate, cor & pulmo augentur. Quia verò tuberculum in maiorem molem excrescit, & ipse thorax non fit amplior; impedita spiratione calor insitus paulatim languescit, tandèmq; suffocatur. Et cùm ob ipsam asthmaticam dispositionem difficilis fiat respiratio, malum duplicatur, gibbositate accedente, vt non sit mirum, hominem in adolescentia mori.

8. Qui verò Gibbi fiunt ex aliis causis, quàm humoribus frigidis, vt tussi, ictu, humorum defluxu non necessariò tam brevis vitæ sunt, sed sæpè diu viuunt.

9. Qui verò Gibbi fiunt post pubertatem, cùm in iis thorax iam naturalem magnitudinem habeat, non tam citò moriuntur.


10. Quicunque ab infantia statim Gibbosi sunt, iis costæ vel parùm vel nihil in latum crescunt, sed foràs antrorsum porriguntur, vnde pectori sua latitudo decedit, atque inde fiunt asthmatici, pulmonibus compressis. Quin etiam ceruicem ad magnam vertebram in anteriorem partem recuruatam habere coguntur, vt & iis caput pronum sit. Id igitur magnam faucibus angustiam exhibet, cùm intrò vergat.

*Curatio.* Indicatio hinc vnica est, vertebram sua sede, è qua prolapsa est, restituere, id quod in tenellis corporibus fieri potest, in luxatione extrorsum facta, si spina dorsi, quæ ad extra gibba est, quotidie ab axillis ad os sacrum versus leniter manibus intrò cōprimatur. Iisdem corporibus adhiberi possunt thoraces ferrei, quibus vertebræ ad sua loca intrò comprimuntur & compelluntur, qualem depinxit Ambrosius Paræus *lib. 22. cap. 48.* vel saltem lamina ferrea thoraci insuitur, & emplastra & inunctiones ex medicamentis neruos roborantibus & consolidantibus adhibentur, de qua vide Guillelmum Fabricium, *cent. 5. obseruat. 67.*

In adultis verò gibbositas non nisi Chirurgiæ opera, & plerumque per peculiaria instrumenta, quæ depingere facilius, quàm describere, curantur. Qua de re videatur Hippocrates, 3. *de articul.* & Galenus, *in comm. Oribas. de machinis c. 35.* Paulus Ægineta *lib. 6. c. 117.* Cornel. Celsi *lib. 8. c. 14.* Paræus *lib. 5. c. 15. & 16.*

Luxatio verò spinæ dorsi ad interiora ab omnibus penè habita est pro impossibili. In corporibus tamen tenellis, si malum sit recens, emplastra fortiter adhærentia applicari possunt, quibus auulsis spina versus exteriora retrahi potest, de quibus dictum, *lib. 1. p. 1. cap. de cranij depressione, & etiam cap. seq. dicetur.*

In adultis verò etiam aliquid tentandum censet Guillelmus Fabricius, *cent. 5. obs. 69.* primò quidem extensione, & spinæ eiusdem nunc in dextrum, nunc in sinistrum latus concussionem, & ventris in altum eleuationem, per instrumenta ab Oribasio & Paræo, *locis allegat. depicta.* Deinde dorsi incisione, vsque ad vertebram luxatam, & vertebræ, quæ post incisionem tenaculis aptis in appendiceprehendenda est, in altum eleuationem. Verùm modus hic tutus vix videtur, & pauci tam ancipiti curatione sese subiciunt,



## CAPVT XII.

De fractura spinæ & vulneribus spinalis  
Medulla.

**I**NTERDV M etiam accidit, vt à caussis externis *Fractura*  
& violentis spina & eius vertebræ frangantur, & con- *spina.*  
tundantur. Fractura plerumque lethale malum est, ob spi-  
nalis medullæ & neruorum læsionem. In contusione hoc  
vsurpetur cataplasma :

*℞. Farin. hordei, fabar. an. ʒ. j. semin. fœnugræc. ʒ. ʒ. Contuso*  
*pulu. flor. chamæmel. absinth. cumini, an. ʒ. ij. croci ʒ. ʒ. rad. spina.*  
*consolid. maior. minoris, an. ʒ. j. ʒ.*

Radices ad mollitiem coquantur & per setaceum traii-  
ciantur, postea adde reliqua, & fiat f. a. Cataplasma.

Si spinalis medulla vulnerata sit, cùm ex ea partes in- *vulnera*  
feriores neruos accipiant, inferiores partes omnes vel re- *spinalis*  
soluuntur, vel conuelluntur, malumque est periculosum, *medulla.*  
quia cerebrum in consensum trahitur, ac dolor & febris  
excitatur, raroque ægri, præsertim si vulnus sit magnum,  
conualescunt. De quò etiam Hippocrates, 2. præditt. Si  
spinalis medulla aut ex casu, aut aliâ quapiam caussa externa,  
aut sua sponte laborarit, & crurum impotentiam facit, ut ne ta-  
ctum quidem percipiat æger, & ventris & vesicæ, adeò vt pri-  
mis quidem diebus stercus aut vrina nisi coactè reddatur. Quod  
si morbus inualuerit, & stercus & vrina ægro inscio prodit,  
tandemque non longo post intervallo perit.

Cùm autem spinalis medulla quasi cerebrum oblonga-  
tum sit, eadem etiam medicamenta ei, quæ suprâ lib. 1. p.  
1. cap. 24. de vulner. cereb. proposuimus adhibenda.

## CAPVT XXIII.

## De tabe Dorsali.

*Tabes dorsalis.* **H**ACIT etiam Hippocrates, lib. 2. de morbis, mentionem tabis dorsalis. *Dorsalis tabes* inquit, ex spinali medulla oritur, præcipuè verò recentes sponfos, & libidinosos corripit. Febris sunt expertes, benè comedunt & colliquantur. Quod si ita affectum perconteris, asseret, sibi videri ex superioribus partibus à capite velut formicas in spinam demitti, cùmque urinam aut stercus reddit, semen genitale copiosum & liquidum ei prodit, neque generatio fit, & inter dormiendum, cum uxore dormiat, nec ne, Veneris ludibria patitur. Cùmque aliàs tum præcipuè per locum arduum iter fecerit aut cucurrerit, anhelosus & imbecillus euadit, caput grauat, & aures sonant. Hic temporis progressu vehementibus febribus correptus perit ex li-  
pyria febre.

*Differen-  
tia.*

Quatuor autem, vt in commentario addit Petrus Salius Diuersus, tabis dorsalis apud Hippocratem occurrunt differentiarum. Prima est ex nimia Venere; altera, ex sanguine copiosiore in spinalem medullam irruente; tertia, ex eiusdem reficcatione; quarta, ex praua destillatione in eandem incumbente.

*Prima.*

Primam differentiam quod attinet, potest illa confirmari historiâ Satyri, 6. epid. sect. 8. text. 42. qui cognomento Grypalopax vocatus, annos 25. natus non solum læpius per somnum genitale semen excreuit, sed & per diem illi multoties promanauit. Cùm autem iam annum trigessimum attigisset, tabe correptus mortuus est.

*Caus-  
sæ.*

Hippocrates morbi huius causam proculdubio hanc esse statuit, quod semen ex cerebro per spinalem medullam ad membra genitalia proueniat, vt ex lib. de aëre, aquis & locis. lib. de genitura & natura pueri, videre est, quâ de re hic non disputo. Hoc tamen certum est, & totum corpus ex nimio seminis profluuium contabescere, & cerebrum insigniter lædi, & proculdubio, etiam spinalem medul-  
lam

lam, quæ cerebrum oblongatum quasi est; vnde succedit tanta corporis impotentia, vt ex omni motu validiore, vt cursu vel in locum accliuem adscensu difficultas spirandi sequatur. Et si verò in principio nulla adsit febris: temporis tamen progressu, & facultatibus omnibus debilitatis febris tandem putrida succedit, quæ plerumque est è malignarum genere, in quibus interiora vruntur, exteriora frigent. Vniuersalibus autem præmissis Hippocrates lac asininum, deinde bubulum per 40. dies præbet, & postea cibis mollibus ipsum reficit.

Secunda tabis dorsalis differentia est, cùm calor spinalis medullæ insitus à copiosiore sanguine obruitur & fere extinguitur. *Secunda.*

Tertia, cùm occlusis meatibus per quas nutrimentum ad eam defertur, exsiccat. *Tertia.*

Quarta, cùm praua destillatio in eam decumbit; cuius exemplum habetur apud Guilielmum Fabricium. *Quarta.* cent. 1. obs. 45.

De ista tabe dorsali pluribus agit Balduinus Ronsseus, epistol. 32. quæ etiam tract. de scorb. ep. 4. habetur quam hic opponere libet: Morbus, quem Græci λωρδωσις, Latini lumbaginem appellant, est Hollandis tum propter rationem victus, tum go. loci ipsius qualitatem vliginosam, prorsus familiaris planè, ac propemodum indigena, quanquam & aliis locis illos soleat inuadere, qui immoderatiore vtuntur Venere. Nam sicuti lib. 2. de morbis, autor est Hippocrates, corripit maximè sponso, atque Veneri deditos, proditque ipsis genitale semen multum ac liquidum, & genitura in utero non manet, & in somnis semen profundunt, siue dormiant cum uxore, siue non. Verùm hanc tabis dorsalis speciem, sicuti puto, non est quod metuamus: quando verisimile magis sit, morbum tuum originem traxisse à materia pituitosa sanguini, aut flatibus, aut melancholia mixta, per modum catarrhi, capite per venas in spinalem medullam defluente, siquidem cùm septem sint catarrheumatism, aut defluxionum septem species, vt author est, libro de glandulis, Hippocrates, quibus species cerebrum sese exonerare solet, per nares dico, per aures, per oculos, per palatum in guttur ac gulam, ac reliqua per venas in spinalem medullam & sanguinem; necessum est, locum, in quem

defluxio incumbit, variè affici pro materia ipsius tum qualitate, tum quantitate. Nam si excrementa aut sordes, quæ à cerebro in aliam partem defluunt, non prorsus malignæ sint, ac quantitate pauca, dolor ipse & affectus talis erit, qui à natura facilè euinci ac discuti possit: sin excrementa tum qualitate tum quantitate peccant, credendum est, eadem grauissimorum symptomatum occasionem præbitura. Ac proinde quoniam reliquis sex omiſſis, de ea tantum defluxionis specie, quæ à capite per venas in spinalem medullam decumbit, nobis sermo est: sciendum est quod quoties frigidi ac lenti humores in spinam defluunt, vicinas partes primum occupare, atque afficere; quæ nisi ita robusta sint, ut conceptam materiam statim euincere, ac dissipare possint, easdem ad subiectas, ac maximè vicinas partes vicissim transmittunt, quæ dum nervosum genus distendit, grauissimis doloribus totum hoc corpusculum lancinat, incipiendo à scapulis, & sensim serpendo ad lumbos, atque interdum etiam ad ipsum os coxendicum. Atque ita affecti vix progredi, aut sese loco mouere possunt, quam affectionem propriè lumbaginem aut λόρδωσις vocamus. Si quis tamen Neotericorum Guttam dicere malit, quod tanquam gutta à cerebro defluat humor, rectius fecerit, quàm ij, qui generaliter ad omnes articulorum dolores guttæ nomen accommodare voluerunt. Habet autem hoc cum quartana commune, quod omnibus anni temporibus inuadat, æstate tamen sit, brevior, autumno longior, maximèque si hyemem attingat. Cæterum si acrior simul, & tenacior sit humor, qui à cerebro defluit, atque maiore cum impetu feratur, iam non solum in subiectam spinam decumbit, verum etiam in acetabula ossis coxendicis, ac tum demum tabem dorsalem, aut spinalem, aut ossis sacri dicti Hippocrati, conciliat, malum tale, in quo vitam cum morte commutare pro solatio est, quando semper magis ac magis ingruentibus doloribus requiei tempus nullum conceditur, siquidem, ut libro de glandulis Hippocrates ait, oritur morbus ex defluxione capitis per venas in spinalem medullam, inde autem in os sacrum impetum facit, quod medulla ipsa fluxionem producit, & in coxendicum acetabula seu iuncturas deponit, & si tabem fecerit, homo marcescit, atque hoc modo contabescit, & viuere non expetit. Statim enim scapula dolent, ambosque pedes &



crava consequenter, & semper tandem pereunt multo tempore curati, atque sic deflorescit homo & moritur. Habet prætercætera cum reliquis tabidis commune, quod autumnus ei magna ex parte exitialis, ver autem ad pharmaciam opportunissimum. Porro quod spinalis medulla arescat, atque marcescat, in causa est obstructio orificiorum ac venarum, atque vasorum à cerebro ad spinam sanguinem atque spiritum deferentium, quo fit, ut curandi methodus in eo consistat, ut reſeratis poris materia peccans euacuetur. Quod si plethoricum quoque corpus sit, primum tundenda erit vena, aut humeraria brachij dextri, aut media sinistri, aut etiam si usus exigat, poplite, & si fortè tumeant ora illa venarum quas hæmorrhoidas Græci appellant, consultum erit easdem, aut admotis sanguisugis, aut alio quovis modo adaperire. Solet enim, ut ante diximus, lumbaginis causa esse humor melancholicus, qui quamvis crassior esse videatur, quàm ut commodè ad spinam transmitti possit: quotidiana tamen experientia fieri posse docet, quando lienosis lumbaginem in dies superuenire conspiciamus, quemadmodum in sceletyrbe nostra annorauimus. Et Galenus commento tertio in primum prorrheticòn Hippocratis idem apertè demonstrat dum dicit, lumbis dolentibus expectandam euacuationem per hæmorrhoidis, quod propter earundem retentionem non rarè doleant lumbi, magisque si eius temperatura, qui ita afficitur melancholica sit, aut si abscedentes, ut sic loquar, præcedentis morbi reliquia, ad ora illa venarum delatæ exitum non habeant.

Post sanguinis igitur missionem decoctis res tentanda est, quæ materiam fluidam reddant: deinde medicamenta purgantia pro humoris peccantis ratione propinanda erunt, incipiendo à clementioribus, habita semper ratione capitis, tanquam partis primariæ affectæ. Deinde si res exiget, fortioribus etiam utendum erit, in quem usum elaterium suum Hippocrates summè commendatum habet. Ego magis probarim globulos ex agarico, cum turpethi portione, aliqua maceratos, idque aut in decocto foliorum senæ, cui nonnihil seminis anisi, aut sænic. additū sit, aut alio quovis, prout res exigere videbitur. Post purgatum corpus, consultum erit fomentationibus, frictionibus, inunctionibusque

Curatio  
Lumbaginis.



trab. 4. ſerm. 2. c. 8. & Paulus l. 4. c. 59. teſtantur, in muſcu-  
loſis corporis partibus, brachiis, cruribus, lumbricorum  
formâ ſeſe exerunt; quorum capita apprehenſa ſi trahan-  
tur, vehementem dolorem excitant. De quo affectu Auicen-  
nas l. 4. p. 3. tr. 3. c. 21. & 22. Guido de Cauliaco, Paræus  
l. 71. chirurg. c. 25. Scholtzius in epiſt. med. epiſt. 27. Reuſne-  
rus Vvierus in tract. Germ. de Dracunculis. Foreſtus, lib. 20.  
in fine in obſeru. medic. Germani Miteſſer, nominant, quod *Miteſſer*.  
alimentum infantium abſumant, nominant. Qui enim hoc  
morbo laborant infantes, contabescunt ſerè, & licèt ſa-  
tis comedant, & aliàs benè valeant, non nutriuntur, &  
pruritus moleſtiſſimus in dorſo percipiunt.

Generantur autem hi vermes ex materia viſcoſa in ve- *Cauſſa*  
nis capillaribus, præcipuè in dorſo, concluſâ ſubter cu- *illorum.*  
tem, & ob cohibitam tranſpirationem in hoc vermium  
genus tranſmutata.

Cognoſcuntur autem hi vermes & ſui ſuſpicionem præ- *Signa.*  
bent, dum infantes quidem comedunt, ſed non rectè nu-  
triuntur, & ſerè contabescunt, & ſunt inquieti, ac pruri-  
tus ſentiunt moleſtiſſimus, & ſæpè lancinatione indefi-  
nente admodum diuexantur, ac quaſi ſpinularum aculeis  
punguntur, ita, vt huc illuc ſeſe iactantes quieti manere  
non poſſint. Quæ res, vt certius cognoſcatur, infantes in  
balneum & ſudatorium inferendi, & manibus fortiter fri-  
candi. (Poſteſt etiam panis cum melle pro frictione adhi-  
beri.) Ita enim quaſi capilli quidam cineritij aut nigrican-  
tes è cute prorèpunt.

Curationem quod attinet, refert Andreas Dudithius, in *Curatio.*  
epiſtol. medic. à Scholtzio collect. epiſt. 27. in Polonia in la-  
brum aquæ calidæ, in quo pueri lauant, iniici panis in  
micas friati manipulum, cineris item parum, lotis infan-  
tibus aquam percolari. & panem illum in maſſam compin-  
gi, quæ vbi in diuerſas partes manibus diſtrahitur, ma-  
gnam ſubeiliſſimorum pilorum vim oculis offerat primo  
die, poſterioribus diebus pauciores, poſtquam conualeſ-  
cunt infantes, planè nullos.

Noſtris viſitatum eſt, dorſum vt & brachia, ſi opus ſit,  
linimento ex farina triticea & melle confecto inungere, &

pares illas benè fricare.

Alij ʒ. Radic. bryoniae ʒ. ij. Coq. in lixiuo è cineribus  
quernis paratò in formam pulticulæ, quâ pueros illinunt.

Vbi vermiculi illi capitella sua instar pilorum vel feminis papaueris è poris cutis exserunt, nouacula acuta statim detruncanda sunt, ne iterum retracta sese abscondant.

Alij sterçus gallinaceum facculo inclusum in lixiuio per noctem macerant, & postero die infantem vsque ad collum eò immergunt, ac peracta sudatione melle inungunt, tandèmq; nouaculam adhibent, infanti semen nasturtij præbent, ter illud repetendo. Atque id aliquoties interiectis aliquot diebus repetendum est, donec frictione illa nihil amplius eliciatur. Mulierculæ certos dies & dierum interuallum eligunt, sed superstitiosè.

### Vertebra

Prima

*capiti*

*adnata.*

*Pediculi*  
1. 1. 6

in der/o.

One is  
done

207/0.  
Cousins

**CURRAN**

Accidunt & alij morbi interdum spinæ ac dorso. Ita Coulmbus, *lib. 15. anat.* vertebam primam occipiti planè adhærentem obseruauit. Ex abscessu in dorso pediculos erupisse refert Forestus. Fabro cuidam lignario in abscessu quinquaginta oua ( seu vesiculæ ) tenuissima membranula obducta, intus limpidissima [aqua plena reperta fuisse, refert ex relatione Laurentij Scholtzj Schenckius *lib. 5. obs. 46.* Cornua quoque in dorso innata fuisse obseruatum est cuius rei exempla annotauit idem Schenckius *loco allegato obs. 50.*

## CAPVT XXV.

*De Luxatione & fractura costarum.*

*Luxatio.*

Costarū

*luxatio.*

**O** S T Æ etiam interdum à percussione vel lapsu luxantur, nunc suprà, nunc infrà, nunc intrò. Si suprà, vel infrà, vel si in latus luxatio fit costæ, inæqualitas visu & tactu deprehenditur, & hinc cavitas, illinc extuberan-

Eius sym

*promata.*

Sequuntur autem varia luxata costas symptomata, difficul-

cultas spirandi, thoracem mouendi, & corpus erigendi dolor pleuritidé referens, musculosæ carnis, quæ costæ superiacet, inflammatio.

Costa autem vt quamprimùm sedi suæ restituatur danda opera. Si luxatio sit in latus superius, æger rectus suspensus ex ianux vel fenestræ alicuius parte superiore brachiis statuatur, & costæ capitulum eminens comprimatur, donec in locum suum redeat. Si verò versus inferiora luxata sit costa, æger pronus incuruetur manibus supra genua innixus, & costa quæ eminet comprimatur, ac in locum suum compellatur. Si verò intrò facta sit luxatio, manus opéra nihil præstare potest, sed emplastrum aliquod attrahens apponendum, qualia supra *lib. 1. p. 1. c. de cranij depressione* sunt proposita. Et talia emplastra non semel sed sæpius applicanda & auellenda sunt.

Si inflammatio carnis superiacentis adsit, cataplasma aliquod conueniens imponatur, quale etiam est, quod capite præcedente propositum, vel Diachylum ireatum. Vide *Paræum, lib. 10. c. 6.*

*Fractura costarum.*

Franguntur quoque interdum costæ itidem ex causis violentis, casu, vel percussione.

Signa eius rei sunt, quod quædam inæqualitas & cavitatum visu, tum tactu deprehenditur, strepitus quoque quidam auditur. Quibus accedunt & alia symptomata. Adest dolor grauis, & præcipuè si internæ costæ pars fracta sit, isque pleuriticorum dolorem æmulans, respiratio est difficilis, tussis molesta, & nonnunquam etiam sanguinis sputum superuenit, dum ex vasis ruptis sanguinem effluentem pulmo imbibit. Præcipuè verò duo mala fracturam costarum comitari solent. Primum est carnis superiacentis costæ inflatio, quæ & tactu & visu deprehenditur, & si manu locus comprimatur, aëris cedentis strepitus auditur. Cui nisi succurratur maturè, inflammatio & febris, atque abscessus succedere solet. Cuius rei causa est carnis ab osse separatio, & imbecillitas partis ictu inducta, quæ alimentum, quod doloris ratione attractum copiosius affluit, satis concoquere nequit, quod partim crudum idè-

remanet, partim in vapores & flatus resolvitur. Malum hoc interdum & costarum corruptio sequi solet. Cum enim caro ab osse abscedit, succedit in locum aër, cuius contactu os offenditur & corrumpitur.

*Prognostica.*

*Prognostica.*

1. Equidem per se vacat periculo costarum fractura: verum quoniam gravia, quæ diximus, symptomata contusioni carnis circa costas accidunt, ea de causa periculo non vacat, imò quandòque lethalis est.

2. Quò pauciora symptomata praua adsunt, eò malum mitius est, quod fit, vbi costa solum fracta, non verò intro compressa est. Solet autem costa per callum die vigesimo coalescere & ferruminari.

*Curatio.*

*Curatio.*

Costa fracta primò rectè componenda & coniungenda est; secundò eius per callum vnitio procuranda; tertio symptomata, & præcipuè carnis inflatio, auertenda.

Primò quidem videndum, an tussi & spiritus retentione, an verò manuum opera fracta costa in locum suum restitui possit. Quod nisi succedat, emplastrum aliquod attrahens, & quod adhæret, qualia supra, *lib. I. part. I. c. 20.* sunt proposita, imponendum, & cum impetu auferendum, vt costa in locum suum reducatur. Conueniens huic vsui etiam est hoc emplastrum.

*℞. Farinæ volatilis, ʒ. ij, tragacanth. thuris pulv. an. ʒ. v. visci querni (glutinis scil.) ʒ. vj. ichthyocoll. ʒ. j. ʒ. album. o-nor. ʒ. ij. aq. rosar. q. s. M.*

Vel emplastrum ex terebinthina, resina, pice nigra, farina hordei vel fabarum, mastiche, aloë compositum. Et talia emplastra sæpiùs applicanda & auellenda sunt, donec æger meliùs spiret. Et memini me ante aliquot annos victori, cui in latere dextro à pertica, quam pro dolij vinculo parando flectere volebat, reciproante, costa fracta & depressa erat, ita vt difficulter respiraret, tussiret, nec se erigere valeret, tali emplastro imposito costam in suum locum reduxisse.

Nonnulli quidem cucurbitulis costas fractas in locum suum reducere conantur: verum improbant id plerique Medici

Medici ; cùm metus sit , ne plus humoris attrahatur , & aliàs caro supra costas inflari soleat. Si verò fragmentum costæ membranam pungat , atque inde acerbissimi dolores & alia praua symptomata oriantur , atque ipsa mors metuenda sit , pars , qua costa fracta est , incidenda , vt fragmenta pungentia vel eximere , vel præcidere liceat. Si etiam contusio adsit , vena secanda , ne inflammatio accedat.

Costis in locum suum reductis natura quidem spontè callum generat ; cui , vt subueniatur , emplastrum aliquod fracturam ossium conueniens imponendum , inter quæ & hoc valdè celebratur.

*℞. Pulu. myrtill. rosar. rubr. an. ʒ. j. farin. bordei , orobi, lentium , fabarum , mastich. an. ʒ. ij. cupular. glandium , nucum cupressi , cortic. granat. balaust. an. ʒ. ʒ. hypocistid. acacia , cortic. thuris , sang. draconis , terræ Lemniæ , aloës , myrrh. an. ʒ. ij. olei myrtin. rosac. omphacini , an. ʒ. ix. Cera & terebinth. claræ , an. lb. ʒ. F. emplastrum.*

Nonnulli in morbi progressu fascias aqua rorismarini imbuunt , quam efficacissimam in ossium fractura esse scribunt.

Si caro humida & flaccida sit , medicamenta antea proposita imponenda , & locus fasciis ac plagis constringendus , vt caro ossi coniungatur.

#### Diata.

Victus sit in principio tenuis & talis , qualis in aliis acutis requiritur. *Diata.* Ager quiescat , non tussiat , non stertet , quantum potest , non loquatur multum , non rideat , non irascatur. Vide Hippocratem , 3. *de artic. th. 54. & seqq.* & Galenum in *comm.*

Sunt & alia interdum costarum vitia. Quandoque numerus variat , refertque Columbus *lib. 1. anat. c. 19.* se aliquando costas tantum vndecim inuenisse , & *lib. 15.* aliquando 25. & 26. Aliquando duas aut tres connexas idem *lib. 15.* obseruauit. Costas etiam in notatu dignum tumorem excreuisse , vidit *ibid.*

*Numerus  
costarum  
vitiatas.  
Tumor  
costarum.*

.....

## CAPVT XXVI.

## De mucronata cartilaginis prolapsu.

Mucro-  
nata  
cartila-  
ginis pro-  
lapsas.

**A**NTE QVAM à morbis pectoris digrediamur, noui & ab aliis non explicati morbi facienda mentio, nimirum mucronatæ cartilaginis prolapsus, quem peculiari libello Baptista Codronchius descripsit. Ex eo ergo, quæ ad rem facere videbuntur, hoc loco afferemus.

## Nomen &amp; natura morbi huius.

Eius no-  
men &  
natura.

Scribit autem, quod in Italia hic morbus vulgo appellant. Animæ, aliqui verò ossiculi vel furculæ casum, & lingua moderna *l'anima caduta*, ipse autem mucronatæ, seu xyphoidis cartilaginis prolapsus, procidentiam, depressionem, plicationem & fluxionem appellat. Primam appellationem peritissimus Mercurialis in quadam epistola ad Codronchium missa improbauit, eò quod ignari homines partem hanc affectam animam appellauerint, tanquam sit quoddam domicilium, quo descendente simul anima ipsa cadat, & eo restituto simul anima ad propriam sedem redeat, quod sanè est merum figmentum. Ipse verò putat vulgus, idèò forsan hanc partem animam nominasse, quod apta sit, animam ex corporibus eximere, ob angustias & ingentia mala, quæ excitare solet, cùm ad infernas partes labitur, vel potius vocasse hanc partem animam ob situm, aut ob similitudinem. Cùm enim populares nucleos fructuum, qui in medio ipsorum sunt, animas vocent, videntes hanc partem in corpore nostro medium sortitum esse locum, illi animæ nomen indiderunt. Vel quoniam opinati sunt hanc partem esse similem aliquibus fructuum nucleis, vt amygdalis. Ipse verò gratia facilioris doctrinæ hunc affectum mucronatæ cartilaginis prolapsus nominat. Galenus enim & cum eo omnes Anatomi- ci testantur, à natura procreatum esse in pectore os quoddam, à Græcis *σέπρον* appellatum, pro stabiliendis illis costis, quæ orbiculatim thoracis amplitudinem efformant,



& vt propugnaculi vicem gereret. Ex huius ergo ossis ima parte exoritur cartilago quædam longa & triangularis, quæ etsi aliquando bifida, geminâque occurrat vt plurimum tamen acuta; vt gladij mucro, spectatur: cui multa fuerunt imposita nomina. Nam Græci, Xyphoidem appellant, eò quod ensis imaginem referat, vt testatur Galenus. 7. de *visib. part.* Alij mucronatam cartilaginem, quod ad gladij mucronis formam accedat, & Iuniores clypealem, gladialem & ensiformem nuncupant. Quidam & malum Punicum, eò quod balaustij formam gerere videatur. Et nonnulli epiglottalem, ab imagine operculi laryngis, huic cartilagini specie non admodum absimili, vocare voluerunt, Sed quod ad formam gladij seu ensis, si rem vt est considerare velimus, multo melius ac verius totum pectoris os pugionis Hispani speciem præ se ferre apparet. Nam primum os, seu prima ossis pars, rotundæ pugionis parti respondet, quam minimus digitus apprehensione tangit, & vulgò dicitur ensis pomum. Secundum vel secunda ossis pars respondet illi parti, quam tota manus complectitur, & capulum seu manubrium nuncupatur. Tertium os, vel tertia ossis pars vnâ cum ipsa cartilagine reliquæ parti pugionis assimilatur, & idèò vniuersam hanc ossium struem nonnulli xyphoidem ab ensis imagine vocarunt. Amatus Lusitanus cent. 3. in schol. cur. 93. refert in dissectione corporum cognouisse cartilaginem hanc à natura perforatam esse, quod tamen alij Anatomici silentio prætereunt.

Cùm autem nulla pars sit in homine, quæ non sit ob aliquem vsum à natura facta; aliter enim superuacanea esset, & potius abscindenda, quàm optanda, teste Galeno, lib. 17. de *visib. part.* 6. 11. Idèò exquirendum, quem vsum, quamue actionem habeat in corpore hæc cartilago. Galenus, lib. 6. *vis. part. cap. 3.* & lib. 7. *cap. 21.* ait, hanc cartilaginem esse factam, vt sit propugnaculum oris ventriculi, & partis septi transversæ, quæ illic est, vt & cordis similiter. Quàm tamen sententiam Realdus Columbus, lib. 1. *anat. cap. 21.* refellit, eo quod pars hæc in sinistro latere à ventriculi regione plurimum distet. Et ipse existimat hanc membranam esse progenitam, vt cordi præsit, & septum trans

transuersum muniat. Iohannes Valuerda, *lib. i. sue anat.* c. 16. aliam habuit sententiam, hanc videlicet partem esse manimen anterioris partis iecoris, ac ventriculi. Quidam celebris ac doctissimus nostræ ætatis Anatomicus arbitrat, xyphoidem iecori tantum superstare, & à ventriculi orificio superiore longissimè distare. Vesalius scribit, hanc cartilaginè subditarum illi partium esse propugnaculum, quæ verò partes ei subiiciantur, non explicat. Videre tamen se non posse scribit, cur cartilago hæc à loco suo dimoueri, ac situm mutare non possit. Nam quamuis dura sit, aliis partibus collata, est tamen mollis præ ossibus, ita ut flecti, ac sedem suam valeat mutare, quamuis non sine aliquo labore, ut animaduertit Columbus: Et sicut epiglottis, quæ tota est cartilaginea, curuatur & inflectitur cum esculenta ac potulenta deglutiuntur, & illis cedit in ventriculum demissis: ita huic parti, cum sit eiusdem naturæ ac substantiæ non repugnat, ut ipsa quoque possit flecti, ac deprimi. Imò fuit sententia Nicoli, *in serm. 7.* & Piccolominei, hanc cartilaginem à summo rerum omnium opifice in humano corpore factam esse, non solum ad tutelam ventriculi, verum etiam ob motum ipsius, id est, ut cedat motui ac dilatationi ventriculi, qui cum copia alimentorum turgescit, iecur antrorsum, simulque sursum propellit, adeò ut ex his grauissimis viris pateat, membranam hanc esse mobilem ac flexibilem. Præterea Excellentissimus Flaminius Rota, Bononiensis Medicus & Anatomicus apprimè peritus, in hanc venit sententiam, hanc cartilaginem non posse quidem luxari propriè dicta luxatione, sed luxatione impropriè acceptâ, id est, depressione ad inferiora. Verum vnusquisque in cõrectandis hypochondriis exercitatus, si voluerit & si occasio se obtulerit, huius cartilaginis depressionè facili negotio percipere poterit extremâ ac interna digitorum parte, in qua quidem sensus tactus maximè viget.

*Qualis  
sit mor-  
bus.*

Morbum autem istum Ioh. Bapt. Codronchius refert inter morbos in compositione seu mala constitutione ad vitiatum situm, siue etiam deprauatam figuram pertinentes. Nam cartilago compressa situm variat, & figuram, quam-

uis hæc morbi differentia potius ad partes instrumentales, ac oppositas videatur attinere, nec morbo tantum in compositione laborat ista pars, verum etiam intemperie composita cum materia affici potest, ut quando à frigido ac humido succo irrigatur, qui saltem est causa antecedens seu mediata ipsius depressionis. Nam sic affecta ex quacunque leui occasione ac vi illata, potest à sua sede moueri. Non esse autem morbum in solutione continui, docet. Nam cum pars sit dura, non nisi cum magna difficultate potest solui illius unitas. Est enim substantia quædam media inter ossa & ligamenta, ossibus tantò mollior, quantò ligamenti durior, propterea nulla ratione frangi potest, cum vbique sua mollietate cedat, neque adeò resistat, sicut ossa faciunt, præterquam quod soluto continuo minimam læsionem subiectis partibus impertiret.

*Causæ.*

Causæ prolapsus siue depressionis huius cartilaginis & obscuræ & manifestæ esse possunt. Manifestæ sunt illæ, quæ extrinsecus fiunt, ut sunt casus, ictus, violenta ac incongrua corporis extensio, distorsiove aut peruersio nimia totius corporis, vel inordinata circumuolutio, vel etiam, ut aliqui volunt, molesta ac magna tussis. Obscuræ verò causæ sunt illæ, quæ ab intrinseco principio ortum habent, ut est humor vel tenuis, vel lentus; ac crassus circa ipsam coaceruatus, qui ipsam laxando facit, ut ex leui quapiam occasione deprimatur, sicut vsuuenire nouimus vertebris spinæ, quæ propter destillationes irruentes ad ipsas facile laxantur.

*Causa manifesta.*

*Obscura.*

Ex huius ergo cartilaginis mutata figura subiecta membra, ventriculus, iecur, ac septum transversum, vel cor etiam, sed mediante diaphragmate, aut ore ventriculi premi & lædi, atque hinc aliqua symptomata excitari posse statuit. Et quoniam cum Realdo Columbo nonnulli alij affirmant, ventriculum vel ventriculi partem superiorem lædi non posse à mucronata cartilagine, eò quod pars hæc ab illa valde absit, ut omnis, ( si fieri potest ) remoueatür scrupus, respondet, posse considerari ventriculum duplici respectu; primò ut est pars corporis mortui, ut est pars corporis

*Quæ partes in hoc morbo afficiantur.*

*Ventriculus dupliciter consideratur.*

corporis viuentis. Si priori modo consideretur, hi viri peritissimi vera fatentur: Si secundo facilè hallucinari potuerunt. Nam cùm partes vita & motu priuatæ concidant, & contrahantur, & illæ præcipuè, quæ in viuente turgere solent, idque eueniat potissimum in hominum cadaueribus, qui vel ex longo morbo extincti sunt, vel post mille tormenta & ærumnas in carceribus toleratas morte violenta perimuntur, ibi non est mirum, si eorum ventriculi tùm Anatomicis videantur valde distare à mucronata cartilagine: qui tamen cùm in sanis ac viuentibus crassi sint, & cibo vtplurimum repleti turgeant, superiùs elati adhærent, vel propinqui sunt mucronatæ cartilagini, Quare fuit rectè scriptum à præclarissimis illis viris, hanc cartilaginem non solùm ob munimen ventriculi, verùm etiam ob motum illius procreatam esse, vt scilicet cederet motui ac dilatationi ventriculi ex alimèti copia turgentis. His adde illud: Quo ablato & alterum aufertur, & eo posito alterum existit, illius quidem causam esse fateri debemus: Sed est obseruatum nonnulla symptomatica ventriculi, potissimum cùm deprimitur ista cartilago, fieri, ac nullo remediorum genere posse profligari, & restituta cartilagine quamprimùm aboleri: quis ergo negare audeat, horum causam esse huius cartilaginis procidentiam? Addit porro: Neque verò ex imperitia vel auaritia aliquorum hominum statuere debemus, esse hunc morbum fictitium, & inuentum dumtaxat pro extorquendis hominum pecuniis, sed potius horum imperitiam ac auaritiam redarguere, & D E V M omnium bonorum largitorem laudare, summæque gratiarum actione prosequi, qui dignatus sit, hunc fortasse antiquum, sed non cognitum morbum nobis patefacere. Ipse quidem non solùm concedit, aliquando accidisse, & accidere etiam posse, vt ex nequitia, vel imperitia aliquorum; qui violenter, vel quando opus non est, illam partem contrectant, vbi morbi non sunt, morbi fiant, & vbi sunt, augeantur, potissimumque si ab alia causa ortum habeant. Verùm etiam hanc rationem ab Excellentissimo quodam viro adductam suam firmare potius opinionem existimat. Nam si hæc cartilago,

*Error  
nonnullorum.*

cùm sit sensus expers, dolore affici non potest, & ea malè ab istis tractata, vel ob vicinitatem iecoris, vel diaphragmatis, aut diaphragma & iecur, vel etiam os ventriculi, consensus ratione afficitur; & varia subsequantur symptomata, cum eas fieri non possint, nisi partes eæ vim huic cartilagini factam recipiant, & illi vicinæ sint, videre se non posse scribit, cur ab aliqua externa causa, vel interna allata huic parti læsione, ac vi pariter earundem partium symptomata varia non subsequantur.

*Symptomata ac signa.*

Symptomata verò quæ sequuntur prolapsum huius cartilaginis, plura recitat. Primum enim ubi cibus receptus, præsertim durioris substantiæ & non admodum dentibus fractus, ad os ventriculi peruenit, ob peruersionem cartilaginis angustius factum aliqualem dolorem parit, & ægrè ad ventriculum pertransit, sæpiusque euomi consuevit. Virtus enim expultrix percipiens læsionem cartilaginis irritata insurgit, vt noxium expellat, in quo conatu frequenter alimentum ipsum reiici, deinde laborantes pondus quoddam circa ventriculi regionem percipiunt, potissimum post assumptum cibum. Præterea cùm appetentia sit oris ventriculi propria functio, ex Galeno, 2. aphor. comm. 20. & 1. de rat. viſſ. in acut. comm. 18. si hæc pars à cartilagine mucronata prematur, ac lædatur, fit, vt appetitus ipse imminuatur vel ferè aboleatur: & quoniam cartilago hæc reclinata aliquam etiam vim infert diaphragmati, hinc insurgit aliqua spirandi difficultas, quâ ægrotantes potissimum laborant, cùm mouentur, vel altiora loca vt scalas & montes ascendunt. Quemadmodum etiam septum transversum à ventriculo & iecore, vt etiam liene, cum maximo tumore laborant, premi potest, & difficilem respirationem excitare, vt scriptum reliquit Galenus, lib. 2. de different. respiration. c. 10. ita etiam illo à mucronata cartilagine pressio idem symptoma oriri sine dubio potest, quâvis id non à Galeno nec alio quopiam fuerit animaduersum. Quod si cartilago hæc iecur ipsum comprimat, cùm ex hac compressione & coarctatione non possit biliosus succus ad propria loca transmitti, per vniuersum corpus

*Symptomata ac signa.*

diffunditur, ac regium morbum excitat: & cum sæpenu-  
mero ex morbis morbi fiant, si inappetentia, vomitus &  
regius morbus diu perseverauerit, in atrophiam vel  
cachexiam incidunt, in illam ratione priuationis alimen-  
ti, in hanc verò causa viciosi alimenti. Præter enarrata  
mala, si laborantes sursum brachia extendant, vel in le-  
ctulo supini iaceant, ingenti vel maiore dolore circa præ-  
cordia afficiuntur, in reliquis sunt anxij, ac loco stare ne-  
sciunt, vigiliisque valdè molestantur. Non est autem ne-  
cessarium, ut omnia commemorata symptomata in sin-  
gulis hisce ægrotantibus reperiantur, sed alia in aliis, mo-  
dò intensiora, modò leuiora, pro maiori vel minori car-  
tilaginis depressione ac læsione illata.

*Prognostica.*

*Progno-  
stica.*

Cartilago mucronata, sicut & cæteræ cartilagines, si  
præscindatur, non recrudescit: & si rumpatur, nunquam  
reparatur, vel solidescit, auctore Aristotele, *lib. 3. histor. ani-  
mal. cap. 8. & lib. 2. de part. animal. cap. 19.*

Mulieres consueverunt magis hoc morbo laborare,  
quàm viri; cum in iis mucronata cartilago sit minus du-  
ra, habitusque sint humidior, & excrementis potissimum  
frigidis abundant.

Hæc cartilago depressa à principio facili negotio ad  
propriam sedem restituitur: Sin autem depressio negligat-  
ur, ac diu perseveret, ratione duritiei partis maximà cum  
difficultate ad situm reduci potest.

*Curatio.*

*Curatio.*

Ideo operæ pretium est, quamprimum operam dare, ut  
ad naturalem situm extollatur, quod pluribus rationibus  
effici poterit. Nam si adesset in corpore humorum abun-  
dantia, vel humores ad partem affectam fluere, ante-  
quam manus intro adhibeantur, plenitudo auferri, vel  
saltem imminui, & fluxio aliò deflecti ac inhiberi debet.  
Igitur peritus artifex ventrem fascia sursum versus de-  
uinciat, & ab utroque hypochondrio subtus costas in-  
choando partes illas manibus comprimat, ut impulsu  
turgentium partium cartilago depressa ad locum pro-  
prium redeat: à qua tamen curatione abstinendum in

*Varij  
cartila-  
ginē re-  
ponendi  
modi.*

I.

mulie

mulieribus grauidis. Nam sine manifesto abortûs discrimine minimè adhiberi potest, vt contigit annis elapsis vxori cuiusdam Equisonis prægnanti, quæ cum febre tertianam imitante cum quibusdam ventriculi perturbationibus afficeretur, à quodam pro restituenda cartilagine ad locum suum, posthabita omni foetus custodia, supra ventrem artissimè vinctâ altero die partum abegit, & sequenti nocte ipsa obiit: & ipse accersitus, vt opem huic mulieri ad interitum properanti afferret, audiens ex viri huius audaciâ & inscitia foetum mortuum excussum esse, & videns miserrimam illam foeminam iam interemtam esse, non potuit non maxima animi sui molestia hanc dementissimam temeritatem detestari, & simul cogitare & perquirere, an verum esset, cartilaginē hanc præter naturā deorsum prolabi posse, & si procidat, quæ symptomata ac mala excitare posset, & tandem, quānam esset germana ac tuta huius procidentiae cura, quam pluribus modis fieri posse postea cognouit, quorum vnus iam explicatus.

Cui succedit alter, quem ægrotus ipse propriâ industriâ assequi poterit, si videlicet rem aliquam grauem ac ponderosam, quantum ferre valet, manibus strenuè capiat, tantumque extollat, vt à terra magis distet; quàm capitis ipsius summitas, & sic eam sublimem summa vi tenens se hinc inde aliquantisper, modò ad dextram, modò ad sinistram vertat.

Cùm tamen non omnes, & potissimum mulieres, ob virium imbecillitatem id efficere possint, succedat tertia ratio curandi, & est, vt artifices manibus cartilaginem lapsam leniter contrectando eleuent, & ad naturalem sedem reducant, ad quod præstandum inueniuntur plures mulieres peritæ, quàm viri; cuius rei hanc esse causam ait excellentissimus Masinus, (quem inuenit in tanto Medicorum numero, qui hanc fieri depressionem ac morbum asseruerit) quoniam mulieres crebrius ab hac ægritudine capiuntur, & ob verecundiam & honestatem libentius mulierum, quàm virorum manibus se committunt. Hinc vsu euenit, vt mulieres ob magis frequentem operationem & vsu peritiores, & magis idoneæ fiant.

Quod si tribus expositis modis cartilago non possit ad naturalem situm restitui, fortasse non erit sine fructu supra regionem huius partis apponere cucurbitulam superius perforatam cum leui tamen flamma. Nam cum ventosa habeat insignem vim sursum trahendi, rationi consonum est, ut & hanc delapsam partem sursum eleuet, ac trahat: cum tamen aliquantisper cucurbita manserit, non vi auferatur, sed aperto foramine permittant, ut per se remoueat. Antequam verò ministri huius cartilaginis restitutionem aggrediantur, ut facilius id consequi possint, cum ea pars, ut sæpè dictum, sit duriuscula, regionem totam superioris partis ventriculi illinere solent vel butyro solo, vel butyro & oleo amygdalarum dulcium, quibus aliqui parum croci adiiciunt, quod faciendum ipse magis probat, cum prolapsus est factus ab aliqua causa externa, quàm cum ab interna, in quo casu magis exsiccatione egemus, quàm humectatione. Si tamen id fiat, ut faciliorem aditum manui præbeat, ut videlicet cutis muscoli huic cartilagini suppositi à linimèto laxati manus cōtrectationi magis cedant, id se non improbare asserit, dummodò parcè fiat. Quod si prolapsus sit antiquus, & qui spatio temporis callo ferè obduruir, adhibenda sunt, quæ molliant, laxent, & partem extensioni aptam efficiant, ut est fofus cum decocto maluæ, althææ, foenigræci, atque id genus aliorum, atque siue fiat spongiâ, siue aliquo instituto molli parum refert.

*Cartilagineum  
firmandi  
ratio.*

Cartilagine in propriam sedem reposita, insurgit alia indicatio ipsam firmandi & roborandi, ne amplius prolatabatur, sed in sua sede constanter firmiterque consistat, quod facili negotio perfici poterit, si locus affectus aliquibus vicibus foueatur spongiâ aliâve re simili madefacta in vino nigro parum austero, in quo mastix, thus, absinthium, balaustia, rosæ rubræ, nuces, cupressi, & id genus alia ebullierint, & postea admoueat sequens Ceratum.

*℞. Mastich. ʒ. ij. ladan. ʒ. j. rad. bistort. nuc. cupress. medull. interioris thur. ros. rubr. balaust. an. ʒ. ʒ. corall. rubr. ʒ. j.*

Misce & cum pice nauali ac terebinth. q. s. f. l. a. Ceratum, quod per 6. vel 8. dies parti adhæreat. Nec laudando s



dos censet illos, qui Cerati vice albumen oui apponunt, quoniam nimis refrigerat, quod in parte adeò frigida vitari debet.

Atque ista è Iohan. Baptista Codrochio proponere libuit, quæ Lectori perpendenda & cum experientia conferenda relinquimus, atque hoc etiam considerandum damus, an non affectus, quem Germani *das Vuebethun* nominant, cuius suprà *de luxat. verteb. dorsi*, mentionem fecimus, quandòque etiam ad hanc causam referri possit.



LIBRI



# LIBRI SECVNDI PARS TERTIA,

## DE SYMPTOMATIBVS, QVÆ PVLMONIBVS ET THORACI ACCIDVNT.


### *Proæmium.*



OSTQVAM præcedēte parte huius libri absolvimus morbos, qui pulmōnes & thoracem infestare solent; restat, vt iam symptomata, quæ iisdem accidunt, subiungamus. Et quidem primò actiones læsas quod attinet, cū pulmōnes cum aspera arteria & thorace respirationis organa sint, simulque voci & sermoni in homine formando inseruiant, dicendum, 1. De respiratione læsa; quò pertinet Asthma, & suffocatio ac strangulatio; 2. de vocis & locutionis vitiis; 3. de tussi, item conuulsione diaphragmatis, quæ ad motus symptomata pertinet; 4. de dolore lateris & pectoris, qui etiam insigne est in pectore in sensu tactus symptoma.

Qualitatis mutatæ, quæ in sensus incurrant, symptomata hîc non dantur. In excretis verò est sputum,

& puris ac sanguinis, grandinis, calculorum ac vermiculorum è pectore eiectio; de quibus ordine dicemus.



## CAPUT I.

## De respiratione laesa in genere.

**R**ESPIRATIO; Græcis ἀναπνοή, motus est pectoris & thoracis, quo aër attrahitur in pulmones & expellitur. Et quidem pulmones naturali vi, ubi aëris attrahendi vel expellendarum fuliginum necessitas percipitur, dilatantur & contrahuntur: quod ut commodè præstare possint, & locum, in quo moueantur, inueniant, facultas animalis simul cum pulmone thoracem dilatat, & contrahit, pulmonisque & thoracis motus in vnum finem conspirant. Ideoque etiam hic motus non planè liber est, & voluntarius, sed *μυδιαρμον*, & necessitatibus corporis subiectus, & thoracis motus naturæ vrgenti cedit. Qui enim motus voluntarius & planè liber est, is nullum tempus, nullam mensuram præscriptam habet. Cohibitum autem spiritum ducere iterum cogimur; cum suffocatio vrgeat, quam natura reformidat.

*Respiratio laesa in genere.*

Peculiare enim quiddam fuit, quod de seruo Barbaro refert Galenus, 2. de motu muscul. cap. 6. qui cohibito spontè spiritu seipsum suffocauit; cum alioquin natura superior tandem ad respirandum impellat.

*Suffocatio serui barbari.*

Respiratio autem duobus motibus perficitur, inspirationis scilicet & expirationis. In inspiratione pulmo & pectus dilatatur, & aër attrahitur. In expiratione pulmo & thorax contrahitur, & aër fuliginosus expellitur. Inter hos duos motus, duæ intercidunt quietes, sicut in pulsu inter systolem & diastolen. Differentia tamen hic quædam est pulsum & respirationem. Quia enim pulsus planè naturalis est, motus ille est continuus & non interruptus, nisi quod duæ quietes inter systolen & diastolen intercedunt:

*Differentia inter pulsum & respirationes.*

quia verò ad respirationem etiam facultas animalis concurrat, nonnihil pro arbitrio nostro hic motus regi, & interdum aliquandiu differri potest.

Tria autem ad respirationem naturalem concurrunt. 1. Facultas mouens. 2. Organa respirationi inferuentia, quæ sunt pulmones, diaphragma, thorax variis musculis instructus & agitated, trachea, quæ via est, per quam aer ingreditur & egreditur, quod pertinent & nares, ac os, & fauces, quæ ipsa etiam aëri transitum permittunt. 3. Vfus, qui est caloris in corde temperatio. spirituumque generatio. Ideo enim fit respiratio, ut cordis calor ventiletur, & in statu naturali conseruetur, cordisque actiones recte perficiantur.

Quibus fortasse quartum addere licet, ipsum aërem, qui inspiratur. Is enim ita dispositus sic necesse est, ut calorem cordis ventilare & refrigerare possit; si verò is sit crassus, fuliginosus, qualis est in quibusdam cauernis, aut si nimis æstuosus, ad refrigerandum ineptus est, & quandoque suffocationem inducit.

Ratione autem organorum respirationis quædam differentia est, & *ἐμπνοή* alia est *ἀβίατος*, cuius instrumentum est diaphragma; alia *βίατα*, quæ a musculo fit in summis scapulis sita, & ab interna intercostalium parte. Sic *ἐμπνοή* *ἀβίατος* instrumenta sunt musculi circa abdomen; *βίατα* autem externa intercostalium pars. Nerui, qui ad diaphragma pertingunt, inter 4. & 5. vertebam cervicis prædeunt, qui ad intercostales musculos & thoracis vertebrae progrediuntur. Atque hæc ad naturalem inspirationem necessaria sunt, quæ si lædantur, respirationem lædi necesse est.

Est nimirum respiratio læsa pulmonis ac thoracis motus à naturali statu deflectens, propter vitium aliquod in facultate mouente, organi respirationis, vfu mutato, vel etiam in aëre, qui attrahitur, consistens.

Læditur autem respiratio, vel quia planè aufertur, quæ *ἀπνοία* dicitur, vel deprauatur, quæ *δυσπνοία* appellatur. Platerus tamen, nec incommode, dyspnæam omnem ad respirationis defectum seu diminutionem refert; Deprauatam autem solum respirationem appellat; quando non recte-

*Respiratio quomodo lædatur.*

Et fit respiratio, ut dum est frequens, cita, vel interrupta; quo etiam suspirium refert.

*Causa.*

Respiratio læditur. 1. læsa facultate, idque fit, vel *Causa.* cum facultas motrix per se læditur, vel per accidens, ubi eâ saluâ ac spiritu animali præsentē aliunde in motu impeditur. Cum autem vis mouendi seu respirationem efficiendi & in pulmone & thorace consistat, utriusque facultatis læsio perpendenda.

Pulmonis præcipui respirationis organi motus peculiari eius vi perficitur, qua eius facultas tam diu salua esse dicitur, quamdiu eius temperies & calidum innatum saluum est. Ideoque læsa pulmonis facultas per se tantum dici potest, cum eius temperamentum vitatur, & calidum innatum deficit, id quod in phthisicis & moribundis sæpè accidit. Impeditur verò facultas pulmonis motrix, licet salua sit, & ita per accidens læditur, & in operatione sua impeditur, dum spatium, in quo liberè moueatur, non habet; id quod fit in pectoris angustia quacunque de causa profecta, ut in gibbositate, empyemate, hydrope pectoris, aut dum ab abdomine diaphragma comprimitur, & sursum pellitur.

Thoracis verò motus ab animali facultate pendet, quæ per se equidem lædi propriè dici non potest; per se tamen lædi à Medicis dicitur, cum spiritus animalis, qui ad motum animale necessarius est, deest, & cum spiritus animalis ad thoracis musculos & diaphragma non influit. Fit autem hoc, vel quia non transmittitur, vel quia non recipitur, ipsiusque influxus prohibetur. Non transmittitur, vel quia spiritus animalis deficit, ut in moribundis, & in nimis euacuationibus & aliis causis spiritum dissipantibus; vel eius influxus à cerebro non fit, ut in apoplexia & soporosis affectibus. Non verò recipitur influens spiritus animalis propter vitium neruorum spiritum animale ad musculos thoracis & diaphragma deferentium. Etsi verò etiam ex sexta & septima coniugatione thorax neruos accipiat: tamen quia septum transversum, cuius motus ad mediocrem respirationem sufficit, neruos etiam à dor-

fali medulla insignes vtrunque accipit, rarò respiratio sola & seorsim, citra aliarum actionum læsionem, neruorum sextæ & septimæ coniugationis vitio læditur, sed dorsali medulla & coniugationibus dictis simul læsis; quod non nisi circa exortum in cerebro fieri potest, vt in apoplexia; respiratio læditur. Nerui autem maiores à dorsali medulla progressi, si seorsim afficiantur, id quod in catarrhis eò decumbentibus, vt & intemperie frigida, vulneribus, tumoribus fit, respiratio deorsim læditur. Quo etiam referri potest spinalis medullæ ob luxationem, vulnera, vel alias causas, vitium.

Per accidens verò læditur facultas & motus thoracis, in primis eius dilatatio, dum facultate integra, & spiritibus præsentibus motus impeditur, vel ob dolorem lateris & diaphragmatis, colli, abdominis, intestinorum, epatis, ventriculi, aut harum partium vulnera, aut dum ob aquam vel pus, vel sanguinem in cavitare thoracis contentum is liberè moueri non potest, & diaphragma comprimitur, vt liberè distendi nequeat; ab epate vel liene tumente, aut flatibus & vaporibus in intestinis contentis. Vapores etiam vel flatus in abdomine collecti, & circa diaphragma subsistentes illius liberum motum impediunt, & nunc respirationem difficilem, nunc suffocationis metum inducunt, quibus sæpè & cerebri ac cordis alia mala accedunt, ob insignem cum cerebro, & corde diaphragmatis consensum, præsertim si materiæ magna sit copia. Vapores autem hi à venis mesaraicis & hypochondriis, ventriculo, intestinis, interdum & vtero attingi solent. Viscera quoque in abdomine circa septum transversum appensa, si obstruantur valde, vel intumescant, pondere suo diaphragma infra trahendo illud liberè moueri non permittunt, id quod fit in epatis obstructionibus & tumoribus, quæ difficilis respiratio sæpè diu hydropem præcedere solet. Ventriculus quoque cibo repletus eodem modo difficilem respirationem efficere solet; quod & ab ingestorum ciborum qualitate interdum evenit. Quod & in gravidis accidit ab vtero, qui distentur diaphragma comprimit, & difficilem respirationem reddit.

II. Ratione organorum læditur respiratio, dum aliquod in iis est vitium. Organa autem respirationis alia ad motum faciunt, ut pulmo, diaphragma, musculi thoracis & abdominis, alia aëri ingressum & egressum permittunt, ut nares, os, & fauces, larynx, aspera arteria, eiusque rami per pulmonem dispersi, quique ad pulmonis substantiam pertinent.

Pulmonis ergo vitio respiratio impeditur, dum pulmonis asperæ arteriæ angustiores, quam par est, fiunt, nec satis dilatari possunt, dum scilicet obstruuntur à catarrhis eò defluentibus, quasi confertim & ἀδρόως ruunt. Suffocatiui nominantur, & pituitoso humore in iis collecto, à sânguine in eo effuso, ut & pure, vel in pulmone collecto, vel aliunde effuso, grandinibus item, calculis & vermiculis aut comprimuntur à pituita in læuibus arteriis & pulmonis substantia, vel tuberculis, vel aqua in pulmone collecta. Connexus etiam pulmonis cum concauo thoracis strictior pulmonis motum liberum impedit, respirationemque difficilem reddit, quod nonnullis à primo ortu, aliis post casum aut pleuritidem accidit. Si etiam pulmo à prima origine sit maior, quam par est; aliquod respirationi impedimentum affert. Faciunt etiam huc pulmonis vulnera & vlcera.

Diaphragmatis verò & musculorum respirationi inferuentium vitio fit respiratio læsa, dum diaphragma vel inflammatur, vel vulneratur, aut dum catarrhus qui in musculos intercostales lapsus est, ad diaphragma vsque etiam penetrat, aut dum musculi contunduntur, inflammantur, vulnerantur, vel exulcerantur, ut & musculi abdominis, respirationi inferuentes, aut si catarrhus in eisdem musculos decumbat.

Pertinet huc & costarum & vertebrarum vitium, dum vel franguntur, vel luxantur, ac thoracis motui obsunt.

Tandem inter thoracis vitia est hoc, si cartilagine thoracis, quæ ad motum faciliorem edendum pectoris circumferentiam constituunt, in osseam substantiam indurantur. Nam & tunc thorax satis dilatari nequit.

Partium autem per quas aër transire debet, vitio putanarium

narium, oris & faucium vt & trachæ angustia, difficilis respiratio, imò suffocatio interdum induci potest. Quod fit si nares vel à pituita, vel à tumore aliquo obstruantur & obturentur, si tumor aliquis sit in musculis faucium, laryngis, in tonsillis, vel columella delapsa sit, vel si vertebræ cœruicis luxatæ viam hanc intercludant. In primis verò si aspera arteria, & præcipuè eius caput seu laryngis rimula, vel obstruatur, vel adstringatur & coarctetur, vel à quacunque causâ angustior reddatur. Quò pertinent & asperæ arteriæ vulnera.

III. Ob vsum respirationis seu finem mutatum, atque ita cordis vitio respiratio læditur. Si enim ille non vrget, nulla aut quàm exigua fit respiratio: & quamdiu motus cordis cessat, tamdiu etiam cessat respiratio; quod fit in syncope & suffocatione vterina. Si verò vsus vrget, respiratio fit magna vel frequens & celer, id quod in febribus ardentibus accidit, & plurimæ respirationis læsæ differentiæ ab vsu & fine mutato proueniunt.

IV. Tandem etiam aëris, quem spirando attrahimus, vitio, respiratio lædi potest. Si enim is crassus, caliginosus, & fuliginosus sit, qualis est in quibusdam cauernis, qualémque faciunt fumi, qui è carbonibus accensis exhalant, vt & vapores è musto & cereuisia feruente, vsui non satisfit, adèò vt etiam à tali aëre nonnullos suffocatos fuisse, comperitum sit. Ita in Cyprò è venis chalcanti fumus attollitur, qui hominem suffocat, teste Galeno 9. de simpl. med.

*Respirationis læsæ facult. tit. de calcantho.*

Has causas omnes vt in numerum redigamus, fit respiratio læsa.

*Causa 1.*

1. Ab insigni intemperie & pulmonis corruptione.

2.

2. A pectoris angustia, quacunque de causâ profecta, ob quam pulmo & diaphragma liberè moueri & dilatari non potest.

3.

3. Ob defectum spiritus animalis, in moribundis, in apoplexia, & frigidis affectibus.

4. Ob neruorum insignium ad thoracis musculos & diaphragma tendentium læsionem quamcunque spiritus animalis influxum prohibere potest.

5. Ob



5. Ob dolorem in musculis thoracis & aliis partibus vicinis, quæ respirationi quocunque modo inferuiunt. 5.
6. A diaphragmatis motu impedito, ab aq. pure, vel sang. in thoracis cavitare contento, vel à vaporibus & flatibus ab inferioribus ascendentibus, & circa diaphragma subsistentibus, seu viscerum in abdomine obstructione, distensione & tumore. 6.
7. Pulmonis vitio, dum scilicet eius arteriæ vel obstruuntur quacunque de causa, vel comprimuntur, aut dum pulmo pectori agglutinatur aut vulneratur. 7.
8. Diaphragmatis vitio, dum illud vulneratur, inflammatur, vel dum catarrhus in id decumbit. 8.
9. Musculorum thoracem mouentium vitio, dum illi contunduntur, vulnerantur, inflammantur, exulcerantur, aut dum catarrhus in eos decumbit. 9.
10. A costarum & vertebrarum dorsii luxatione & fractura, vt & cartilaginum pectoris induratione. 10.
11. A musculorum abdominis morbis, ob quos liberè moueri non possunt. 11.
12. A narium, oris, faucium angustia. 12.
13. A laryngis & asperæ arteriæ obstructione compressione, vulneribus. 13.
14. Ab vsu mutato, qui varius est. 14.
15. Aëris, quem inspiramus, vitio, si is calori refrigerando & ventilando non sit idoneus. 15.

Atque tot quidem respirationis læsæ causæ. Verùm enimuero plurimæ à morbis, quos iam explicauimus, vt & apoplexia, febribus, & similibus dependent, atque ita de respirationis læsæ curatione vno in loco tractari non potest: Ideoque alios Medicos secuti, hîc saltem de ea respirationis læsæ curatione dicemus, quæ vulgò Asthma, vel orthopnoea dicitur, deinde de suffocatione, & strangulatione, quæ peculiare respirationis læsæ differentie sunt.

## CAPVT II.

## De Asthmate, &amp; Orthopnoea.

*Asthma.* **A**STHMA, Latinis Anhelatio, etsi interdum in genere & amplo vocis significato pro quacunque respiratione difficili & anhelosa quacunque de causa profecta, siue cum febre, vel sine febre accipitur: Strictâ tamen vocis significatione Hippocrati est πύκνυς, hoc est, frequens, seu densa & difficilis respiratio sine febre, qualis est eorum, qui ex cursu & celeri exercitatione subsistunt, & quidem cum sono, vt Celsus addit, à spiritu humorem in pulmone contentum dissolvente. Quando verò malum eò vsque creuit, vt æger erecto corpore propter suffocationis metum respirare cogatur, ὀρθόπνοια appellatur. Imò vt Galenus, 6. aphor. 46. scribit, qui Hippocratem ætate secuti sunt, affectionem quandam diuturnam nonnulli asthma simpliciter, nonnulli quoque ὀρθόπνοια nominant, cum sine febre æger continenter difficilem habet respirationem.

Vnde etiam Asthma definitur læsa respiratio, eaque densa & frequens ferè, vt æger sine anhelatione respirare nequeat, sine febre plerumque ab angustia bronchiorum pulmonis proueniens. Quando malum ( differt enim asthma & orthopnoea saltem magnitudine ) ita incrementum sumpsit, vt æger non nisi erecta ceruice spirare possit, orthopnoea nominatur.

Locus affectus est pulmo, & quidem secundum bronchia, id est, asperæ arteriæ cartilaginosa propagines per pulmones dispersas, quæ spiritus via sunt. Quanquam enim thorax & pulmo etiam suo modo satis dilatentur: tamen propter harum viarum angustiam satis aëris inspirando attrahi non potest, vnde, vt quod magnitudini & sufficientiæ deest, compensetur frequentia & velocitate, frequens ac velox spiratio oritur.

Causse.

Etsi verò, vt dictum, respirationis difficilis plurimæ *Causse.* causse sint: Asthmatis tamen in specie dicti duas tantum ponit causas Galenus, humores scilicet crassos ac pituitosos, & crudum tuberculum, quibus tamen adhuc vna, atque altera addi potest.

Est nimirum proxima asthmatis causa, angustia bronchiorum pulmonis, seu usus auctus propter angustiam bronchiorum pulmonis. Angustia autem illa oritur, non à quacunque causâ, cum, vt dictum, asthma sit respiratio difficilis non quævis, sed anhelosa & diuturna ac curatu difficilis sine febris, ab obstructione, vel compressione pertinaci. Vtrumque enim, obstructionem & compressionem scilicet, efficiunt primò humores sæpè crassi & visciidi, nonnunquam & tenues ac serosi, sed copiosi, deinde crudum tuberculum, vel grando & calculi in pulmonibus hærentes. Quibus nonnulli & flatum crassum addunt. Hæc enim siue intus bronchia pulmonum obstruant, siue in substantia pulmonis, venis eius & læuibus arteriis hærentes ea comprimant, angustiam efficiunt, & ita respirationi obsunt, vt postea, *quæst.* 1. dicetur.

Materia autem bronchia pulmonum seu obstruens, seu comprimens, nunc in pulmonibus sensim colligitur, ob debilitatem & cachexiam illius visceris, vt docet Auicennas, 3. *can. sen.* 14. *tract.* 4. *cap.* 3. & bronchia obstruit, quæ interdum etiam in calculum & grandinem induratur: nunc verò aliunde affluit. Fit hoc interdum à capite, cum catarrhi à capite lapsi in pulmonibus subsistunt, id quod vulgò frequentissimè fieri putatur. Verùm ego id rarius accidere

*Frequen-  
tissima  
asthma-  
tis caus-  
sa.*

puto, vt postea, *quæst.* 2. dicetur, & frequentissimam asthmatis causam esse puto materiæ per venam arteriosam in pulmones effusionem, dum scilicet circa epar in venoso genere crudi humores colliguntur, & per venam arteriosam in pulmones effunduntur, & bronchia pulmonis comprimentes respirationis difficilis & asthmatis propriè dicti, mali scilicet diurni & contumacis illius causa sunt. Etsi enim in hydropicis humor serosus ad thoracem penetrans respirationem difficilem efficere possit: ta-  
men

men ea respiratio difficilis propriè asthma non est, sed ab hydrope, morbo primario, dependet. Et quidem ille humor, qui è venis per venam arteriosam in pulmones confluit, non semper crassus est, sed sæpè tenuis & serosus, qui in venis & arteriis collectus nunc motu corporis, nunc irâ, sæpè verò ad aëris & tempestatis mutationes, agitur in pulmones irruit, vnde paroxysmus sæpè secundum Lunæ motum & quarto ferè die exacerbatur. Non impossibile tamen videtur, vt humor etiam talis ( cum arteriæ multo sero abundant ) per arteriam venosam in pulmones infundatur. Eodem modo à crudo tuberculo oriri potest asthma, non solum in asperis arteriis consistente, sed & extra eas constituto, easque comprimente. Et quidem si crudum tale tuberculum consistat solum in aspera arteria, vel circa eam, tantum asthma parit; sin etiam circa lienes, cor in consensum trahitur, & pulsus inæqualis efficitur, id quod in Antipatro factum refert Galenus, 4. de loc. affect. cap. ult. Sin vtrâsque pulmonis arterias obsideat, & asthma, & inæqualitas pulsus inducitur.

Possunt quidem & alij tumores qui suppurantur, respirationem difficilem efficere, vt non solum Galenus, 4. de loc. affect. cap. 8. & Aëtius, tetrab. 2. serm. 4. cap. 37. docet, sed & res ipsa loquitur; cum tum etiam bronchia pulmonis comprimantur: tamen si strictè vocabulum asthmatis accipimus, ea læsa respiratio asthma non est, sed cōstro ac rupto abscessu ac pure per sputum reiecto cessat; asthma verò propriè dictum, saltem ab humore crasso & crudo tuberculo oriri docet Galenus.

Hisce causis nonnulli addunt etiam vapores ex vtero ascendentes & flatus crassos. Verùm etsi negandum non fit, ab hisce causis interdum respirationem planè difficilem fieri: tamen quia illa subito inuadit, & citò cessat, asthma propriè dictum non constituit. Ille flatus potius ad asthma pertinet, qui se materiæ asthmatis causæ iungit, paroxysmique autor est; cum scilicet humor crassus à motu nimio vel alia causâ in flatum resoluitur.

Quod autem flatui tribuitur, sæpius rectius humori seroso, vt modò dictum,tribuendum esset, cum is in ramis  
men

venæ cauz maioribus quacunque de caussa feruens & motus *ἀσπός*, & confertim per dextrum ventriculum cordis in pulmones irruit, & asperas arterias comprimit; quæ non infrequens paroxysmi asthmatici caussa est; ob quam æger difficili respiratione, sæpè nulla caussa manifesta præcedente, sed imminente aëris aliqua mutatione & tempestate corripitur.

Affinis etiam est asthmati illa difficilis respiratio, quæ à siccitate nimia pulmonis provenit, ob quam pulmones satis dilatari ad aërem hauriendum non possunt; quam siccitatem in primis metallici vapores inducunt, & propterea iis, qui metalla & mineralia tractant, familiaris est. Ita refert Heurnius, *de morb. prat. cap. 4.* typographo cuidam aded siccatos fuisse pulmones, ut aridum pomum retulerint.

#### Differentiæ.

Asthma aliud est recens, aliud inueteratum, aliud est *Differentia* periodicum, quod per intervalla redit, ubi scilicet materia interiecto quodam temporis intervallo vel confluit *ἀσπός*, id quod potissimum per venas fieri puto, vel paulatim antea in pulmonibus collecta moveri & agitari incipit. Hinc fit, ut præter causas proximas antea enumeratas, etiam remotiores cognoscendæ sint, ut vitentur. Tales sunt cibi flatulenti, aër crassus ac nubilosus, aëris caliditas aut frigiditas nimia, corporis & animi motus nimius.

Deinde asthma aliud est gravius, aliud mitius. Si enim æger quidem difficulter respiret & anhelosus sit, simpliciter asthma appellatur. Si verò ita incrementumumat difficilis respiratio, ut æger non nisi erecta ceruice respirare possit, orthopnoea nominatur, ut antea etiam dictum.

Tertiò asthma aliquando est etiam hæreditarium, habentque nonnulli congenitam ad asthma propensionem, quæ sita est in pulmonum laxitate quadam & debilitate ad recipiendum affluentes aliunde humores, vel etiam eos cumulandos apta.

Signa.

Imminentis asthmatis signa ita tradit Aretæus, *lib. I. de sign. & caus. morb. diuturnor. c. II.* Morbi incipientis, seu impendentis notæ sunt huiusmodi; grauitas pectoris, tarditas ad solitum opus, & aliud quodlibet agendum, in cursu, & in accliuo itinere difficilis & ægra spiratio, raucescunt & tussunt, flatus in præcordiis atque eructationes præter rationem excitantur, vigilant, noctu parum, & obscurè incalescunt, nares acutas ad spirationem paratas habent.

Malum autem præsens facile signis suis pathognomicis cognoscitur. Egri nimirum plerumque sine febris, de qua postea, 9.3. dicetur, & alia euidente causa, quæ respirationem difficilem inducere potest, frequenter, ut ij, qui cursu velociore, aut motu alio vehementi sunt defatigati, & si malum sit vehemens, etiam erectâ ceruice respirare coguntur. Et fit hæc respiratio læsa quandoque cum stertore, & sonitu, quandoque sine eo, ideò quod materia quandoque hæret in bronchiis & asperis arteriis, quæ dum spiritu disploditur, sonitus excitatur, aliquandoque extra asperas arterias. Scribit tamen Iohannes Zechius, *consultat. 18.* hoc quidem ut plurimum fieri, se tamen in quàm plurimis obseruasse, respirationem accessionis præsertim tempore, raram & admodum tardam, longèque difficiliorē inspirationem expiratione ipsa esse. Atque ipse causam huius rei hanc reddit, quod cum duo sint respirationi inferuentium instrumentorum genera, quorum alia aërem suscipiunt, ut arteria cum pulmone, alia mouent, ut ipse etiam pulmo cum thoracis musculis: si accadat, ut non solum bronchia pulmonum, sed & ipsa pulmonis substantia, cum suis venis & leuibus arteriis, afficiatur, facultasque thoracem mouendi languida sit, accidere, ut nec pulmones humore grauati, nec thorax facile moueri, & distendi possit. Quapropter tùm natura non sine labore & conatu maximo ac longiore temporis intervallo inspirationem moliri potest, unde etiam partes pectoris supernæ mouentur, quam inspirationem sublimem Hippocrates appellare solet, in qua obeunda, ut

vires

vires deiectas interposita quiete aliqua natura nonnihil reparare possit, inspirationem alteram non admodum maturat, & accelerat; & ipsa expiratio expeditior est inspiratione, quoniam huius operis instrumenta sine multo labore mouentur, & ferè sponte sua concidunt. Idem tamen, *consultat.* 53. addit, respirationem hanc simul magnam esse. Cum enim rara respiratio vsui non satisfaciat, ab urgente postea necessitate coacta natura magnam pro viribus respirationem efficit; ita vt non solum septum transversum cum musculis intercostalibus manifestè moueantur, sed etiam musculi superiores omnes, ita vt sublimis fiat appellata respiratio.

Quomodo autem asthma à difficili respiratione, à virium imbecillitate, & calore magno in corde discernenda sit, docet Galenus. 4. de loc. affect. capit 7. subiiciamus, inquit, aliquem omnes simul mouere musculos, vt pectus vnà cum scapulis manifestè subleuetur. In hoc opere ex tribus vnum aliquod conicere necesse est, aut virium imbecillitatem, aut viarum spiritus angustiam, aut vehementem in corde, & pulmone calorem. Quamuis interdum duæ, ac nonnunquam (licet raro) tres quoque ex iam dictis causis concurrere possint. Igitur ubi vires duntaxat fuerint infirmæ, ad tria mouentium musculorum genera venire, eosque omnes ad motionem excitare solent: vno genere vehementer pectus mouere nequeunt, & propterea non solum diaphragma, sed vniuersi thoracis musculi mouentur: motum tamen & sensum efficiunt, & propterea neque frequens omnino, neque raro omnino eorum actio existit. At præterea thoracis dilatatio haud quaquam magna erit, nullaq; ex ore fiet exsufflatio & spiritus ex solis naribus emitti solent. Quod si per inspirationem narium pinnae manifestè trahi videantur, id prostrati roboris efficax indicium erit. Aucto verò in corde & pulmone calore, omnibus quidem thoracis musculis peragitur quoque respiratio, sed magna, velox, frequens, vehemensq; percipitur, & præterea calidus exsufflando spiritus emittitur. Tandem qui ob viarum spiritus angustiam difficulter anhelosq; respirat, totum quidem thoracem magna ex parte & celeriter & frequenter dilatant, sed neque exsufflare, neque calidum spiritum emittere consueverunt. Id enim acuti caloris est indicium.

Signa  
caus-  
saru.

Cum verò angustia ista bronchiorum pulmonis, quæ proxima est asthmatis causa, à pluribus, ut dictum, causis provenire possit, & eæ discernendæ sunt. Ut verò de causis, quæ respirationem difficilem in genere excitare valent, nihil dicamus, ut de pure vel sanguine in spiritus vias illapsis, & aliis quæ ex suis locis patent. Si à crassis humoribus fiat asthma, & iis quidem in pulmone collectis, sensim difficulter respirare incipit æger, estque difficultas spirandi continua. Si verò aliunde affluat materia, respiratio difficilis eodem modo continua non est, sed per intervalla infestat vel exacerbatur. Et si enim asthma, quod ob materiam in pulmone collectam excitatur, ob iram, aërem austrinum & similes causas exacerbari etiam possit: tamen in asthma, quod fit à materia aliunde affluente, exacerbatio illa longè manifestior est.

Exacerbatur autem hoc malum magis tempore autumnali, & hyberno, & noctu. Cum enim, ut Galenus, 6. epid. sect. 1. text. 15. docet, dies toti anno proportionem respondeant, ut matutino tempori ver sit simile, meridiei æstas, vesperi autumnus, nocti hyems; pituita verò noctu moveri soleat: non etiam est mirum, asthma, quod est morbus pituitosus, noctu magis exacerbari. Siue enim humor aliunde affluat ad pulmonem, noctu is magis moveri solet, siue in pulmonibus congestus contineatur, nihilominus ibi agitur, & proprias qualitates intendens, vel ad maius spatium sese extendit, vel vapores de se emittit, & omninò euentia sui exhibet indicia. Et quidem si materia à cerebro delapsa sit, catarrhi signa adsunt: quod si catarrhus absit, per venas materiam affluere indicio est, epatisque affecti signum tandem exhibet tumor pedum, & cachexia. Ac si humor ille crassus obstructionem efficiat in bronchiis pulmonis, difficilis est respiratio cum sonitu & tussi; malum quandoque etiam cessat, vel remittit pituita excretâ; Si verò pituita & humor in venis & pulmone hæreat, abest sonitus & tussis; & raro aliquid excernitur, ac malum pertinaciùs, & diutius hominem exercet.

Quod si à crudo tuberculo sit Asthma, æger ab initio, dum



dum bene adhuc habere videtur, paulatim incipit difficulter spirare, accrescitque deinceps quotidie anhelatio circa stertorem ac strepitum. Quod si huiusmodi tuberculum temporis diuturnitate calefactum, & tandem quandam coctionem recipiens in abscessum mutetur, febris accedit, deinde rupto tuberculo pus, vel puri simili quid excreatur, ac pure euacuato, fit respiratio leuior.

Grandinis, & calculorum signa antea sunt proposita.

Si à siccitate pulmonis proueniat asthma, præcesserunt causæ, quæ talem siccitatem inducere potuerunt; sputum deficit, & macies totius corporis adest.

#### Prognostica.

1. Asthma etsi sit morbus diuturnus, tamen paroxysmos habet acutos, ob loci affecti nobilitatem qui organum respirationis est, quo grauius affecto homo diu viuere nequit, compertumque est, nonnullos in platea ambulantes, hoc malo subito extinctos fuisse. Prognostica.

2. Iuuenes hoc malo difficulter liberantur, senes verò nunquam, sed eos asthma ferè comitatur vsque ad mortem, 2. aph. 40. Infantes autem suffocat, nisi maturis auxiliis sistatur & auertatur.

3. Asthma hæreditarium vix vnquam curatur.

4. Qui gibbosi ex asthma aut tussi fiunt ante pubertatem, ij statim moriuntur, 6. aphor. 46. Galenus in comment. causam refert in angustiam pectoris & tubercula spinæ intus adnata, quæ si cruda & coctu difficilia sint, hominem asthmaticum diu viuere non sinunt. Sin humida, quæ tandem suppurantur, tussi aliquando vexatos citò tandem suffocant & interimunt. Et quamuis aliàs calor circa pubertatem incrementum sumens multos morbos curare soleat: tamen calor hic gibbositatem tollere non potest: & quia adhuc pulmones incrementum sumere solent; spina verò in gibbis amplius non crescit, atque ita pulmoni crescenti in angusto pectore satis loci non datur, is non satis ventilari potest, caloremque natium suffocari necesse est,

5. Periculosum valdè est asthma in febre acuta. Nam materia & causa asthmatis à calore febrili valdè exsiccat, & ad eiiciendum ineptior redditur. Multa quoque

inspiratione in febre ob calorem vehementem opus est, quæ ob angustiam pectoris, quæ est in asthma fieri nequit. Materia præterea calore febrili agitata asthma grauius reddit, & simul ob eam febris inualefcit.

6. Asthmate laborantibus cum tussi, si tussis cessat, difficultate respirationis aut perseverante, aut incremente, periculosum est. Contumaciam enim materiæ, & virtutis expultricis debilitatem significat.

7. Ad asthma inueteratum si noua repente accesserit influxio, quæ pulmones obruat, vt in catarrho suffocatiui fit, lethale est.

7. Asthmatici ij maximè periclitantur, qui viribus sunt infirmi. Citò enim suffocantur, & in syncopen incidunt; cum autem pulsus inæqualis admodum redditur, ægrum mortì vicinum esse indicio est, & multò magis, si intermittat.

9. Postquam etiam asthmatici difficulter respirant, vt omnes muscoli intercostales superiores scapularum, & ipsæ scapulæ attollantur, periculosum asthma est. Virium enim imbecillitas, calor vehemens & angustia partium respirationi inferuentium adest. Ne tamen in præfagitione ex pulsu & respiratione medicus decipiatur, videndum. Sæpissimè enim, qui bonum pulsum habere videntur, subito moriuntur & suffocantur; & contrà, qui pulsum prauum habent, auxilio aliquo adhibito, aut flatu, vel seroso humore discusso, subito restituuntur. Ideoque ad causam morbi, eius magnitudinem, aliasque functiones attendere decet, non ad solam respirationem, & pulsum respicere.

10. Asthma nonnunquam in peripneumoniam mutatur, idque febre superueniente cognoscitur, nonnunquam in hydropem & cachexiam degenerat.

*Indicationes.*

*Indicationes.*

Materia, quæ angustię bronchiorum caussa est, tollenda; quod fit euacuando eam: idque vt commodius fieri possit, eius crassities, si adsit, attenuanda, visciditas detergenda. Partes etiam materiam in pectus mittentes euacuandæ & roborandæ, & materia ad pectus ruens ab eo

auer

auertenda. Flatus si coniungantur, discutiendi; crudum  
tuberculum attenuantibus & exsiccantibus absumendum.  
Pulmonis siccitas humectantibus emendanda.

*Quæ tempore paroxysmi facienda?*

Et quidem tempore accessionis omnis danda opera, vt Quid  
tempore  
paroxys-  
mi facien-  
dum?  
æger à præsentī periculo liberetur, nec suffocari permittatur.  
Hoc enim maximè vrget, & propterea ad hoc maximè  
respiciendum. Cùm verò paroxysmus è tribus causis ori-  
ri possit, nimirum vel ex commota materia, quæ in pul-  
mone quiescebat, vel ex noua in pulmones afflu-  
xione, quam & flatus, & vapor aliunde transmissus ter-  
tiò augere potest: materiam verò moueat corporis atque  
animi motus nimius, mora sub radiis Solaribus, ad ig-  
nem; suppeditet autem & augeat ebrietas & crapula, vsus  
ciborum crassorum & flatulentorum. Initio perpenden-  
dum est, à qua causâ paroxysmus ortum habeat. Nam si à  
causâ ortum habeat, quæ præsentem antea materiam a-  
gitare soleat, non ita opus est frictionibus, ligaturis, cu-  
curbitulis & aliis reuulsionibus, sed quiete potius, &  
iis, quæ materiam motam discutere possint. Si verò  
aliunde materia ad thoracem affluat, seu ex toto, seu ex  
aliqua parte, omni studio laborandum, vt materia à pecto-  
re auerti & distrahi possit. Ergo tum æger corpore erecto,  
vt spiritui via & dilatato pulmoni spatium maius detur,  
nullo modo supinus, ne confidente ad dorsum thorace an-  
gustia augeatur, collocetur pectore nudo, aut certè leui-  
bus saltem vestibus tecto, non verò onerato aut coarctato,  
in aëre temperato, & ad frigidum declinante collo-  
cetur, & inutilium adstantium importuna turba arceatur.  
Hinc magnæ frictiones, vt & ligaturæ, in parti-  
bus inferioribus instituantur, quæ humores ad supe-  
riora ruentes reuellunt, eos verò, qui in pectore sunt,  
non agitant. Si verò pectus & dorsum etiam fricare li-  
beat, fiat id sanè leniter, vt meatibus saltem dilatis fa-  
cilius fiat transpiratio, quæ respirationis defectum aliquo  
modo compensare possit. Suppositoria quoque hîc indan-  
tur.

Clysteres verò non admittit Ludouicus Septalius, cùm Clysteres  
viribus

viribus prostratis, & suffocationis periculo incumbente commodè iniici non possint. Sed tamen vires non semper ita prostratæ sunt; vt clysterem non admittant, qui à pectore satis commodè reuellit.

*Vena-*  
*sectio.*

Si sanguis in corpore abundet, & virtus valida sit, vena basilica secetur, vel mediana, & tantum sanguinis detrahatur, quantum vires & morbus ferunt. Si verò menses, vel hæmorrhoides substiterint, saphena aperienda. Possunt & cucurbitulæ, cum & sine scarificatione scapulis & cruribus applicari, reuulsionis & auersionis gratia.

*Purgan-*  
*tia.*

Si humor sit crassus, equidem non satis commodè purgantia exhibentur. Verùm si humor sit tenuior & mobilis, ad periculum suffocationis vitandum satis commodè purgantia exhibentur, de quo *quest. 4.* dicitur.

*Topica*  
*discutiē-*  
*tia.*

Ad materiam verò discutiendam pectori applicanda Topica laxantia, discutientia, ex oleo amygdalarum dulcium, chamæmelino, alborum, irino, pinguedine gallinæ & similibus. Vt:

℞. Pulu. rad. althææ, iridis, an. 3. j. ℞. farin. sem. lini, sænugræc. an. 3. ij. ol. amygd. dulc. irini, chamæmel. an. 3. ℞. pinguedini gallinar. 3. ij. ammoniaci vino dissoluti 3. ℞. cera q. s. F. Linimentum.

Vel ℞. Mucilag. sem. lini sænugræc. cydonior. cum aqua scabiosæ vel tussilag. extract. an. 3. vj. pulu. rad. ireos, hyssopi, an. 3. ℞. croci, ʒ. j. ol. lilior. albor. amygdal. dulc. amarar. an. 3. j. ℞. Cum cera. F. Linimentum.

Si tamen flatus coniungantur, cauendum, ne subito & confertim calefacientia medicamenta extra adhibeantur. Si enim flatus à materia foveantur, metuendum est, ne his calidis medicamentis ea attenuetur & fundatur, flatûsque augeantur, atque ita respiratio difficilior reddatur.

*Lenien-*  
*tia &*  
*attenuā-*  
*tia.*

Exhibeantur medicamenta interna lenientia, attenuantia, detergentia & expectorantia, quælia sunt, amygdal. dulc. & amaræ, ficus, passulæ, scabios. capill. Ven. marrubium, hyssopus, radix aristoloch. rotundæ, ireos, ari, belenij, gentianæ, scilla, sperma ceti, crocus, mos. b. ammon. sulphur, benzoe, & medicamenta ex his parata, vt:

℞. Rad.

℥. Rad. ari. ʒ. ʒ. Coqu. in vino albo & cum lob de pino vel syrup. de byssopo. Misce & Eclegmatis forma exhibeantur. Vel ℥. Aqu. cinamom. ʒ. ij. oxym. scillitic. ʒ. j. M. aliquid sensim sorbeatur. Vel ℥. Ammoniac. Scrup. ʒ. flor. ʒ. vel lactis eiusdem, croci an. ʒ. v. Moschi, ʒ. j. oxymel. s. Drach. ij. vini albi ʒ. iij. M. Vel ℥. Ammoniac. ʒ. j. ʒ. adde pulu. glycyrrh. & sacchar. penidy q. s. Formentur Pilul. xxv. quarum 4. vel 5. exhibeantur.

Brunnerus, *consil.* 34. vt expertam & vsu probatam sequentem potiunculam commendat:

℥. Ammoniac. Drach. j. ʒ. aqu. byssop. ʒ. iij. vini Rhenani. ʒ. ij. M.

Maior tamen videtur Ammoniacci quantitas, quam quæ pro vna dosi exhibenda. Theriaca etiam vel mithridatium in ore teneri potest, & sensim aliquid deglutiri.

Commendatur & pomum excauatum, & ʒ. j. thuris repletum & assatum.

Vel ℥. Flor. ʒ. j. ʒ. Benzoes ʒ. v. ammon. ʒ. iij. croci ʒ. ij. margaritar. præpar. Scrup. j. moschi Scrup. ʒ.

F. Puluis, cuius quantum cuspidè cultelli capi potest, cum iurè pulli aut oxymelite aut aqua scabiosæ sumatur.

Auicennas cuminum cum aceto, vel semen sinapis albi cum æquali portione mellis ad formam Electuarij mistum exhibet.

Vel ℥. Oxymel. s. ʒ. j. scillitic. aqu. cinam. an. ʒ. ʒ. ammoniaci Scrup. j. croci ʒ. iij. Misce.

Vel ℥. Croci Scrup. j. moschi ʒ. j. flor. benzoes ʒ. ij. succi ocymi depurati ʒ. j. vini albi calefacti ʒ. iij. M.

Commendatur & tanquam vsu probata aqua è floribus raporum destillata, & cum croco ac pauxillo moschi mixta.

Vtiles etiam sunt, aquæ pectorales dictæ (Lussivnaesser.) Item aqua saluix, anisi, roris marini.

Aqua pectoralis temperata D. Andr. Doererii.

℥. Rad. glycyrrh. ras. polypod. q. mund. an. ʒ. j. ʒ. tussilag. ʒ. j. belenij, borrag. an. ʒ. ij. dactylor. rec. enucl. zibeb. rec. exacin. an. ʒ. iij. conseru. viol. purp. ʒ. j. ʒ. rosar. incarn. rec. ʒ. ʒ. nuc. mosch. croci oriental. Caryophyll. arom. cinamom. elect. an. ʒ. j. ʒ.

Incidentur & contundantur, postea affundantur, *Serilactis caprill. rec. & puriss. lb. ij. s. aq. scabios. lb. j. veronic. prunell. an. lb. s.*

Relinquantur in infus. in loco calido vel B. per nouendium, destillentur deinde per organa vitrea.

*Collecti liquoris lb. iiij. adde sacch. candi albiss. 3. vi.*

Alia aqua pectoralis à me præscripta.

*℥. Herb. veronic. scabios. an. M. ij. capill. Vener. byssopi, saluie, marrubij, an. M. j. rad. ireos Florentin. glycyrrh. eryngij, helenij, fanic. an. 3. s. Cinam. opt. granor. iuniperi, an. 3. iiij.*

Affund. spir. vini opt. q. s. Stent in infus. dies xiiij. postea destillentur; Destillatum funde super *dactylos N. x. iuiub. sebesten. an. N. xxx. ficuum N. x. passular. minor. maior. exacinat. an. 3. ij. croci 3. s.* Digerantur & filtrentur. Neque enim è dactylis, iuiubis, sebesten, ficubus, passulis multum per alembicum eleuatur.

Commendantur & millepedæ vel aselli, qui sub vasis aquariis stabulantur, si scilicet panno lineo excepti in vino macerentur & vinum sine expressione propinetur.

Quando paroxysmus ultra quartum diem protrahitur, vesicatoria in dorso, è regione pulmonis, applicentur. Nonnulli sinapismos in anteriore parte thoracis applicant, & vesiculas diu apertas seruant.

Victus interea sit tenuissimus, atque utilis est ptisana cum croco & saccharo, cibique croco condiantur; cum is vtilissimum sit in asthma remedium.

*Quomodo extra paroxysmum æger curandus sit?*

*Quid extra Paroxysmum faciendum*

Quando æger à paroxysmo vehementiore & suffocationis periculo liberatus est, laborandum omnis generis præfidiis, ne malum reuertatur. Ideoque si plenitudinis signa adsunt, & vires permittant, vena aperienda basilica, præsertim vbi vaporum calidiorum copia magna in corde & pulmone vrget. Et vbi à mensium & hæmorrhoidum fluxu suppresso malum originem habet, vel augetur, vena tali vel malleoli aperiatur. Cucurbitulæ quoque in eundem finem femoribus & cruribus adhiberi possunt.

Postea præparetur materia & euacuetur. Præparetur autem

autem attenuantibus, incidentibus, & abstergentibus  
iis, quæ thoraci dicata sunt. Vbi tamen videndum, ne  
nimis calida & exsiccantia exhibeantur, quæ partes te-  
nues materiæ absumere, reliquumque incrassare, & ita  
malum curatu difficilius reddere possunt. Quapropter  
commodè glycyrrhiza, passulæ, & similia medicamenta hu-  
mequantia simul admiscantur.

Vtilia & hæc medicamenta sunt; *byssopus*, *scabiosa*, *ca-  
pilli Vener.* *præssium*, *passula*, *calamintha*, *faniculum*, *scilla*,  
*iniuba*, *ficus*: & ex his composita, *syrup. capill. Vener.* *de  
glycyrrhiza*, *de iniubis*, *de scabiosa*, *de byssopo*, *de calamintha*,  
*de præssio*, *oxymel simpl. compos.* & *scillitic.*

Vt ℥. *Capill. vener. byssopi*, *scabios. præssij*, an. M. ℞. *rad.  
helen. ireos*, an. ʒ. ij. *sem. anisi*, *fanicul.* an. ʒ. j. *passul. gly-  
cyrrh. rasæ*, an. ʒ. ℞. *ficuum*. N. vi. Coqu. in aqua simpl.  
Colat.

℥. ʒ. vj. adde *syrup. capill. Vener. byssopi*, *oxymel. scillit.*  
ʒ. ℞. Misce pro duabus dosibus, an. ʒ. ℞. & potus hic bis re-  
iteretur.

Vel ℥. *Rad. ireos*, *glycyrrhiz. helenij*, *fanicul.* an. ʒ. ℞.  
*byssopi*, *capillor. Vener. tussilag. scabios. satureiæ*, *calaminth.*  
an. M. ℞. *iniub. sebest.* an. N. x. *caricar.* N. vi. *passular.* ʒ. ℞.  
*semin. anisi*, *faniculi*, *maluæ*, an. ʒ. j. Coqu. in aqua s. Colat.  
℥. ℥. j. *Oxymel. scillit. syrup. de præssio*, *de glycyrrhiz.* an. ʒ.  
j. ℞. *aqu. cinamom.* ʒ. j. M. pro 4. dosibus.

Vel ℥. *Aquæ veronica*, *scabiosæ*, an. ʒ. iij. *syrup. de præ-  
ssio*, *capill. Vener.* an. ʒ. j. ℞. ꝑ. ☿ ℞. M.

Vel ℥. *Syrup. de præssio*, *de byssopo*, *de glycyrrh.* an. ʒ.  
j. ℞. *flor. Sulphur.* ℞. j. *succi glycyrrh. inspiss.* ʒ. j. ℞. vel  
potius *extract. glycyrrh.* ʒ. ℞. *aqu. veron. tussilag.* an. ʒ.  
iij. M.

Sumat æger manè & ante coenam cochlearia 2. vel 3. *Purgan-*

Præparata materia euacuanda est, & primò per pur-  
gantia. Etsi enim materia, quæ in thorace continetur, ita  
facile per aluum euacuari non possit: dum tamen mate-  
riam ex vniuerso corpore purgantia euacuant, eadem à  
pulmone reuellūt. Imò aliquid retrahi posse nō impossibi-  
le est. Præterea cū antea dictū sit, & postea, *quest. 2.* di-  
cetur,

cetur, materiam, quæ paroxysmos asthmaticos concitat, non semper totam in pulmone consistere, sed ex epate & venis affluere, commodissimè per purgantia ea tollitur.

Antiqui etiam fortioribus purgantibus utebantur, vt ex Aëtio, *tetrab. 2. serm. 4. cap. 37.* Paulo Aegineta, *lib. 3. cap. 39.* Oribas. *lib. 9. cap. 5.* imò ipso Galeno 7. *de compos. med. sec. loc. cap. 6.* videre est.

Purgan-  
tia mu-  
sanda  
sunt.

Verùm tutius est, à mitioribus inchoare, atque ea sæpè repetere, & ita per *επιεργασίαν* materiam euacuare. Cùm enim materia crassa, viscida & contumax sit, & sæpè satis copiosa, vna vice expurgari non potest; ideòque per interualla eam præparare & euacuare decet, medicamentis mediocribus, qualia sunt agaricus, mechoacanna, & similia; quibus tamen stimuli loco fortiora quædam in minore quantitate addere vtile est. Quoniam verò purgantia medicamenta diutius continuanda, ne natura iis assuescat, earumque vires ob longam consuetudinem contemnat, ea mutare vtile est.

Itaque in decocto præparante supra proposito infundantur. *agaric. trochisc. ʒ. j. sem. carthami. ʒ. vj.* Colentur & exhibeantur. *ʒ. iiij.* Vel *ʒ. Pilul. de agaric. ʒ. ij. assaieth. cochiar. an. ʒ. ʒ. ʒ. extract. panchymag. ʒ. vj. cum oxymel. scillit. F. pilul.* Vel *ʒ. Agaric. ʒ. j. ʒ. turbit. ʒ. j. semin. fenicul. zingib. an. ʒ. j.* Infundantur in *oxymel. s. ʒ. j. vini albi, aqu. hyssopi, an. ʒ. ij.* Colat. adde *manne ʒ. vj.* Iterum colentur. F. Haustus.

*ʒ. Rad. ireos. ʒ. ij. tussilag. ʒ. j. ʒ. pulmonar. M. ʒ. ligni guaiaci. ʒ. j. rad. helenij, hellebor. nigri, an. ʒ. j. ʒ. fol. sen. ʒ. ij. zingib. galangæ, an. ʒ. j.* Coqu. in *s. q. decocti pectoralis.* In colat. infundantur *agar. troch. ʒ. ʒ. rhubarb. ʒ. j. cinamomi. ʒ. ʒ. cum s. q. sacchari F. syrupus liquidior, cuius ʒ. iiij. manè exhibeantur.*

Nonnulli frequenter ad purgandum in asthmate trochiscis de uolis vtuntur, à Mesue, *cap. de asthmate* descriptis, quos tamen relicit Alexander Massarias, quod compositio minus sit artificiosa, & diagrydium non benè correctum. Verùm diagrydium facilè correctius reddi potest.

Vel *ʒ. Polypod. q. ʒ. ʒ. mechoacan. opt. ʒ. j. agaric. albiss. ʒ. ʒ.*



℞. glycyrrh. ℥. β. fol. sen. ʒ. vi. zinziber. galangæ, an. ʒ. ij. passular. ʒ. j. sem. anisi, fœnicul. an. ʒ. ij. fol. tussilag. capillor. Q*ui*, an, M. j. Infundantur in vini mensura una, detur manè haustus.

Oxymel de Nicotiana purgans anhelosis vtile descripsit Quercetanus, pharmacop. cap. 10. & syrup. de Nicotiana, ibid. cap. 12.

Imprimis vulgò commendatur ius galli decrepiti purgans, quod tamen à Ludou. Sepralio planè reiiicitur, vt decrepiti. postea, quæst. 5. dicetur. Paratur autem hoc modo:

℞. Gallum decrepitum evisceratum, ventremque eius sequenti pulvere reple.

℞. Pulmon. vulpis. ʒ. j. passular. ficuum, an. ʒ. j. β. glycyrrhiz. ʒ. j. hyssop. saturiæ, thymi, an. ʒ. β. semin. fœnicul. ʒ. j. cartham. ʒ. β. turbit. elect. ʒ. ij. agaric. trochisc. ʒ. β. zinzib. ʒ. j. Postea coqu. in aqua pura.

De iure detur manè haustus, qui si non satis purget, dissoluatur in eo aliquid mannæ.

Vix verò quicquam commodius est ad pulmones expurgandos quam oxymel cum agarico. Efficax quoque est Oxymel helleboratum Gesneri. Sed omitti potest helleboratum albus & augeri pondus agarici. Gesneri.

Corpore toto euacuato danda opera, vt causa continens seu proxima è pulmonibus tollatur, idque medicamentis tum internis, tum externis effectum dandum. Ad crassam & viscidam materiam attenuantia, incidentia & detergentia adhibenda, citra tamen insignem caliditatem, ne humores exsiccati magis crassi & lenti reddantur. Hinc Attenuantia, incidentia & detergentia. Auicennas etiam diuretica fortiora improbauit, quòd subtili extrahant crassiore relicto. Ideoque vtile est attenuantibus & incidentibus humectantia permiscere, vt Humectantia. glycyrrhi. passulas, caricæ, pineas, mel, saccharum, maluam, althæam. Atque talia medicamenta supra inter præparantia proposita sunt. Valdè etiam laudatur terebinthina, quæ non solum pulmones abstergit, sed & epar, lienem, renes, simulque aluum citra noxam soluit.

E supra enumeratis varia componuntur medicamenta. In vulgari vsu sunt Loch de caulibus, de tussilag. de pino, de

de passulis, de pulmone vulpis, de scilla, & quod ad asthma dicitur, species diaireos s. diaireos Salomon, diatragacanth. calid. diapenid. diabyssop. diaprassij, conditum, rad. helenij, extract. helenij, ireos, ol. anisi, feniculi, oxymel scillit. flores Sulphuris, lac & balsamum eiusdem, flores benzoës. Galenus, 7. de comp. med. sec. loc. in fine cap. 6. ex veterum scriptis aliqua recenset, inter quæ & hæc:

℞. Succ. scillæ crudæ, mellis part. æqu. Coqu. lento igne. Dosis 3. ij. circiter, ante & longè post cibum.

Vel ℞. Sulphur. viui, sem. ruta sylu. an. 3. j. aristoloch. absinth. cinamom. abroton. an. 3. β. Terantur cum aceto & F. Trochisci, magnitudine fabæ, quorum 3 j. manè & vesperti exhibeatur cum 3 iij. oxymelitis. Vtile est & hoc:

℞. Ammon. aceto dissol. ʒ j. essent. zedoar. ʒ ij. aqua cinamomi 3. β. veronic. 3. ij. flor. chamamel. 3. iij. Misce pro 2. dosibus.

Medica-  
mēta se-  
pius re-  
petenda  
& mu-  
tanda.

Cùm autem malum sit diuturnum & contumax, vsus medicamentorum continuandus, & medicamenta sæpè repetenda, simulque permutanda, ne materia vni assuescat. Per interualla quoque theriacæ 3 β. vel ʒ ij. exhibeantur. Vtiles quoque sunt millepedæ seu aselli, vt etiam suprà dictum, quorum & Galenus, 7. de comp. med. s. l. in fine mentionem facit; feruntque *ὀπίστροι*, & vulgatum Græcæ plebeculæ hodie esse medicamentum ad pulmones infarctos à crassis humoribus liberandos.

Vel ℞. Hyssopi, veronica, scabiosa, marrub. origan. pulegij, cardui benedicti, an. M. j. rad. ireos 3. vi. zinzib. 3. j. β. agaric. albiss. 3. β. Infunde in aceti vini lb. j. β. aqu. veronica, cardui bened. an. lb. β.

Stent in vase vitreo obturato loco calido per triduum, deinde lento igne coquantur & exprimantur.

Colat. ℞. lb. j. β. mell. opt. lb. β.

Coqu. lento igne ad syrupi formam, qui aromatisetur cinamomo, caryophyllis & calamo aromatico in petia ligatis. Dantur manè 2. vel 3. cochlearia. Crato, consil. 29.

Syrupus Augeny de helenio.

℞. Rad. helenij, polypod. q. in vino albo macerat. an. 3. ij. passul. Corinth. 3. β. sebesten N. xv. farfara, pulmonaria, fol. satur-  
reia,

*reia, calaminth. an. M.j. fol. tabaci unum magnum. glycyrrh. 3. ij. sem. urtica, bombacis, an. 3. j. B.*

Coqu. in mulla ad remanentiam lb. j. B. & cum pari quantitate sacchari F. syrupus, cui oleum sulphuris addi potest.

Vel ℥. Rad. gentian. helen. 3. vi. ireos, galange, an. 3. iij. agaric. spica, an. 3. j. B. sacch. albi 3. ij. F. pulvis.

Vel ℥. Hyssopi sicci. semin. anisi, an. 3. j. glycyrrh. 3. B. sem. fenicul. cinamom. an. 3. ij. cardamomi, 3. ij. ireos Florent. 3. v. sacch. ad pondus omnium. F. Tragea, vel cum melle electuarium.

Laudatur & diabutrum Benedicti Victor. Fauentini.

℥. Butyri recent. bene loti 3. iiij. caricar. nucleor. pini, dactylor. amygdal. amar. an. 3. ij. succi glycyrrh. tragacanth. an. 3. j. hyssop. ireos, thymi, satureia, prassij, pulegij, sem. urtic. an. 3. B. cinamom. zinzib. pyrethri, an. 3. iiij. caryophyll. galang. piperis nigri, sem. anisi, carui, cardamomi, an. 3. ij. ligni aloës, nucis moschat. an. 3. j. aqu. mellis lb. iiij.

Caricas, passulas, dactylos bene contusos in aqua mellis triduo infunde; postea lento igne coque, & succum fortiter exprime, cui succo adde butyrum & præterea mellis dispumati lb. vii. & iterum lento igne vnica ebullitione ebulliant, iterumque colentur. Colaturæ adde nucleos pini & amygdalas bene contusas; & in mortario omnia diligenter misce: quibus reliqua omnia subtiliter puluerisata, ut & pulmonis vulpis subtiliter puluerisat. 3. ij. insperge, & super igne miscendo F. Electuarium de quo 3. B. manè, meridiè & vesperi exhibeatur.

Vel ℥. Conseru. betonic. botryos, an. 3. ij. violar. loch de pino, an. 3. j. pulmon. vulpis prepar. 3. j. B. extract. glycyrrh. ireos, an. 3. j.

Cum syrupo de hyssop. vel capill. Vener. F. Electuarium. Dos. Drach. B. Et commodum fuerit, si superbibatur haustus iuris galli decrepiti cum herbis pectoral. & ligno guaiaco facti. Vel ℥. Pinear. mundat. 3. ij. radic. ireos. glycyrrh. an. 3. ij. tragacanth. 3. B. sem. anisi, fenic. urtica, an. 3. B. radic. angelica, 3. B. cinam. 3. iv. styrac. calam. 3. B. sacch. penid. candi an. q. s.

Cum aq. scabiosæ & feniculi, F. rotulæ vel morsuli.

Vtile

Diabutrum  
Benedicti  
Victor. Fauentini.

Vtile est & sequens medicamentum.

*℞. Radic. irid. Florent. helenij, an. ʒ. β. pulpæ dactylor. & passular. mundatar. an. ʒ. iiij. cortic. arantior. siccor. citri siccor. an. ʒ. ij. benzoës, ʒ. j. croci, ʒ. β.*

Infundè bidui spatio in spiritu vini optimè rectificato. Postea liquor per inclinationem separetur, cui adde sacch. candi pulu. q. s. spiritum vini accende, & liquorem continuò agita, donec flammâ spontè extinctâ liquor olei ferè consistentiam acquirat, cui adde ol. sulphuris q. s. ad gratam aciditatem.

Externa.

Cum internis medicamentis externa coniungenda. Illinendum nimirum pectus oleo amygdal. dulcium, chamæmel. anethino, cheirino, liliorum alborum, rutaceo, additis mucilaginibus & pinguedinibus emollientibus & discutientibus.

*Vt ℞. Ol. amygdal. dulc. lilior. albor. rutac. an. ʒ. vj. adipis gallinæ, anseris, an. ʒ. β. mucilag. sem. sænugræc. cum aqua russilagin. extractæ ʒ. iiij. Pulv. rad. ireos, helenij, croci, an. ʒ. j. Cere parum. M.*

Vel *℞. Sem. carui, ʒ. iiij. anisi, summit. absinth. an. ʒ. ij. puluerisatis adde micæ panis similaginei ʒ. iiij. mell. crudi, ʒ. iv. terebinth. ʒ. ij. Coqu. in vino ad consumptionem vini. F. emplastrum, applicetur calidè pectori & dorso.*

In topicorum tamen horum vsu obseruandum, ne cutis pori occludantur: ideòque emollientibus commodè medicamenta attenuantia ac poros aperientia, & nitri aliquid admiscetur.

Cauteria actualia.

Nonnulli etiam in malo inueterato & quod nullis aliis mediis cedit, cauteria actualia adhibent, secundùm colulum, pectus & dorsum, circa medium vertebrarum & costarum, de qua vitione videatur Aëtius, *tetrab. 2. serm. 2. cap. 57.*

Si à catarrho malum sit vel foueatur, eius ratio habenda, & vt suprà lib. I. part. 2. cap. 34. de catarrhi curatione diximus, in brachiis fonticulos excitare utile est.

Exsiccantia.

Pectore expurgato, danda opera, vt per exsiccantia & absorbentia reliquiæ in pulmone absumantur: in quem vsum plerâque medicamenta humorem crassum è pectore

Stomacho expurgantia adhibentur, è quibus tamen hic fortiora & magis siccantia eligenda. Cum enim, ut antea dictum, in principio & præparantia & expectorantia validius siccantia non sint satis commoda, quia tenui parte absumpta crassior relinquitur & induratur: ubi materia per incidentia & attenuantia præparata, ut & per expectorantia conuenientia euacuata fuerit, reliquum postea tutius per validius siccantia absumere licet. Qualia sunt, *belenium, arum, scilla, Nicotiana, ammoniacum, sulphur, benzoë, theriaca, mithridatum.*

Ut ℞. Rad. ireos, ʒ. ij. belenij, ari, an. ʒ. j. scillæ, angelicæ, an. ʒ. β. glycyrrh. ʒ. j. byssop. saturiæ, pulegij, marrubij, calaminth. an. m. j. seminis feniculi, anisi, an. ʒ. ij. vrtic. erucæ, cartham. an. ʒ. β. Coquantur, & cum melle, vel saccharo. F. Syrupus. Sub finem adde croci, ʒ. β. Utiles est & syrupus de Nicotiana.

℞. Nicotianæ sicca, m. iij. byssop. marrubij, calaminth. an. m. β. capill. Ven. scabios. an. m. j. caricar. dactylor. an. N. x. rad. angel. fenicul. an. ʒ. β. sem. fenic. anisi, an. ʒ. iij. vrtic. ʒ. β. rad. ireos, ʒ. x. Coq. in aqu. lb. iv. Et addito melle & saccharo fiat syrupus.

Syrupus  
de Nico-  
tiana.

Laudatur & ros Solis, si ei cum semine botryos, glycyrrhiza & marrubio S. V. affundatur. Vel fiat hoc eclegma:

℞. Ammoniacy, aceti scillit. dissoluti, ʒ. ij. sem. nasturtij, vrtic. an. ʒ. j. flor. sulphur. ʒ. β. croci, ʒ. j. pulmon. vulpis præpar. ʒ. ij. cum oximet. scillit. F. Electuarium. Vel hic pulvis.

℞. Rad. ireos, glycyrrh. belenij, an. ʒ. j. ari, ʒ. ij. cinnom. ʒ. ij. sem. vrtic. nasturt. an. ʒ. j. pulmon. vulp. præpar. ʒ. ij. croci, ʒ. j. flor. sulphur. ʒ. j. benzoës, ʒ. β. sacch. cand. ʒ. vj. F. Pulvis.

Vel ℞. Flor. sulphur. vel lactis sulph. ʒ. β. benzoës, ʒ. β. fecul. ari, ʒ. β. rad. ireos, ʒ. j. croci, ʒ. j. sacchar. candi. ʒ. vj. F. Pulvis.

Vel ℞. Ammoniacy, ʒ. j. β. croci, ʒ. β. flor. benzoës, ʒ. v. extract. glycyrrh. q. s. Fiant pilulæ xxx. dentur manè 5, 6, 7.

Vel ℞. Flor. sulphur. ʒ. j. extract. belen. ʒ. j. sacch. albiss. in aqu. tussilag. dissol. ʒ. iij. ol. anisi, ʒ. iv. F. rotulæ.

Vel ℥. *Spec. diaireos simpl.* 3. j. *diatragac. calid.* 3. *℞. balsam. sulph.* 3. *℞. sacch. in aqu. scabios.* dissol. 3. v. *ol. anisi,* ̄g. v. Fiant rotulæ.

Vel ℥. *Lact. sulphur. flor. benzoës,* ̄g. vj. *ammoniaci,* ̄g. iij. *croc.* 3. *℞. margarit. præpar.* 3. j. *magister. oculor. ̄m.* *moschi,* an. 3. *℞. sacchar. candi* 3. ij. Fiat pulvis, de quo, quantum cuspide cultelli bis capi potest, detur in ovo forbili, vel aqua scabiosæ.

Est & efficax decoctum ligni guaiaci, sassafras, farsæ parillæ, si pectoralia addantur, non quidem ad sudores ciendos, sed ad reliquias materiæ in pectore absumentas.

Vt ℥. *Ligni guaiaci,* 3. iv. *farsæ parilla,* vel *ligni sassafras* 3. j. *℞.* Infundantur horis 24. in aq. ̄b. iij. Deinde adde *conseru. violar. botrys,* an. 3. ij. *daſtylor.* N.x. Coq. in balneo vase clauso. Colatura exhibeatur.

Ad easdem reliquias absumentas utiles etiam sunt suffitus ex thure, myrrha, mastiche, styrace, benzoë, gummi iuniperi, nicotiana, cinamomo & similibus. Nonnulli etiam arsenicum suffimigiis istis admiscendum censent, sed male, ut postea *quest. 4.* dicetur.

Hæc tamen omnia ferè humorem crassum & viscidum spectant. Si verò ab humore tenui & seroso sit asthma, sæpius is euacuandus. Postea etià per sudorifera discutiendus.

Curatio  
asthma-  
tis à tu-  
berculo,  
grandine  
vel cal-  
culo.

Si à tuberculo, vel grandine, aut calculo in pulmonibus genito, aut siccitate pulmonis hoc malum proveniat, quæ ratione curatio instituenda sit, ex iis, quæ suprà, *part. 2.* de morbis pectoris dicta sunt, patet. Nam si tuberculum sit sanguineum, citò suppuratur & rumpitur etiam sine medicamentorum ope, idque ex puris excreatione, febribus & anhelationis remissione cognoscitur, & tum hydromelite, aliisque medicamentis, quæ in pleuritide sunt proposita, ad extersionem utendum, ne vlcus relinquatur. Si verò tuberculum crudum sit, & coctu difficile, medicamenta calefacientia, attenuantia, & absumentia, quæ suprà sunt proposita, etiam hîc locum habent. Quod si tandem in abscessum mutetur tuberculum, abstergentia requiruntur. Hinc Galenus, 4. *de loc. aff. c. ult.* ad absumentia talia tubercula vitur Athanasia theriaca & simil. valdè  
exsic

exsiccantibus medicamentis. Vix tamen aliquis talium ægrorum sanitati restituitur.

## Dieta.

Quia asthma plerumque à causa frigida & crassa or- Dieta.  
tum habet, victus ratio sit calefaciens & attenuans, de quo postea *quest. 7.* dicetur. Aër nimirum, quem inspirat æger, sit calidus, siccus, attenuans, liber & perflatilis. Ideò etiam in cubiculo; in quo æger degit, suffimigia frequenter fiant ex styrace, thure, myrrha, benzoë, moscho, amara. Vitetur verò aër frigidus, & humidus, & crassus. Cibus easdem qualitates habeat, ita tamen calefacientia & attenuantia moderanda, ut humectantia quædam admisceantur, ut materia facilius expectoretur. Nam si cibus & potus exhibeatur, qui solum calefaciat, attenuet, & simul siccet: facile fieri potest, ut humor maiorem crassitiam acquirat, & tenacius asperis pulmonis arteriis adherescat. Ideòque cibi condiantur saluiâ, satüreiâ, thymo, hyssopo, foeniculo, baccis iuniperi, & cinamomo, & in primis croco. Vtiles quoque sunt passulæ, amygdalæ dulces, pinæ, pistacia, & in primis commodum est ius galli decrepiti cum hyssopo & croco, atque aliis pectoralibus. Melliti quoque cibi adstringentes omnes & crassi succi, ut pisces, legumina, caro suilla, lac & caseus.

Potus sit vinum tenue, subdulce, vel melicratum, in quo thoracica medicamenta cocta sint. Possunt etiam cerevisiæ fieri cum saluia, hyssopo, roremarino & similibus. Vtilis etiam potus est decoctum ligni Guaiaci. Æger sitim non ferat, sed largius bibat; quia humectatione indiget ad eam quæ iam incisa & deterfa est in pectore, materiam tussi eiciendam, ut docet Galenus, 7. de loc. affect. c. 6. Unica tamen vice, & cum cibo potus copiosus non assumatur; cum repletus potu nimio ventriculus difficultatem spirandi parere soleat, sed si opus; cibo iam concocto potus aliquid sumatur. Somnus sit nocturnus moderatus. In paroxysmo somno, quantum potest, æger abstineat, aut si vires imbecillæ somnum requirant, brevis sit & interruptus. Dormiat æger capite & pectore non nihil eleuato.

Vtilis est & ambulatio ante cibum, & frictio partium extremarum. Vehementia autem exercitia, quod humores commoueant, omninò intermittendæ. Vitentur animi perturbationes, ira, & omnis nimius animi, ac corporis motus; cùm humores commouere, & paroxysmum accerere soleant. A Venere etiam abstinendum ægro.

## QVÆSTIO I.

*An humor asthmatis caussa habeat etiam quandoque extra bronchia pulmonum?*

*An humor asthmatis caussa habeat quandoque extra bronchia pulmonum.*

Alexander Massariæ Auicennam reprehendit, quod statuat, humorem asthmatis causam contineri, quandoque etiam extra bronchia pulmonum in ramis læuium arteriarum, quarum propagines multæ per pulmonem distribuuntur, statuitque, si in pulmonibus obstruantur propagines læuium arteriarum, non asperæ arteriæ, cor laborare, pulsusque fieri inæquales, minimæque asthma excitari, nisi bronchia pulmonum simul obstruantur.

Verùm enimuerò materiam asthmatis causam quandoque etiam extra brōchia pulmonum in aliis pulmonis vasis, imò in ipsa pulmonis substantia consistere, multæ Medicorum obseruationes docent. Ita Hollerius in quodam pulmonem tanquam spongiam imbutum multo humore pituitoso inuentum esse scribit. Et patet id ex eo, quod qui asthmate laborant, non continuò cum stertore, & sonitu respirant, neque etiam semper tussunt, aut si tussunt, tussis tamen sicca est, quod minimè fieri deberet, si materia in asperis pulmonum arteriis semper consisteret. Nam aer materiam transiens & displodens sonitum & stertorem excitat & quicquid in aspera arteria, eiusque ramis existit, tussim excitare solet, vt postea, in capite de tussi, dicetur. Et licet verum sit, læuibus arteriis affectis mutationem in pulsu fieri: tamen & respiratio tunc quoque affici potest, si obstructio illa tam magna sit, humorisque tanta copia, vt & asperas arterias comprimat, angustiorisque reddat, docentque hoc satis paroxysmi asthmatici



matici, qui per interualla materiâ agitâtâ in vasis excitantur. Ideoque si materia in læuibus arteriis consistat, & asperas comprimat, siue in utrôque arteriarum genere consistat, simul & Asthma, & pulsus inæqualitatem parit. Et ipsa origo asthmatis, de qua quæstione sequenti dicetur, satis docet, causam asthmatis potius in venis & pulmonis substantia, quàm asperis arteriis contineri.

## QVÆSTIO II.

*An asthma frequentius à catarrho, an verò ab humore crudo è venis in pulmones effuso excitetur?*

Vulgata opinio est, frequentissimè à cerebro frigido & humido atque excrementis abundante materiam pituitosam ad pulmones descendere, atque ibi hærentem asthma parere. Verùm etsi non nego, quandôque post catarrhos aliquid pituitæ in pulmone restare, eiûsque bronchia obstruere, & asthma excitare posse: tamen rarius hoc fieri existimo, sed frequentissimè asthma generari puto ab humoribus crudis circa epar, imò in vniuerso venoso genere collectis, & per venam arteriosam in pulmones effusis. Etenim si materia è cerebro descendens causa asthmatis esse debet, necessariò catarrhus asthma præcedere debet, atque tussim adesse necesse est; quod tamen non semper obseruatum. Etenim, si vel leuiter saltem asperæ arteriæ afficiuntur, tussis excitatur, vt postea, ex capite de tussi, patebit. Nonnulli quidem, vt Zecchius, *consult. 12.* aliam huius rei causam reddere conantur, statuuntque tussim in asthma quandôque non excitari ob partium spirituum æqualem intemperiem, quæ cùm tristem sensum non inducat, etiam tussim non excitet. Cùm enim spirandi organa ex longa patiendi consuetudine in morbosum quandam habitum commutata ferè sint, æqualique intemperie cum humore per omnem partem æqualiter disperso afficiantur, nouum dolorem seu molestiam non sentire, atque ita tussim non excitari, nisi quando noua accedit materia, vel prior certo loco collecta & commota vias exasperando

rando, & aëris ingressum & egressum præpediendo novam affert molestiam.

Verum cum idem Zecchius, *conf.* 58. causam cur asthma non semper cum stertore & sonitu fiat, hanc reddat, quod materia non semper in asperis, sed quandoque in lævibus pulmonis arteriis consistat; causam eandem hic etiam multo rectius asserere potuisset, quam istam æqualem intemperiem. Neque enim quæ tussim excitant, saltem ob intemperiem, quam inducant, id præstant, sed etiam quia aëris ingressum prohibent, quod ipse confitetur; id quod materia asthmatis, si in bronchiis pulmonis hæret, perpetuò faceret, & ita perpetuò tussim excitaret, eodem modo ut grandines tussiculam perpetuam excitant, neque longa patiendi assuetudine ullus talis habitus induci potest. Sunt & alia, quæ idem probant. Refert idem Zecchius, *conf.* 18. Cardinalem Paliottum, asthmaticum simul urinæ ardore, & difficultate laborasse, & ita quidem, ut cum urinæ ardor, & difficultas vrgeret, spirandi difficultas interim euidenter imminueretur, & rursus cum maiore impetu, stranguria cessante, repeteret. Quod certè indicio fuit à communi causa hæc duo mala provenisse, vitiosos & crudos humores, qui antea è venis ad pulmones ruentes asthma faciebant, postea ad renes, & vesicam transmissos difficultatem urinæ excitasse. Et licet non omnibus asthmaticis urinæ difficultas & ardor adsit: tamen durante accessione ægri urinas crassas, & turbidas mingunt; quia scilicet humorum crassorum & crudorum in venis agitatorum pars etiam ad renes, & vesicam ruit. Arguit idem & hoc, quod asthmatici plerumque sunt cachectici, ut de eodem Cardinale Paliotto, refert Zecchius, pedesque tandem asthmaticis penè omnibus intumescunt; quod indicio est, causam asthmatis circa epas potius contineri, siue ibi ob epatis imbecillitatem generetur, siue ab utero in foeminis, quibus menses suppressi sunt, sanguis eò mittatur. Neque id ideo fit, quod pulmones epas refrigerent, cum si diligenter signa omnia perpendamus, crudorum humorum in venis cumulatorum signa adsint. Insuper idem

& hoc probat, quod asthma interdum citra tussim definit, nec materia exscreatur & è pectore eiicitur, dum scilicet ea, vel per halitum digeritur, vel per vrinæ vias expurgatur, aut in venas recurrit. Sicut & hoc id persuadet, quod suppressis mensibus & hæmorrhoidibus ac aliis consuetis euacuationibus, asthma nullo præcedente catarrho, succedit. Quod tandem & hoc confirmat, quod Aretæus inter signa imminenti asthmatis flatus in præcordiis, & eructationes præter rationem recenset; quæ proculdubio à materia cruda in hypochondriis agitata proueniunt. Neque enim, vt nonnulli volunt, flatus hi proueniunt, quod ventriculus ob pulmonis consensum afficiatur. Nam Aretæus eos non inter signa asthmatis, quod diu durauit, & in quo pulmonis temperies valdè labefactata sit, sed incipientis asthmatis signa recenset, vbi pulmones non ita labefactatos esse credibile est, vt ventriculum refrigerare possint. Materiam autem hanc, quæ è venis in pulmones effunditur, non semper crudam & pituitosam, sed quandòque etiam serosam esse, non sine ratione statuit Carolus Piso.

## Q U Æ S T I O III.

*An Asthma semper sit sine febre?*

Vulgata est opinio asthma sine febre esse, & differre asthma à respiratione illa læsa, quæ fit in febribus, quod illa sit ob vsum auctum, hæc verò saltem ob vasorum angustiam.

*An asthma semper sit sine febre?*

Suspectam tamen habet hanc doctrinam Carolus Piso, de morbis à colluue serosa, pag. 220. cum febris in nonnullis etiam sensui sese prodatur, etsi calor non sit siccus, & acer, sed halituosus plerumque, humidusque & blandus. Etsi verò vrinæ sæpè sint copiosæ in asthma, ac tenues & instar aquæ perspicuæ, atque ideò dissimiles vrinis familiaribus, & propriis febrium putridarum, suspicionem absentię febris præbeant: tamen id familiare febribus, quæ ab humoris serosi feruore fiant, esse putat, idémque in

arthritide, aliisque à fluxione & feruore humoris serosi morbis accidere potest. Idque etiam historiis aliquot adductis comprobatur.

Et omnino non est de nihilo hæc Caroli Pisonis sententia. Etsi enim sæpe febris absit, cum humor est crassior, aut tuberculum aliquod adest: tamen ubi à seroso humore asthma originem habet, quale plerumque circa insignes temporum mutationes in quibusdam ei obnoxiiis excitatur, tum febrem aliquam simul adesse, experientia testatur: sed est ea blanda & halituosa, qualis etiam alios morbos à feruore & motu serosi humoris ortos, ut arthritidem, catarrhos, & huiusmodi fluxiones alias comitatur.

#### Q V Æ S T I O IV.

*An purgantia in paroxysmo asthmatico conueniant?*

*An purgantia in paroxysmo asthmatico conueniant?*

Diffuadent id nonnulli ea primùm de causa, quod humor, qui asthma excitat, crassus sit, viscidus, neque euacuari facillè possit, nisi prius præparetur, & postea sensim ac per vices euacuetur, id quod etiam in aliis morbis pituitosis, faciendum.

Deinde ob suffocationis periculum, quod maximè vget; cum metuendum sit, ne si medicamenta purgantia exhibeantur, materia à medicamento agitata non ad ventrem inferiorem, sed potius ad locum affectum confluat, atque ita suffocationis periculum augeatur.

Contra verò Carolus Piso statim post sanguinis detractionem purgationem auertendi gratia instituendam censet: cum non nisi cum periculo suffocationis purgatio protrahi possit, & humor ipse per se satis sit fluidus, neque magno apparatu indigeat.

Verùm distinctione hinc opus est, & humoris natura consideranda. Si enim humor sit crassus & viscidus, sine fructu initio statim instituitur purgatio, isque potius agitur, quàm educitur, atque hinc paroxysmus augetur. Si verò humor sit tenuis & serosus atque è venis in pulmones effundatur, quod præsupponit Piso, commodissimè mox initio instituitur purgatio.

Q V Æ S T I O

## QVÆSTIO V.

*An ius galli decrepiti asthmaticis conueniat ?*

Ius galli decrepiti non solum cum pectoralibus co-  
ctum ad alterandam & expectorandam in asthmate ma-  
teriam, sed etiam cum purgantibus ad purgandum in  
omnibus ferè medicorum, post Arabum tempora, libris  
præscribitur. Vnus, quod sciam, Ludouicus Septalius,  
*animaduers. medicar. lib. 6. num. 137.* id, tanquam noxium  
reiciit, utpote quod experientiæ non respondeat, & ra-  
tioni aduersetur: scribitque, se Mediolani, ubi frequen-  
ter exhibetur à Medicis, præsertim secundum descriptio-  
nem Benedicti Victorij Fauentini in Empirica, id aliquo-  
ties initio successu exhibuisse. Obesse autem potius, quàm  
prodesse, hisce de causis putat. In longa, inquit, ebulli-  
tione nitrosæ illæ partes, quibus maximè prodesse ius  
galli veteris creditur, tanquam terrestres subsident, atque  
in percolatione reiiciuntur, viscidæ ac glutinosæ, crassæ,  
tum & præpingues ex cute, pedibus, alarum extremis,  
musculosis denique & neruosis partibus, prouenientes,  
maximè remanent. Qua de causâ non solum non adiuua-  
re materiæ ex pectore excretionem, sed crassiore & visci-  
diore materia & antecedente & coniuncta causâ reddita  
humorem contumaciorem magisque rebellem ad excern-  
endum reddere. Neque etiam quæ cum gallo coquun-  
tur, aliquid prodesse putat. Quæ enim pro soluenda aluo  
adduntur, agaricus, sena, sem. carthami, cum paucissimam  
admittant ebullitionem, vim omnem purgandi perdere  
ex longa coctione; alterantia etiam, ut capill. Vener. &  
alia, cum vires suas in superficie positas habeant, ex longa  
coctione eas amittere; alia, ut origanum, botryn, ex longa  
coctione putrilaginosa euadere.

Verum enimverò hæc, quæ ex Ludouico Septalio pro-  
tuli, non tanta videntur, ut ideo à communi opinione sit  
recedendum. Etenim à multis hæctenus Medicis obserua-  
tum, ius galli decrepiti in asthmate profuisse. Neque re-  
fert, quod Septalius id aliquoties irritò conatu exhibuit.

Incidit enim forsan in asthmaticos desperatos, quibus omnia, etiam efficacissima remedia, frustra adhibentur. Rationes verò, quæ ab ipso afferuntur, etiam quod debent, non persuadent. Quæ ut rectius intelligantur, ius galli decrepiti Bened. Victor. Faurentini, quod allegat, prius proponendum. Ita autem habet eius descriptio:

*℞. Gallum antiquum ad minimum trium annorum, quæ flagellato & multum defatigato, postea decollato, & sine aqua deplumato, ac visceribus mundato, & vino forti cluito, parumque salito: Deinde*

*℞. seminis carthami, anisi, anethi, an. 3. ij. rad. belenij, iridis, fol. hyssop. prassij, an. 3. ℞. glycyrrh. pasul. enucleat. an. 3. vj. tartari albi, 3. j. pulmon. vulpis puluerisati 3. ij.*

Omnibus hisce crasso modo contusis venter galli repleatur, gallusque in aquæ lb. xxx. coquatur, donec caro ab ossibus separetur. Deinde factâ colaturâ cum forti expressione, colatura in frigido loco relinquatur, ut quod sæculentum est, subsideat, pars verò clara separetur & vsui referuetur.

Primò ergò verum quidem est, quod vis iuris galli decrepiti in partibus quibusdam nitrosis & abstergendi vi præditis consistat. Hoc autem falsum, quod Septalius opinatur, illas partes nitrosas subsidere, & postea, tanquam sæculentas, abiici. Etenim terrestres quidem, crassæ, viscosæ ac sæculentæ subsident; nitrosæ autem propriè terrestres non sunt, sed falsæ suo modo, iis quæ claro liquori permiscuntur salis more, non verò subsident. Deinde etsi verum sit, coctione nimia vim tam purgantem quam alterantem dissipari: tamen hoc facile præcaueri potest, si in vase clauso & duplici in balneo feruenti fiat decoctio, & tum minus aquæ, cum nihil absumatur, affundendum. Aut si hac coctione vim omnem ex gallo extrahi non posse, sed coctione in vase aperto opus esse quis existimet, gallus primò solus coquatur, deinde in decocto in vase clauso infundantur vel ebulliantur medicamenta purgantia & alterantia. Pinguedo etiam facile separari potest.

## QVÆSTIO VI.

*An Arsenicum suffimigijs in asthmaticis curandis rectè admisceatur?*

Plerique Medici post Arabes inter suffimigia, quæ ad exiccandas & absumendas reliquias materiæ in asthmaticis adhibent, etiam Arsenicum admiscere iubent: sed quàm rectè, non video. Notum enim est, arsenicum esse summè venenosum. Sunt quidem nonnulli, inter quos etiam Valsus, qui id excusare eo modo volunt, quod in exigua quantitate admisceatur, aliisque medicamentis castigetur, & suffitu eius facultas elicitæ non adeò corrodens, malignaque existat; cùm venenosæ qualitates non in partibus tenuibus, igne resolutis, sed in crassioribus ac terrestribus insint.

Verùm enimverò hoc modo se non expediunt. Primò enim Medici non in parua quantitate arsenici pulverem admiscunt, sed ad pondus omnium. Imò etiam in parua quantitate nocere potest. Deinde thus, myrrha & similia, quæ admiscuntur, venenosam arsenici vim corrigere non valent. Præterea notissimum est Chymicis, etiam fumos arsenici, dum calcinatur, esse summè noxios; nec partes heterogeneæ sunt in arsenico, ut aliæ sint terrestres & crassæ, aliæ volatiles. Nam dum arsenicum calcinatur, in fumos, utpote totum volatile, resolvitur, qui summè venenosi & noxij sunt. Ergo arsenicum omninò in eiusmodi suffimigijs omittendum.

Error verò inde manavit, quod vocabula Sandarax Arabum, & Sandaracha Græcorum, malè confusa sunt. Sandarax enim Arabum, vulgò vernix, gummi iuniperi est, vi eximia ficcandi præditum; vnde Arabes in suffitibus illis, qui ad reliquias humorum in pulmone in asthmaticis absumendas adhibentur, illud rectè præscripserunt. Sandaracha verò Græcorum, arsenicum rubrum est. Cùm ergo, qui in Arabum scripta inciderunt, sandaracen Arabum, & sandaracham Græcorum idem esse putarent;

putarent, malè pro gummi iuniperi, quod Arabum sandarax est, arsenicum, seu sandaracham Græcorum, quæ arsenici species est, substituerunt. Scio equidem nonnullos id probandum suscipere, ipsos etiam Græcos sua sandaracha, id est, arsenico in suffumigiis hisce usos fuisse; & sit, ut obtineant, tamen quibus maligna arsenici qualitas non ignota est, non faciliè eos imitabuntur.

## QVÆSTIO. VII.

*An victus attenuans simulque tenuis asthmaticis conueniat?*

*An victus attenuans simulque tenuis asthmaticis conueniat?*

Mouent nonnulli quæstionem, an victus attenuans asthmaticis conueniat, & in eo soluenda multum laborant. Nam etsi Galenus, in principio libri de attenuante victu, scripserit, solâ victus ratione attenuante, sine vllis medicamentis, difficiles respirationes, arthritides, epilepsias & alios morbos diuturnos se sanasse: tamen in contrarium adducunt Hippocratem, qui 1. aphor. 4. scribit: in morbis longis victum tenuem & exquisitum semper parum tutum esse.


Verum res plana est. Aliud enim *λεπὴ διαίτα*, victus tenuis est, de qua Hippocrates, aphor. allegato: aliud *λεπὴν καὶ λεπὴν*, victus attenuans, vel attenuandi vim habens. Nam, *λεπὴ διαίτα*, victus tenuis, solam victus formam ac quantitatem respicit, cum scilicet ægro cibus coctu facilis, & quidem in exigua quantitate, & minus ferè, quam possit concoquere, offertur: cui opponitur diæta *ἀσθενέσθην*, plenior victus, qui scilicet maiore copia exhibetur: diæta verò *λεπὴ καὶ λεπὴ* solam qualitatem respicit, & victus attenuans est, qui viscidos & crassos humores in corpore extenuat, cui incrassans victus opponitur, qui crassos humores in corpore nostro gignit, ut docet Galenus, loco allegato. Et agunt de tenui diæta cum alibi tum lib. de victus rat. in acut. Hippocrates & Galenus. De victu verò attenuante agit Galenus peculiari libello, de eo conscripto, describitque ibi Galenus cibos attenuantes, quod sensus



sensus mordeant & acres sint, cibosque illos, *lib. alleg.* Galenus enumerat & describit. Et tales cibos asthmaticis viles esse nullum dubium est; an verò victus tenuis conveniat, valde dubium est, cum, ut *aphor. alleg.* Hippocr. docet, in morbis longis parum tutus sit.

Vasculum equidem hanc, quam ipsa linguæ Græcæ proprietas suggerit, solutionem non probat, victumque attenuantem & tenuem re ipsa non differre statuit; idèd, quod victum attenuantem constituentia alimenta, cum tenuia & debilia sint, alimentum copiosum victumque plenum præbere non possint, aut si adèd magna quantitate exhibeantur, ut copiosum nutrimentum æquare valeant, à facultate concoqui non possint.

Verum enimverò diuersa planè victus ratio est, tenuis & attenuans; cum, ut dictum, tenuis victus saltem formam & quantitatem, attenuans qualitatem respiciat. Et diuerso planè fine diætæ tenuis & attenuans instituuntur. Finis diætæ tenuis est, ut natura à coctione morbi ad coctionem cibi non auocetur, idèdque paulò minùs cibi exhibetur, etiàmsi cum aliqua virium iacturâ id fieri videatur. Attenuantis verò victus finis est, ut cibi qualitate humores crassi attenuentur, atque ita, quod forsân medicamentis fieri non poterit, quotidiano cibi usu præstetur. Interim nullo modo in victu attenuante requiritur, ut de consuetâ quantitate aliquid subtrahatur. Et si hoc etià attendendum sit, ut æger eiusmodi cibi copiâ sese non oneret, & plus assumat, quàm concoquere possit. Et omnino victus attenuans non semper tenuis est, & cibi, qui victum attenuantem constituunt, etià diætâ plenam præbere possunt, sicut hoc ex allegato Galeni libro de victu attenuante patet, vbi *cap. 8.* aues montanas, pisces saxatiles, carnem gallinarum, perdicum carnes, quæ victum plenum præbere possunt, in attenuante victu admittit. Idèdque si asthmaticis auiculæ montanæ, perdices, gallinæ ac similes cibi, qui victum incrassantem non præbent, præcipuè cum hyssopò, satireia, thymo & similibus dentur, victus erit is attenuans, non tenuis.



## CAPUT III.

*De suffocatione seu strangulatione.*

*Suffoca-  
tio seu  
strangu-  
lacio.  
Causa.*

**A**D læsam seu potiùs abolitam & interceptam respi-  
rationem pertinet & suffocatio, cuius species est  
strangulatio, de qua aliquid in specie dicendum.

Suffocatur autem homo, cum aër ventilando calori cor-  
dis necessarius non attrahitur, fuliginisque calidæ exspi-  
ratione non emittuntur.

Fit hoc 1. cum viæ aëri attrahendo dicatæ occluduntur;  
quod fit interdum ore occluso seu obstructo, simulque na-  
ribus muco obturatis, vnde interdum Apoplecticis & Epi-  
lepticis periculum suffocationis imminet.

2. Si fauces, præsertim circa laryngem, occluduntur, id  
quod fit in tumoribus muscutorum faucium, laryngis,  
glandularum, columellæ, sicut & in luxatione vertebrarum  
cervicis.

3. Si asperæ arteriæ caput, seu rimula illa, per quam aër  
ingreditur, à re quacunque obstruatur. Et si enim hoc fa-  
cilè non fiat, sed natura ob imminens summum pericu-  
lum per tussim magno conatu omnia talia excutere co-  
netur: tamen si res ita pertinaciter & fixè rimulæ illi in-  
hæreant, suffocationem inducunt. Ita Hadrianum Pon-  
tificem à musca in fauces iouolante suffocatum esse, histo-  
riæ referunt; alióque vix acinis, infantes quosdam num-  
mis seu aliis rebus deglutitis suffocatos esse, ex historiis  
patet. Potest referri huc & suffocatio ab aqua. Quanquam  
Platerus ob defectum aëris eam fieri putet.

4. Ipse quidem asperæ arteriæ ductus non facilè ob-  
struitur, cum sit satis patens: à vi tamen externâ collo  
constricto, vt fit in strangulatione, via omnis spiritui in-  
tercipi potest. Et notabilis est hîc historia, quam in viro  
quodam docto observavi. Is enim cum cerasa comede-  
ret, accidit, vt cerasi nucleus in asperam arteriam incide-  
rèt, & in pulmonem ipsum delaberetur, atque ibi etiam  
quandam gravitatem pectoris excitaret; post aliquod verò  
tempus

tempus accidit, vt nucleum illum pituita tenaci inuolutum cum vehementi tussi reiiceret. Præterea fungorum quorundam esus, vt & alia venena strangulare solent; quod proculdubio fit, cum ob membranam, quam œsophagus habet cum aspera arteria & laryngē communem, laryngis rima contrahitur & coarctatur. Ita ex medicamento sursum ac deorsum purgante ferè suffocatus Vnctor apud Harpalidem, *lib. 7. epidem.*

Accidit etiam in apoplexia suffocatio, cum motu thoracis omni & membrorum respirationi inseruientium læso nulla fit respiratio.

Tandem etiam in catarrho subito & confertim ad pulmones ruente suffocatio fieri potest, qui catarrhus idcirco Suffocatiuus appellatur, de quo, *lib. 1. part. 2. in fine dictum.*

Pertinet huc & aër, qui attrahitur, ventilando calori ineptus & suffocans, qualis est ille, qui è carbonibus accensis exhalat, vt & qui ex cloacis, sentinis & puteis exhalat, cuius rei exempla duo habet Christoph. à Vega, *Artis med. lib. 3. f. 5. cap. 8.* & aliquot etiam Marcellus Donatus, *de hist. med. mirab. lib. 2. c. 6.* Disputatur quidem hac de re inter Medicos, vt etiam, *lib. 1. part. 1. cap. 7.* dictum est, an magis cerebrum, an verò magis pulmones & cor afficiantur. Et quidem Marcellus Donatus, *loco alleg.* cerebrum præcipuè affici statuit. Et negari non potest, cerebrum & spiritus animales affici, vt exempla ab eodem allegata testantur. Quidam enim postea resoluti sunt, quidam delirarunt. Verum nec hoc negandum, organa respirationi dicata simul affici. Aër enim istis fumis infectus calori cordis ventilando ineptus est: cuius rei indicium est, quod nonnulli periculo suffocationis cessante febris correpti sunt.

Pertinet huc & illa suffocatio, cuius Aretæus, *lib. 1. c. 7. & l. 7. c. 7.* mentionem facit, cuius etiam supra, *part. 1. c. 24. de angina* mentionem fecimus, quæ fiat spiritus praua cōuersione ad calidissimum & siccissimum, nulla corporis parte inflammatione laborante. Etsi verò alij aliter hac de re disputent, & in loco illo Aretæi explicando multum laborent: tamen commodissimè mihi explicari videtur,  
 si dica

si dicamus, spiritum sæpè ita esse inflammatum, calidum & siccum, vt ei refrigerando aër externus, qui spiritu attrahitur, non sufficiat. Cui hoc addi potest, quod spiritus ille habere potest prauam qualitatem, & insignem exsiccandi, & constringendi vim, ob quam organa spirationis constringuntur & coarctantur, vt respiratio libera fieri non possit. Similem huic affectum describit Hippocrates, 4. de rat. viſſ. in acut. text. 31. ad 35. cum qua tamen catarhus fuit coniunctus.

*Prognosticum.*

*Prognosticum.*

Strangulati aut suffocati, non tamen mortui, ad se non redeunt, quorum circa os collecta spuma apparet, 2. aph, 43. Non tamen hoc vniuersaliter verum est, vt Galenus, in com. addit: Nonnulli, quibus strangulatis spuma circa os apparuit, sibi sunt restituti, vt etiam duo exempla obseruauit Christoph. à Vega, loco alleg. quamuis id rarè accidat.

*Curatio.*

*Curatio.*

Cùm verò morbi plerique, à quibus istæ suffocationes pendent, suprà cum curatione explicati sint, saltem hic quomodo strangulatis, & aquâ & fumo suffocatis succurrendum sit, dicemus.

*Laqueo strangulati quomodo curandi.*

Qui laqueo penè strangulati sunt, iis laqueo soluto acetum cum pipere, aut pulegium tritum, vel semèn vrticæ cum vino aut mulso, vel aromata cum vino propinanda sunt, & collum lanâ oleo irino calente madidâ, inuoluentum. Possunt etiam commodè exhiberi aquæ epilepticæ, vitæ, cinamomi, & reliqua, quæ ad manum sæpè sunt.

*Ex vaporibus seu fumis suffocati.*

Eadem etiam iis, qui ex vapore cloacarum, puteorum, seu fumis carbonum suffocantur, exhibenda, vt & ea, quæ suprà, lib. I. part. I. cap. 17. sunt proposita.

*Ex submersione in aquâ.*

Si verò ex submersione in aquam quis suffocationis periculum incurrat, is aquâ ereptus moueri debet, & capite deorsum inclinato ac pedibus eleuatis, ac pennâ oleo intinctâ, vel digito ori immisso vomitus prouocandus; vel exhibeatur decoctum hordei, ficuum, glycyrrhizæ, adiecto butyro & saccharo; vel decoctum florum chamæmeli cum cereuisia. Postea verò vinum meracius vel mulsa exhibenda.

da, & etiam aliquæ aquæ vitæ. Simul æger in calido conclavi seruandus, & suffimigia instituenda, sorbitiones quoque decocto farinæ cicerum exhibeantur.

Si suffocatio à fungis venenatis immineat, vomitus statim concitandus decocto raphani cum oxymelite, vel facilis vitrioli 3. β. cum oxymelitis 3. iij. propinanda. Postea absinthium & melissa in vino infundantur, & vinum exhibeatur.

Cùm Pausaniæ puellam, lib. 7. epid. suffocatio ex fungi esu apprehendisset, ei profuit mulsa calida epota & vomitio, balneumque calidum. In balneo fungum vomitione reiecit, & cùm cessatura essent symptomata, sudore de-tenta est.

## CAPUT IV.

## De vitiis vocis &amp; sermonis.

**V**M in homine aër, quem spirando attrahimus, & efflamus, non solum ventilando cordis calori, sed & voci & sermoni formando inferuiat, ordo postulare videtur, vt post respirationis vitia etiam de vitiis vocis & sermonis dicamus.

*Vitia  
vocis, &  
sermonis.*

Non verò omnis sermo vox est, sed qui solum ab animalibus prouenit; & quidem, vt Iulius Cæsar Scaliger, de causis ling. lat. c. 4. definit, est vox sonus ex ore animalis: Sermo verò dispositio vocum articulatarum, ad interpretandum animum. Et omnis vox, vt ibidem, Scaliger docet, est ab animi affectu.

*Non om-  
nis sermo  
vox est.*

Est enim data animalibus ad expressionem voluntatis. Neque tamen omnis vox articulata est, sed multæ voces ab affectu proficiunt, quæ sunt inarticulatae, vt gemitus & sibilus venatorum.

*Vox ani-  
malibus  
cur data.*

Est autem vox articulata, quæ scripto excipi atque exprimi valet: inarticulata, quæ non. Et articulatas voces à brutis non excludit Scaliger; cùm ouium voces adeò clare scribi possint, vt ab ipsis vocabulum apud nos sumptum, balare. Et sit, vt pleræque brutorum voces non sint

*Vox arti-  
culata.*

An etiā  
sit bru-  
torum.

articulata: ad animi tamen affectum significandum com-  
posita sunt, de quo Lucretius, lib. 5.

————— quod secla ferarum

*Diffimiles soleant voces variāsque ciere  
Cum metus, aut dolor est, & cum iam gaudia gliscunt,  
Quippe etenim licet è rebus cognoscere apertis.  
Irritata canum cum primum magna molossum  
Mollia ricta fremunt, duros nudantia dentes,  
Longè alio sonitu rabie distracta minantur:  
Et cum iam latrant, & vocibus omnia complent.  
At catulos blandè cum lingua lambere tentant,  
Aut ubi eos iactant pedibus morsuque petentes,  
Suspensos teneros nituntur dentibus haustus,  
Longè alio pacto gannitu vocis adulant,  
Et cum deserti baubantur in ædibus, aut cum  
Plorantes fugiunt submisso corpore plagas.*

Verùm de humana voce hîc agere nobis propositum est.  
Etsi verò vox ex aëris è pectore effluatione fiat: tamen non  
quælibet effluat vocem parit. Si enim sit illa lenis, saltem sit  
expiratio sine voce, ut verò vox fiat, vehementiore effluatione  
opus est. Neque tamèn omnis vehemens efflatio vox  
est: neque tussis propriè vox nominatur, sed quæ sit anima  
& voluntate dirigente ad sensus animi patefaciendos.

Materia autem vocis est aër, seu spiritus, qui expirando  
emittitur & ad organa vocis alliditur.

Materia  
vocis.

Organa  
vocis.

Organa verò vocis & sermonis formandî quod attinet,  
equidem ad aërem efflandum etiam requiritur pulmo, &  
musculi thoracis, ut & arteria aspera, quæ aëri transitû præ-  
bet: Verùm propria instrumenta vocis edendæ non sunt.

Quod primò ex eo patet, quod si infra caput arteria in-  
cidatur, expiratio quidem fit, sed non vox editur quæ non  
fit, nisi aëre per asperæ arteriæ caput seu laryngem, & qui-  
dem per eius rimulam, emittatur. Atque ita larynx propriû  
& primarium vocis formandæ organum est. Atque ideò e-  
tiam rerum opifex laryngi varios musculos tribuit, ut pro-  
hibitu eius rimula dilatari & constringi possit. De cuius  
constitutione artificiosissima videantur Anat. & inter eos  
præcipuè Hieron. Fabr. ab Aquap. l. de laring. & vocis organ.  
Etsi verò vocis organum primariû sit rimula illa laryngis,

seu γλῶττις: tamen ad vocem articulatam & in primis sermonem formandum non sufficit illa aëris è palmone per rimulam laryngis efflatio, sed præterea requiritur gurgulio, qui vnde plectrum vocis nominatur, lingua, palatum seu oris coelum, quod appellant, dentes. Vnde videmus, si harum partiū aliqua desit, vel vitiata sit, vt gurgulio præfectus, seu erosus, lingua præcisa, seu alio modo vitiata, si palatum vlcere perforatum, si dentes elisi sint, seu inciderint, ex his omnibus vitiis vocem vitari.

*Differentia.*

Sunt autem variæ vocis differentiæ. Aliæ quidem naturales voces, vt sunt magna, seu grandis, & parua, lenis, aspera, acuta, grauis, de quibus non nostri instituti, sed Physici est agere: Aliæ voces præternaturales, cuius etiam differentia multæ ab autoribus recensentur, & ab aliis aliter. Verùm commodissimè voces p. n. secundùm differentias actionum læsarum distinguuntur, quod scilicet vox vel aufertur, vel imminuitur, vel deprauatur. Vocis defectus ἀφασία appellatur, cùm scilicet homo planè vocem edere non potest: qui verò loqui non potest, mutus dicitur: qui difficulter verò loquuntur, δυσλόγοι nominantur. Deprauata verò vox est, rauca, obscura, tremula, abrupta, clāgosa, de quibus postea in causis dicetur. Pertinet huc & Balbuties, & omne illud vitiū, cùm homo sermonē nō facile, & non nisi cū magno conatu, ac crebra hæsitacione inchoare potest.

*Causæ.*

Cùm autem ad vocem & sermonem formandum concurrant larynx, eius musculi, & qui iis inferuntur nerui recurrentes, aspera arteria; & ad aëris efflationem; pulmo, & thorax cum suis musculis, præterea lingua, columella, palatum, dentes necessarij sint; vocis & sermonis læsi causæ in his quærendæ sunt.

*Causæ.*

Primò ergo vocem abolitam & interceptam ac imminutam quod attinet, tollitur, seu imminuitur vox, vel principio neruorum affecto, vel vocalibus instrumentis, vel deficiente vocis materia. Vox & sermo aboleretur ob cerebrum, neruorum principium; affectum in apoplexia, epilepsia, cerebri concussione & commotione; vt & in syncope, & vteri suffocatione ac similibus affectibus, ob quos spiri-

tus animalis influxus prohibetur. In primis verò in affectu illo, qui *ῥῆσι ἐξοχλῶ ἀφασία* appellatur, & neque ad apoplexiam, neque ad epilepsiam commodè referri potest, sed inter eos quidam affectus medius videtur. Quem etsi in praxi sæpè obseruauerim, vt ex historiis annotatis, quas suo loco proponam, patebit, descriptum tamen inuenire hæcenus apud Autores non potui, nisi nuper apud Adrianum Spigelium, lib. 2. de *sem. tert. cap. 16.* his verbis: *Est morbus in Germania & Pannonia frequens, quem Austriaci, Morau, & Styri Timorem appellant, inter apoplexiam, & epilepsiam quodammodo ambi-gens. Cadunt enim velut apoplectici sine sensu, non autem motu priuantur, neque tamen conuelluntur, vt epileptici: aliquando stertunt, nec tamen discusso morbo paralyfin alicuius membri incurrunt.* Si tamen causæ magna sit vehementia, in apoplexiam vel epilepsiam degenerare potest, tandèmq; aliquos hoc modo affectos subitò vt apoplecticos mortuos vidi. Talis *ἀφασία* etiam proculdubio est, quæ fit ex ebrietate, de qua Hippocrates, 5. *aph. 5.* Oritur autem ferè à consensu partium infernarum, & vapore narcotico spiritus animales in cerebro sopiente, seu perturbante, & propterea commodissimè inter affectus cerebri refertur.

Instrumentorum verò vocalium causâ vox & sermo aboletur, seu imminuitur, cùm laryngis membrana madefit, & humectatur ab humoribus à capite defluentibus.

Deinde si laryngis rimula angustior redditur seu occluditur à tumore, & compressione, vt in angina, & luxatione vertebrarum ceruicio fieri solet.

Tertiò, cum muscoli laryngem mouentes, seu resoluuntur, seu vulnerantur, seu contunduntur.

Quartò, vbi nerui vocales, & quicunque voci edendæ inferuientes inciduntur, diuelluntur, interceptiuntur, refrigerantur, aut quocunque modo læduntur. Ita refert Galenus 1. *de loc. affect. cap. 6.* cecidisse quendam ab alto in terram, ita vt dorsi initium affligeretur, eúmque tertio die exiguam admodum vocem edidisse; quarto die omninò obmutuisse, resolutaque simul fuisse crura manibus illæsis, sed neque spirationem amisisse, neque difficulter spirasse. Cùm enim



enim tota sub cervice spinalis medulla esset resoluta, accidit thoraci, ut per septum transversum & musculos supernos numero quidem sex moueretur: quippe nervi ex spinali medulla, quæ in cervice est, ipsis adveniunt. At intercostaliū musculorū nervi, per quos exsufflationem fieri diximus, omnes affecti erant. Cū itaque frustra Medici negotium subirent circa crura quidem ut pote resoluta, circaguttur verò propter vocis affectum equidem, id interdixit, atque affecto duntaxat loco curationem adhibuit, proinde finita tandem spinalis medullæ inflammatione à septima die vox restituta est iuveni, & crura motionis facultatem recuperauerunt. *Ibidem* refert fuisse quendam, qui cū ex cervice strumas in profundo excinderet, ac inter secandum quoddam vas, membranas non specillo secaret, sed vnguibus euelleret, imprudens ob ignorantiam simul nervos recurrentes distraxit, atque hoc pacto quidem puerum liberauit à strumis, sed mutum reddidit. Alium pariter in puero strumas secantem læso altero nervo recurrente, ipsum semimutum fecisse. Similem historiam recitat Amat. Lusit. cent. 2. cur. 70. Mulier Illyrica, inquit, quæ ad caput montis habitat, cū strumam à Gallica scabie originem ducentem in collo haberet, mendicum quidem officio Medici fungentem pro sua valetudine accersivit, qui indiscretè cū pro ea propulsanda multis usus esset medicamentis, ita sublimatum, ut eius refecaret radices loco indidit, à quo alter nervorum ex pectore recurrentium, qui vocem effingunt, inibi corrosus est, unde ipsa paulatim raucescens vocem ferè in totum amisit.

Quintò, si aspera arteria incidatur, etiam vox & sermo perit; cū spiritus voci & sermoni formando necessarius desit: quod etiam fit, si aspera arteria comprimatur, quod fit in stranguatione.

Tandem ob defectum materiæ vox perit, vel imminuitur, vel ut modò dictum, cū aspera arteria vulneratur, aut compressa spiritui transitum non concedit, seu ob thoracis musculos resolutos. Eius rei exemplum habet Galenus, 3. de loc. affect. cap. 1. de quodam, qui nullo in vocalibus instrumentis vitio existente, sed musculis intercosta-

libus ob casum ex alto resolutis, vocem amisit.

Idem fieri potest: si iidem muscoli & membrana costas succingens vulneretur & perforetur. Cum enim tum thorax contrahi non possit, vocis etiam materia, spiritus qui efflatur, deest. Non tamen semper ob musculorum intercostalium læsionem vox tota perit, sed solum cum læsio illa magna est. Aliàs enim pro læsionis magnitudine vox saltè ex parte amittitur. Præterea pulmonis vitio idè euenit, qui si sanie vel humore repletus sit, aut aliàs debilis, vt fit in catarrhis suffocatiuis & tabe, vel valdè imminuitur.

Accidit idem cum pauca fit efflatio, & spiritus deficit, vt in deliquio, syncope, vteri suffocatione. Quia verò ad sermonem formandum etiam lingua facit, sermo etiam ob linguæ motum impeditum læditur, de quo supra *l. i. p. 3. s. 5. c. 7.* dictum. Vnde etiam citra vocis læsionem locutio interdum aboletur; id quod fit in mutis, in priuata resolutione linguæ, qui tamen vocem quandam inarticulatam edere possunt, & fit hoc ob nerui, qui ad tertiam coniugationem tendit, vitium. Quod si magnum sit, & præcipuè si vitium sit à prima conformatione, auditus tum ferè simul, ob illius cum dicto neruo communicationem, læditur, vnde plerique qui sunt muti à natiuitate, simul surdi sunt. Idem accidit si defluxio aliqua & humor in musculos linguam ac larynges mouentes decumbat. Reliqua videantur *loc. alleg.* de motu linguæ impedito.

Causas vocis deprauatæ quod attinet, sunt nonnullæ congenitæ, & à natura quibusdam est vox aspera, quæ cum propterea à nonnullis inter naturales vocis differentias numeretur, saltem de iis vocum differentiis p. n. agemus, quæ à caussis p. n. proueniunt.

*Vox rauca.*

Et quidem frequentissimè accidit vox rauca, quæ fit à membrana, quæ laryngem & asperam arteriam inuestit, p. n. affecta, exasperata, & inæquali reddita. Cum enim aspera arteria læuis facta sit, & si ea benè sese habeat, vox lenis & moderata edatur. Si illa naturalis læuitas & æqualitas tollatur, inæqualiter etiam aër allisus repercutitur, atque inde vox rauca efficitur.

Acci

Accidit hoc primò à nimia humiditate vocis hoc organum irrigante; id quod frequentissimè à catarrho à cerebro delabente, & in organa vocalia irruente accidit, qui in specie branchus appellatur, de quo Hippocrates, 3. aphor. 13. *Aestate sicca & aquilonia, autumno verò pluuioso & australi vehementes capitis dolores in hyemem incidunt, & tussēs, & branchi seu raucedines, & grauedo, nonnullis etiam tabes exspectanda.* Deinde idem accidit à tussi vehementi, qua arteria ob crebram materiæ reiectionem exasperatur; id quod in phthisicis & thoracis suppuratione accidere solet. Idem præstant humores & vlcera vocalium instrumentorum. Vnde luè venerea laborantes vocem raucam habent. Atque hæ causæ internæ sunt.

Externæ causæ sunt clamor nimius & vociferatio, quæ similem affectionem membranæ laryngis & asperæ arteriæ inducunt lassitudini inflàmatorix in musculis. Aër quoque frigidus inspiratione attractus, vt & siccus, venenatus, & vaporibus, fumis, & puluere inquinatus arteriam exasperandi vim habet. Idem præstat potus aquæ frigidæ, vini vel austeri, vel meracioris, nimius cibus & potus falsi, & acres.

Vox obtusa seu tenebricosa & turbida, vt nonnullis appellatur, fit à pituita crassa & viscida, quæ organis vocis adhærescit, vel abscissione columellæ.

Vox tremula fit ex virtutis imbecillitate, cum ob defectum spirituum natura organa respirationis æqualiter mouere non potest; id quod in quibusdam febribus accidit. Interdum idem euenit, vbi in musculos laryngis, seu linguæ & neruos his inseruientes humor aliquis decumbit, partēque illas relaxat quasi; id quod ebriis accidere solet. Fit idem etiam ex timore, cum calore & spiritibus ad cor recurrentibus, tum aliæ partes, tum etiam respirationi & voci edendæ inseruientes iis destitutæ officio suo rectè fungi non possunt: Vnde & qui valdè timent, pedibus & manibus tremunt.

Abruptæ vocis etiam Hippocrates, 4. de rat. vit. in acutis, mentionem facit, quam in lib. de Coacis prænotionibus, effractam nominat. Habet autem ea ortum ex imbecillitate

cillitate facultatis mouentis & organorum, qui spiritus efflationi inferuiunt. Vt enim si is, qui folles, quibus organa musica inflant, mouet, sit debilis, nec æqualiter moueat, sed aliquandiu quiescat, sonus interrumpitur: ita si muscoli; quia aëri, qui vocis materia est efflando inferuiunt, ob imbecillitatem à mouendo aliquandiu cessent, fit vox interrupta.

*Tarda.*

Vox tarda fit cùm humor in spinalem medullam & nervos musculis thoracis inferuientes effunditur. Tum enim facultas supprimitur, vt liberè thoracem mouere non possit.

*Clangosa.*

Vox clangosa est subrauca, sed acuta ferè & sonora, qualem pleraque animalia, quæ collum habent oblongum, vt græcæ, edunt. Habet ortum hæc vox, vt Galenus 7. de usu part. cap. 7. 1. prorrhætic. com. 1. text. 3. & 17. docet, à ficitate nimia laryngis & asperæ arteriæ, & defectu humiditatis, qua naturaliter arteria irrigatur, & quasi læuigatur, id quod fit in febribus ardentibus, & phrenitide.

*Lupi cō-  
spectus  
vitiata  
vocis  
caussa.*

Tandem referunt etiam inter causas raucedinis, & vocis vitiatae lupi conspectum, si is hominem obuium prior adspiciat, quam vulgi opinionem etiam Virgilius secutus est, dum scribit:

—————*Vox quoque Mærin*

*Iam fugit ipsa: lupi Mærin videre priores.*

Vnde etiam habet ortum prouerbiū: *Lupus in fabula*; quo vitimur, cùm is, de quò sermo superuenit, & ita in præsentia suâ sermonem interrumpit: de quo varij variè disputant, & alij aliam huius affectus causam reddere conantur. Verùm prius hic *τίδεν*, & an sese res ita se habeat, quam *τίδέν* inquirendum censeo.

*Causa  
sermonis  
vitiati.*

Eisdem ferè ob causas sermo & locutio vitatur:

1. Quidem ob instrumentorum vocalium & laryngis præcipuè vitium. Nam si vox sese non benè habet, nec sermo benè se habet, de cuius causis modò dictum.

2. Propter motum linguæ impeditum, de quo suprâ, p. 1. huius libri cap. 9. diximus.

*Balbu-  
ties.*

3. Ob labiorum, dentium, palati vitium.

De Balbutie & blæsitae eiusque causis agit Gal. & alij autho

authores, ad aphor. 32. sect. 6. & docet Galenus, quod *ψαλλειν* & *αεωλιζειν* non vocis, sed linguæ vitium sit, cum scilicet lingua eas voces, quæ per T & R scribuntur, articulatè proferre non potest. Idque accidere, quia lingua sit molliore ac humidiorè temperaturâ ac constitutione: quam ob causam pueri balbutiunt; cùm musculi molliores & infirmiores linguam satis stabilire non possunt, eo modo, vt in ambulando titubant. Inde etiam ebrij balbutiunt.

*Signa diagnostica.*

Vox & sermo ac locutio læsa, & quodnam vitium sit, facile ab audientibus cognoscitur. Causæ verò signis cognoscendæ. Et quidem externæ facile ex relatione ægri atque adstantium cognoscuntur. Internæ etiam suis signis patefunt. Si rauco do sit à catarrho, is adfuit, vel adhuc adest, qui facile patet. Si à phthisi seu pure & sanie in pectore contenta, & tussi crebrius reiecta rauco do oriatur, etiam signa eius aderunt. Ita etiam aliarum causarum, à quibus vox seu aboletur, vel imminuitur, seu deprauatur, signa in morbis, à quibus illa pendent, explicantur.

*Signa  
vocis &  
sermonis  
vitiati.*

*Prognostica.*

1. Rauco do orta à causis externis seu euidentibus facilius curatur, quàm quæ à causis internis sit.

*Prognostica.*

2. Branchi & coryzæ in valdè senibus coctionem non admittunt, 2. aph. 40.

3. Vocis vitium, quod fit à columellâ abscissâ vel erosâ, lingua mutilatâ, dentibus elisis vel elapsis, nisi factitij substituantur, non curatur.

4. Ita & motus linguæ inhibitus à ruptione vel contusione nerui non sanatur.

5. Rauco do per annum vel duos confirmata, vix sanatur.

6. Impeditus motus linguæ in pueris superueniente adolescentiâ & iuuentute interdum cessat, absumptis & exsiccatis superfluis humiditatibus.

7. Balbi alui profluuium maximè corripuntur, 6. aph.

32.

8. Rauco dines, quæ ob suppurationem vel tabem sunt,

ferè mortem futuram indicant.

9. Cum voce tremula alui præter rationem solutio in morbo acuto lethalis. Cum enim vox tremula fiat ex insigni debilitate virium, si alui profluuium accedat, vires magis deiicit.

10. Voces clangosæ malæ, & vacillatio mentis cum voce clangosa, linguæque convulsiones cum tremore, & voces ipsæ obmutescences mentis alienationem significant. *In Coacis.*

11. Vox effracta ex hypercatharsi ob musculorum thoracis convulsionem periculum portendit.

12. *A'φωvία* cum singultu pessimæ, *1. prorrh. com. 1. text. 23.*

Plura ex voce vitia in febribus prognostica videantur apud Hippocratem, *in Coacis prænot. & libris prorrhetic.*

*Curatio raucedinis.*

*Curatio raucedinis.* Cum vocis & abolitæ & diminutæ ac deprauatæ varæ causæ sint, etiam curatio varia pro causarum varietate instituenda. Cum autem morbi illi, à quibus vocis & sermonis vitia pendent, iam ante explicati sint, pauca hîc dicenda restant.

Etenim si cerebri vitio malum hoc accadat, curatio ex iis, quæ *lib. I. de apoplexia & paralyfi* explicata sunt, patet.

Cæterum quoque supra, *lib. I. cap. 9. de linguæ motu* impedito, eiusque causâ & curatione actum. Dictum *ibidem* de faucium & dentium morbis: *parte verò secunda*, de asperæ arteriæ, pulmonis & thoracis morbis. Quos qui curauerit, simul & vocis & sermonis vitia, quæ ex iis morbis pendent, tollet. Ideoque saltem quædam de raucedinis curatione hîc adiiciemus, cum vox obtusa & similes eandem ferè curationem habeant. Vox verò clangosa, cum ferè cum febribus acutis coniungatur, ab earum curatione & huius mali curatio dependet.

*A catarrho.* – Primò ergo si raucedo à catarrhò dependeat, irrigante & inæqualia reddente vocis organa, primò danda opera, ut catarrhus remoueat, quo præsentē vix raucedo tolli potest. Qua ratione autem catarrhus curari debeat, dictum, *lib. I. par. 2. c. 34.*

Deinde

Deinde danda opera, vt aſperitas & inæqualitas à catarrho inducta tollatur, & præcaueatur, ne, ſi catarrhus adhuc fluat, ab eo amplius vocis organa exaſperentur; quod præſtant medicamenta Arteriaca ab uſu dicta.

Si ergo catarrhus ſit frigidus & tenuis, medicamentis calefacientibus, ſiccantibus & lenientibus opus eſt, vt diatrachantho calido, melle roſato cum ſyrupo myrtino mixto, ſucco glycyrrhiz. amygdalis dulcibus.

Si verò materia ſit craſſa & viſcida, incidentia, abſtergentia, ſimulque lenientia & vocis instrumenta læuigantia requiruntur; quæ parantur ex caricis, uis paſſis, melle, hyſſopo, glycyrrhiza, ſucco braſſicæ cum melle mixto, thure, myrrha, croco, terebinthina, ſaccharo penidio, cubebis cum paſſulis tritis mixtis. Et ſi pituita ſit viſcida, etiam oxymel ſcilliticum admifceri poteſt. Conuenit etiam hîc lohoh ſanum & expertum, de althæa, de pino, de caulibus, ſyrup. de glycyrrh. de hyſſopo, pilulæ ſeu trochiſci de benzoë.

Vtile etiam eſt & ſequens eclegma.

℞. Succ. praſſij bene depurati ℥.ij. ſacch. penid. ℥.j. oxymel. ſ. vel ſi maiori incifione opus ſit, ſcillit. q. ſ. F. lambile.

Vel ℞. pomû, & ſeminibus exemptis repleatur myrrha, croco, thure, & aſſetur, àc manè & veſperi comedatur.

Vel ℞. Succ. glycyrrhiz. ℥.℞. croci, ℥.j. myrrh. thuris, an. ℥.j. ℞. gummi tragacanth. Arab. an. 3. iij. carnis trium daſtylorum, vini dulcis q. ſ.

F. pilulæ ſub lingua tenendæ.

Matthias Lobelius ſyrupum de eryſimo, quod laudatiſſimum arteriacum nominat, commendat, ſcribitque ſe eius uſu iuuenulam, decennali raucedine laborantem curaffe, & alios diuturna & prope inuiſta raucedine laborantes eryſimi uſu reſtitutos fuiſſe.

Syr. de  
eryſimo.

℞. Eryſimi totius recentis M.vj. rad. helenij, tuſſilag. ſucco adhuc prægnantium. glycyrrh. an. ℥.ij. borrag. cichor. capill. Ven. an. M.j. ℞. flor. cordial. anthos, ſtach. vel beton. an. M.℞. ſem. aniſi, 3. vj. paſſul. mundat. ℥.ij. Coqu. in ſ. q. aq. bordei, & hydromelitis, & ſucci eryſimi, ℥.vj. ad lb.ij. vel iij.

Colaturæ adde sacchari q. s. Fiat syrupus.

Vel ℞. Rad. glycyrrh. alibæ, an. ℥. iiij. ireos, fol. erysimi, M. iij. tussilag. prassij recentium, an. M. iij. sem. psyllij, cydonior, an. ℥. β. iuiub. N. xij. passul. enucleat. ℥. ij. cubebar. 3. j. β.

Coquantur, & cum f. q. sacchari. Fiat syrupus.

Quod si catarrhus sit calidus & tenuis, frigida incrassantia & lenientia requiruntur, vt diatragacanth. frigid. conferua rosar. viol. diacodium, syrup. & lohoh de papauere, Syrup. rosar. violar. de iuiubis, myrtinus.

*A pure.*

Si à pure in pulmone contento raucedo ortum habeat, ad morbum quidem præcipuè curâ dirigenda; simul tamen lenientia & læuigantia asperam arteriam modò enumerata vsurpanda.

*A caussis externis.*

A caussis externis fit raucedo, iisq; siccantibus & calefacientibus. Leuiter itaque refrigerantia & lenientia vsurpanda, vt diatragacanth. frigid. conferua rosar. viol. syrup. & lohoh de papau. de iuiub. & similia.

Si ab aëre, potu vel aliâ causâ frigida, calefacientia, modò in raucedine à pituita proposita, vsurpanda.

Tandem si à nimia vociferatione, clamore & vocis intentione fit excitata raucedo, conueniunt hîc medicamenta Arteriaca dicta, quòd scilicet peculiariter asperæ arteriæ & laryngis affectibus conueniunt. Parantur autem ex amylo, tragacantha, gummi Arabico, glycyrrh. sacchar. cando & penidio, passulis, dactylis, iuiubis, sebesten, amygdal. dulc. mucilag. althææ: vnde fiunt syrapi, iuiubinus, capill. ♀, de althæa, de glycyrrh. & similia.

Vel ℞. Mucilag. sem. althææ, ℥. j. β. conferua viol. ℥. iiij. amyli, ℥. ij. sacch. in aqua rosar. solut. q. s. F. Lohoh.

Vel ℞. Tragacanth. gummi Arabic. an. 3. j. syrup. iuiub. viol. an. q. s. mucilag. sem. althææ 3. ij. F. Lohoh.

Atque hæc in primis in principio conueniunt. Vbi raucedo iam imminuitur, vt humiditas in parte relicta absumatur, exsiccantibus, discutientibus & extergentibus, sed sine acrimonia, opus est. Qualia parantur ex terebinth. melle, amygdalis amaris, iride, styrace, croco, myrrha.

Vt ℞. Gummi iuniper. tragacanth. an. 3. ij. sacch. penid. 3. j.



3.j. succi glycyrrh. 3. ij. thuris, 3.j. B. styracis, calamitæ, 3.j. croci, 3.j. cum melle. F. eclegma.

Vtile etiam. est eclegma de succo brassicæ antea propositum.

Vel 2℥. Hord. excoct. pass. enucl. an. 3.j. glycyrrh. 3. ij. caricar. ping. N. vj. capill. Veneris, byssop. an. M. j. sem. brassic. 3. j. pinearum non rancidarum, 3. B.

Coquantur in l. q. aquæ puræ.

Colaturæ pro qualibet libra adde mellis despumati, sacchari albi, an. 3. vj.

Misce, de quo sæpius aliquid bibendum.

Plura videantur apud Galenum, 7. de compos. medic. sec. loc. cap. 1. Aëtium, tetrab. 2. serm. 4. c. 51. & 52.

## C A P V T V.

### De Tussi.

**A**D deprauatos organorum vocis respirationis motus *Tussis*. tussis quoque pertinet, atque inter eos motus est tussis, qui quidem à naturâ fiunt, irritatâ tamen & coactâ, atque à causâ morbificâ stimulata ad expellendum id quod molestum est, cuiusmodi motus habetur oscitatio, pandiculatio, sternaatio, singultus, ut docet Galenus, lib. 2. de causis sympt.

Est nimirum tussis motus deprauatus seu vehemens efflatio, à veloci pulmonis & thoracis contractione edita, ut *Definitio*. id, quod spirandi organis molestum est, excutiat. Seu ut Avicennas definit: Tussis est motus Naturæ, quo conatur expellere, quicquid lædit, è partibus pulmonis, & partibus proximis pulmonum. Sicut enim in sternutatione cerebri, in singultu & vomitu ventriculus: ita in tussi thorax insurgit, & plurimò spiritu in pulmonem immisso, forasque iterum celerrimè exploso, atque impetu quodam id, quod molestum est, expellere conatur. Etenim aspera arteria, & eius ramuli per pulmonem sparsi tunicâ intus obdu

obducti sunt, cui exquisita vis inest sentiendi ea, quæ molestiam pulmoni creant, ita ut minimum quodque in asperam arteriam illapsum statim sentiat. Atque ita tussim nihil excitat, nisi quod hanc membranam, quæ intus asperam arteriam, eiusque ramos inuestit, afficit. Sic igitur irritatus pulmo non solum ipse mouetur, sed & in auxilium musculos thoracis & diaphragma sibi adsciscit, & quod sibi molestum est, expellere nititur.

*Causse.*

*Causse.*

Atque ita causa proxima tussis est, quicquid pulmones, asperamque arteriam, & quidem membranam, qua intus inuestiuntur, afficere potest. Quæ autem id præstant, causæ sunt variæ, ut mox dicemus. Ad duo tamen genera referri possunt. Vel enim hoc præstant, quia angustiam in respirationis organis pariunt, vel quia mordicant, asperitatemque inducunt, atque adeo quocunque modo molestæ sunt.

Causas verò omnes tussis, seu angustiam pariendo, seu irritando quocunque modo id præstent, in classes quasdam digeremus, & ordine enumerabimus.

Et 1. inter causas tussis est intemperies, & quidem sola ac sine materia etiam tussim excitare potest, sed leuiorem, quam quæ est cum materia. Et frequentissimè quidem & maiorem tussim parit intemperies frigida, utpote quæ pectori maximè inimica est, quæ excitatur ab aëre frigido, de quo Hippocrates, 3. *aphor.* 23. *Hyeme morbi laterales, pulmonis inflammationes, rauedines, tusses fiunt; & ibidem aphor. 5. Aquilo tusses mouet: potu aquæ frigidæ, & præcipuè ex niue solutâ, medicamentis frigidis seu assumptis, seu thoraci applicatis. Excitat etiam tussim intemperies calida, sed minorem, qualis est, quæ febribus ardentibus superuenit, quæque, ut est apud Hippocratem, 6. *epidem. sect. 2. text. 24. est arida & parum irritans, & quæ non fit, nisi quando loquitur aut hiat.**

Quando autem non loquuntur neque hiant, non tussunt. Siccitas autem præcipuè cum frigiditate coniuncta exasperando & irritando tracheam tussim excitat. Hinc, ut Hippocrates, 3. *aphor. 5. scribit, Aquilo tusses mouet*

mouet fauces exasperando, & vt Paulus Ægineta, *lib. 3. cap. 28.* docet, in Aquilonaribus constitutionibus non pauca, neque contemnendæ tussis fiunt. Humiditas autem, vt qualitas minimè omnium actiua, & quæ potius lenit, quàm exasperat, vix tussim inducit; nisi forsan inæqualiter primùm inducatur, vbi breuiter leuissimam quandam tussiculam excitare potest, quod tamen rærum. Et dictum est suprâ de causis, quæ intemperiem pulmonis inducere possunt.

Deinde tussim excitat materia quæcunque in pulmonem & asperam arteriam incidit, aut in ea præter naturam continetur. Materia autem hæc varia est, catarrhus nimirum à capite defluens, atque ita omnes causæ, quas suprâ, *lib. 1.* catarrhum excitare posse diximus, etiam tussim excitare valent: vt & humor aliquis in cerebro collectus, qui per accessiones febrium mouetur, & à calore febrili funditur, de quo Hippocrates, *in Coacis: Qui circa accessiones tussunt, & leniter resudant, malignè habent.* Et, *ibidem, ex insania in raucedinem cum tussi sit abscessus.* Sicut & materia parotides excitans: de quo idem Hippocrates, *eodem libro, & in prorhet. Abscessus ad aures soluunt tussiculæ cum sputationibus.* Idem efficit sanguis è vase in pulmone rupto fluens, vel è vicina aliqua parte vulneratâ vel erosâ in pulmones irruens. Item humor in pulmone collectus in phthisi, peripneumonia, & vomica pulmonis, vel aliis vicinis partibus communicatus, vt in pleuritide & hydrope pectoris fieri solet. Pertinent huc & grandines, calculi, ac vermiculi in pulmone geniti. Idem præstant etiam res externæ in tracheam illapsæ.

Cùm enim spiritu, quem trahimus, diu carere non possimus, organa, per quæ ille admittitur, vacua esse decet, Ideoque ne aliqua substantia præter aërem in asperam arteriam eiusque ramos per pulmones dispersos ingrediatur, caput asperæ arteriæ epiglottide, seu operculo quodam Creator sapientissimus muniuit, vt sic quidem aëri ingressus pateat, à cibi verò potusque pondere depressum esculentis & potulentis aditum de-

neget,

neget, vt Galenus, 4. *de usu part. cap. 3.* docet. Quod tamen si fortuitò fiat, vt interdum inter loquendum & ridendum, & infantibus inter lac sugendum accidere solet, periculum suffocationis inde imminet, à quo vt natura sese liberet, vehementissimam tussim excitare, nec prius desistere solet, quàm omne id, quod molestum est, excusserit.

Tertiò inter causas tussis est soluta vnitas vasorum in pulmone, siue illa sit vulnus, siue vlcus & erosio.

Quartò excitatur tussis, dum in pleuritide materiæ aliquid ad pulmones mittitur, vel ob membranarum consensum pulmones irritantur. Pertinet huc & diaphragmatis inflammatio & tubercula in spina enata, quod gibbis familiare est, teste Galeno, 6. *aphor. 46.* Imò ipsa luxatio vertebrarum dorsi.

Ex quibus omnibus colligitur, tussim propemodum omnium thoracis & pulmonis morborum symptoma inseparabile esse, vt pleuritidis, peripneumoniæ, vomitæ pulmonis, sputi sanguinis, phthisis, & similibus.

Causæ verò extra pulmonem & thoracem consistentes, & quæ ita per *sympliciter* tussim efficiunt, etiam variæ sunt.

Quintò nimirum tussis excitatur epate, liene, ventriculo intumesciente aut inflammato, vt & in hydrope, siue id fiat, quod pulmo comprimitur, siue quod obstruitur, aut molestat à materia ad pulmonem redundante, siue quod partium vicinarum membranæ affectæ membranas organorum respirationis in consensum trahunt & vellitant, siue quod vapores aliqui ad organa respirationis transmittuntur, eaque siue obstruunt, siue mordicant, id quod etiam interdum in febribus accidere solet.

Externæ tandem causæ etiam variæ sunt.

Sextò enim præter aëris intemperiem, vt & potus ac medicamentorum qualitatem, quæ asperæ arteriæ intemperiem inducunt, tussim excitare valent causæ aliæ quoque externæ, irritando & exasperando nimirum asperam arteriam, vt fumus, puluis, & vt Auenrhois, 3. *coll. cap. proprio* monet, præcipuè puluis ex lino, dum pectinatur, & ex veteri tritico, dum cribro excutitur. Puluis item & vapor calcis

Exter-

na.

calcis, & metallorum ac mineralium. Quò pertinent austera, acida, adstringentia, pingua & rancida præcipuè, vt nuces & oleum rancidum. Vocis item intentio nimia. Referendi huc & lumbrici ac vermes in intestinis & ventriculo geniti, qui ipsi etiam tussim excitant, vapores, vt nonnullis placet, putridos & malignos ad pulmones mittendo, vel, quod probabilius est, membranam œsophagi vellicando, quæ membranam asperam arteriam inuestientem in consensum trahit. Profundior etiam styli purgatorii in aures immissio tussim excitat, communicatâ scilicet hac irritatione trachæ per neruulum quinti paris vtrique parti communem.

### Differentia.

Primò est tussis differentia secundùm magnitudinem. Nam datur tussis quædam planè exigua, aut potius ad tussendum quidam impetus, & tussendi initium, quod Græcis *κέρχυν* dicitur. Vt enim vomitum nausea præcedit, ita tussim *κέρχυν*, vt docet Galenus, 2. de differ. sympt. cap. 4.

Difference-  
rentia.

Deinde tussis alià est arida & sicca, quæ *ἀνίσχυς* facit, nec pituitam citat, vt Celsus, lib. 4. cap. 4. habet: alià verò humida. Sicca seu arida est, in qua nihil exspuitur, atque fit hoc, vel quia causa, quæ tussim excitat, non in organis respirationis hæret, vel licèt ibi hæreat, inepta est ad excretionem. Prius accidit, cum aspera arteria vel intemperie afficitur, vel exasperatur, vel membrana asperam arteriam & eius ramos inuestiens vellicatur à vaporibus ab inferioribus ascendentibus, siue comprimitur, aut à vicinis membris affectis in consensum trahitur, vel tenuis paucúsque humor à capite destillat, aut aliunde transsudat, vt Galenus, 4. aph. 37. docet.

Posterius verò accidit, vbi in respirationis instrumentis humor hæret, qui eiici non potest, vel quia ob lentorem & crassitiem bronchii pulmonis nimis tenaciter adhæret, vel quia ob tenuitatem inter eiiciendum disploditur à spiritu, vt & in pulmonem relabatur, vt Galenus, 1. epid. comm. 1. text. 12. docet. Humida tussis est, quando humor aliquis tussiendo eiicitur, atque oritur ab aliqua

mediocris consistentiæ materia pulmones & tracheam irritante, quæ cum spiritu tandem expellitur.

Tertiò tussis aliqua vehemens est, quæ suppressi nequit; alia mitis. Vehemens Hippocrati, 2. aphor. 17. & 24. *ἰσχυρά* nominatur, atque oritur ab humore magna vi destillante, vel vlcere organa respirationum obsidente, vel ab abscessu genito ibidem, vel ab empyemate.

Mitis fit ab intemperie organorum respirationis; vel ab asperitate faucium & tracheæ, vel à puluere, & aliis expectantibus, vt & ab ambiente aëre, vt docet Galenus, 6. *epid. comm. 2. aph. 24.*

Quartò tussis quædam frequenter molestat: & fere continuò ægrum affligit, quædam per certa intervalla corripit, prout causâ tussim excitans nunc semper præsens est, nunc per intervalla colligitur & recurrit.

Verùm præcipuæ & ad curationem maximè cognitiuæ necessariæ sunt differentiæ, quæ à causis desumuntur. Id eoque secundùm causarum differentiam postea etiam curationem in certa quædam capita distinguemus.

#### *Signa diagnostica*

*Signa.*

Tussis ipsa aded evidens symptoma est, vt signis ad eius cognitionem opus non sit. Verùm cum causæ, à quibus excitatur, variæ sint, omninò signis opus est, quibus illæ cognoscantur, ne Empeiricorum more cum ægri damno cuiuslibet tussi quoduis remedium applicetur. Signa ergo causarum, vt supra eas recensuimus, explicabimus.

Ab intemperie nuda primò si sit tussis, abest catarrhus, alijque morbi, qui materiam tussis causam suppeditant, vel etiam in consensum pulmonem trahere possunt: contra præcesserunt causæ, quæ intemperiem aliquam pulmonis inducere potuerunt, quæ ipsæ etiam, *hoc capite*, & *suprà, part. 1. huius libri*, de intemperie pulmonis enumeratæ sunt. Adest difficultas spirandi, tussis ipsa est sicca, nec ita vehemens & pertinax, facillè quoque suppressitur.

Qualis autem intemperies sit, causæ inprimis, quæ præcesserunt, vel adsunt, indicabunt, iuvantia item & nocentia. Etenim si à frigiditate solâ sit tussis, cohibito spiritu non solum reprimitur, sed & sanatur. Auctus enim

cum

tum in organis respirationis calor intemperiem illam corrigit, ægrotique aliis etiam calidis, vt potu & cibo, iuuantur, frigido offenduntur. Ideoque ægri calidum ærem amant, & linteolo manibus, & ori admoto, spiritum trahunt, ne mox frigido æris impulsu tussis irriteretur, vt hac de re scribit Galen. 6. epid. 2. com. 1. 24. Sitis etiam abest in hac intemperie.

Contrà si tussis sit ab intemperie calida, sitis molesta est, quæ potius æris frigidi inspiratione, quàm potu frigido sedatur, vt docet Galenus, art. med. cap. 64.

A catarrho tussis proueniens, è signis catarrhi supra lib. 1. propositis, patet, tussisque est vehementior & perseuerans. Si verò absque catarrho à materia in pectore contenta tussis concitetur, aderunt morbi tales, vt pleuritis, peripneumonia, empyema, phthisis, grandines, calculi, vermes, hydrops pulmonis, & similes morbi, in quibus materia tussim excitans colligitur, qui suprà, part. 1. huius libri explicati sunt.

Quæ tussis quibusdam interuallis, vt bis terte anno affligit, ex irruente destillatione proficiscitur: quæ verò continenter, aut minimâ intermissione fatigat, aut vitiosam pulmonem affectionem, aut obstructionem veterem, aut aliam stabilem intus causam habet.

Si verò asperitas à causis externis inducta sit, vt à fumo, pulueribus, cibis vel medicamentis exasperantibus, illæ per se patent. Si tandem morbi extra thoracem, pulmones in consensum trahendo quocumque modo, tussis causa sunt, vt hydrops, ventriculi, epatis, lienis tumores & inflammationes, affectus illi ex suis signis patent.

*Prognostica.*

1. Tussis frequens & diuturna plerumque ad sanguinis sputum perducit, teste Auicenna, propter vehementem thoracis motum, à quo ruptura vasorum pulmonis metuenda est; ac præsertim in adultis, quorum membra duriora concussionis violentiæ non ita cedunt. Quod si materia tussi non eiiciatur, intus putrescens vel febrem putridam aut hecticam gignit, vel vlcus excitat. In prægnantibus talis tussis abortum ciere solet.

2. Tussis vehemens interdum suffocat, non tam re aliqua obstruente, quàm iteratâ sine intermissione validâ efflatione, & quod aër inspiratus prius quàm ad cor perveniat, è pulmone mox iterum eliditur.

3. Tussis valida pectoris pulmonisque partes calefacit, ideòque febrem accendit, & sitim auget. Quæ verò exiguæ tusses sunt, ac per longiora intervalla excitantur, tantisper membra illa concutiunt, donec ab ea humiditas aliqua irruens deferatur, quo fit, vt ægri intus siticulosi reddantur. Galenus, 6. *epid. text. 24.*

4. Tussis caput nihil iuvat, Galenus, 2. *de sympt. causis cap. 4.* ac si violenta fuerit, ipsum replet, 6. *epid. s. 3. text. 18.* Neque enim vt sternutatio motum cerebri in expellendo iuvat, sed ipsi potius nocet.

5. Tussis ex intemperie organorum respirationis periculosa equidem non est. Negligi tamen non debet, sicut exemplo docet Galenus adolescentis, qui ex tussi à causa frigida dimidiam heminam sanguinis reiecit, 5. *meth. med. cap. 13.*

6. Tussis ex catarrho periculosior est, quàm ab intemperie nuda, & si frequens ac diuturna sit, ad sanguinis sputum sæpè deducit, teste Avicenna: imò experienciâ, propter vehementiorem thoracis motum, à quo ruptura vasorum pulmonis metuenda est, præsertim in adultis, quorum membra duriora motui violento non cedunt, aut si materia tussi non reiiciatur, intus putrescens vel febrem, vel vlcus, & hinc phthisin generat. Periculosa etiam est tussis, si materia è capite destillans tenuis & acris est. Nam siue retineatur in pulmone, intus putrescens pulmonem erodit & exulcerat, siue eiiciatur, tussis violenta metum affert, ne vas aliquod rumpatur. Galenus, 6. *epid. com. 3. text. 18.* Ideòque diligenter est laborandum, vt destillationes tales acres à pectore auertantur, ne hominem in tabem deducant.

7. Tusses etiam à catarrhis in senibus periculosæ sunt, quoniam in iis non maturantur. 2. *aphor. 40.* & vt Galenus inde rectè colligit, eos vsque ad mortem comitantur.

8. Hydropi si tussis superueniat, malum, 2. *aph. 35.* Serosa enim



enim humiditas ita tum augetur, vt contineri tota in abdomine nequeat, sed pars quædam in thoracem, & asperas pulmonis arterias transponatur.

9. Tussis, quæ ex vicinarum partium consensu oritur, per se periculosa non est, sed sublatis illis morbis earumque causis, tollitur.

10. Tussis à fumo, vel alia causâ asperæ arteriæ inæqualitatem & asperitatem inducente absque periculo est, & ferè causâ ablata cessat.

11. Tusses infantium diuturnæ & vehementes deterri-  
mæ; quoniam respirationem & somnum impediunt. Sæpè etiam ex multâ agitatione febres acutas & epilepsiam excitant. Non rarò denique herniam.

12. Qui gibbi ex asthma & tussi ante pubertatem fiunt, ij statim moriuntur, 6. aph. 46.

13. Tusses in febribus abscessus futuros sæpè præ-  
nunciant, non quod ipsa materia ex pectore ad articulos decumbat, sed potiùs quod febres, quæ tales tusses habent comites, in abscessus terminantur; de quo vide. Hippocratem, 2. epid. s. 2. & Galenum, in com. vbi verba enarrat: *Quæ tussi parùm & nihil notabile reijciebat, ei manus dextra & crus sinistrum resoluta sunt.*

14. Tusses in febribus cum destillatione coniunctis quando exacerbantur, febriles accessiones instare indicant, & aliquando malum significant, vt Hippocrates docet, in Coacis, dum scribit: *Qui circa accessiones tussunt, ac leniter desudant, malignè habent;* ij scilicet, qui vehementer tussunt, ita, vt tussi vehementi vires deiciantur, somnùsque turbetur, vt ex fatigatione magna circa collum & frontem sudare incipiant.

15. Febres cum tussi si solvantur, tussis verò remaneat, recidiuæ periculum minatur.

#### Indicationes.

Ad duo in omnis tussis curatione attendendum, primò ad causam, quæ tussim excitat; secundò ad ipsam tussim. Causæ tussim excitantes cum variæ sint, vt ex iis, quæ de causis dicta sunt, patet, quælibet etiam peculiarem Indicationem suppeditat. Intemperies nimirum per contra-

*Indica-  
tiones.*

ria alteranda; si à catarrho sit tussis, curatio catarrhi modo, *lib. I. descripto*, instituenda. Si à materia citra catarrhum in pectore hærente, vt pure, grandine, vel vermibus fiat tussis, materia illa eiicienda. Si à causâ externâ exasperante tussis proueniat, causâ illa amouenda, & aspera arteria læuiganda. Si à partium vicinarum morbis, & pulmonis seu compressione, seu irritatione fiat tussis, morbi illi conueniente modo curandi.

Ipsam verò tussim quod attinet, etsi, vt alia symptomata, etiam commodissimè tollatur causâ sublatâ, & propterea similis sit tussis, ipsa neglecta à causâ ablatione curationis initium faciendum sit: tamen sæpe tussis tam vehemens est, vt omnem curationem Medicique consilium ad se trahat, & postpositâ causâ, ipsi statim succurrendum sit: id quod sæpe accidit, cùm tussis tam vehemens est, vt ne vasa rumpantur, metuendum sit, aut ne à continuis vigiliis febris accendatur, aut timendum sit, ne in grauida abortus, aut in infante ruptura accadat. Tum igitur danda opera, vt tussis sedetur.

*Tussis, quatenus talis, curatio.*

*Curatio  
tussis,  
quate-  
nus ta-  
lis.*

Cùm verò tussis illa vehemens sit ab asperitate aliqua in aspera arteria, eiusque ramis, & irritatione organorum respirationis, quæ naturam ad expulsionem stimulat, duobus omninò modis tussis mitigari potest; vel asperitatem leniendo & læuigando, vel sensus acrimoniam obtundendo, & quasi sopiendo. Prius præstant paregorica, aut lenientia dicta medicamenta, quæ lentore quodam viarum respirationis asperitatem æqualem reddunt, qualia sunt, lactis omne genus, amyllum, ptisana, oleum amygdalarum dulcium, tragacantha, gummi Arabic. mucilag. sem. cydon, psyllij, syrupus de iuiubis.

Sensus verò acrimoniam retundunt & tollunt papauer, & medicamenta ex papauere parata, vt syrup. de papau. & diacodion; vt & ex opio confecta, quæ somnum inducunt, & sensus acrimoniam obtundunt, qualia sunt, theriaca recens, Philonium Roman. pilulæ de cynoglossa, trochisci de carabe, laudanum opiatum.

*Curatio*

## Curatio tussis ab intemperie.

Quâ ratione intemperies tracheæ & pulmonis curandâ sit, suprà *part. 1. huius libri cap. 1. & 2.* dictum, quæ omnia etiam in hac tussis specie curandâ locum habent. In tussi nimirum ab intemperie frigida aër, in quo versatur æger, sit calidus, spiritus retineatur, ut ab eo pulmones incallescant, cibus & potus sint calidi, atque in primis vtile est vinum generosum subdulce. Exhibeatur succus de glycyrrh. & de hyssopo. Topica pectori applicentur, pectusque inungatur oleo chamæ, lilior. albor. & similibus. Eodem modo intemperies reliquæ curentur, ut loco allegato dictum.

Curatio  
tussis ab  
intem-  
perie.

## Curatio tussis à Catarrho.

Quâ ratione catarrhus seu materia ad pectus ruenis euacuanda, auertenda, deriuanda, intercipienda sit, suprà, *lib. 1. de curatione catarrhi*, dictum. Frustrâ enim in tussi curandâ laboramus, nisi catarrhus eius causa prius sistatur & tollatur. Hic ergo nihil aliud restat, nisi ut dicamus, quid materia, quæ in pectus illapsa est, requirat.

A catarrho

Cum autem materia illa sui euacuationem indicet, compertum quidem est, materiam è pectore etiam per urinam & aluum euacuari posse: verum id rarissime, & in aliis potiùs pectoris affectibus, quàm tussi accidit. Ideoque nullus alius commodior modus est, quàm ut materia in pectus illapsa per tussim reiiciatur.

Medicamenta autem quæ hoc præstant, inæqualitatem & asperitatem leniunt & humectant, & humores ad expulsionem aptos reddunt, viasque disponunt, ut minore cum dolore reiciantur; sopitam item & imbecilem facultatem ad efficiendum per tussim materiam stimulant, quæ medicamenta ἀρτηραιὰ & βροχικά nominantur, quæ tamen pro diuersitate materiæ habent aliquam varietatem.

## Syrupus catarrhalis vel pectoralis D. Cass. Kegleri.

℞. Rad. polypod. ʒ. j. B. glycyrrh. rasæ, farsaræ, an. ʒ. vj. herb. saluia, hyssop. betonic. an. M. ij. prassij, M. j. B. sem. 4. frig. mai. c. cort. conuass. ʒ. B. bombac. ʒ. iij. passular. enucl. ʒ. j. B. sebesten, ʒ. ij. iuiubar. ʒ. j. caricar. N. vij.

Syrupus  
catarr-  
halis  
D. Cass.  
Kegleri.

Bulliant l.a. in aq. hord. ad tertias, Circa finem, add. sol. senæ Alex. s. s. 3. ij. xingib. 3. s. agar. rec. 3. iij. turbiib. gumm. 3. ij.

Huius colaturæ claræ ʒ. lb. iij. postea add. sacch. candi, lb. j. croci, 3. j.

Denuo coq. parum ad fyr. consistentiam.

Vltimò depuretur per resident. & clarificetur.

*Aqua catarrhalis.*

ʒ. Herb. veronic. scabios. an. M. j. Capilli Veneris, byssopi, adianth. nig. fragar. meliss. marrub. an. M. iij. rad. ireos, angelic. eryng. glycyrrh. an. 3. j. myrrhæ, 3. ij. croci integr. 3. ij. piperis alb. 3. j. caricar. N. viij. scillæ præp. 3. ij. 3. ij. passular. min. 3. iij. sem. lini, fœnigraci, an. 3. iij.

Infund. cum spir. vini puriss. lb. vij. aq. fragor. scabios. an. lb. j. aceti vini, lb. j. Distillantur per M. B.

*Curatio tussis à materia calida, tenui & acris.*

*A ma-  
teria ca-  
lida, te-  
nui &  
acris.*

Si ergo materia sit calida, tenuis & acris, post vniuersalia illa præsidia euacuantia, reuellentia, intercipientia, & catarrhum sistentia, vtendum est medicamentis refrigerantibus, humorem incrassantibus, acrimoniam eius obtundentibus, atque omninò eum concoquentibus, & ad mediocrem quandam crassitiem redigentibus, & ad exclusionem præparantibus, arteriamque asperam lenientibus. Cùm enim, vt Galenus, 3. de rat. viñt. in acut. t. 2. ait, aër tanquam manus sit, quæ sursum humores è pulmonibus effert, sputum, vt non nimis crassum & viscidum esse decet, quòdque visci instar organis respirationis adhærescat, ita nec nimis tenue esse oportet. Tenuis enim humor inter tussendum ab aère disploditur, & non eicitur, sed in pulmones relabitur. Galenus, 2. de caus. sympt. c. 4. 6. epid. s. 3. t. 4. de loc. affect. cap. 4. 2. de cris. cap. 10. Talia medicamenta sunt syrupus de iniub. de violis, de papauere, diacodion Montani, mucilago sem. psylli, cydon. succus glycyrrhiz. cum amylo, conserua rosarum & violar. cum bolo Armeno, Emulsio seminis papauer. albi.

*Syrupi.*

ʒ. Hord. M. s. sem. 4. frigid. maior. an. 3. j. papau. albi 3. ij. glycyrrh. 3. j. s. iniub. N. x. Coq. in s. q. aquæ s.

Colat. ℥. 3. x. Add. syr. violar. de iuiub. de papau. an. 3. ij. M. pro 4. dosibus.

Vel ℥. iuiub. sebesten. an. N. xv. passul. 3. ℞. glycyrrh. sem. alt. an. 3. ij. cydon. 3. j. rad. alth. 3. ij. Coq. in aqu. bord. f.

Colaturæ ℥. ℥b. j. syr. viol. de iuiub. an. 3. ij. M.

*Alius syrupus contra tussim.*

℥. Rad. tussilag. glycyrrh. rasæ, an. 3. v. helenij, alth. ireos Florent. an. 3. iiij. fol. malu. cum radicib. capill. ♀. tussilag. an. ℥b. j. violar. veronic. scabios. an. ℥b. ℞. hordei mund. ℥b. j. Ebulliant aliquoties, add. byssop. ℥b. j. sem. malu. cydonior. an. 3. j. fœnicul. 3. j. ℞. ficuum pingu. daçtylor. an. N. iiij. iuiubar. sebesten. an. N. v. vuar. passar. ab arillis mund. 3. j. Decoqu. omnia cum aq. f. ad ℥b. j.

Facta colatura cum forti express. add. syr. de glycyrrh. de iuiubis, an. 3. j. capill. Ven. 3. ℞. sacch. candi albi, 3. j. penid. q. f. Ebulliant ad consistentiam syrupi. Alius :

℥. Rad. glycyrrh. 3. ℞. tussilag. 3. iiij. althææ, helenij, an. 3. j. ℞. herb. capill. Ven. endiu. scabios. an. ℥b. j. fol. tussilag. betonic. byssopi, veronic. an. ℥b. ℞. hordei mund. ℥b. j. ficuum, daçtylor. an. N. iiij. iuiubar. sebesten, an. N. v. passular. sine arill. flor. violar. borragin. cichorij, maluæ, an. P. j. sem. cydon. maluæ, cucumer. an. 3. j. Coq. in aqu. scabios. & tussilag. an. q. f.

Colaturæ ℥. ℥b. j. & 3. ij. Add. syr. de iuiub. de glycyrrh. an. 3. ℞. capill. Ven. 3. j. sacch. cand. penid. an. 3. j. Coq. ad formam syrupi.

*Rotulæ & trochisci sublinguales.*

Sub lingua teneantur rotulæ diatragacanth. frigid. dia- Trochisci  
penid. trochisci bechici albi. sublin-  
guales.

Vel ℥. Boli Armeni prepar. veri, amyli, 3. j. gummi Arab. tragacanth. an. 3. ℞. sacch. candi, penid. an. 3. ij. Cum mucilag. sem. psyll. aq. ros. extract. F. trochisci sub lingua tenendi.

Vel ℥. Confect. diacodij Mesue cum sacch. parat. spec. diatragac. frigid. sacch. penid. an. 3. ij. boli Armeni, 3. ℞. Cum syrupo myrt. aut mucil. tragac. F. trochisci sub lingua tenendi.

Vel ℥. Spec. diatrag. frig. 3. ij. bol. Arm. D. ℞. sacch. in aq. ros. solut. 3. iiij. F. rotulæ.

Pastilli, vel trochisci contra tussim.

℞. Pulu. glycyrrh. el. ʒ. ij. ℞. sem. 4. frig. maj. an. ʒ. ij. anisi, fœnic. an. ʒ. ℞. spec. diapenid. diaireos, an. ʒ. j. sacch. penid. ʒ. j. cum infus. tragacanth. cum aqu. byssopi, F. trochisci.

Ecleg-  
mata.

Eclegmata.

℞. Conseru. viol. nympha. an. ʒ. ℞. spec. diatrag. frigid. diapenid. s. spec. an. ʒ. ℞. succi glycyrrh. ʒ. j. tragacanth. ʒ. ℞. cum syrup. iuiub. F. Lohoh.

Vel ℞. Conseru. rosar. viol. an. ʒ. j. ℞. spec. diatrag. frig. ʒ. j. ℞. bol. Arm. præpar. ʒ. j. Cum syrup. de pâpauer. Fiat Lohoh.

Vel ℞. Mucilag. sem. alth. ʒ. vj. sem. psylli, ʒ. iij. amygd. dulc. pinear. mund. an. ʒ. ℞. sacch. penid. amygd. an. ʒ. ij. spec. diatrag. frigid. ʒ. j. gummi Arab. suce. glycyrrh. an. ʒ. ℞. sem. 4. frigid. maior. an. ʒ. ij. papau. alb. lactuc. an. ʒ. iv. cydon. ʒ. ℞. cum syrupo viol. F. Lohoh.

Narcoticis non vtendum, nisi quando metus est, ne vel vas rumpatur in pectore ex vehementi illo, & continuè affligente tussi, vel vigiliis continuis febris accersatur, virésque deiciantur. Tum enim pilul. de cynogloss. theriac. rec. Phil. Rom. laudan. opiato vti licet.

Extra etiam inungatur thorax hoc vel simili linimento.

℞. Ol. viol. amygd. dulc. an. ʒ. ij. mucil. sem. psyll. cum aqu. ros. extr. an. ʒ. ℞. ceræ albæ, q. s. F. linimentum.

Vbi materia in pectore hærens satis inspissata est, ab huiusmodi remediis cessandum, ne nimio earum vsu crassa reddatur, & ad excernendum ineptior, sed tum ad detergentia accedendum, vt syrup. de glycyrrh. capill. Veneris & similia.

Curatio tussis ab humore pituitoso.

Ab hu-  
more pi-  
tuitoso.

Si à materia frigida & lenta sit tussis, post vniuersalia illa suprâ lib. i. de catarrho, proposita, vtendum est calidis attenuantibus, incidentibus & abstergentibus, vt capill. Ven. byssop. fœniculo, scabiosa, helenio, & aliis pectoralibus calidis, & ex iis compositis syrup. de capill. Ven. de byssopo, de glycyrrh. de prassio, oxymel. simpl. compos. scillitico, cum aqu. byssopi, capill. Ven. prass. scab.

Vt ℞. *Ficuum*, N. x. *glycyrrh. rasæ*, passul. an. ʒ. B. sem. anisi, sænic. an. ʒ. ij. capill. Ven. hyssop. an. m. j. Coq. in aq. pura.

Decoctum melle vel saccharo dulcoretur. Vtile etiam est lohoh sanum & expertum, & de pulmone vulpis.

Ad inueteratam tussim Aëtius commendat mellis, butyri, an. ʒ. iv. cumini pulu. ʒ. j. Melli despumato butyrum admisceatur, simulque calefactis cuminum inspergatur, & ægro delingendum cochlear præbeatur.

Vel ℞. Cumini, piperis, sem. vrtic. an. ʒ. j. Trita subigan- tur cum mellis despumati sextario, & parumper feruefa- cto, reponantur ad vsum, & cochlear delingendum offe- ratur. Laudatur & hoc :

℞. Pulegij, piper. hyssop. calam. an. ʒ. ij. petrosel. ʒ. j. Mellis despumati sextarium. M.

*Aqua pectoralis calida Dorncreilij.*

℞. Rad. Enula, ʒ. j. B. potypod. q. mundi, pimpinellæ, an. ʒ. j. althææ, myrrhid. an. ʒ. B. aristoloch. rotund. ʒ. iij. pæo- Aqua  
nia masculi, decrescente Luna in signo piscium collectæ, ireos pectoralis  
Illyric. an. ʒ. ij. B. zingib. ʒ. j. asparagi, apij, an. ʒ. ij. berb. calida  
capill. Ven. hyssopi, carduiben. veronica, pulmonaria maculos. Dorn-  
an. m. iij. sem. sænugi. sesel. an. ʒ. ij. anisi, ʒ. iij. quatuor. fri- creilij.  
gid. maior. excort. an. ʒ. iv. carthami, ʒ. iij. B. lini, ʒ. ij. flor.  
cordial. an. m. B. ficuum ping. recent. N. vij. passul. maior.  
enucleat. ʒ. ij. dactylor. ping. enucleat. N. xij. iniubar. se-  
besten. an. paria ix. succi glycyrrh. s. q. aqu. scordij dissoluti  
ʒ. j.

Puluerisanda pulueriscentur subtilissime, reliqua verò in- cidantur & cōtundantur minutim & infundant. in aq. scab. marrub. an. lb. iv. sæniculi, betonic. tussilag. cardui Maria, Ni- cotiana an. lb. j. Stent in infusione in loco calido per octi- duum, vase aliquoties singulis diebus agitato, deinde adde mellis passul. Chorinthiac. lb. B. croci Oriental. ʒ. B. M. & de- stillentur igne lentissimo in B. M.

Pro vsu quotidiano in tussi idem Aëtius ficus ficcas, pin- gues in vino dulci meraco madefactas vnà cum vino exhi- bet. Alij ficus ad ignem parum tostas sub noctem deuora- re iubent. Vtile est & hoc.

℥. Succī tussilag. ℥b. β. mucil. sem. vel rad. alib. extrah. cum aqu. hordei ℥. ij. Cum sacch. penid. F. lohoh.

Vtilis est & radix tussilaginis melle condita.

Plura eius generis vide etiam, part. 2. huius lib. cap. 4. de arteriarum asperatum pulm. & apud Galenum, 7. de compos. med. sec. loco. c. 3. & in lib. euporist.

Vt efficacissimum in materia crassissima sequens electuarium commendat Mercatus.

℥. Succī tussilag. ℥. iiij. rad. pulegij, ℥. j. apij virid. m. j. Infundantur in ℥b. j. mellis optimi. aceti ℥b. β. Coq. lento igne & facta expressione adde prædictum succum & sœnugraci sæpius antea loti decoctum pond. ℥. x. Mitbridat. aut the-riaca ℥. j. β.

Porrige summo manè & ante coenam cochl. ij. quibus admiscere potes syr. de præss. de hyssop. lohoh de pino.

Rotulæ contra tussim pro pueris.

℥. Spec. diaireos s. diatrag. frig. an. ℥. j. β. extr. glycyrib. ℥. β. enulæ, ℥. β. sacch. candi alb. ℥. iiij. albi in aqua scabios. dissol. ℥. vj. F. conf. in rotulis.

Extra pectus inungatur hoc vel simili vnguento.

℥. Mucilag. sem. alth. sœnugrac. an. ℥. β. butyri recent. axung. gall. an. ℥. j. bdellij, styracis, an. ℥. β. croc. ℥. β. ol. lilior. albor. amygdal. dulc. an. ℥. ij. ceræ q. s. F. Linimentum.

Tandem reliquæ exsiccantibus & detergentibus absumendæ, vt etiam suprâ dictum.

Detergentia tamen & exsiccantia non sint nimis calida, nec acria, ne dissipata parte humoris tenuiore crassior remaneat. Ideoque Auicennas monet, vt vbi ob pituitæ crassitiem nihil exspuitur, humectantia addantur.

Celsus ouum forbile præbet cum pauco sulphure. Exstat etiam descriptio antidoti diasulphuris apud Serapionem, de antidot. cap. 8. quod ad tussim, sputum sanguinis & asthma commendat; Et apud Mesuen, de antidot. cap. 3. Recentiores flores sulphuris, lac sulphuris & balsam. sulphuris exhibent, cui & benzoën, & eius flores addunt. Exempli gratia:

℥. Flor. sulphur. ℥. ij. spec. diatrag. fr. ℥. j. β. diaireos, ℥. j. croc. ℥. j. ol. anisi, gutt. xii. sacc. in aq. tussil. & scab. diss. ℥. vj. F. l. a. rot. Vel ℥.



Vel ℞. Rad. ireos Florent. Helen. tussilag. an. 3. ℞. benzoës, 3. ℞. flor. sulphur. 3. j. croci. ḡ. vij. cort. aurantior. ʒ. ℞. sacch. albiss. in aq. tussilag. solut. 3. iij. & 3. ij. Fiat confect. in rotulis, instillando spir. terebinth. Pulvis pectoralis, seu pulmoniacus.

℞. Glycyrrh. rasæ, 3. iij. sem. anisi, fœnic. an. 3. j. ℞. spec. diatrag. fr. 3. j. diaireos, 3. ℞. flor. sulphur. ʒ. ij. pulm. vulp. prepar. ʒ. ij. ℞. sacch. cand. alb. 3. j. ℞. F. pulvis.

Ad tussim & pectus roborandum commendantur pulmones animalium, præcipuè vulpis, unde & lohoh paratur, quod in officinis prostat. Item ex pulmone vulpis, addita salvia, hyssop. capill. Vener. & similib. thoracicis aqua destillatur, atque sacchar. dulcorata propinatur. Laudatur & pulmo ceruinus, si cum gula sua exsiccatus in furno & puluerisatus cum melle exhibeatur.

*Curatio tussis à reliquis causis.*

Si verò absque catarrho à materia in pectore contenta *A reli-* tussis excitetur, id quod in pleuritide, peripneumonia, *quis* phthisi, calculis pulmonis fieri solet, curatio è suis locis, *causis.* atque ex iis, quæ suprà de his affectibus dicta sunt, petenda. Ita & reliquæ tussis differentiæ, quæ ab asperitate & inæqualitate arteriæ, vel consensu diaphragmatis, aut irritatione pulmonis in morbis vicinorum viscerum excitantur, qua ratione curandi sint, ex iis, quæ suprà de iis dicta sunt, & suo loco dicentur, patet.

*Dieta.*

Si tussis sit ab intemperie frigida, æger degat in aëre *Dieta* calido, seu naturâ tali, seu arte parato. Utendum cibus calidis & pectoralibus calidis, ac aromatibus conditis. Potus sit vinum generosum, dulce, vel mulsum. Inter bellaria viles sunt pinæ & pistacia. Si ab intemperie sicca sit tussis, humectante diætâ utendum, butyro, oleo amygdal. dulc. cum sacch. malua, borrag. Galenus; 7. de loc. affect. capit. 3. commendat aquæ dulcis tepidæ balneum, scribitque se tragœdos, guttur & asperam arteriam cantu & vocis intentione resiccata habentes hoc modo humectasse & curasse. In catarrho cibi sint dulces, lenientes, & pectus dilatantes; vitentur omnia amara, acrida, salsa, acida, acerbata.

In caussa calida conuenit ptisana hordeacea, malua, emul-  
sio amygdal. dulc. & sem. 4. frigid. maior. Lac caprinum,  
& vaccinum, si febris absit. Potus sit aqua saccharata. In  
frigida caussa vtatur æger calidis vel temperatis. Panis sit  
benè fermentatus, & semine fœniculi ac anisi conditus.  
Potus sit hydromel. Æger temperanter viuat, vitet som-  
num mox à cibo, & diurnum.

## QVÆSTIO I.

*An tussis sit solùm ab angustia tracheæ arteriæ, &  
eius ramorum?*

*An tus-  
sis sit so-  
lùm ab  
angustia  
tracheæ  
arteriæ  
& eius  
ramorũ?*

Plures esse tussis caussas ex superioribus patet. Verumta-  
men in eo omnes conueniunt, quod aliquam pulmonibus  
molestiam creant.

Verùm quo modo, non omnes idem sentiunt. Non-  
nulli quidem omnes illas caussas tussim excitare statuunt,  
quod angustiam aliquam in asperis arteriis pulmonum  
creent. Verùm si caussas, quas suprà proposuimus, consi-  
deremus, manifestum euadet, non solùm angustiam pul-  
monum, sed etiam dolorem aliquem & molestiæ sensum  
in organis respirationis tussim parere, quo modo partes  
membranosæ vicinæ affectæ, ob consensum, quem habent  
cum membrana asperam arteriam intus inuestiente, tus-  
sim excitare solent. Cùm enim membrana hæc sit exquisi-  
tissimo sensu prædita, si vicina aliqua membrana distenda-  
tur, vellicetur vel quocunque modo molestè afficiatur,  
membrana hæc in consensum tracta & ipsa obiectum in-  
gratum & dolorificum percipiens, illud excutere nititur,  
tussimque excitat. Atque id manifestè in tussi ab intempe-  
rie nuda patet, vbi nulla angustia adest, sed sensus sal-  
tem molestus in aspera arteria. Idem etiam ex eo manife-  
stum fit, quod vt suprà dictum, stylus purgatorius auri  
profundius immissus tussim siccam excitat, non angu-  
stiam pariendo, sed saltem ob membranam communem  
asperam arteriam irritando. Idem etiam clarum euadit  
ex similitudine, quam habet tussis cum sternutatione, &  
singul

singultu, quæ symptomata excitantur solummodo velli-  
cando & molestiam pariendo partibus. Idque Galenus  
etiam multis in locis docet, vt 2. de symptomat. causis, ca-  
pit. 4. de different. morbor. capit. 7. Et præcipuè de simpl.  
medic. facult. capit. 13. vbi tussim excitare posse docet om-  
ne, quod asperæ arteriæ molestum est,

## QVÆSTIO II.

An aliquid in pulmonem ex ore delabatur?

Solet & hoc loco hæc controuersia moueri, an aliquid *An ali-*  
ex ore in asperam arteriam illabatur? Nam negare id vi- *quid in*  
detur Hippocrates, 4. de morb. & Galenus 4. de usu par- *pulmonē*  
tium, capit. 8. vbi docet; ne aliqua substantia præter aë- *ex ore*  
rem in tracheam ingrediatur, laryngis caput & rimulam *delaba-*  
epiglottide seu operculo quodam tegi, vt sit obturatum,  
sed non omninò aëri saltem viam concedens, ab ingre-  
dientis cibi, potusque pondere depressum ligula ipsa ma-  
gis conclusum esculentæ, potulentæque substantiæ aditum  
non præbeat. Hinc etià si mica panis, vel potus portiuncula  
inter mandendum, vel loquendum bibendumve ad arte-  
riam asperam deferatur, tussis continua excitatur donec  
excutitur.

Contrà verò in pulmones aliquid effluere ipsa experien-  
tia docere videtur. Testatur enim Hippocrates, in libello  
de corde, si quis sui, vel alteri pecudi aquam cæruleo co-  
lore tinctam sitienti bibendam dederit, deinde statim la-  
ryngem eius sequerit, colore eo infectum guttur inueniet.  
Quod idem Galenus, 8. de placid. in fine, docet. Et vi-  
detur antiqua hæc fuisse sententià, vnde illud Alcæi πύργε  
πύμονας εἰσφύετο γὰρ ἄστρον, ἐπὶ τέλλειαν. Riga pulmones vino, nam  
cuniculæ astrum exoritur. Deinde nisi aliquid in pul-  
monem descenderet, frustra eclegmata, syrupi, tro-  
chisci, & rotulæ sublinguales à Medicis in thoracis  
affectibus præscriberentur. Tandem videmus sæpè mul-  
ta excrementa in pulmonibus subsistere, quæ tamen per  
asperam

asperam arteriam, vt & interdum magna sanguinis copia, sine suffocationis periculo per asperam arteriam reiiiciuntur.

Verùm sciendum, etsi rimula laryngis epiglottide claudatur, quia tamen non exactè clauditur, aut nonnihil laxatur, vbi ea, quæ vtilia sunt, admitti debent, impossibile non est, portionem aliquam potus & medicamentorum in eam fluere; quod si sensim & lentè eat, etiam tussim non excitat. Neque enim respirationis viæ tum angustiores redduntur, vt docet Galenus 8. *de plac. Hippocr. & Plat. in fine*, & 2. *de simpl. medic. fac. c. 17*. Si quid verò in ipsam cauitatem, & quidem confertim irruit, tussim, & si magnum sit, etiam suffocationis periculum tum maximè suboritur, cum laryngis rimula occluditur. Vbi verò res in asperæ arteriæ cauitatem illapsa est, non ita suffocationis periculum timendum; cum canalis ille satis amplius sit, tussis tamen inde excitatur. Et vt modò dictū, si calculi, si pituita crassa, si pus, si sanguis, & quidem sæpè magnâ copiâ è pulmone per asperam arteriam reici potest sine suffocatione: etiam sine eiusdem periculo aliquid in illam labi potest. Notabilis huius rei historia est, cuius etiam suprâ, c. 3. *huius partis*, facta mentio. Anno 1620. vir quidam doctus, cum cerasa arbore decerpta in horto comederet, atque subito in strangulationis & suffocationis periculum cum maxima tussi coniiceretur, nucleum cerasi in guttur illapsum, & tussis & strangulationis causam esse existimans, chirurgum qui illum eximeret, accersuit: verùm cum chirurgus nullum nucleum deprehenderet, & suffocationis periculum cessaret, tussis verò nihilominus perseueraret, in eâ opinionem venit, nucleum nullū in guttur illapsum fuisse, sed hoc symptoma ex catarrho subito & vehemèti prouenisse. Deambulauerat verò in horto tempestate pluuiosa, & aliàs catarrhis valdè obnoxius erat. Durauit ista tussis per tres septimanas, & per interualla quædam ægrum valdè afflixit, quo tempore etiam dolorem quandam grauatium in dextra thoracis parte deprehendebat. Tandem cum noctu vehementer integram horam tussiuisset, nucleum illum pituitæ crassæ adhærescentem tussi reiecit, atque ita tussi liberatus est.

Ad motus deprauatos organorum respirationis pertinet & conuulsio diaphragmatis, quæ plorantibus infantibus accidere solet, cum scilicet ex nimio animi affectu spiritus in lachrymando eò effunduntur, & cum spiritibus aliquid materiæ, quæ neruos ad diaphragma tendentes irritat. Verum cum causâ illa euidenti sublatâ sponte hoc symptoma cessare soleat, de eo nihil amplius hic addimus.

## CAPUT VI.

## De dolore pectoris.

**D**E pleuritide equidem, quæ membranæ costas succingentis inflammatio est, dolorémque insignem coniunctum habet, diximus suprâ. Verum cum alij adhuc dolores pectoris dentur, de iis in genere hoc loco agendum, qui tamen in genere sæpe pleuritidis nomine veniunt. Cum enim membrana costas succingens densissima sit, & exquisito sensu prædita, non solum ipsa primariò afficitur, verum etiam cum vicinorum musculorum membranæ vellicantur & afficiuntur, ipsa faciliè in consensum trahitur, & inde dolor excitatur; imò membranis etiam musculorum externorum affectis dolor oritur, vnde pleuritidis vocabulum hoc modo & in genere pro omni dolore lateris accipitur, & pleuritis alia vera, alia notha est. Pleuritis vera ex inflammatione membranæ costas succingentis oritur, de qua suprâ diximus. Notha verò varias causas habet.

Primò excitatur cum sanguis per ramos venæ axillaris in externa thoracis spatia, & in externos musculos thoracis illabatur; quæ tamen inflammatio ob continuitatem propaginum venarum externarum & internarum sæpè in veram pleuritidem permutatur.

Secundò, dum materia à capite per ceruicem & homoplatas in musculos externos laterum decumbit.

Tertiò, cùm spiritus flatulentus membranas costarum & musculorum thoracis distendit. Atque accidit hoc faciliùs, si vociferatione & labore, tussi, vel alijs motibus muscoli pectoris distendantur, ac flatus eò commoueantur, & si pectus refrigeretur. Vnde sæpe contingit, vt si pectus post validos motus denudetur, & frigori exponatur, subitò tales dolores excitentur, qui quiete & calore mitigantur.

Quartò, quando membranæ pectoris in morbis epatis & lienis mediante diaphragmate deorsum cum dolore trahuntur. Aëtius, *tetrab. 2. s. 4. c. ult.* affectiones cuiusdam meminit, quæ pleuritis non sit; specie tamen pleuritidis fallat, quæ ex victu crudo & crasso oriatur, cùm cumulatus in corpore humor crudus & lentus, subitò in vacuum thoracis spatium, aut in pulmonem ruat, membranisque adhærens dolorem distendendo inferat cum magna spirandi difficultate. Verùm credibilius est, in musculorum membranas humores tales, & præcipuè serosos & acres effundi, quàm in ipsam cavitatem thoracis. Sæpe enim accidere solet, vt serosi, interdum etiam maligni humores ex venis in externos lateris musculos effundantur, & grauissimos sæpe dolores, non tamen diuturnos efficiant, & quidem sine inflammatione. Ita memini infantes aliquot grauissimos dolores in pectore perpeffos esse, antequam morbili erumperent, qui morbilis erumpentibus postea cessârunt. Ita aliquoties obseruaui, ex scabie intempestiuè curatâ pectoris dolores & nothas pleuritides ex falsis & serosis humoribus sine inflammatione excitatas fuisse, sed qui non fuerunt diurni. Idem accidit sæpe in febribus malignis, vt & in scorbuto. Nec solùm humores, sed & vapores hos dolores excitant, vti à vermibus putrescentibus eleuati.

*Signa diagnostica.*

Dolor ipse pectoris per se notus est, & ex ægrorum querelis patet. Cùm verò dolores pectoris à variis causis ortum habere possint, signis eæ discernendæ sunt. Quæ pleuritidis veræ signa sint, suprà de pleuritide dictum. Reliqui verò dolores pectoris & nothæ pleuritides à verâ non difficulter discernuntur.

Nam in vera pleuritide signa omnia pathognomonica, quæ suprà recensuimus, adesse necesse est, quorum si vnum absit, ea pleuritis notha est, non vera. Deinde in notha pleuritide signa omnia, quæ adsunt, sunt ferè mitiora. In notha enim pleuritide febris vel nulla adest, vel mitior adest. Respiratio equidem, si dolor sit vehementior, parua est & frequens; cùm per validam respirationem dolor irriteretur: Non tamen tam parua & frequens est, vt in vera pleuritide. Tussis nulla adest; nisi forsàn aliquid à capite destillet: & nihil cruenti, præsertim tussi, excernitur. Pulsus neque tensionem habet, neque duritiem; dolor neque ad iugulum, neque ad hypochondria sese extendit. Locus manu pressus dolet, inflammatis intercostalibus musculis externis, vel musculis costis incumbentibus. Nonnunquam & tumor apparet, qui suppuratus per cutem erumpit, teste Galeno, 5. de loc. aff. cap. 3. Si à flatu dolor est, vagus est, neque perpetuus, sed per intervalla recurrens.

Si à catharro dolor est, in ceruice & scapulis primùm percipitur, postea in latus descendit, vbi tactu exacerbatur, & versus inferiora descendit, nec in vno loco subsistit. Dolores ab humore seroso plerumque paulò acutiores sunt, sed febris ferè abest, suntque, vagi, & scabies, vel similes morbi præcesserunt, vel adsunt. Si à maligna materia est dolor, febris malignæ signa adsunt. Si à scorbutico, & eius signa aderunt.

*Prognosticum.*

Quid in vera pleuritide præfagiendum sit, suprà de pleuritide dictum est. Reliqui dolores pectoris minus periculosi sunt, & faciliùs curantur.

*Prognosticum.*

*Curatio.*

Et quidem vt aliarum partium dolores commodissimè curantur causâ sublatâ; ita & pectoris dolores. Verùm, quia nullum symptoma est, quod plus ægrum afficit, quàm dolor, in omni etiam pectoris dolore, si is vehemens sit, danda opera, vt dolor mitigetur; quod præstant Anodyna. Hinc Hippocrates, 2. de rat. viñ. in acut. in pleuritide fomentis statim in initio vtitur, aquâ nimirû tepidâ,

*Curatio.*

aut fale & milio torrefactis & sacco conclusis. Hodie plura alia adhuc in usu sunt, ut:

*℥. Fol. malvæ, parietar. branc. vrs. an. M. j. sem. lini, fenugr. an. 3. ij. flor. chamæm. sambuc. an. P. j.*

Coquantur in aqua.

Colatura calida vel spongiâ, vel linteolo triplicato lateri dolenti applicetur.

Vulgatum est hodie decoctum florum chamæmeli cum lacte in vesica pectori applicatum.

Vel *℥. Parietariam*, coqu. in oleo chamæmelino, & loco dolenti applicetur, quod efficacissimum est remedium. Vtilis est & saccus furfure plenus, si in decocto florum chamæmeli prius ebullierit.

Et omninò dolorem sedare vtile. Nam dolore sedato non tantus fit humorum affluxus; cùm dolor fluxioni occasionem præbeat, ut Galenus, 13. *meth. med. cap. 3.* docet. Idèoque ubi vel pleuritis est parua, aut etiam si sit paulò maior, si corpus sit purum, & externa potius causa morbo originem dederit, vel si signum aliquod deficiat, medicumque dubium reddat, an sit vera pleuritis, an verò febris aliqua, cui dolor pectoris ex humore seroso & acris, vel flatu coniungatur, fomentis statim uti licet.

Quibus de causis Hippocrates proculdubio, loco allegato, fomentis uti præcepit, & re ipsa tentavit, 3. *epid. s. 2.* in historia Anaxionis, quod & Galenus, *ibidem*, confirmat. Nam ut solum exploraret fomentis, an dolor fuerit à flatu, non est credibile. Nam dolorem pectoris à flatu provenire, ex febris absentia, pulsu & excreatione nulla agnoscere non difficile est. Si verò certum sit, pleuritidem esse veram, ægrique corpus sanguine abundare, aut vitiosis humoribus refertum esse, ante venæsectionem & purgationem fomenta tutò non adhibeantur. Nam, ut Galenus, 6. *aphor. 1.* docet, fomenta quidem dolorem leniunt nonnihil, aliam tamen fluxionem excitant.

Quod verò causas doloris pectoris attinet, dolor, qui à vera pleuritide venit, qua ratione curandus sit, etiam supra dictum.

Si verò pleuritis sit notha ab inflammatione in musculis



lis intercostalibus externis, aut iis etiam, qui costis incumbunt, vena primò etiam secatur, si cætera consentiunt. Postea fodus fiat ex violaria, parietaria, malua, flor. chamæmel. melilot. summit. anethi, rosis rubris. Vel vsurpetur tale vnguentum.

*℞. Pingu. gallin. butyri recent. an. ʒ. j. pulu. chamæmel. ʒ. j. ol. rosar. amygdal. dulc. ʒ. ʒ. cera q. s. M.*

Vel *℞. Ol. amygd. dulc. violar. lilior. albor. an. ʒ. ij. butyri rec. ʒ. j. pingued. gallinæ ʒ. vj. cera nouæ q. s.*

F. vnguentum.

Interdum inflammatio in cutem erumpit, teste Galeno, 3. de loc. aff. cap. 7. in fine, vbi danda opera, vt tumor suppuratur, & suppuratio adiuuanda emplastro diachylo s. & alijs conuenientibus medicamentis, & nisi tumor spontè rumpatur, aperiendus est.

Qui ex destillatione è capite per ceruicem in pectus dolor ortum habet, is catarrho sublato tollitur.

A flatu frigido & crasso si sit dolor, venæsectio omittatur, ne materia crudior, dolorque maior reddatur, si signa simul plethoræ adsint. Fomentis verò ille discutiatur è floribus chamæmeli, fol. rutæ, semin. cumini.

*℞. Flor. chamæm. sambuc. an. p. j. summ. anethi vnà cum semine, an. ʒ. ʒ. sem. faniculi, cumini, rutæ an. ʒ. j.*

F. Saeculus interfusus, qui vino irroretur.

Efficaciora sunt calamintha, pulegium, thymus, rosmarinus, folia lauri, faniculæ, alchymillæ, bacc. iuniperi, sem. nigellæ.

Extenuatis ita flatibus, tempestiuum erit, quatuor aut sex digitis sub loco dolente cucurbitulam magnam sine scarificatione ac cum multa flamma bis aut ter affigere, vt extractus spiritus flatulentus dissipetur.

Interim vniuersalia præsidia non omittenda. In dolore ab humore seroso & præcipuè maligno ea, quæ suprâ à proprietate pleuritidi prodesse diximus, hîc locum habent, vt sem. card. Mariæ, card. bened. oculi cancri, aqua cardui Mariæ, card. bened. aqua & syrupus papaueris erratici.

## CAPVT VII.

*De sputo sanguinis.*

*Sputum sanguinis.* **S** Tque hæc sunt symptomata actionum iæsarum, quæ organis respirationis accidunt. Symptomata in excretis quod attinet, inter ea primum est sputum sanguinis. Et si verò in genere sputum sanguinis Græcis αἱμόνιον, omnem sanguinis per os reiectionem significat, atque ita eam etiam, quâ sanguis à capite, gingivis, palato, & faucibus, œsophago, ventriculo, liene & locis vicinis per os reijcitur: tamen propriè αἱμόνιον seu sanguinis sputum, de quo hic agimus, est sanguinis cum tussi, ex partibus respirationi dicatis, reiectio. Et quanquam etiam, quæ in pleuritide, & peripneumonia fit sanguinis reiectio hoc nomine appellari possit: tamen in specie ea solùm sanguinis cum tussi reiectio, quæ citra harum partium inflammationem accidit, sanguinis sputum seu αἱμόνιον appellari solet. Est nimirum sputum cruentum symptoma è genere excretorum, quæ toto genere sunt præter naturam, è pulmone & vasis eius. Quanquam enim naturaliter in fæminis per vterum, & in quibusdam cùm fæminis, tum viris sanguis per hæmorrhoidas euacuari soleat: tamen naturaliter è pulmone euacuari non solet.

*Causæ.*

*Causæ.* Cùm sanguis præter naturam reijci non possit, nisi vas aliquod præter naturam patefiat, hic etiam nisi vas aliquod in pectore aperiatur, sanguinis sputum excitari non potest. Morbi autem, ob quos vasa aperiuntur, sunt αἰσθησις & διαρρηξις, & quidem ῥήξις s. ruptio præcipuè, ad quam etiam referri potest contusio, vt & vulneratio seu incisio venarum Διαρρηξις enim, erosionem, seu exsectionem ab humoribus acerbis quod attinet, à Platero, *tomo 3. pract. lib. 2. cap. 8.* hæc non recipitur. Nam cùm ex his pulmonum vasis & pulmonum substantia simul erodatur, sensimque hoc fiat, moxque vlcus inde sordidum potius,

potius, quàm sanguine madens prodeat, phthisis potius, quàm hæmoptoïca passio exoritur: cui tamen, vti in alijs vlceribus, sanguinem interdum, cum impelluntur, exsudan-  
tibus, cruenta exspuitio aliquando iungi potest. *Διὰ πύλινος*  
verò vix sputum sanguinis inducit. Hi autem morbi à quibus causis oriantur, supra hoc libro, parte 2. cap. 7. de apertione vasorum pulmonis dictum, vt ea hîc repetere opus non sit.

Hoc saltem hîc addimus, non semper pulmonibus primariò affectis, sed sæpe secundariò quasi, sputum sanguinis excitari, sicut idem sanguis & per vomitum hoc modo reijcitur, transmissus scilicet ab epate, & vena caua, à liene, ab hæmorrhoidibus, vtero, per nares effluere consuetus, vt ex Galeno, de venæ sect. aduers. Erasistratum cap. 5. & 7. Aretæo, lib. 2. de causis & sign. acut. morb. cap. 2. Celso, lib. 4. cap. 4. Auicenna, lib. 3. fen. 10. tr. 3. cap. 5. Aëtio, tetrabib. 2. serm. 4. cap. 59. videre est, & ipsa experientia testatur. Et quidem obseruatum est, interdum per interualla quædam sanguinem è pectore quasi criticè sine omni incommodo reijci, & à retentorum menstruorum malis, atque alijs, quæ ex sanguinis copia proueniunt, incommodis liberare. Ita refert Plinius, lib. 11. cap. 38. Volusium Saturninum omnibus annis statò tempore sanguinem exspuisse, & nihilominus ad annum 90. vixisse. Et noui virum nobilem plethoricum in vicino Anhaltinatu, qui per interualla sæpe è pulmone sanguinem copiosum sine omni incommodo reijciebat, in senectute verò per eandem viam quotidie magnam pituitæ copiam sine omni damno reijciebat, qui nihilominus ad summam senectutem peruenit.

#### Differentiæ.

Differentiæ sputi sanguinis sumuntur.

1. Ab excreto. Potest is sanguis esse sincerus, vel cum alijs Differentiis humoribus mixtus putridus vel non, alióque colore, sapore, consistentiâ præditus, copiosior vel paucior.

2. A parte, vnde prodit, à vena scilicet vel arteria, eaque vel pulmonis vel pectoris, vt vulgò docetur. Quod tamen à venarum in conuexo pectoris refectionibus aut

læſionibus ſputum ſanguinis oriri poſſit, Cl. Platerus, loco allegato, non concedit, ſed ſanguinem illic ſubſiſtentem corrumpi, & vel phthiſin, vel empyema tandem inducere ſcribit. Qua de re quid ſentiendum ſit, ſuprà, de inflammatione pleuræ, dictum.

3. A cauſſa efficiente, quæ eſt vaſorum vel anastoſiſ, vel diareſis.

*Signa diagnostiſtica.*

*Signa.* Signa ſputi ſanguinis etiam ſuprà, part. 2. cap. 7. ſunt propoſita. Hoc loco ergo ſaltem explicanda reſtant, quibus ſanguinis ex alijs partibus effuſi per os reiectione à thorace aut pulmone exeuntis ſputo diſtinguitur, ne in prognostiſtico vel curatione fallatur Medicus. Principio ergo modus reiectionis attendendus, an ſcilicet cum tuſſi, vel ſine tuſſi reiiciatur; præterea eius copia conſideranda. Eſſi enim ſanguis, qui à thorace prodit, omnis tuſſi reiicitur: tamen non omnis, qui cum tuſſi reiicitur, è pectore prodit. Nam ſi ſanguis confertim è capite & naribus in fauces & gutturis partes dilabatur, etiam tuſſim excitat. Idcoque ſi ſanguis paucus cum tuſſi reiiciatur, ſignum quidem eſt, à thorace provenire. Si verò multus cum tuſſi reiiciatur, cum tum æquè à capite & thorace provenire poſſit, ſignis id diſcernendum eſt, quæ ſanguinem è capite fluentem indicant; quæ ſunt, ſi ſanguis ſimul è naribus fluat, vel nuper fluxerit, ſi ægro hæmorrhagia narium conſueſta ſit, eaque iam ſuppreſſa, ſi ex ore & naribus ſimul ſanguis reiiciatur, (dum modò & alia ſigna adſint. Nam aliquando & ſanguis è pulmonibus erumpens adſcendit in fauces, & per os ac nares reiicitur) ſi rubor, calor & dolor capitis adſit, ſi tuſſis in principio ſit vehementior, dum ſcilicet ſanguis per aſperæ arteriæ caput tranſit, quam dum aliquid confluxit. Si ſanguis ſit nigrior, craſſior & copioſior, ac qui primò excernitur, ſpumâ omni careat, reliquus verò parùm ſpumofus ſit, qui ſcilicet arteriam ingreſſus nigreſcit, & egreſſus agitatur; ſi adſit palati titillatio; ſi ſanguinis ſputum percipitur ante tuſſim; ſi crebra adest ſpuitio, & omninò thoracis affecti ſigna abſint.

Si verò hæc signa absint, aut post casum, percussionem, clamorem magnum, tussim vehementem, similesque causas sputum sanguinis sequatur, è pectore provenire indicio est. Si verò sine tussi sanguis vomitu, vel scretu solo reiiciatur, certum est, eum à thorace non provenire, à quocunque etiam loco prodeat, quod definire huius loci non est. Videatur Gal. 4. de loc. affect. c. 5.

Porro si à partibus respirationi dicatis reiiciatur tussi sanguis, duo amplius inquirenda sunt; 1. à qua parte determinata sanguis proveniat; cùm partes respirationi dicatæ sint plures; 2. à qua causa.

Ergo si leuissima tussi & scretu potius, quàm tussi, sanguis reiiciatur, isque paucus, & parùm spumofus, & cum obscuro aliquo doloris sensu, ab aspera arteria prodire indicio est. Si verò maiori cum tussi, maiore quantitate, & cum maiore spumæ copia sanguis reiiciatur, à pulmone provenire argumento est; cùm aliter in asperam arteriam è substantia pulmonis provenire non possit. De quo Hippocrates 1. aphor. 13. *Quicumque spumofum sanguinem exspuunt, is è pulmone educitio.* Quanquam verò ex aliis partibus sanguis profluens ex viscidæ & aëreæ substantiæ permistione spumofus fieri possit: tamen ex toto spumofum esse solius sanguinis, qui ex pulmone provenit, proprium est. Et quidem cùm plurimum spumat, è pulmonis bronchiis erumpit: cùm verò totus ferè spuma est, secundùm partes internas & externas, non tantùm in superficie spumas habens, è pulmonis substantia provenit. Qui verò è pectore sanguis reiicitur, liuidus est ac nigricans, ac multum alteratus, cùm à loco longinquo proveniat, & extra vasa diutius immoratus sit. Dolor etiam in aliqua parte thoracis percipitur. Contra sanguis, qui è pulmone exit, est tenuis, floridus, spumofus, vt dictum: & citò reiicitur, ac sine dolore. Qui è membranis exit, paucus est, spūto permixtus, & cum tussi molesta, ac dolore pectoris.

Causarum verò signa quod attinet, dictum est de iis suprâ, p. 2. c. 7. Videatur etiam Gal. 4. de loc. affect. c. 5. Aret. lib. 2. de causis. & sign. acut. morb. c. 2.

Hoc saltem addendum, diligenter inquirendum esse,

num priuato pulmonis vitio, sanguis reiciatur, an verò aliunde, ab epate scilicet, liene, vel quod consueta aliqua sanguinis per vterum, hæmorrhoides, hæmorrhagiam narium, euacuatio suppressa sit, & is ad pulmones transmittatur. Neque enim ea, quæ hæctenus proposita sunt, & ab autoribus proponi solent, id satis determinant. Nullum autem hic habetur signum pathognomonicum sed *σχετμῶν* artificioso opus est, exercitatumque id Medicum requirit, qui ex antea obseruatis id colligere possit, & præcipuè per negationem & re motionem aliorum. Si enim signa & indicia, quæ pectus primario affici indicant, abfuerint, vel omnia, vel multa, atque alterius partis in corpore affectæ, quas modo enumerauimus, signa adsint, probabile est, sanguinem qui sputo reijcitur, non ob priuatum pulmonis vitium reijci, sed aliunde ad pulmonem transmitti. Quod magis confirmatur, si antequam sanguis erumpere incipiat dolor aliqua in parte in ventre inferiore, circa epar scilicet, lienem, vterum, vel alibi percipiatur.

Addendum tamen & hoc, si ab aliis partibus sanguis ad pulmones mittatur, non solum per pulmonem eum reijci, sed obseruatum est, sputum & vomitum sanguinis vno tempore accidisse, naturâ superfluum sanguinem partim ad pulmones, partim ad ventriculum propellente.

*Prognostica.*

*Prognostica.*

1. Vt sanguis ex quacunque parte profusus mortem afferre: ita etiam si è pectore multus effundatur, hominem interimere potest. Si tamen sedetur sputum sanguinis sæpè in tabem transit.
2. Etsi verò omne sanguinis sputum periculo planè non vacat: tamen aliud alio periculosius est. Primò quidem ratione causæ, de quo suprà *loc. modo alleg. prognost. 1. 2.*
3. 4. dictum.
3. Deinde loci affecti ratione. Nam sputum sanguinis, quod ex pectore prouenit, minus periculosum est, quàm quod ex pulmone. Et ex pectore sanguinis reiectio triplex beneficium habet præ ea, quæ sit in pulmone 1. Quia vasa pectoris minora sunt. 2. Sanies in spatium & cavitatem pectoris effunditur. 3. Quia pectus magis carnosum est, quàm pulmo,

pulmo, ideoque vlcera pectoris facilius carne replentur.

4. Sanguinis sputum principale magis periculosum est, quàm nò principale, quale est in pleuritide: quia nò principale rupturâ apostemat. significat, ac pus euacuari denotat.

5. Sanguinis è pulmone reiectio, quæ infra tres dies non curatur, superueniente phlegmone, incurabilis redditur. Galenus, 5. de loc. affect. c. 8.

6. A sanguinis sputo puris sputum malum, 7. aphor. 15. quod scilicet ab inflammato & eroso pulmone prouenit. Id enim rarò aut nunquam curatur; cùm phthisis inde & tandem mors sequatur, teste Hipp. ibid. aph. 16.

#### Indicationes.

In sputo sanguinis indicatio præcipua est, sanguinem sistere; quod fit, si sanguis ad partem non confluat, vel vas, è quo sanguis erumpit, claudatur, vel vtrumque præstetur. Ideoque si vitium sit à causa interna, ea tollenda; sanguis nimirum copiosus, & ad partem affluens reuellendus; calidus & acris refrigerandus & mitigandus; humores biliosi & acres euacuandi; ipsum verò vas, è quo fluit sanguis, occludendum. Et quidem si ab anastomosi sit sputum, vas obturandum & adstringendum. Si verò vas sit ruptum, vni-  
re atque agglutinare oportet. Sin erosum, sarcoticis simul opus est, quod deperditum regeneretur. Si à *Alamdiol* prouenit, densare & incrassare conuenit. Concretus etiam sanguis in pulmone, si quis absit, dissoluendus, & detergendus.

#### Curatio.

Ideoque ad duo omnis curatio hinc dirigenda, vt sanguis fluens sistatur, & vas, quod sanguinem effundit, occludatur. Quæ quomodo præstanda sint, suprâ, loco alleg. de *apert. vasor. pulm.* explicatum, quæ hinc non repetimus. Parca saltem addemus.

Et primò quidem generales quasdam regulas in sputo sanguinis curando obseruandas,

1. Reuulsio sanguinis fluentis fit per phlebotomiam, frictiones, ligaturas, & cucurbitulas. Et quidem venæsectio plerumque fit in brachio; quandoque tamen in talo, in mensium suppressione, de quo infra, in *quest.* dicitur.

2. Mala sanguinis qualitas corrigatur & temperetur. Si tamen ab acri sanguine, & bilioso humore referto fit vas erosio, vel apertio, purgandus est ab initio statim biliosus humor, ne dum eum alterare & temperare studemus, malum augeat & grauius reddat. Purgantia tamen non sint calida & fortia, ne acrimoniam humorum augeant, eosque valde commoueant. Qua de causa aloë & scammonium non vsurpanda.

3. Inflammatio in ea parte, vbi sanguis exit, omni ingenio prohibeatur.

4. Grumi sanguinis dissoluantur. Ad quod etsi acetum vtile sit: solo tamen & sincero eo non vtendum, cum partes exasperet, tussimque excitet, & fluxionem augeat. Ideoque vel melle, aut saccharo dulcorandum, vel aliis diluendum.

5. Vitentur, quæ sistunt, aut nimium adstringunt, ante auertentium vsum. Nam sanguinem intrò in pulmones impellunt, vnde eius putrefactio pulmonisque vlcera sequuntur. Ideoque remedia ex adstringentibus & agglutinantibus mista sint, ita quidem, vt in aperto per anastomosin vase adstringentia, in rupto glutinantia, & citra mordacitatem siccantia superent.

6. Topica frigida valde esse non debent. Frigida enim non solum pectori inimica sunt, sed & sanguinem intrò pellunt, atque fluxionem augent.

*Opia.* Deinde hoc monendum, si reliqua, *loc. allegato*, proposita sunt medicamenta ad sanguinem sistendum non sufficiant, ad opiata accedendum, & Philonium Romanum, requies Nicolai: pilul. de cynogloss. aut laudanum opiatum exhibendum cum aqua portul. vel plantag. aut horum syrupis, quorum vfu sâguis ad motum torpidior redditur, somnûsque concitatur, ne perpetua tussi pulmones vehementer concutiantur. Galenus prima mox die medicamentum diaspermatum dictum ante somnum exhibuit, aut theriacam recentem quatuor mensium. Referri huc potest aqua contra sputum sanguinis Dorncreilij, *in dispers.* quæ non tantum sanguinem, qui in pulmones, aut in capacitatem thoracis se effundit, sistere, sed etiam iam effusum, &



& concretum tutò dissoluere, & blandè ac leniter expurgare perhibetur, si ʒ. iij. dosi cum *syrup. de symphyto*, Fernelij, vel *syrup. myrtini compositi*, ʒ. ʒ. sumatur. Est autem talis.

ʒ. Rad. *symphyt. maioris*, ʒ. ij. *plantaginis*, ʒ. ij. *tormentilæ*, ʒ. vj. *pimpinellæ*, ʒ. j. *herb. bursæ pastoris*, *prunellæ*, *polygoni*, *consolidæ mediæ*, *saniculæ cum radic.* an. m. j. ʒ. *flor. ros. rubr.* m. j. *trochisc. de terra sigillata* ʒ. j.

Puluerisanda pulueriscentur subtilissimè: Herbar verò & flores minutim incidantur & contundantur, ac infundantur in aquæ *symphyti maior.* *plantag.* *bursæ pastor.* an. lb. ij. *pectoral. frigid.* lb. j. ʒ. *scabios. marrub.* an. lb. ʒ. *oxymelitis compos.* ʒ. iij.

Misce, & stent in infusione in loco calido per octiduum vase quotidie aliquoties moto; deinde destillantur in alembico vitreo per M. B. igne lentissimo.

Possent fortasse & ea hic vsurpari, quæ occultâ proprietate sanguinem sistere dicuntur, quæ suprà *lib. 1. part. 3. sect. 4. c. 7.* de hæmorrhagia narium proposuimus, & inter ea radix nigellæ, de qua in Practica Kentmanni M. S. hoc habetur.

ʒ. Rad. nigellæ, & si quis habet fluxum sanguinis narium, da ei ad masticandum, & postquam masticauerit, impone naribus, restinguit sanguinem; hoc similiter facere poteris in vulnere, sed magis appropriatum naso.

Historiam curatæ à se mulieris nobilis habet Galenus, 5. *meth. med. c. 13.* quæ ex catarrho, & hinc sequenti tussi vehementi sanguinis spūto laborare coeperat, proculdubio ob catarrhum & tussim vehementem vase rupto: quæ exemplum nobis præbere potest curandi spūtum sanguinis ex catarrho simplici sine pulmonum erosione. Mulieris huius, cum statim prima die Galenum consulisset, capiti, post usum clysteris acris, frictionum & vinculorum, applicauit medicamentum calidum è stercore columbino. Post horas tres, medicamento illo amoto ægram in balneum deduxit, quia cum illatam prius per inediau euacuata esset, timendum non erat de fluxione noua concitanda, & caput balneo incalescens ipsum quoque à pectore reuelletur.

*Historia  
mulieris  
curatæ à  
Galen.*

bat. Postea fructum autumnalem austerum dedit, post sorbitionem, qua cibata fuit. Tandem dormituræ theriacam quatuor mensium exhibuit, ut fluxura per noctem ad pectus materia interciperetur & sisteretur. Sequentibus diebus eadem penè administravit, nisi quod tertia die mel coctum exhibuit, quo materia in pulmone ad expectorationem sensim præpararetur, & pro sorbitione cremorem ptisanæ concessit. Quarto die, cæteris non mutatis, theriacam vigentis ætatis dedit, cum fluxio iam cessasset. Quinto autem die, postquam ægrum præcedenti tempore in quiete continuisset, pectus per tussim expurgare coepit; dehinc rursus capiti emplastrum calefaciens & siccans apposuit, ut materia catarrhi planè exhaustiretur.

Meminit, *ibiaem*, adolescentis, qui non è catarrho ex capite, sed ex refrigeratis spiritus instrumentis tussi cum sanguinis reiectione laboravit. Et primo mox die sanguinem misit, eum fricari & ligari iussit, medicamentum diaspermaton ad vesperam exhibuit, & pro cibo sorbitionem. Secundo die iterum bis sanguinem detraxit, ceratum è thapsia pectori toti admovit, vesperi id auferens, diaspermaton quoque & sorbitionem dedit. Tertio die, postquam ceratum è thapsia per tres horas apposuisset, hominem lauit, cremore ptisanæ ac plenioris aliquo cibo nutritiuit, sed vesperi diaspermaton dedit. Quarto denique die instrumentis respirationis ad temperiem iterum reductis, & vacuato toto corpore pectus tussi expurgare aggressus est: theriacam exhibuit vigentis ætatis, & ægrum tandem ad Thabias, pro bibendo ibi lacte, misit. Vide Galenum, *5. meth. med. cap. 22.* *Dieta.*

Diætæ ratio etiam suprà exposita est; hoc saltem addimus. Cælius Aurelianus & Autor libri de subfiguratione empeirica & alij prohibent aspectum rerum rubrarum, ne, imaginatione commota, sanguinis fluxus concitetur. Neque enim de nihilo est, imaginationem & spiritus ab aspectu rerum externarum moveri. Nimirum & tenebræ & color niger timorem incutit, ac tristitiam excitat; contra color albus & lucidus exhilarat; unde etiam color rubeus, cuius natura in fulgore quodam consistit, spiritus non parùm commouet, notumque est, elephantos, tauros, gallos

Indicos rerum rubrarum aspectu ad iram concitari. Animi pathemata, præsertim ira, quæ sanguinem & spiritus commouet, studiosè vitentur.

## Q V Æ S T I O.

*An in spūto cruento sanguis semper è brachio, an verò etiam è talo & cruribus, præcipuè in sæminis mittendus sit.*

Galenus equidem, 5. meth. med. cap. 8. in spūto sanguinis internam cubiti venam secat, eamque sequenti die repetit. Alexander tamen Trallianus, lib. 73. cap. 1. etiam vena in talo secta se sanguinem misisse, & multo magis profuisse, quàm in cubito scribit; cum sanguinem misisse, & multo magis profuisse, quàm in cubito scribit; cum sanguinem ad longinquas partes auocantia fortiore multo reuulsionem efficiant. Mesues & Auicennas distinctione vti videntur, & in præseruatione rectius ad inferiores partes sanguinem retrahi, in curatione verò è cubito mitti censent. Nonnulli tamen sunt, è quibus Valefc. de Tarant. & Hieron. Capiuacc. qui etiam in curatione saphenam secandam existimant. Videturque his fauere Hipp. 5. aph. 32. dum scribit: *Mulierì sanguinem euomenti mensstrus erumpentibus solutionem fieri.*

*Vnde in spūto cruento sanguis præcipuè mittendus?*

Verùm enimverò rectissimè hîc sentire videntur Mesues & Auicenna, dictumque est suprâ de pleuritide; non semper licere ad remotissima reuellere, sed vbi in morbis pectoris præsentaneo auxilio opus est, venam in brachio esse aperiendam. Ideoque cum vel non dum ad pectus sanguis decubuit, sed fluxurus metuitur; aut parum omninò affluxit, prouidentia & præseruationis gratia, ad remotissima sanguinem reuellere, & venam in talo aperire licet. Vbi verò materia iam affluxit, & adhuc copiosè affluit, vt inflammationis metus sit, vena in talo secta nimis tardum auxilium affert; sed tum in cubito vena aperienda, vt de pleuritide dictum.

In mulieribus verò mensium habenda est ratio, vtpote quorù fluxus eas à morbis multis præseruat, & liberat. Distinctione tamen opus est. Cum enim menses statò tempore fluentes mulieribus profint, alio verò tempore, facile

facile concitari non possint; si mulieri sputo sanguinis, seu ex suppressione mensium, seu absque ea laboranti menses iam instent, vena in talo aperienda est. Ita enim Medicus socias naturæ operas præstat, atque in sanguinis ad uterum reuulsione natura Medico se coniungit. Atque hoc sensu accipiendus est allegatus aphorism. Hipp. Si verò fluxus mensium nondum instet, distinctione iterum utendum. Nam si sanguinem in foeminis circa uterum cumulatam esse constet, nondum verò magnus eius sit ad pectus fluxus, tum æquè in foeminis ac in viris è talo sanguis mittendus. Si verò ad pulmones magnus eius sit impetus, magna tamen ex suppressione mensium etiam in uteri venis sit eius copia, ex utrisque venis quidem sanguis mittendus, veruntamen si mensium fluxus nondum instet, in cubito primùm vena aperienda, cùm præsentaneum & subitum, quod vena in talo aperta præstare non potest, auxilium requiratur.





LIBRI SECUNDI  
PARS QUARTA,  
DE  
MORBIS, AC SYM-  
PTOMATIBVS CORDIS.

CAPVT I.

*De morbis Pericardij.*



ESTANT tandem in hoc secundo libro morbi & symptomata Cordis. Cum autem cor sit vitæ principium, caloris natiui fons, primum viuens, & vltimum moriens, ac cæteræ corporis partes ex eo sanguinem, spiritus, ac calorem vitalem accipiant, at-

que actiones suas exercere non possint, nisi calore & spiritu à corde sint perfusæ; omnino cordis actiones ad vitam summoperè sunt necessariæ. Ideoque etiam natura cor maximè ab omnibus iniuriis tuetur, & cor vitali calore copioso præditum maximè omnibus iniuriis resistit, & noxia à se repellit, & hinc rarius, quàm aliæ corporis partes, morbis afficitur. Sûntque etiam morbi cordis difficiles cognitu, atque plerumque nonnisi in mortuis anatome deprehenduntur. Et si cor paulò grauius præter naturam afficiatur, mortem id homini accersere solet. Est nihilominus cor etiam multis morbis obnoxium. Et cum cor mem-

brum tam nobile ac necessarium sit, peculiari capsula tegitur, quæ pericardium vocatur. Ideoque morbi alij ipsius cordis, alij pericardij, de quibus seorsim dicendum. Symptomata verò præcipua sunt palpitatio cordis, virium imbecillitas, ac lipothymia & syncope.

*De aqua in pericardio aucta & deficiente.*

*Aqua in pericardio aucta.*

Aqua quædam secundum naturam, ut in aliis animalibus, ita in homine reperitur in pericardio; id quod non solum docuit Hippocrates, in libello de corde, sed & ex viorum animalium sectione patet.

Hanc tamen aquam interdum præter naturam augeri, ut cor non liberè moueri, & ita palpitatio cordis causa esse possit, docet Galenus, 5. de loc. affect. cap. 2.

*Deficiens.*

Contra si ista aqua præter naturam deficiat, causa marasmi esse solet.

*De vermibus in pericardio.*

*Vermes in pericardio.*

Vermes aliquando in capsula cordis seu pericardio genitos fuisse obseruatum est, annotauitque aliquot eius rei historias Schenckius.

*Signa.*

Difficulus autem cognoscuntur, & rarò exactè, nisi post mortem. Solet autem tales ægros infestare cordis tremor, anxietas, animi deliquium & syncope, ac plerumque tandem ægri subita morte extinguuntur. Si ergo talia symptomata adsint, & medicamenta cordialia exhibita nihil proficiant, vermem talem adesse suspicari licet.

*Lunaticæ passio.*

Nonnulli Lunaticæ cuiusdam passionis mentionem faciunt, quæ ex vermibus in pericardio ortis pueris & infantibus accidat, unde ij sæpè semimortui appareant. Verùm mihi probabilius videtur, hoc quicquid est symptomatis, quod infantibus accidit, ex vermibus prouenire in intestinis genitis, & in ventriculum ascendentibus & orificium ventriculi molestantibus, quod etiam *æpèdia* appellatur.

Contra vermes autem in corde commendatur allium, obseruatumque est, vermes, qui in mortuis in capsula cordis reperti sunt, necatos fuisse succo allij; dum in circulum ex allij succo in mensa figuratum concluderentur: Utile est & hoc:

*℞. Succum ally, raphani, & nasturtij, & exhibeatur.*

Ad Lunaticam verò illam passionem, quæ ex vermibus in capsula cordis ex nonnullorum opinione, aut potius ex vermibus orificium ventriculi, seu cardiacum molestantibus oritur, commendatur tanacetum. Ramuli eius tenues in umbra siccentur & addantur sequentis pulueris, 3. ij.

*℞. Rad. gentiana, pæonia, an. 3. ij. myrrhæ, 3. j.*

Fiat pulvis.

Pulvis hic aquâ humectetur, & ori infantis inungatur.

*Defectus Pericardij.*

Aliquando planè deest pericardium. Id quod obseruat Columbus, qui, *lib. 15. anat.* refert, se discipulum in Romana Academia secuisse, cui pericardium deerat: itaque subinde in syncopen incidebat, & mortuo similis conspiciebatur, quo genere morbi etiam exanimatus est.

*Tumores Pericardij.*

Tumores etiam in pericardio deprehensi sunt. Galenus, *5. de loc. aff. cap. 2.* scribit, se simiam quandam quæ indies emaciebatur, post mortem secuisse, & cæteris omnibus partibus saluis, inuenisse in pericardio tumorem præter naturam, qui humorem in se, qualem hydatides emittere solent, continuerit. Atque in gallo quodam se vidisse aliquando cordis tunicam scirrhuso tumore affectam, perinde ac si plures membranæ crassæ inuolutæ altera alteri fuissent. Vnde coniecturam sumit, homines similibus affectibus obnoxios esse posse. Quem secutus Petrus Salius Diuersus, *de morb. rariorib. c. 4.* colligit, idem in homine accidere posse. Nā si quis emacietur, nulla præsentē destillatione, nec sputo vel cruento vel purulento, nullaque naturalium partium ita læsa videatur, ut hinc maciēs & atrophia subsequi posset; suspicari licet, posse hoc accidere ex pericardio malè affecto. Etsi enim membrum per se non sit nobile: tamen quia cordi proximum est, id in consensum trahit & afficit. Affectus autem hic ut difficulter cognoscitur, & non nisi coniecturâ, ita curatu est impossibilis, scribitque Petrus Salius Diuersus, *loc. alleg.* se, etsi multa tentarit, nihil profecisse, omnesq; tandem tabe cōsumptos & emaciatos,

Ultimò quadam accedente leui febricula, cui fyncope coniungebatur, interiisse.

*Vulnera, putredo, & corruptio pericardij.*

*Vulnera  
& pu-  
trede pe-  
ricardij.*

Vulneratur etiam interdum pericardium, interdum exulceratur & putrescit. Galenus, 7. de administ. anatom. c. 13. refert, se in puero quodam in palæstra icto, & inflammationem in pectore passo, regione pectoris detecta & offese exciso, nudum cor inuenisse, vtpote cuius inuolucrum putruerat. Ita ex Francisco Rota, de torm. vulner. cap. 3. refert Schenckius, in suppurato quodam totum ferè pericardium corruptum deprehensum fuisse.

Beniuenius, de abdit. morb. causs. cap. 5. narrat, quendam in pericardio vulneratum sua cura conualuisse. Et Cardanus, in comm. ad 8. aph. lib. 6. Hippocrat. refert, se partem pericardij vidisse ablatam, ægrumque tamen sanatum, sed suspiria alta duxisse, nec multis annis superuixisse.

*Historia  
pulmonis  
planè  
consum-  
pti.*

Notabile est & hoc, quod ex obseruat. Iohan. Bauhini refert Schenckius, in cadauere quodam dissecto pulmonem repertum fuisse planè consumptum, thoracis cauitatem plenam putrido & concreto sanguine, in pericardio verò plusquam mensuram puris albi contentam fuisse, totâ cordis superficie absumptâ & extenuatâ. Symptomata, quæ passus est, erant tussis, febricula, dolor in thorace, & in anteriore ventris parte, difficilis respiratio, paucis diebus ante mortem deliquium animi, mens constabat. Verùm quia Medici opera in his parùm præstare potest, plura de iis non addimus.

\*\*\*

## C A P V T . II.

### De cordis intemperiebus.

*Intemperies cordis calida.*

*Intem-  
peries  
cordis  
calida.*

Requentissimè tor intemperiem calidam patitur, & quidem à caussis externis & internis: & omnes causæ, quæ febrem excitare solent, etiam intemperiem calidam



dam cordis excitant; cum nulla febris excitari possit, nisi cor prius incalescat. *Causse.* Causse tamen, quæ intemperiem calidam cordis excitant, non verò in toto, mitiores sunt; & quamvis cor per animi affectus & alias causas etià per se incalescere possit: tamen per consensum aliarum partium sæpissimè intemperiem calidam contrahit; & præcipuè à partibus inferioribus incalescit, è quibus vapor calidus cordi communicatur. Ideoque de causis intemperiei calidæ cordis multa hic addere opus non est, cum satis de iis in doctrina de febribus dictum sit.

Cognoscitur intemperies calida cordis præcipuè ex actionibus eius mutatis; respiratio fit magna, celer, frequens, pulsus similiter est celer, frequens; magnus, si vires sufficiunt; adest propensio ad iram, calor adest præter naturam, & in totum corpus diffunditur, halitus, qui ore egreditur, calidus est, ut ferè palatum, linguam & labia exsiccet. Præcesserunt causse cor calefacientes; iuvant frigida, nocent calida. *Signa.*

Quò maior autem excessus est caloris, eò morbus periculosior est, patetque id maximè ex effectibus, & virium robore vel deiectione, de quo de febribus dictum. *Prognostica.*

Curationem quod attinet, calida intemperies refrigerantia indicat. Vbi primò in genere monendum, extremè frigida vel nimis cor alterantia non usurpanda esse. Cum enim cor caloris natiui fons sit, & maiorem calorem, quam nulla pars alia corporis, obtineat, & ab eo vita hominis pendeat, calor is studiosè fovendus, nec quicquam adhibendum, quod ipsum extinguere possit, utpote quo extincto mors sequitur. Deinde quia cor spiritus vitales generat, sua violentia cordi maximè utilia sunt. *Curatio.*

Medicamenta autem cor refrigerantia sunt, acetosa, flor. rosar. violar. nymphae, flor. borrag. bugloss. succus citri, amomum, granat. cerasor. pomæ odoratæ acidiuscula, fructus ribes, berber. rubi Idæi, C. C. terra sigillata, bolus Armenus, corallia, margaritæ.

Ex his parantur alia Medicamenta.

*Interna.*

Aquæ: Rosar. violar. nymph. acetosa, borrag. bugloss. fragor.

Hh 3

Syrupi

Syrupi. *Acetosi, citri, granator. acetos. acetosell. de succo ribes, berberis, helen. nymph. borrag. cerasorum, coralliorum.*

Conferuæ, *Rosar. borrag. nymph. viol. acetos. acetosell. flor. aurantior. citri.*

Condita, *caro citri, cerasa, ribes, berberis.*

Species *diamargarit. frigid.*

Rotulæ, & *mersuli manus Christi perlat. diamarg. frigid. de succo citri, ribes, berberis.*

*Aqua Cordialis.*

℞. *Conferu. flor. bugloss. borrag. violar. rosar, nymph. cort. citri, an. ʒ. ij. spect. el. diamarg. frig. de gemm. an. ʒ. ij. diambf. ʒ. j. croci ʒ. j. b. sem. citri, oxalid. cydonior. an. ʒ. iij. 4 frig. mai. scariolæ, an. ʒ. j. lactucæ ʒ. ʒ. herb. lactucæ, oxalid. portulac. endiu. an. M. ʒ.*

*Addendo.*

*Caponem exenteratum, purgatum & incisum, ut decet. succi acetosell. citri, granator. an. ʒ. j. ʒ. aqu. rosar. borrag. bugloss. meliss. an. ʒ. j.*

*Incidantur & contundantur, ac misceantur in mortario lapideo, & postea lento B.M. calore destillentur.*

*Externa.*

*Extër- Eadem pleraque extra applicari possunt. Vnde fiunt.*

*Epithemata, ex aqua rosar. nymph. aceto rosar. santalo, margarit. corallis, quibus aliquid camphoræ additur.*

*Sacculi, ex herbis, floribus, & foliis antea enumeratis cum serico rubro vel albo, & floccis panni coccinei.*

*Olca, rosar. violar. nymphæ.*

*Vnguenta, rosar. santalinum.*

Talia autem Topica commodissimè ad sinistram partem applicantur. Etsi enim cor in medio pectoris sit situm: quia tamen thorax in medio planè ossæus est, commodè ibi non possunt penetrare. Circa papillam verò sinistram, quò pars inferior cordis vergit, faciliùs penetrant.

*Victus ratio medicamenti respondeat.*

Si verò cum materia calor coniungatur, & quidem si sanguis abundet, is euacuandus; si bilis, expurganda syrupo rosar. solut. & viol. sol. pulp. tamarind. manna, triphera Persica.

*Interm*

## Intemperies cordis frigida.

Rarius verò cor intemperie frigida laborat. Cum enim fit calidum membrum, caussis frigidis fortiter resistit. Aliquando tamen etiam frigida intemperie corripitur, quam induci retentio excrementorum frigidorum, & vapores frigidi ex aliis partibus ad cor adscendentes. Animi perturbationes, præcipuè moeror & timor, quibus calor cordis torpidior redditur, & penè suffocatur, immodica exercitia, otium nimium, ob quod spiritus torpent, & calor remittitur. Cibi & potus vt & medicamenta frigida, aer ambiens frigidus, siue inspiratione attractus, siue ob vestium defectum pectore nudo extra ad cor penetrans, vt & nimia pluuiarum ad pectus appulsio. Et omninò omnes morbi, qui interitum homini afferunt, cor tandem refrigerant; cum mors ab extinctione calidi innati cordis proueniât.

Cognoscitur intemperies cordis frigida ex cordis pulsu paruo, tardo, raro, & respiratione simili, aerque, qui exspiratur, frigidus percipitur. Et si sit excessus frigoris magnus, & calor cordis iam penè extinctus, corpus vniuersum frigidius sentitur. Præcesserunt causæ cor refrigerantes: iuuant calefacientia cor, nocent refrigerantia.

Curatur autem intemperies cordis frigida calefacientibus. Sunt autem medicamenta cor calefacientia simplicia; *Melissa, ocymum, rosmarinus, card. benedict. calamintha, rad. belen. angelic. flor. rorismarini, tunicis, lauendul. lilij conuall. sem. citri, grana alcherm. lignum aloës. Aromata pleraque, cinamom. caryophyll. xedoar. macis, nux moschat. ambr. moschus.*

Atque ex his varia componuntur. Interna.

Aquæ & spiritus *meliss. rorismar. flor. citri, arantior. cinamom.* Interna.

Conferu. *anthos, meliss. tunicis, lauendula, lilior. conuall.*

Syrupi, *tunicis, meliss. lauendula, cinamomi, cortic. citri.*

Condita, *cortices citri, arantior. rad. belen. nuc. iugland.*

Olea destillata, *citri, meliss. cinam. caryophyll. macis.*

Species & confectiones aromaticæ, *diamargarit. calid. confect. de hyacinth. species cordiales, diamosch. diamb. diaxylo, aloës, aromat. caryophyllat. & præcipuè confect. alcherm. theriaca itidem & Mithritatium.*

Exter-  
na.

Eadēque pleraque etiam extra applicantur, vt postea dicetur.

Ex his porrò varia composita fiunt :

Aquæ vitæ omnis generis, quæ passim extant, *aquæ virtutum*, *aqua carbunculi dicta*, *elixir vitæ Matthioli*. Videantur Instit. l. 5. p. 3. sect. 3. cap. 5.

Vel paretur talis aqua :

℞. *Meliss.* M. ij. *ocymi* M. j. *flor. anthos*, *cordial. tunic.* an. M. ℞. *cortic. citri* ℥. ℞. *sem. citri* 3. ij. *caryophyll.* 3. iij. *cinaomom.* 3. j. *ligni aloës*, *macis*, *zedoariae*, an. 3. j. *croci* 3. ℞. *moschi*, *ambr.* an. 3. ℞.

Affundatur *vini Maluatici* q. s.

Digerantur aliquandiu, postea destillentur. Detur ab 3. ℞. ad 3. j.

*Rondeletij aqua & Iulebus.*

Ronde-  
letij a-  
qua.

℞. *Cord. porci* N. ij. *cerui vel bovis* N. iij. *caryophyllor.* *galangæ mai. & min. sem. basilici.* an. 3. iij. *flor. bugloss. borrag.* an. P. ij. *anibos* P. iij.

Macerentur in *vino maluat.* & destillentur in vitro. Aqua seruetur vsui.

Iulebus  
eiusdem.

℞. *Aquæ prædict.* 3. iij. *sacch. parum.* F. Iulebus.

*Aqua virtutis.*

Aqua  
virtutis.

℞. *Rad. bugloss. Ital.* 3. iv. *flor. borrag. bugloss.* an. 3. ij. *vorismar. croci* an. 3. j. *succi cydonior. malor. Borstorf.* *citri cum cortic. incisi.* an. 3. j. ℞. *vini Rhenani albi* ℔. iij. *aqu. meliss. borrag. bugloss.* an. ℔. ℞.

M. Stent in infusione per dies 10. in loco calido, postea fiat destillatio.

*Aqua cardiaca D. Georgij Leuschneri.*

℞. *Fol. basilic. c. floribus. meliss.* an. M. j. ℞. *pulegij, mentha, flor. rosarum rubr.* an. M. j. *borrag. bugloss. tunic. pæoniae, violarum, betonicae,* an. M. ℞. *sem. meliss. basilici, cubebæ.* an. 3. j. *caryophyllor.* 3. ij. *zedoar. galangæ, enulæ, doronici,* an. 3. j. ℞. *macis* 3. ij. *santali citrini, albi,* an. 3. j. ℞. *ligni aloës* 3. j. *cortic. citri exsiccat. aurantiior.* an. 3. ij. ℞. *cinaomom. acutissimi* 3. j. Hisce contus. & conquass. superfund.

*Vini Rhenani puri* ℔. v.

Stent infusa hor. xxxvj. ad cineres calidos, postea destillentur s.a. in B. adicianturque tandem *Fol. auri* N. v. [ ætate fumantur recentia & viridia, & medietas tantum vini. ]

*Aqua virtutis alia.*

℥. *Galang. xingib. caryophyll. granor. Paradisi* an. 3. iij. *cubeb. piperis longi*, an. 3. j. *β. macis, nuc. mosch.* an. 3. ij. *β. ligni aloës*, 3. iij. *cinam. el. cortic. citri*, an. 3. *β. calam. arom.* 3. j. *β. rorismarini, saluæ*, an. 3. j. *flor. lauend.* 3. vj. *rutæ*, 3. ij. *rosar. rubr. borragin.* an. 3. *β. fol. lauri*, 3. *β. Contund.* & infund. in *vini boni mens.* iij. Destillentur s. a.

*Alia.*

℥. *Rorismarini, meliss. basilici, pulegij, serpilli*, an. m. j. *cortic. citri extern.* 3. j. *ligni aloës, santali citrini, rhodij rass.* an. 3. j. *β. caryophyll.* 3. ij. *croci, D. j. spicæ Celticæ, Indic.* an. D. j. *nuc. mosch.* 3. j. *β. cortic. cydon. recent.* 3. j.

Concisa infund. per dies 3. ad Solem, vel in loco calido in aqu. rosar. spir. vini opt. an. ℥. j. *β. acet. ros.* ℥. j.

Destillentur postea in M. B. In destillato liquore dissolve, *mosch. q. s. ad gratiss. odorem.*

Vel suspendatur moschus in alembici rostro.

*Alia.*

℥. *Flor. lilij conuall. m. ij. lauendul. cichor.* an. m. j. *cardamomi utr. galang. cyperi rotund. macis, nuc. mosch. ligni aloës, piperis longi nigri, mastich. xingib.* an. 3. j. *β. cinamomi* 3. ij. *vini sublimati* ℥. ix.

Infundantur per aliquot dies, postea destillentur.

*Elixir vitæ.*

℥. *Cinamom. elect.* 3. vj. *caryophyllor. cardamomi, ligni aloës opt.* an. 3. j. *β. santali citrini*, 3. ij. *nuc. mosch. macis*, an. 3. j. Puluerifatis mediocriter omnibus, adde *spirit. vini puriss.* ℥. vij.

Et permistis omnibus in vitreo vase clauso orificio ita referuentur per mensem, singulis diebus ter quaterve agitando & commiscendo. Postremo die, vbi perfectè referderint, percolentur, & colaturæ benè claræ add. *syrupi de cortic. citri*, ℥. j. *β. moschi, ambra*, an. D. *β.* Referuetur in vitro benè obturato.

## Aliud.

℥. Cinam. elect. ʒ. ij. zingib. ʒ. vj. caryophyllor. nuc. mosch. an. ʒ. ij. gran. paradisi, ʒ. ij. cal. aromat. ʒ. ʒ. galang. ʒ. j. fl. rosar. ʒ. j. rorism. ʒ. iiij. cort. citri, ʒ. j. ʒ. maioran. meliss. an. m. j. ligni Rhodij ʒ. iiij. santali citrin. ʒ. ij. rubr. ʒ. j. vini sublimati lb. xij.

Infund. per mensem, deinde colentur & colaturæ claræ add. syr. de cort. citri, miuæ cydon. an. lb. j. ʒ. M.

## Electuaria.

℥. Conf. borrag. bugloss. anthos, tunic. an. ʒ. j. ros. ʒ. ʒ. cortic. citri condit. ʒ. vj. nucis mosch. conditæ, ʒ. j. pulv. caryophyll. ʒ. ʒ. Cum syr. tunic. F. Elect.

## Rotulæ &amp; morsuli.

℥. Spec. diamb. diaxyloaloës, an. ʒ. j. ol. cinamom. citri, an. gutt. iiij. confect. alcherm. ʒ. j. sacch. in aqua rosar. solut. ʒ. iiij. F. Rotul. Illinant. ambr. in aq. ros. diss. ʒ. iiij.

Vel ℥. Spec. diamb. aromat. caryophyll. diamosch. dulc. an. ʒ. ij. lapid. bezoar. ʒ. ʒ. cortic. citri condit. ʒ. ij. sacch. alb. in aqua ros. dissol. ʒ. iiij. F. Morsuli.

Vel ℥. Amygd. dulc. pistacior. an. ʒ. j. pinear. ʒ. vj. carn. citri cond. ʒ. j. nuc. mosch. in India cond. ʒ. vj. cort. citri cond. ʒ. iiij. zingib. in Ind. cond. ʒ. ʒ. macis, ʒ. j. cinamomi, ʒ. j. ʒ. Fructus macerentur per noctem vnam in aq. rosar. & aromata cum eis incidantur & frangantur mediocriter. Add. sacch. albiss. ʒ. xx. in aq. ros. dissol. In fine admisce, mosch. opt. ʒ. ix. ol. cinamomi. ʒ. vj. F. l. a. morsuli deaurandi.

**Externa.** Ex medicamentis hactenus enumeratis etiam externa varia componuntur.

## Epithemata.

℥. Aq. fl. aurant. meliss. anthos, an. ʒ. ij. carbunculi, virtut. an. ʒ. j. spir. ros. ʒ. j. conf. alch. ʒ. ʒ. cort. citri sicc. ʒ. ij. croci, ʒ. ʒ. M.

## Balsama &amp; Linimenta.

℥. Ambr. liquidæ, olei nuc. mosch. expr. confect. alcherm. an. ʒ. ʒ. olei destill. citri, meliss. an. ʒ. ʒ. F. Linimentum.

## Sacculus.

℥. Flor. anthos, cordial. meliss. lauendul. an. m. ʒ. cortic. citri siccor. caryophyll. macis, an. ʒ. j. Cum syndone rubro, F. sacculus.

*Intemperies Cordis humida.*

Intemperies cordis humida fit à caussis, quæ aliàs totum corpus humectare possunt: verùm non faciliè eam recipit, cùm sit valdè calidum & siccum. Præcipuè verò aër humectandi vim habet, vtpote qui per pulmones ad cor penetrat, nebulosus scilicet, crassus & humidus. Humectat etiam totius corporis intemperies humida, qualis est in anasarea.

*Intemperies cordis humida.*

Cognoscitur ex talibus caussis, quæ præcesserunt; ex effectis item, vt pulsu molli, & toto corpore humidiorè. Curatur siccantibus medicamentis hæc intemperies, qualia sunt omnia calida modò proposita. Omnia enim talia siccandi vim habent.

Exsiccant præterea cor humidum, quæ frigida siue temperata sunt, *margaritæ, corallia, C. C. os de corde cervi, bolus Armenus, terra sigillata, lapides pretiosi.*

Diæta medicamentis respondeat.

*Intemperies cordis sicca.*

Cor siccant corporis atque animi motus nimij, curæ, moeror & sollicitudines, vigiliæ nimix, vnde quibusdam ex hisce caussis mortuis cor tanquam pyrum tostum inven-  
tum fuisse historiæ testantur, aër calidus & siccus, qualis est in locis montanis, & sæpè etiam maritimis, cibi & potus siccandi vi præditi, in primis vini potentis vsus, medicamenta eiusdem generis, febres biliosæ, tumores pericardij, & aliæ causæ, quæ febrem hæcticam inducere valent.

*Intemperies cordis sicca.*

Cognoscitur siccitas cordis è caussis his, si præcesserint; sequitur verò totius corporis, & in primis pectoris extenuatio, pulsus est durus.

Curatur verò humectantibus, *borrag. bugloss. violis, semin. frigid. maior. passulis, amygdalis.* Prodest etiam balneum aquæ dulcis tepidum, in quo malua, althæa, foenugræc. cocta sint. Fomenta etiam pectoris ex iisdem parantur, post quæ pectus inungatur ol. amygdal. dulc. viol. mucilag. femin. althææ, maluæ.

Diæta etiam sit humectans, & omninò curatio & diæta talis instituenda, qualis hæcticis convenit.

Morbi  
totius  
substan-  
tiæ.

In primis verò & frequenter cor à morbis totius substantiæ, seu formæ, vt appellant, vel qualitatum occultarum infestatur. Pleraque enim venena, quocunque modo in corpus sese insinuent, cor hoc modo afficiendi vim habent, de quibus suo loco dicetur, & etiam, *lib. 2. instit. part. 2. c. 23. & de Peste* dictum.

Cognoscuntur autem hi morbi è causis, quæ præcesserunt, ad tales morbos producendos idoneis. Et si de causis eiusmodi non constet, ex effectis deprehenduntur, quæ supra vires causarum manifestarum sunt grauiora, vt anxietas & inquietudo, subita & summa virium deiectio, animi deliquium, & syncope, pulsus summa imbecillitas, & inæqualitas. Maculæ hinc inde in corpore erumpentes, & similia symptomata; quæ pestilentibus ac venenatis morbis sunt propria.

Morbi autem hi longè sunt periculosissimi, & hominem inopinatò sæpè iugulant.

Curantur autem hi morbi alexipharmacis. Et quidem quilibet veneno suum alexipharmacum opponendum, de quibus in *Institut. lib. 5. pag. 1. s. j. cap. 21. & de Peste* dictum, ac suo loco, de venenis dicetur. In genere & præcipuè si de natura veneni non constet, antea enumerata vsurpanda, & inter composita theriaca & Mithridatium.

*Elect. Bertruci confortans cor in omni causa.*

*Elect. Bertruci.* 2℥. Smaragd. hyacinth. sapphir. an. 3. β. auri & argenti puri foliati, an. 3. j. margarit. perforat. & non perforat. 3. j. β. bugloss. meliss. flor. borrag. ocymi, & edoar. been alb. & rubr. caryophyllor. ligni aloës, zingiberis, cinamomi, elect. an. 3. β. serici contusi, non combusti, cubeb. cardamom. calami arom. spica, galang. mosch. camphor. os de C. C. ambr. an. 3. j. corall. alb. rub. santal. rosar. spsdy, myrobalan. belliric. terr. sigill. coriandr. an. 3. ij. β.

Terantur omnia subtiliter; & pro qualibet unica speciem fumatur sacch. albiss. lb. j. F. elect. Deauretur.

Cùm etiam ad calidum natium & naturalem corporis constitutionem conseruandam spiritus vitales pertineant, atque hi etiam varia vitia pati possint, etiam de iis hoc lo-



eo dicendum esset. Verum de iis postea de lypothymia & syncope dicetur.

## CAPUT III.

## De reliquis Cordis morbis.

**P**RÆTER morbos intemperiei & totius substantiæ, Reliqui qui cor frequentissimè infestant, adhuc alij morbi cordis dantur, qui, quia rariores & raro curabiles, eos vno hoc capite coniungemus.

*Sinistri cordis ventriculi defectus.*

Cordis ventriculum sinistrum in quibusdam defuisse, vel planè exiguum fuisse, observavit Columbus, *anatom. lib. 15. vt & septum, quo ventriculi cordis distinguuntur, cartilagineum.* Sinistri cordis ventriculi defectus.

*Cor hirsutum.*

Quosdam cor hirsutum habuisse annotavit Plinius, *lib. 11. nat. hist. c. 25. Valer. Max. lib. 1. cap. 6. Benedict. Faen-* Cor hirsutum.  
tinus, *de additor. morbor. & curation. caus. c. 85. Antonius Muretus, lib. 11. variar. lection. c. 10. Amatus Lusitanus, cent. 5. curat. 65. Omnes autem hi, qui cor hirsutum habuerunt, fuerunt audacissimi & famosi latrones.*

*Vermes, calculi & alia præter naturam in corde reperta.*

Vermes aliquando in pestilentibus febribus in ventriculis cordis fuisse genitos, audiuisse se ab hominibus fide dignis, qui huiusmodi ægrotantia corpora secuerint, refert Vidus Vidius, *cap. de morbis cordis. Idem etiam scribit, quod lapides in corde fuerint geniti, se neque audiuisse, neque legisse. Referunt tamen id alij quamplurimi. Hollerius comm. 1. in lib. 6. aph. 4. Coac. prædict. Hippocr. Scholiographus in Hollerium, ad cap. 29. & 50. lib. 1. Iacotius, com. 1. lib. 6. sect. 2. aphor. 4. Coac. Hippoc. Et comm. 1. ad aphor. 52. l. 3. sect. 2. Coac. Hippoc. Et in Maximiliani II. Imperatoris corde inuenti sunt tres lapides, vt refert Vvierus; de præstig. demon. lib. 4. sap. 6. Et Erastus, in consil. & epist. à Scholæzio,* Vermes, calculi &c. in corde reperti.

*Scolæzio collectis.* Atque horum alij palpitationem cordis frequenter passi sunt, alij vrinam purulentam per multos dies, imò menses, saluis renibus & vesicâ, minxerunt.

Carnosas quoque excrescentias in cordis dextro ventriculo vel sinistro repertas fuisse in iis, qui dolorem cordis, & syncopen passi fuerunt, & pulsus intermittentem habuerunt, refert Vesalius, *lib. 2. c. 5. de hum. corp.* Fabric. Beniuenius, *de abdit. morb. & curat. causis. c. 25.*

*Cordis tabes.*

*Cordis  
tabes.*

Cor quoque in quibusdam contabuisse & exsiccatum fuisse, obseruatum est. Idque etiam ex tumore pericardij accidisse, antea, *c. 1. dictum.* Ad cordis verò tabem prodessè succum raphani ex Ægyptiorum traditione refert Plinius *hist. nat. lib. 19. c. 5.*

*Situs cordis mutatus.*

*Situs cor-  
dis mu-  
tatus.*

Cor etiam situm quandôque mutasse obseruatum est, ut in Liuno illo Vvitebergæ, cuius supra, *lib. 12. p. 2. c. 15.* mentio facta est.

*Vulnera cordis.*

*Vulnera  
cordis.*

Cor etiam interdum vulneratur, & quidem ut Galenus, *5. de loc. aff. c. 1.* scribit, si ad ventrem cordis vulnus penetret, protinus magno cum sanguinis fluore hominem mori necesse est. Idque præcipuè si sinister ventriculus cordis fuerit vulneratus. Si verò non ad ventrem vsque pertingit, sed in cordis substantia constiterit, viuere ita affectus non solum ea die, sed etiam sequenti nocte potest.

*Apostemata, & ulcera.*

*Aposte-  
mata &  
ulcera.*

Imò cor apostemata & ulcera pati potest, quæ tandem hominem subito per syncopen tollunt. Quia tamen breui tempore contrahi non potuerunt, inde etiam ægri tales frequentissimè lipothymia fuere obnoxij; collegitque huius rei exempla Schenck. *in obseru. Med.* Refert quoque Henricus Smerius, *miscell. lib. 10.* se vidisse in mercatoris cuiusdam dissecto corpore dextrum cordis sinum interiore sui parte durum, exasperatum vndique, & quodammodo squamosum, quo in loco continebatur frustum condensati humoris pituitosi, lentis, albicantis, longitudine medij digiti, crassitie pollicis, sanguine mistum. Verum quia talia non

nisi post mortem demumprehenduntur, nec curationem recipunt, plura de iis non addimus.

## CAP V T I V.

## De Cordis palpitacione.

**A**T Q V E hi sunt morbi, quos cor patitur. Restat vt *Cordis*  
 de symptomatibus, quæ in eius actione accidere so- *palpita-*  
 lent, dicamus, palpitacione scilicet, & animi deliquio, *rio.*  
 syncope. Palpitatio, Græcis *παλμός*, vocabulo generaliter  
 accepto, est *ἀσπλην* p. n. in quacunque corporis parte,  
 quæ distendi & dilatari, iterumque concidere potest, cu-  
 iusmodi sunt partes molles, vt cutis, & subiecti huic mu-  
 sculi; quarum hi non obscuras cavitates habent; inter cu-  
 tem autem & musculos etiam spatia quædam interiecta  
 sunt, in quibus materia palpitacionem efficiens colligi, &  
 contineri potest. Causa enim palpitacionis ita generaliter  
 acceptæ est halitus crassus, qui in parte collectus cum exi-  
 tum non reperiatur, partem attollit, quæ suâ gravitate ite-  
 rum concidit. Atque ita ad hunc motum, seu palpitatio-  
 nem generaliter dictam natura præter expulsionem mate-  
 riæ nihil confert, neque palpitatio hæc voluntariæ virtu-  
 tis & organorum huius actio est, aut motus ex volunta-  
 rio & naturali mixtus, qualis in tremore, sed simpliciter  
*παρὰ φύσιν, & ἀντὶ προαιρέσεως*, à sola causa morbifica partem  
 dilatante & attollente. De quo videatur Galenus, in libr.  
*de tremore, palpitat. & convuls. c. 4. & 5.*

Deinde tribuitur etiam eadem appellatio motui cordis  
 præter naturam, qui *παλμός*, & palpitatio cordis nomina-  
 tur. Nonnulli etiam, teste Galeno, 4. *aph. 65.* per *καρδιαγμὸς*  
 cordis ipsius motionem crebram & celerem palpitatio-  
 ni similem intellexerunt, quam alteram *καρδιαγμὸς*,  
 speciem Erotianus, alij notham palpitacionem faciunt.  
 Verum propriè *καρδιαγμὸς*, & *καρδιαλγία* oris ventriculi  
 affectiones sunt, ortæ ab humore acri, & mordaci, quam  
 partem antiqui *καρδίαν* dixerunt. *Παλμός*, & palpitatio  
 cordis

cordis à nonnullis etiam tremor cordis & "saltus cordis appellatur. Distinguunt nonnulli, inter quos Mercatus, inter tremorem cordis & palpitationem cordis, quod palpitatio à solo morbo fiat, tremor verò à morbo & facultate; Deinde quod palpitatio in ipsius partibus proueniat, quæ dilatarì possunt, tremor verò in iis tantùm, quæ voluntariè moueri possunt. Verùm errandi causa pluribus ista fuit, quod palpitationis vt & tremoris vocabulum vniuocè cordi & aliis partibus competere existimant; quod tamen falsum. Nam sunt plurimi in ea sententia, cordi quoque tale quid accidere posse, quale in cute & musculis fit, à spiritu & flatu frigido & crasso, à quo impletum iterùmque euacuatum cor moueatur, instar vtrium, in quibus tale aliquid à liquore violenter infuso, vel spiritu inflato & rursum compresso contingit. Verùm magna palpitationis in partibus externis, & palpitationis cordis est diuersitas. Cutis enim & partes externæ nullo modo sponte se dilatant, sed solùm à causis morbificis in altum eleuantur & attolluntur. Cor verò cùm facultatem insitam, qua dilàtetur & contrahatur habeat, palpitatio cordis sine motu eius fieri non potest. Neque enim credibile est, cor, cuius motus proprius ad vitam summè necessarius est, & quo cessante, vires omnes collabuntur, instar vtris, vel vesicæ, à flatibus distendi posse. Hoc enim si fieret, cordis naturalem motum cessare necesse esset. Et frustra à nonnullis hinc multa loca à Galeno congeruntur, quibus probare conantur, palpitationem cordis fieri non à natura, sed à morbo, aut potius causa morbifica. Galenus enim in iis locis omnibus tantùm de palpitatione in cute & partibus externis, non verò de palpitatione cordis, quæ alterius naturæ est, loquitur. Et ipse Galenus, 2. de sympt. caus. c. 2. palpitationem cordis & arteriarum ab aliarum partium palpitatione discernit. Atque hinc etiam accidit vt autores alij aliter de cordis palpitatione, vel tremore sentiant, nonnulli etiam planè falsa dogmata habeant. Alij enim in specie eum saltèm cordis motum, qui fit à causa cor molestante, seu ab expultrice cordis stimulata ad expellendum id, quod eordi molestum est, palpitationem cordis appel

appellant. Imò nonnulli specialissimè cordis palpitationem ad eum saltem motum deprauatum restringunt, qui fit à materia crassa & flatulenta cor grauante, & quidem nonnulli, vt dictum, eodem planè modo, vt in cute, in corde à flatu palpitationem fieri docent.

Alij verò omnes motus cordis deprauatos nómine palpitacionis cordis comprehendunt, siue sint parui & tremuli, siue magni & cum saltu quodam. Hinc nonnulli palpitacionem cordis aliam faciunt legitimam & veram, aliam notham; & legitimam eam saltem nominant, quæ fit à vapore crasso, ab aliis autem caussis ortam notham appellant. Sed sufficiens causa nulla est, cur non & illa palpitatio, quam ex vulnere ortam describit Forestus, quæ tam vehemens ac violenta fuit, vt etiam extra domum, in qua æger decumbebat à transeunte, si fenestræ aures admoueret, exaudiretur, & illa, quam Fernelius thoracis vicinas costas effregisse, vel de sua sede depulisse scribit, aut quas Hollerius recenset, legitimæ & veræ cordis palpitaciones nominari non debeant.

Ideoque definimus *palpitationem cordis motum deprauatum pulsantis cordis facultatis, stimulata & irritata à re molesta, & usu eius actionis aucto*. Quamquam enim in febribus in æstu vehementiore & aliis caussis nonnunquam etiam cor vehementius mouetur: tamen nisi motus ille insignis sit & deprauatus, palpitatio cordis non dicitur.

*Causæ.*

Irritatur autem facultas motrix tribus de caussis, nimirum à re aliena & molesta, quam cor expellere nititur, spirituum vitalium defectu, & caliditate præter naturam.

Prima ergo palpitacionis causa est alienum & molestum quid cordi occurrens, quod à se amouere cupit. Et quia hæc causa frequentissimè facit, vt cor ita moueatur, vt eius motus deprauatus appellari possit, reliquæ verò duæ sæpius vehementem aliquem motum potius quam deprauatum efficiant, nonnulli, vt dictum, palpitacionem cordis in specie appellant, quæ fit à causa cor grauante, siue ab expultrice cordis stimulata ad expellendum id, quod cordi molestum occurrit. Dum enim cor grauatur & in motu

impeditur, fit, vt pulsans vis, dum valida est ad expellendum id, quod molestum est, concitetur, & subito ad motum instigetur, vel refarciat motus impeditos, vno maiore pulsu, vel vtraque de causa motum vehementiorem efficiat, aut si vis imbecilla sit, pulsus paruos & crebros faciat, Neq; mirum est, quod à corde tam vehementes motus proficiuntur. Cum enim cor principium vitæ sit, vim etiam expultricem, quàm vlla alia pars, robustiorem habet, quæ nihil, quod cordi damnum inferre possit, tolerat. Ideoque quotiescunque ipsi aliquid molesti occurrit, contra illud vehementissimè insurgit, & hinc edit motus vehementissimos.

*Causæ* Sunt autem causæ, quæ cor molestore, & expultricem  
*cor mo-* eius stimulare possunt, variæ. Primò vapores & flatus non  
*lestes.* solum copia, sed & qualitate manifesta, vel occulta, vel utroque modo cor molestantes, cordis palpitationem excitant. Vnde à venenis, vt & in febribus malignis & pestilentibus, ab humorum putredine & corruptione palpitatione cordis excitatur. Hinc quoque euenit, vt foeminis mensium suppressione laborantibus, & qui melancholiâ hypochondriaca laborant, cordis palpitationes familiares sint. Per arterias enim mesaraicas, & quæ multæ per lienem diffunduntur, itémque ex utero prauis vapores cor subeunt, cuius vis irritata vehementiore palpitatione nititur, quod noxium est, expellere. Hinc etiam euenit, vt in corporis motu nimio, ira, metu, tristitia, æstu, balneis, venere, nimio vini potentioris potu, inedia, palpitatione cordis præcipue in dispositis excitetur. Itaque enim, gaudium, timor, non solum sanguinem & spiritus, sed & humores ac vapores quietos commouent; quod idem & corporis exercitia præstant, & leue exercitium in iis, qui huic malo obnoxij sunt, palpitationem cordis excitat.

Deinde humores putridi, acres, calidi, vel etiam copiosi cor molestore & grauare possunt. Qualem sanguinem in arteriis ex summo calore, veluti retorridum bilique atræ cognatum, se deprehendisse testatur Fernelius. De qua etiam re videatur Platerus, *lib. 1. Pract. p. 569.* qui prolixè hæc de re agit, & palpitationem cordis, quæ virginibus  
 men

menstruorum suppressione laborantibus familiaris est, ad hanc causam refert. Malim tamen in prauos & foetidos vapores causam referre palpitationis cordis in virginibus causâ suppressorum menstruorum malum habitum acquirantibus, quàm cum Platero in copiam sanguinis feruidi & biliosi, qui cum cachexia, ac malo corporis habitu vix consistere potest. Aliàs non negarem, retorridam ac inflamatam in hypochondriis, & in arterias effusam bilem atram cordi communicari posse, cuius malignitate & acrimoniâ cor irritatum vehementiorem hunc motum edat. Idem tamen à prauis vaporibus ex eodem humore eleuatis fieri potest.

Fiunt & cordis palpitationes, dum humiditas illa in pericardio incrementum sumit, vt cor premat & grauet. Huc pertinet sanguis, qui interdum in vulneribus ad cor effunditur, quod accidit proculdubio iuueni illi apud Forrestum, *lib. 17. obseru. 1.* de quo antea dictum. Molestant & cor tumores in pericardio excitati, siue illi sint scirrhusi & humoris expertes, siue humorem in se contineant. Refert Platerus in quodam, diuturniore cordis tremore è medio sublato, osseum quiddam & cartilagineum in corde deprehensum fuisse. Et Schenckius, *lib. 22. obs.* refert, in sacerdote quodam, qui à teneris vnguiculis vsque ad annum 42. quo mortuus est, palpitatione cordis laborauerat, in cordis basi carnis excrescentiam repertam fuisse, quæ sex drachmas ponderaret & alterum corculum repræsentaret. Refert quoque Dodonæus, in *annot. ad cap. 35. obseru. Beniuenij*, se callum in arteria magna loco cordi proximo obseruasse. Vnde palpitatio orta est per multos annos durans. Huc etiam referendi vermes, quos in capsula cordis genitos causam palpitationis cordis fuisse referunt. Nonnunquam etiâ externum quid cordi occurrere potest, quod illud pungat, rodât & rumpat.

Secundò, si ob inedia, vel morbos vehementes spiritus subito aut nimium dissipentur, vel per animi affectus, iram, gaudium, metum, pudorem, spiritus subito hinc inde propellatur ac dissipentur, nec vt par est, in totum corpus distribuuntur, vt huic defectui cor occurrat, & quod sui

officij est, omnibus partibus spiritus necessarios suppeditet, eius motum intendi, vehementiorémque reddi necesse est. Hinc quibus aliàs spiritus defunt, & qui debiles ac huic morbo obnoxij sunt, iis vel leue exercitium cordis palpitationem accersere potest.

Tertiò si calor præter naturam in corde augeatur, non solum spiritus intus absumentur & dissipantur, sed & accenduntur, ac propterea motus cordis & arteriarum augeatur, vt quod absumitur, restituatur & calor refrigeretur. Fit autem hoc à causis tum internis, tum externis, irâ, motu. Ita obseruauit Platerus, iuuenem quendam admodum calentem, cum in exercitio pilæ ira corripere, atque ita duæ causæ coniungerentur, ita palpitatione cordis affectum fuisse, vt cum recolligere se non posset, nec hi motus remitterent, subito extingueretur.

Hæc duo tamen causarum genera posteriora valdè excedere oportet, si cordis palpitationem excitare debent. Aliàs enim saltem vehementiorem aliquem, non verò deprauatum, arteriarum & cordis motum excitant. Ideoque nonnulli, vt dictum, primum solum causarum genus admittunt, vtpote quod frequentissimè palpitationem cordis excitare solet.

Et omninò frequentior est palpitatio cordis, quæ fit per consensum aliarum partium, quàm quæ per primarium cordis affectum oritur. Habet enim cor cum pluribus partibus corporis consensum, & ab iis vapores ac flatus & humores recipere potest. Ab vtero quidem per arterias cum spermaticas, tum hypogastricas, quæ à corde ad vterum descendunt; à liene, per arterias, frequentiores per lienem dispersas, id quod scorbuticis non rarò accidit; ab epate, per arterias ad epar tendentes, & venam insignem dextro ventriculo cordis insertam; à pulmone etiam per communia vasa.

#### *Differentiæ.*

*Differentiæ.*

Differentiæ ex hæcenus dictis ferè parent, & à causarum varietate præcipuè petuntur. Patet ex iisdem affici cor vel per idiopathiam, cum causa morbi in ipso corde aut eius vasis consistit, vel *ἢ συνεπάδεται*, cum aliunde communicatur ex vtero, liene & aliis partibus.



## Signa diagnostica.

Signa.

Malum hoc etiam ab ipso ægroto proditur & cognoscitur, manūque suprà cordis regionem appositâ deprehenditur. Estq; hic motus in corde aliàs debiliior, aliàs validior, & nonnunquam tam validus & vehemens deprehensus fuit, vt ab adstantibus audiretur, vt refert Christ. à Vega, *art. Medic. lib. 3. c. 8.* & quidem etiam ex interuallo, vt ex Foresto dictum, aut vt costas vicinas cordi effringeret, vel sua sede dimoueret, aut in arteria *ad Axiom.* pomi magnitudine efficeret. Quiete hoc malum remittit; exasperatur motu, æstu, balneo, ira, crapula, vsu vini potentioris, venere. Causarum autem varietatem discernere non ita facile est. Si à vapore & flatu originem ducat cordis palpitatio, repentina fit accessio, & à leui corporis motu excitatur, ac facilius quoque discutitur; respiratio est difficilis, sæpè accedunt tremor in genuis, oculorum tenebræ, sonitus aurium, & non rarò circa aliquam partem dolor, qui sponte statim cessat, percipitur. Qualis autem flatus sit vel vapor, ex humorum signis cognoscitur, cùm vapor humoris, è quo eleuatur, naturam referat & retineat. Si verò humor sit causa palpitationis, non ita subitò humor inuadit & diutius durat, quàm cùm à vapore palpitatio ortum habet. Qualis autem humor sit, ex signis humorum abundantium faciliè innotescit. Et omninò siue humor, siue vapor ab aliis partibus communicetur, ex partium illarum affectarum signis cognoscitur, & inprimis affectio hypochondriaca & mensium suppressio in foeminis latere non possunt. Difficilius aqua in pericardio abundans cognoscitur. Malum tamen etiam est continuum, & ægri conqueruntur, cor in aqua quasi detineri & suffocari, tandèmq; emaciantur, vt hecticâ correpti. Si humores sint prauis, corrupti, maligni, venenati, magna varietas in pulsū apparet, præcipuè in magnitudine & paruitate. Magna enim est naturæ pugna. Accedit lipothymia, atque alia signa humorum venenatorum & malignorum adsunt. Si ab alia substantia cor grauante & premente est palpitatio, tùm motus valdè est præternaturalis, & inæqualiter ac præter naturam cor quasi exsilit, vt vel propulset, quod mo-

lestum est, vel ibidem motu diastolin maiori resarciat. Atque tales causæ faciliè à suis signis patent. Si tumor sit causa palpitationis, notabilis in cordis pulsu apparet varietas, motus valdè à naturali statu recedit; ferè inæqualis, ac inordinatus est. Et si tumor sit calidus, maxima in corpore erit inflammatio, sitis magna, difficilis respiratio, accedit lipothymia, & tandem mors sequitur. Si autem tumor durus sit in pericardio, motus est continuus, & æger sensim sine manifesta causâ & euidenti contabescit. Si caro, vel simile quid cordi à primo ortu adnascatur, palpitatio quoque à primo ortu ad mortem vsque hominem comitatur.

Si verò ex spirituum defectu palpitatio cordis excitetur, patet hoc non solum ex causis, quæ præcesserunt, spiritusque dissipauerunt & absumpserunt, verum etiam ex eo, quod pulsus crebrior est, & interdum celer, simulque parvus, ob virium imbecillitatem.

Tandem si ob caliditatem nimiam præter naturâ palpitatio cordis accidat, cognoscitur id ex signis febris, aliisque causis calefacientibus: & præter frequentiam & celeritatem in pulsu magnitudo adest, dum vires constant. Præterea motus hic paulatim deprauatur, & maior est ac vehementior in diastole, quàm systole. *Prognostica.*

*Prognostica.*

1. Palpitatio cordis omnis periculosum & non contemnendum malum est, ob læsum cordis motum, quo vita conseruari debet, & quæ frequenter ad syncopen deducit, tandemque hominem è medio tollit. Docetque Galenus, 2. *aph.* 41. & 5. *de loc. affect.* c. 2. omnes, qui iuuenes, aut in declinante ætate sani subito sine ullo manifesto symptomate, palpitatione cordis correpti sunt, omnes ante senectutem mortuos esse, alios per febres acutas, alios cum sani degerent subito syncope correptos, alios etiam citra syncopen apoplectico more. Frequens enim palpitatio signum erat, cor & partes vicinas debiles fuisse.

2. Palpitatio per idiopathiam cordis periculosior est, quàm quæ fit per sympathiam: quæ item ab interna causâ, quàm quæ ab externa; nisi magna sit externæ causæ vehementia, vt veneni & ictus violentia.

3. Malum

3. Malum hoc sæpius recurrens tandem hominem iugulat, & quidem si à pericardio affecto proueniat, hominem lentè enecat, & ad tabem deducit.

4. Si proueniat à soluta vnitatē vel tumore cordis, malum desperatum & insanabile est.

5. Periculosum quoque est, si à causa venenata & maligna originem ducat, ægrique tales ratiō euadunt, sed citò moriuntur.

*Indicationes.*

Curatio autem, vbi malum curam suscipit, ad duo in- *Indica-*  
primis dirigenda. Primum est, vt causa quælibet, prout na- *tiones*  
tura eius postulat & indicat, tollatur. Alterum, vt cor fa-  
miliaribus & calorem eius innatum fouentibus roboretur.  
Nonnulli censent, & quidem ex Galeni, vt opinantur, sen-  
tentia, omnes palpitatione cordis laborantes adiuuari san-  
guinis missione. Verùm & ipsa hæc sententiā à veritate alie-  
na est, & falsum Galenū hoc scripsisse. Non enim Galenus,  
5. de loc. aff. c. 2. omnes palpitatione cordis laborantes ad-  
iutos phlebotomia scribit, sed omnes, qui iuuenes aut in  
declinante ætate constituti sani repente cordis palpitatione  
correpti sunt, eos scilicet, qui palpitatione cordis la-  
borabant ex sanguine vitioso cor opprimente, aut ex flatu  
crasso vel frigido, vel cum plethora pura aut impura, quæ  
adiuuat impetum huius flatus ad cor, aut eius generatio-  
nem per oppressionem diminuto calore, aut etiam impe-  
diebat sua præsentia vsum remediorum sanantium cali-  
dorum. Si verò palpitatio cordis sit ex frigidis, pituitosis,  
crudisque humoribus, sanguinis missio non conuenit; cum  
humores illi sanguine detracto crudiores reddantur: sic &  
in aliis causis, quas non tollit venæsectio, sanguinem mit-  
tere inutile est.

*Curatio palpitationis cordis à flatu & vapore.*

Sed vt de hisce in specie secundum causarum varie- *Curatio*  
tatem dicamus, Primò si à flatu & vapore cor molestante *palpita-*  
fit palpitatio, sanguisque simul redundet, vena aperi- *tionis*  
da est. Alioquin enim calidis flatus discutientibus com- *cordis à*  
modè vti non possumus, quin potius calidiorum vfu mate- *flatu &*  
riæ affluxus ad cor augeretur. Aperiatur autem vena vel *vapore.*  
in dextro vel sinistro brachio, prout pulsus in hoc vel illo *Venæsectio.*

brachio magis inquietus est, & pro redundantia eius ac virium robore sanguinis emittatur. Utile quoque foret, crurum venas aperire, ut materia deorsum retrahatur, præsertim in foeminis, quibus à mensibus suppressis malum originem habet. Licet & cucurbitulas cruribus affigere.

*Hæmorrhoides.* Hæmorrhoides, si prouocari possint, magnum in hoc malo auxilium afferunt; cum vix commodiore via sanguinem euacuare tum liceat.

*Hæmorrhoides.* Reliqua quod attinet, cum flatus & vapores ab humore sui generis foueantur, humores vitiosi tollendi medicamentis non violentis, sed lenibus sæpè repetitis, ut materia per *ἰνίξεσιν* tollatur. Et cum malum hoc multorum morborum, inprimis melancholiæ hypochondriacæ & mensium suppressorum, utriusque morborum comes sit, curatio ad illos morbos dirigenda, cordialibus semper additis.

*Vapores discutientia & corroborantia.* Postea vapores discutientia & corroborantia exhibeantur, & ex iis nunc calidiora, nunc frigidiora, ut causa morbi requirit. Monétque Auicennas in omnibus morbis cordis fugienda esse vehementer calefacientia, quæ vires cordis dissoluunt; vehementer refrigerantia, quæ calorem labefactant, & spirationem difficilem reddunt; vehementer adstringentia, quæ fulgines & excrementa retinent. Quæ autem cor calefaciunt, quæ item refrigerant, suprà de intemperie cordis sunt proposita. Temperata sunt, *aurum, margaritæ, corallia, os de C. C. lapides pretiosi, bezoar, bolus armenus, terra sigillata.*

*Oleum citri in hoc malo valde efficax.* Oleum citri quoque cum conserva aliqua vel alio modo exhibita valde efficax est ad flatus crassos discutiendos & corroborandum. Insignem quoque vim habet rhaponticum verum *ἢ ij.* pondere exhibitum cum vino, aut vinum, in qua eadem radix macerata est.

*Electuarium.* Vel *℥. Conserva. meliss. anthos. bugloss. an. ʒ. j. cortic. citri condit. rad. condit. scorzonera, an. ʒ. ʒ. spec. diamosch. dulc. diabræ, an. ʒ. j. confect. alcherm. ʒ. j. Cum syrupo tunic. F. Electuarium. Aliud.*

*℥. Conserva. borag. tunic. an. ʒ. ij. confect. alcherm. theriac. an. ʒ. j. spec. elect. de gemm. arom. ros. letitiæ Galeni an. ʒ. j. Cum syrupo bugloss. & de cortic. citri. F. Electuarium.*

Electuarium Langij.

℞. Conf. ros. ʒ. iv. fl. tunic. ʒ. j. meliss. ʒ. ʒ. spec. diamarg. Elect.  
 frig. ʒ. iv. galangæ, ʒ. j. cinam. interior. ʒ. iv. caryophyllor. Langij.  
 ʒ. ij. doronic. ʒ. j. succin alb. ʒ. ʒ. nuc. mosch. condit. ʒ. ij.  
 xinxib. condit. ʒ. ʒ. cortit. citri. pinear. præp. an. ʒ. ij. sem.  
 melonum. ʒ. j. manus Christi cum perlis, ʒ. ʒ. marg. præp. ʒ. v.  
 fol. auri, N. x. Cum syr. acetos. citri. F. Elect.

Vel ℞. Confect. alcherm. ʒ. ij. lapid. bezoar. margarit. præ- Syrupi &  
 par. an. ʒ. ʒ. ol. citri, gutt. iij. M. potiones.

Detur ʒ. ʒ. vel vnus, cum aq. vel syr. borrag.

Vel ℞. Aq. flor. borrag. in balneo destillat. ʒ. vj. flor. citri,  
 ʒ. ij. syrup. flor. borrag. tunic. an. ʒ. j. spiritus ros. ʒ. ij. aqu.  
 cinamomi ʒ. ʒ. carbuncul. ʒ. ij. magister. perlar. ʒ. j. confect.  
 alcherm. ʒ. ʒ. M.

Dentur cochlearia duo, vel tria.

Extra quoque applicentur sacculi de melissa, flor. lauend,  
 rorismar. borrag. bugloss. & aliis supra enumeratis cordiali-  
 bus parati, ac vino albo & aq. ros. irrorati.

Vt ℞. Flor. rosar. rorismar. an. ʒ. ij. lauend. ʒ. j. sem. angel.  
 cortic. citri, caryoph. cinamom. macis, an. ʒ. ʒ. croci, ʒ. j. mos-  
 chi, ambr. an. ʒ. vj. Cum syndone rubro, fiat sacculus.

Aut applicetur epithema, ex aqu. rosar. meliss. lauendul.  
 borrag. card. benedict. cinamomi, carbuncul. vel melissa viri-  
 dis contrita & aqu. ros. ac maluatico irrorata supet latere  
 ignito calefacta cordi applicetur. Inungi etiam potest  
 cordis regio, oleo citri, meliss. caryophyll. macis, cinamomi,  
 vel solis, vel cum vguento rosaceo mistis.

℞. Unguent. rosar. ʒ. ʒ. ol. citri, ʒ. ʒ. cinamom. carya-  
 phyll. an. gutt. vj. mosch. ambr. an. ʒ. iij. M. fiat linimen-  
 tum.

Vel ℞. Ladani puri, ʒ. ʒ. styrac. calamithæ, terebinthin.  
 mastich. an. ʒ. ij. ol. citri, caryophyæ. cinam. an. gutt. vj. mosch.  
 ambr. an. ʒ. iij.

Subigantur in mortario pistillo calido, addendo sub  
 finem, ol. nucis mosch. express. ʒ. ij. F. emplastrum.

Vid. Vidius lib. 7. de cur. membr. pag. 292. cucurbitulas  
 sine scarificatione applicare iubet, iisque magnam in dis-  
 cutiendis ac digerendis flatuosis spiritibus, qui in parti-

bus internis inclusi continentur, inesse scribit.

Sunt & odoramenta valdè vtilia: cùm via non longè ad cor tendant, virèsq̃ valdè reficiant.

*℞. Fol. meliss. ocymi caryophyllati, an. ʒ. ij. cortic. citri, sant. citrini, caryoph. an. ʒ. j. croci, ʒ. ʒ. ambr. ʒ. vj. mosch. ʒ. iv.*

Ligentur in nodulo, & irrorentur aq. cinam. & rosar. Vel balsama ex enumeratis modo oleis olfacienda naribus illinantur.

Tandem in hac palpitationis cordis specie, quæ à flatibus provenit, opera danda, vt materia flatuum distrahat̃ur, & propterea clysteres purgantes & resoluentes flatus sæpius iniiciantur.

*Curatio palpitationis cordis ab humore.*

*Curatio  
palpita-  
tionis  
cordis ab  
humore.  
Venase-  
ctio.  
Purgan-  
tia hu-  
mores se-  
roses.*

Si palpitatio cordis ab aqua in pericardio contenta originem habeat, ea euacuanda & absument̃da, ac cor roborandum est.

Nonnulli hîc etiam venæsectionem præcipiunt, sed malè. Tantùm enim abest, vt venæsectio eam euacuet, vt potius ad augendam faciat, calore debilitato.

Quidam purgantibus humores aquosos vtuntur, verùm causam antecedentem & humores serosos in corpore, quæ aquam augere possunt, talia euacuant: ipsam verò aquam in capsula cordis contentam euacuare non valent. Itaque efficacissima hîc sunt medicamenta aquam illam absumentia & discutientia tam interna, quàm externa.

*Aquam  
in peri-  
cardio  
discuti-  
entia in-  
terna.  
Externa.*

Inter interna vtilia sunt *confect. alchermes, spec. diambre, diamoschi, aromat. rosati, theriaca, Mithridat. & alia cordialia calidiora, vt; decoct. ligni guaiaci, sarsaparill. sassafras cum corticibus citri.*

Extra verò vtile est, panem calentem à furno regioni cordis applicare, item spongiam vel linteum triplicatum decocto vel aqua aliqua cordiali discutiendi & exsiccandi vim habente madidum.

*℞. Spec. arom. ros. diam. an. ʒ. ij. pulu. mat. caryoph. cortic. citri an. ʒ. j. fl. bugloss. citri, an. ʒ. ʒ. F. Sacculus ex syndone rubro, qui vino albo irroretur, & cordis regioni applicetur. Simul odorata medicamenta cordialia, naribus admoueantur, & cibis admisceantur.*

Nonnul

Nonnulli vesicatoria cordis regioni applicant, quæ quomodo è cordis capsula per spatium thoracis in cavitatem, in musculos & cutem aquam attrahere possint, non video. Vesicatoria.

Quæ verò ex humoribus è ventre inferiore transmissis oritur cordis palpitatio, eandem ferè curationem habet, quam ea, quæ ex flatibus prouenit. Et omnino si palpitatio cordis per consensum fiat, præcipua curationis ratio est, vt pars affecta, quæ eam communicat, diligenter curetur. Curatio palpitationis cordis ex humoribus aliunde transmissis.

Itaque primò vniuersales corporis purgationes instituendæ, & vel vena aperienda, vel humores vitiosi expurgandi, vel vtrumque agendum pro humoris peccantis & membri materiam suppeditantis naturâ & ratione. Humores etiam ad cor ruentes reuellendi. Hercules Saxonia hoc Elect. cõmendat, ad humorem tam pituitosum, quàm melancholicum in hypochondriaca affectione, & cordis palpitacione. Purgatio.

*℥. Meliss. ocymi, buglos. borrag. betonic. agrimon. puleg. an. m. j. cortic. citri, ʒ. ss. sem. citri, ʒ. j. caryophyll. cinamom. ligni aloës, macis. an. ʒ. j. sol. sen. elect. ʒ. vj. epithymi, polypod. q. an. ʒ. iv. mirobalan. chebul. citrin. an. ʒ. j. passul. enucleat. lb. j.*

Aromata ligentur in nodulo, & omnia bulliant, in s. q. aquæ ad dimidiæ partis consumptionem, vel quod commodius est, dimidium saltem aquæ, quæ aliàs ad coquendum sumi solet, affundatur, & in vase clauso in Balneo per triduum macerentur, exprimantur & clarificentur.

Hinc adde *pulp. prun. lb. j. cinam. el. ʒ. ss. sacch. alb. q. s.*

Coquantur ad iustam consistentiam, vel potius saccharum sufficienter inspissatum addatur.

Ad materiam reuellendam in diuturnis & frequentibus cordis palpitacionibus cauteria & vesicatoria, vel brachiis; si materia à capite defluat, vel cruribus, si palpitatio cordis sit per essentiam, aut à partibus inferioribus ad cor transmittatur, vtilia sunt. Cauteria & vesicatoria.

De vesicatoriis tamen hoc monet Mercurialis, ne cantharides vsurpentur; cùm vim malignâ & cordi aduersam habeant, sed potiùs ranúculus, flâmula Iouis, sinapi, & similia. Cautela.

Hinc cor roborandum medicamentis modò enumeratis, & inter ea in primis lapide Bezoar, margaritis, lapidib. pretiosis Cor roborandis.

pretiosis. Et quidem in materia frigida, theriacā præsertim extra adhibitam, valdè commendat Mercurialis, narratque Maximilianum Imperatorem, cui palpitatio cordis familiaris erat, sibi retulisse, se nullum remedium theriaca melius inuenisse.

Nonnulli quadrupedum & auium corda, vt cæui, bovis, porci, turturis commendant, & præsertim assa peculiari proprietate prodesse docent. Hinc hæc aqua additis medicamentis cordialibus destillari potest.

℞. Cor cæui vel bovis, N. j. meliss. m. j. flor. cordial. m. fl. cortic. citri, ʒ. fl. sem. ocymi ʒ. ij. caryoph. cinamom. sant. citrin. an. ʒ. j. croci, ʒ. fl.

Affundatur vini, q. s. ac destillentur. Aliæ duæ descriptæ exstant in Institut. lib. 5. part. 3. sect. 3. c. 5. p. 1352.

Efficaciores fiunt aquæ, si moschi, ambre, an. ʒ. fl. in alembicò suspendantur.

Mercatus hanc commendat.

℞. Corda turturum N. ij. ceruorum, vel bovis N. iij. caryophyll. galangæ, an. ʒ. ij. fl. macis. flor. bugloss. borrag. an. p. j. rorismar. p. ij.

Affundatur vini q. s. Stent per noctē, postea destillentur. Efficax est & elixir cordiale in Institut. loc. all. p. 1359. propositum. Vt & hæc aqua :

℞. Flor. borrag. rorismar. rad. bugloss. an. ʒ. iv. croci, ʒ. j. succ. cydonior. lb. fl.

Vini q. s. Stent in infusione per dies 14. postea destillentur. Dosis ab ʒ. fl. ad ʒ. j. cum ʒ. ij. vini albi gener. vel maluat. tici in caussa frigida; in caussa calida cum aqua borraginis. Vel propinetur hoc vinum.

℞. Rad. belen. angelic. zedoar. galangæ, scorzon. an. ʒ. ij. cortic. citri, ʒ. j. caryoph. cinamom. an. ʒ. ij. sem. coriandr. præp. ʒ. fl. anthos. ʒ. ij. meliss. m. j.

Affundantur vini alb. lb. xvij. Plura talia vide apud Rondelet. l. 2. c. 17. Iohan. Lang. lib. 3. epist.

*Curatio palpitatio cordis à reliquis causis.*

*Curatio palpitatio*

Si à vermibus in capsula eius palpitatio cordis fiat, vermes interficiendi, vt suprà de vermibus in capsula cordis genitis



genitis dictum. Ad eosdem autem enecandos, & lapis Bexoar adhibetur.

Si à spirituum defectu fit palpitatio, curatur spiritus reficientibus & corroborantibus, inter quæ in primis, si morbus id patitur, vtile est vinum odoratum, & aquæ ac spiritus cordiales, quorum hætenus facta est mentio.

Quæ ex calore nimio & in febribus accidit cordis palpitatio, tollitur medicamentis calorem febrilem temperantibus, & iis, quæ supra de intemperie, cordis calida propofita sunt.

## Dieta.

Victus ratio à medicamentis non discrepet. Aër fit purus & alteretur cordialibus compositis, prout causæ ratio id postulat. Eodem modo cibus & potus sese habeat, qui causæ aduersetur, cor verò roboret. Si causæ sit frigida, flatus crassi, materia melancholica, cibo attenuante, & calefaciente opus est, & propterea cibi condiantur aromatibus, & aliis cordialibus calidis. Vinum fit tenue, odoratum, & ad dulcedinem vergens, vel cereuisia clara & defecata, qui potus herbis & aromatibus conuenientibus condiri possunt. In causæ calida cibi condiantur acetosis cordialibus, vt succo citri, limonum, arantiorum, granatorum, acetosæ, ribes.

Potus sit aqua hordei cum succis iisdem & eorum syrupis, aut cereuisia tenuis. In spirituum defectu nihil vtilius vino odorato, quod subito spiritus reficit. Animi & corporis motus nimij, vigiliæ, exercitia nimia, Venus præcipue, ira, tristitia, aliæque animi perturbationes vitentur.

## CAPVT V.

## De virium imbecillitate.

**V**T in palpitatione cordis eius pulsatio deprauatur: ita quandoque accidit, vt eodem modo eius & artèriarum motus imminuatur: quod malum vulgò virium imbe-

tionis  
cordis à  
reliquis  
caussis.  
à vermi-  
bus.  
à spiri-  
tuum  
defectu,  
à calore  
nimio  
febrili.

## Dieta.

Virium  
imbecil-  
litas.

imbecillitas; Germanis *Schwachheit*, appellatur. Et si enim virium nomine etiam aliæ functiones intelligantur: tamen præcipuè vitales actiones per eas accipiuntur; & propterea hoc loco de ea agere placet. Itaque virium defectus & imbecillitas dicitur, cum vires vitales atque cordis & arteriarum præcipuè læduntur. Adest quidem & tum motus impotentia, sed differt ea ab ea motus impotentia, quæ, *libr. 1. part. 2. cap. 26.* fuit explicata, quod illa, viribus, & actionibus cordis saluis, neruoso genere in primis affecto, accidit; hæc verò potissimum corde læso & spiritibus deficientibus ortum habet, unde labes illa etiam animali facultati communicatur, dum spiritus vitales, animalium materia, non sufficienter generantur, nec calidum natium omnium partium influente calore, & spirituum vitalium influxu satis fouetur. Hinc in hac virium imbecillitate vniuersum corpus actiones suas difficulter perficit, & ægrè etiam mouetur, partibus non resolutis, vt in motus impotentia, sed languidis, & conquassatis. Arteriarum quoque modus, seu pulsatio tunc etiam imminuitur, nec ea, vt solent, & debent dilatantur, fitq; pulsus, vel paruus, vel languidus, vel tardus, vel rarus, vel intermittens, vel obscurus, aut miurus, aut formicans, aut vermiculans, prout imbecillitas hæc maior, vel minor est. Eodem modo, vt arteriarum motus, ita & cordis motus sese habet. Estque hæc virium imbecillitas maxima paulò ante mortem in agone dicto.

*Causæ.*

*Causa.*

Imbecillitas autem hæc ortum habet à spirituum & calidi innati, seu substantiæ spirituosæ, à quo vita & robur partium dependet, defectu. Spiritus autem hic insitus cum foueatur à spiritu vitali, in sinistro cordis ventriculo genito, & per arterias in vniuersum corpus diffuso, qui inde influens spiritus dicitur; si primò spiritus ille vitalis non satis copiosè, & rectè à corde in partes omnes influat, insitum etiam, atque hinc omnes totius corporis vires debilitari necesse est. Qua ratione autem & quibus de causis spiritus vitales deficere possint, *capite sequenti* dicitur; scilicet, quod vel non generantur, vel quod generati dissipantur, aut suffocantur. Quæ causæ omnes etiam

hic

hic locum habere possunt, nisi quod in lypothymia & syncope spiritus vitales penè toti & subito deficiunt; in virium verò imbecillitate pauciores, quàm debebant, partibus communicantur.

Deinde cùm spiritus insitus non solum influente foueri debeat, sed etiam humido primigenio, quod appellatur, cui insideat, tanquam pabulo indigeat, si humidum istud deficiat & imminuatur, etiam spiritum insitum debilitari, & vires labefactari necesse est.

Tertiò si etiam ipsa spirituosa partium substantia, seu spiritus insitus, vel calor innatus dictus imminuitur in toto, virium in toto corpore imbecillitas sequitur. Accidit autem hoc ab iisdem causis, quæ spiritum influentem dissipare, vel suffocare possunt, quæ *capite sequenti* proponuntur. Fit nimirum cùm humidi primigenij, tum caloris insiti, seu, ut utrùmque vno nomine complectamur, calidi insiti imminutio à nimia Venere, sanguinis, & alijs euacuationibus, quæ spiritus dissipant, dolore nimio; animi affectibus, & præcipuè timore & moestitia diuturna; morbis acutis, & longis, in primis febribus, quæ & cordis & omnium corporis partium humidum primigenium exhauriunt, & calidum natium dissipant; calore, & æstu externo; labore & exercitiò nimio; frigore nimio, ut & otio, quo calor nativus quasi suffocatur & torpidus redditur; humoribus vitiosis, qui per totum corpus diffunduntur, & calidum natium opprimunt, vnde insolita virium debilitas imminentium morborum signum esse solet; venenis tandem & venenatis qualitatibus, quæ cordi & calido nativo tota substantia aduersa sunt.

#### *Signa Diagnostica.*

Ipsam malum per se patet, ægrique de virium omnium debilitate conqueruntur. Causæ verò ex iis quæ præcesserunt, vel adsunt, cognoscuntur, & *cap. seq.* etiam explicabuntur. *Signa.*

#### *Prognosticum.*

Quid autem periculi portendat, id omne ex causarum gravitate, vel leuitate æstimandum. Prout enim causa, quæ virium debilitatem inducit, grauior, vel leuior est: ita etiam *Prognosticum.*

etiam virium imbecillitas plus vel minus periculi portendit.

*Indicationes.*

*Indicationes.*

Curatio in duobus consistit, primò vt causæ, si adhuc adsint, tollantur, nimirum si euacuatio aliqua nimia sit, supprimatur; si à dolore spiritus dissipentur, vt is leniatur, & mitigetur; si ab animi affectu nimio, vt ei modus adhibeatur; si morbus vel febris adsit, curetur; si imminet, humores vitiosi expurgentur; si ex otio calor torpeat, corpus exerceatur; si à qualitate maligna calor destruat, ea expugnetur: Secundò vt calidum insitum & spiritus vitales influentes conseruentur.

*Curatio.*

*Curatio.*

Qua ratione autem causæ istæ tollendæ sint, aliunde & ex sequenti quoque capite patet. Quapropter saltem hic, qua ratione calidum insitum & spiritus influentes conseruari, instaurari & augeri possint, dicemus: etsi etiam supra, *de intemperiebus & morbis cordis*, hac de re dictum sit, quod ibi videri, & huic transferri potest. In medicamentis tamen exhibendis ad causas simul respiciendum, ne dum spiritus reficere volumus, causam augeamus. Ideoque in imbecillitate virium à febre acuta, vel hectica calefacientia, & exsiccantia non conueniunt, sed temperata exhibenda.

*Odorata  
spiritus  
reficiunt.*

Vtilia autem hîc sunt in primis medicamenta cordialia supra preposita, è quibus pro causæ ratione conuenientia eligantur. Ideoque hîc composita quædam saltem proponemus; è quibus cuilibet morbo commoda eligi poterunt. In primis verò gratum odorem spirantia spiritus reficiunt, ac roborant; atque hinc vinum odore plenum spiritus valdè recreat; præcipuè si aliorum odoratorum vi imprægnetur, qualia sunt *moschus, ambra, cinamomum, caryophylli, macis, crocus, zedoaria, cortices citri, lignum aloës, santalum, styrax, ladanum, rosæ, violæ, lauendula, yosmarinus, spica nardi, melissa, ruta, salvia, &c.* Vtile etiam est acetum, præcipuè ex maluatico, & in primis rosis, fl. lilior. conuallium, ruta, pulegio, succo rubi Idæi imprægnatum.

*Aqua*

*Aqua odorifera cordialis, pro naturis calidioribus.*

℞. Caponem, abscinde caput & pedes, exenteretur, ac *Aqua*  
pinguedo remoueat. Incidatur minutim & affundatur *cordialis,*  
*Aq. buglossæ, cortic. citri, borrag. cichori, acetosæ, rosar. an. canth.* pro cali-  
*f. flor. stæchad. Arabic. chamamel. Romani, borrag. buglossæ, an.* dis.  
M. j. spec. aromat. rosati, diatrionsantal, cinamom. acutiss. an.  
℥. β. santali citrini odoriferi, ℥. j. pomor. citri recent. N. iv.

Incidentur incidenda minutim, fiatque destillatio secundum artem: Datur ad placitum fumentis ab uncia semis ad unciam unam.

*Aquam instaurans dicta.*

*Aqua*

℞. Iuris capi & cordis bouis vel cerui simul perfecte cocti, instaurans. j. vini maluatici, pomum arantium vel limonium, vel raris.  
aliud; ut dictum, dissectum in partes unum vel duo, rad. galangæ, fol. melissæ, an. ℥. j. cinamomi, ℥. β. caryophyll. ℥. ij. sem. coriandri, acymi, flor. rosar. rubr. scabiosæ, bugloss. utriusque an. ℥. j. croci ℥. j. rasuræ C. C. eboris an. ℥. j. Misce; eliciatur aqua.

Quæ per se datur, vel cæteris commixta.

*Aqua odorifera pretiosa.*

℞. Flor. lilior. conuall. M. ij. rosar. rubr. opt. M. vj. lauendula, M. j. borrag. bugloss. an. M. ij. fol. saluæ, maioranæ, hyssopi, rorismarini, an. M. iij. melissæ, mentha crispæ, an. M. j. cinamom. acutiss. cubebæ, styrac. calamitæ, an. ℥. j. macis, piperis long. cardamomi minor. nuc. mosch. caryophyll. an. ℥. β.

*Aqua*  
*odorifera*  
*pretiosa.*

Tusis & incisus minutim, ac repositis in cantharum magnum, affunde vini maluatici & aq. rosar. opt. ana canth. ij. digerantur ad triduum, quotidie ter agitando: dehinc fiat destillatio igne lentiss. & in capitello vel rostro ponatur ambr. moschi ana ℥. β. cum syndone rubr. detur imbecillo vel natura vel vi morbi cochleare vnum sæpè, & humectentur in hoc destillato lintea pura, quæ admoveantur cordi, temporibus, pulsibus ac naribus.

*Aqua vitæ odorifera pro naturis frigidioribus*

*& adultis.*

℞. Spiritus vini rectificati lb. ij. croci, caryophyll. granor. paradisi, nuc. mosch. macis, cinam. mastiches, cardamom. zedoariæ, cubeb. rosar. rubr. an. ℥. j.

*Aqua*  
*odorifer*  
*pretiosa*

Pulueriscentur crasso modo, fiatque infusio ad octiduum, dehinc fiat colatura citra expressionem, & adde *miſc. cydonior.* 3. vj. Misce, datur pro vice cochleare vnum: roborat stomachum, epar, splenem, & cor, renibus etiam in expellenda serositate vires addit: potest mane, ac sero sumi ante somnum.

*Alia aliqua odorifera.*

℞. *Flor. rosar. opt. recent.* 3. vj. *Spica nardi vulgar. rec. berb. rorismar. maioran. an.* 3. j. *basilici, thymi, satureia, an.* 3. 8. *cortic. citri recent.* 3. ij. *ligni aloës odoriferi, cinam. elect. an.* 3. j. *cariophyll. 3. 8. rad. ireos Florent. 3. vj. storac. calam. asæ. dulcis, an.* 3. 8. *vini maluatici, aquæ rosar. ana. lb. iv. lauendul. meliss. an. lb. j.*

Viridia incidantur, arida verò in puluerem redigantur, Solique exponantur per 7. vel 9. dies: Deinde destillentur lento igne in vase duplici. Præparanda est hæc aqua tempore æstiuo: datur intra corpus 3. 8., extra eâ pulsus & nares humectentur: potest etiam manibus irrorandis ac lauandis adhiberi.

*Utile & potiones.*

℞. *Confect. Alkermes, ʒ. j. pulu. diamarg. frig. 3. 8. syr. de acetos. citri, 3. 8. de papauere, 3. iij. Cum aq. rosar. bugloss. & cinamomi, Fiat potio.*

Hæc & in doloribus hominem prostermentibus utilis, auctâ præsertim syr. papauerini quantitate.

*Alia, quæ & in veneno sumpto conueniet.*

℞. *Confect. de hyacinth. 3. 8. Syr. acetos. citri, 3. j. aqu. scabios. meliss. an. q. s. Fiat potio.*

Rotulæ Manus Christi & diamargariti frigidi sint in frequenti usu, vel rotulæ & morsuli suprà, partis huius cap. 2. propositi. Vel paretur talis mistura,

℞. *Pulu. sacch. optim. q. v.*

Humectetur probe cum aqua cinamomi optima, quo nihil fluidum reddatur saccharum, cui adde aliquot guttas spiritus vitrioli pro acetositate manifesta; vterius admisce ol. cinamomi, gut. iij. caryophyllorum, gut. ij. macis, nucis mosch. destillat, anisi, an. gut. iij.

Probè

Probè inuicem miscendo detur cum cochleari argenteo ad placitum.

*Electuarium confortans.*

*℞. Cons. rosar. rubr. borrag. bugloss. tunicis, melissæ, an. ʒ. j. spec. elect. resumptiui, ʒ. ʒ. cortic. citri condit. ʒ. vj. rad. condit. eryngij, satyrj, an. ʒ. ʒ. confect. alhermes, ʒ. ij. spir. rosar. essentia citri, an. ʒ. ʒ. ol. cinamom. gutt. vj. Cum syr. fl. borrag. Fiat elect.*


Externa quoque antea proposita pulsibus, cordi & naribus applicentur.

*Dieta.*

Æger nutriatur alimentis, quæ bonum & multum succum præbent, ac facilè concoquuntur; eaque in quantitate parua, sed sæpè exhibeantur, potissimum senibus, & qui è morbo conualescunt, aut ex magnis euacuationibus vires perdiderunt. Et si vis coquendi sit debilior, vt crassiores cibos concoquere non possit, dentur iura instaurantia in Institut, lib. 5. part. 3. sect. 3. cap. 2. proposita. Præcipuè vinum odoratum, quale est Rhenanum & Necaricum, & panis albi mica eo madida vires valdè instaurat, cui pro morbo exigente succus citri, vel granatorum, vel simile quid addi potest.

C A P V T V I.

*De lipothymia & syncope.*

 Vandòque verò accidit, vt arteriarum motus ferè tollatur: Quod malum, prout varios gradus minoris & maioris ratione differentes habet, ita etiam variis nominibus exprimitur.

*Lipothymia & syncope.*

Ἐκλυσis leue est animi deliquium, λειποθυμία & λειποψυχία & ἀποψυχία grauius; συγκόπη grauissimum. Quæ si eò vtque deueniat, vt in toto corpore pulsatio aboleatur, ἀσφυζία nominatur, quæ proximus ad mortem gradus est. Differre autem ἔκλυσιν à λειποθυμία vel λειποψυχία, patet eo, quod Hippocrates, 7. aphorism. 8. scribit: *A tuberculi*

*Ἐκλυσis à λειποθυμία & λειποψυχία differt.*

*Syncopes  
ut Hippo-  
crati  
non in  
usu fuit.*

*introrsum eruptione* ἐκλυσίς καὶ λιποψυχία oritur. Et Ægine-  
ta, lib. 3. cap. 34. inter syncopes signa ἐκλυσιν & λιποψυχίαν  
nominat. Apud Hippocratem quidem & antiquos Græ-  
cos vox συγκοπή vñtata non fuit, qui affectum hunc λιπο-  
θυμία & λιποψυχία & σφοδρία appellârunt: Paulò ta-  
men ante Galeni tempora hæc vox inuenta, & in specie  
tribuitur grauiori malo, quam est λιποθυμία & λιποψυχία.  
Hæc enim inter has voces genuina est differentia. Nam,  
vt docet Galenus, ad Glauclib. cap. 14. λιποθυμία est syncopē  
imperfecta, & præterea syncopen semper præcedit, atq;  
in λιποθυμία sensus nondum planè aboletur; & in ipso pa-  
roxyſmo ægri vident, audiunt & intelligunt, quæ audiunt,  
licet non possint nutu aut signo demonstrare cogitatio-  
nes. Præterea, vt Aëtius, tetrab. 2. serm. 2. cap. 3. docet, in  
λιποθυμία ægri non sudant, in syncopē verò sudationes  
accidunt, quæ ideò etiam syncopiticæ dicuntur. Cùm enim  
in syncopē vires magnoperè prosternantur, & calor ad  
interiora refugiat; humidum partium solidarum rectore  
destitutum ad exteriora defluit. Ac frigidi sunt ij sudores,  
quia calor naturalis regens partes solidas in syncopē vel  
extinguitur, vel extinctioni proximus est; quod à parti-  
bus illis profluit. In lipothymia verò sudores non exeunt;  
quia vires in hac non ita collabuntur. Quidam tamen hanc  
Aëtij sententiam & differentiam non simpliciter admit-  
tunt, putântque, etiam in lipothymia aliquando aliquem  
sudorem accidere posse, & in syncopē corpus ita disposi-  
tum esse posse, vt vix aliquis sudor erumpat.

*Lipothy-  
mia &  
syncopē  
an solium  
gradibus  
differât.*

Sunt quidem nonnulli, qui lipothymiam & syncopen  
non solum maioris & minoris ratione discrepare putant,  
& longè maiorem esse differentiam existimat Mercatus,  
atque lipothymiam esse affectum cerebri, & in ea solum  
& primariò cerebrum offendit, seu esse casum subitum  
animalis potentia, qui fiat retrocedentibus spiritibus ani-  
malibus ad cerebrum ipsum, quo accidat, vt instrumenta  
sensuum & motus spiritibus destituantur, atque ita actio-  
nes suas exequi non possint. Syncopen verò esse proprium  
cordis affectum, & in eo cor primum pati, & hinc ob de-  
pendentiam, quâ cum corde habent, aliàs actiones omnes  
lædi.



lædi. Verùm falsa & tanto viro indigna est hæc opinio, & in lipothymia non tam spiritus animales, quàm vitales læduntur, id quod symptomata, quæ in lipothymia adsunt, & causæ, quæ eam excitant, ac cor, non cerebrum afficiunt, solùmque à causis syncopes magnitudine differunt, satis docent. Ideoque in omni lipothymia pulsus (quànquam Mercatus sine ratione contra experientiam id negat) aliquo modo læditur, nec planè saluus est. Quod verò simul facultas animalis afficitur, ideò fit, quia spiritus animales salui esse non possunt, si vitales rectè sese non habent, cùm illi ex his generentur. Quapropter lipothymia non cerebri, sed cordis affectus est, in quo sensus & motus ideò læduntur, quod spiritus vitales cerebro non communicantur.

Cælius Aurelianus & Aretæus, in inscriptione cap. 3. lib. 2. de morbis acutis, cardiacam in genere appellat. Quia tamen *cardia* non solùm cor, sed & orificium ventriculi significat, in specie nonnulli eam syncopen, quæ oris ventriculi consensu fit, cardiacam appellant. Alij verò & magis propriè eam syncopen simpliciter cardiacam vocari debere censent, quæ primario cordis affectu fit, eam verò, quæ ex oris ventriculi fit consensu, stomachicam esse nominandam, vt docet Galenus, 5. de loc. affect. cap. 2. 12. meth. med. c. 5. 3. de victus ratione in acutis text. 59.

## Definitio.

Est ergo animi deliquium, vt Galenus, 12. meth. med. cap. 5. definit, præceps virium lapsus, id est, subita actionum vitalium & consequenter animalium imminutio, sicut syncope penè earum abolitio, ob spirituum vitalium vitium, & denegatum in alias partes influxum.

## Causæ.

Itaque pars primariò affecta est Cor. Causa proxima est spirituum vitalium, sine quibus cor, nec vlla alia pars in corpore suas actiones edere potest, subitus defectus; id quod subita huius mali inuasio satis testatur. Spiritus autem vitales ad alias partes non influunt, vel quia non generantur, vel quia generati dissipantur & dissoluuntur, aut suffocantur. Non generantur, vel defectu materiæ,

Causæ.

vel generatrice eorum facultate sese non rectè habente. Deficit materia in nimia sanguinis euacuatione. Quamquam & tum spiritus simul dissipantur. Quò etiam facere potest calor intensus & perseverans, qui non solum spiritus dissipat, sed & eorum materiam absumere potest. Spiritus enim vitales ex tenuissima sanguinis parte generantur, quæ à calore magno & diuturno absumitur, idque in iis faciliùs accidit, qui humores tenues, & corpus ad *ἀσθενειαν* aptum habent; de quo Galenus, *12. meth. med. c. 6.* Facultatis autem generatricis causa spiritus non generantur, cum ipsa cordis substantia, quæ spiritus generat, sese rectè non habet; quod fit in morbis, qui temperiem cordis valdè immutant, calidumque eius natium absumunt, quales sunt febres syncopicae, malignae, pestilentes, colliquantes, hecticæ, *μολυσματώδεις*, item morbi compositionis, & solutæ unitatis, qui si sint paulò grauiores, à syncope ad vitam nullus datur regressus, sed hominem jugulat.

Spiritus verò generati absumuntur & dissipantur ac corrumpuntur variis de causis. Primò spiritus corrumpitur, aut certè insigniter mutantur & afficiuntur à maligna ac venenata cordis ac spiritibus vitalibus peculiariter aduersa materia, siue illa in corpore generetur, id quod accidit in febribus malignis, aut cum vermes in aliquo loco stabulantur, vel sanguis menstruus, aut alius humor corruptus alicubi in corpore delitescens putres ac malignos vapores ad cor mittit; siue extra adueniat, id quod fit, cum aer malignus & venenatus, vel venenum admotum, vel morsu aut ictu animalium venenatorum corpori communicatur. Quò pertinent & peculiare antipathia, cum quidam rerum aliis non ingratarum odorem, conspectum, vel præsentiam ferre non possunt, sed ea de causa animo deficiunt. Deinde à corde auertuntur, resoluuntur & dissipantur spiritus vitales variis de causis. Nimirum calor insignis spiritus ad exteriora euocat & dissipat. Quò pertinent febres ardentes, æstus aeris, balnei, corporis motus nimius, perturbationes animi nimia, ira, *μεγαλειαι* seu effusum gaudium, quo alios syncope correptos, alios mortuos esse legimus, vigiliae, fames & inedia diuturna, Venus ni-

mia, dolores vehementes, colici, oculorum, dentium, oris, ventriculi & aliarum partium, in primis earum, quæ magnū cum corde consensum habent, euacuationes nimix, vel sanguinis per nares, vterum, hæmorrhoides, vulnus, phlebotomiam, vel humorum excrementitiorum, per vomitum, aluum, vrinam, sudores; quæ excretiones, in primis si cum dolore coniungantur, id quod fit in dysſenteria, vires valde proſternunt; aut si absceſſus ſubitò rumpatur, de quo Hippocrat. 3. aph. 8. à tuberculi intus ruptione exſolutione, vomitus & animi deliquium accidit, aut si hydropicorum aquæ, aut empyicorū pus ſubitò euacuatur. Et vt ſpiritus faciliùs diſſipentur, facit corporum & humorum natura in iis, qui tenuēs ſuccos habent, vt faciliùs exhalent, & ἀσπν, patiantur, de quibus Galenus, 12. meth. med. c. 16.

Tertiò ſuffocantur & obruuntur ſpiritus vitales, vel cum ſpiritus & ſanguis ſubitò ad cor confluit, quod fit in febre ſyncopali, ex humore crudo cum oris ventriculi offeſſione, de quo Galen. 12. meth. med. c. 3. & conſternatione nimia & repentina, quàm Græci ἐκλυσις, nominant, Galen. 12. meth. med. c. 5. vel cum vapores craſſi à ventre inferiore attolluntur, & humores craſſi ac frigidi arterias replent, vt ſpiritus liberè moveri non poſſint, vel cum circa cor & membra vicina copioſè fulgines cumulantur, & læſa reſpiratione non expelluntur.

Hiſce cauſis hætenus enumeratis addit adhuc aliam Carolus Piſo, de morbis ab illuue ſeroſa cap. de morbis thoracis, ſtatuitque, eſſi cauſæ hætenus enumeratæ omnes abſint, tamen accidere poſſe ſyncopen, quæ hominem in momento ſerè jugulet, ab interceptione ſeu obſtructione nerui ſexti paris cordi implantati, ab humore ſeroſo è cerebro repentè in eum deſſuente. Docet enim cor accepto à cerebro motus principio moveri, ideòque ſi ætate florēte vel conſiſtente & in corporibus calidis & humidis & ſeroſa in capite colluies abundet, & in principiū neruorū irruat, ac vel guttula ſaltem eius in neruum cordi inſertū aberret, ſpiritu animali non denegato, cordis motū ſubitò intercipi, hominēque inopinatò mori. Quod ante ipſum etiam docuit Piccolomineus, qui ſtatuit, neruulos

illos exiles, qui à sexta coniugatione cordi inferuntur, ei vim motoriam præter sensum tribuere.

Verùm in hac opinione illud magnum paradoxum est, motum cordis pendere à facultate animali, & non sui generis ac peculiarem esse, qui vitalis dicitur. Et si ab hoc nervulo obstructo fieret non solum syncope, sed & mors accidere idem deberet, vbi in apoplexia totum nervorum principium affectum. At videmus in Apoplecticis nihilominus cor moveri & pulsus durare. Et experientia etiam se didicisse scribit Spigelius, falsam esse Piccolomini sententiam; cum plurimum animalium corda exempta è corpore abscisso penitus nervo aliquandiu mota fuisse observarit. Ideoque cuilibet perpendendum relinquo, an non illi, quorum, vt syncope subito extinctorum, allegat historias Carolus Piso; apoplexiâ forti extincti fuerint; & memini aliquos iis similes, quos Piso describit, habitu scilicet corporis carnosio, ætate consistente, subito concidisse, & nullum verbum protulisse, ac post horas non multas mortuos fuisse; qui tamen reuera fuerunt apoplectici; cum motus cordis & pulsus in iis permanerit aliquandiu, facultatis verò animalis affectæ signa evidentia adfuerint.

*Differen-  
tia.*

*Differentia.*

Differentia illa, quæ secundum maius & minus est, non ita magni momenti est; cum curationem non ita variat. Magis illa attendenda, quæ à causarum diversitate sumitur, & quod alia sit per primarium cordis affectum, alia per consensum vteri & lienis. Nimirum quinque, quæ curationem variant, differentia sunt attendendæ, quarum tamen singulæ rursus aliquas particulares differentias habent.

Prima est, cum materia spiritibus generandis subtrahitur quocunque modo; quod præcipue accidit in corpore raro, & quod humores tenues habet, qui facile dissoluntur.

Secunda, cum ob morbum aliquem cordis œconomia eius & spirituum generatio læditur.

Tertia, cum maligna & venenata materia spiritus cor-  
rumpit,

rumpit, vel insigniter mutat, seu in corpore genita, in febribus malignis, seu extra communicata, quò pertinet & opiatorum vsus.

Quarta, cùm spiritus dissipantur & absumuntur à calore nimio, motu corporis & animi, vigiliis, inedia & euacuationibus immodicis, abscessuum eruptione, & aquarum sub cute euacuatione confertim facta, doloribus.

Quinta cùm suffocantur spiritus, vel ab humore crudo in febris syncopali, aut animi consternatione, aut à vaporibus, seu intra genitis, seu extra communicatis.

*Signa Diagnostica.*

In lipothymia, quæ syncopen antecedit, pulsus est *Signa.* languidus, paruus, inæqualis; facies pallore suffunditur, ex recurso spirituum & sanguinis ad interiora: qua de causa & extrema frigent, oculis tenebræ suffunduntur, aut viride, vel flauum quid iis obseruari videtur. Sudor sæpè diaphoreticus apparet, præcipuè circa frontem; quoniam partes calore destitutæ humiditatem continere nequeunt, & cerebrum aliqua ea parte compatitur: frigidusq; erumpit; quia per cutim ob reuocationem caloris ad internam refrigeratam transit. Quæ signa omnia diligenter attendenda sunt; cùm vtilissimum sit, imò summè necessarium, imminetent syncopen præuidere, vt quantum fieri potest, præcaueri possit. Nam sicut Menon, filius Zoar, ait, vt refert Rabbi Moses, 6. *apbor.* qui syncopen non præuidit, aut præuisam annunciauerit, hominis mortui homicida est.

In syncope verò symptomata hæc omnia vehementiora sunt, pulsus quo ad sensum cessat, mentis actiones, & metus sensusque corporis, ac vox quoque perit.

Quod ad signa causarum, humorum tenuitas, & corporis constitutio ad *Alcôpnos*, apta suis signis cognoscitur; & tales præcipuè syncope corripiuntur, si febris accedat, vel ambientis æstus, atque in his celeriter facies Hipp. apparet, vt docet Galenus, 12. *meth. med. c.* 6. Humores maligni in corpore geniti, aut venena extrà quocunque modo communicata è suis signis patent. Cause resoluentes à suffocantibus non ita difficulter discerni possunt. Si enim

corpus extenuatum sit, & causæ etiam spiritus dissipantes præcesserint, ex spirituum resolutione, & dissipatione malum ortum esse indicatur. Si verò cohibita sit aliqua euacuatio, homo plus iusto edat aut bibat, frigidorum, ac crudorum humorum signa adsint, aut phlegmone vel obstructio, vel dolor circa cor adsit, aut *mutatio*, materiæ subita ad partes illas facta sit, aut repentino timore aut terrore homo consternatus sit, suffocari spiritus argumento est.

Ex cuius autem partis vitio cor afficiatur, ex cuiusque propriis accidentibus, quæ syncopen necessario antecedunt, cognoscitur. Ex vtero v. g. si syncope prodeat, vteri affecti signa sunt. Ex affecto ventriculo si proueniat, præcesserunt oris ventriculi dolor & morsus, & nausea, vomitus, & eius generis signa alia. Et quidem si ob flauam bilem os ventriculi molestantem accadat, cognoscitur ex maiore oris ventriculi dolore, ex vellicatione, anxietate, oris amarore, siccitate & siti. Idem de aliis partibus esto iudicium.

Si vero nullum alicuius partis affectæ est indicium, nullusque alius affectus, nec febris, nec inflammatio, nec alicuius partis affectæ signa adsunt; ex primario cordis affectu lipothymiam prouenire indicio est.

Quid autem mali cor patiatur, cognoscitur ex ægri facie, modo, quo in syncopen incidit, & ex his, quæ præcesserunt. Ex spirituum corruptione, aut venenatâ aut maligna alteratione si sit syncope, liuida & valdè frigida apparent extrema, facies pallida & plumbea est, nec tamen collapsa, respiratio non ita est immutata, licet sit frigida, cessit subitus ægri lapsus, & si venenû sumserit, vel ab animali venenato morsus vel ictus sit æger, nec id latere potest.

Ex spirituum dissipatione syncopé prouenire, ut dictum, cognoscitur ex iis, quæ præcesserunt, labore & exercitio nimio dolore, vehemente, vigiliis, & similibus causis.

Ex spirituum suffocatione fieri cognoscitur si causæ istæ non præcesserunt, æger plurimis & crassis humoribus abundet, adsit ventriculi anxietas, & nausea, cum præcordiorum tensione ac dolore.

Ex quibus omnibus syncopen à cognatis affectibus discernere facile est. Distinguitur syncope ab epilepsia, quod licet interdum animi deliquium, aut potius quædam animi seu sensuum perturbatio epilepsiam præcedere soleat, nulla tamen adest in syncope conuulsio, sicut in epilepsia. Ab apoplexia verò differt, quod in apoplexia pulsus insigniter non mutatur, nisi morte instante. Ab vteri strangulatu, quod in ea aufertur respiratio, sed non pulsus, cum contra in syncope pulsus ad sensum penitus auferatur, respirationis autem difficultas tanta non adsit. Interdum tamen cum suffocatione vteri syncope coniungitur, atq; tum pulsus interdum non percipitur. *Prognostica.*

*Syncope  
à cognatis  
affectibus  
differentia.*

1. Qui sæpè & sine manifesta causa animo linquuntur, ij repente moriuntur. Hipp. 2. aph. 41. *Prognostica.*

2. Omnis syncope mala; sed pessima, quæ fit in corpore debili, quæ vetusta, quæ confirmata. Cognoscitur autem syncopen esse confirmatam & consummatam, quod color faciei viridis apparet, & collum, ut in strangulatis inuertitur. Auicenn. 3. canon. sen. 11. tract. 2. c. 6.

3. Syncope, à qua homo non restituitur, post irrorationem faciei cum aqua rosarum, Post vini exhibitionem, post ptarmica etiam, lethalis est.

4. Cor primariâ affectione laborans auxilium non admittit, puta phlegmone, erysip. dyscrasia vehementi, per febres acutissimas, vulnera præsertim sinistri ventriculi. Per consensum verò affectum à cerebro, epate, ore ventriculi, à subita & vehementi animi perturbatione, curationem recipit, nisi vires planè deiectæ sint. Paul. Ægin. lib. 3. c. 34.

5. Syncope ex cordis intemperie simplici mitior est, quàm quæ ex instrumentariis eius morbis, aut soluta vni-tate oritur. Simplex etiam spirituum animalium alteratio minus offendit, quàm eorundem suffocatio aut resolutio, & euacuatio.

6. Syncope, quæ fit ab intemperie cordis frigida vehementi, ægerrimè curatur. Nam à nulla alia corporis parte calor naturalis cordi communicatur, sicut cor, quod est caloris principium, calorem aliis communicat.

7. Qui ob magnam humorum crudorum copiam febri-

citan

citantes in syncopen incidunt, si ventriculus & epar in his inflammatum fuerit, desperata salus est. Similiter qui ob humores tenues omnino concidunt per febres, & ventriculum aut epar inflammatum habent, viribusque languent, in his celeriter lethalis constitutio in facie apparet. Galenus, 12. *meth. med. c. 3. & 6.*

8. Non statim salus promittenda, cum quis à syncope sibi redditur. Nam si pulsus non redit, nec calor viuidus, & æger frigidus semper manet; mox in syncopen relabitur.

9. Syncope, quæ ex immodicis euacuationibus, timore, tristitia, aut alia euidenti causâ prouenit, minus periculosa est, quàm quæ ab interna orta est.

*Indicationes & Curatio.*

*Indica-  
tiones &  
curatio.*

Curatio autem syncopes in duo tempora diuiditur, vñ paroxysmi, alterum intermissionis. In paroxysmo vt æger excitetur & reuiuiscat quasi, primò spiritus cõseruandi, fouendi & instaurandi sunt; secundò facultas animalis atque vitalis excitanda; tertio causâ, quæ spiritus lædunt, tollendæ sunt, pro quarum diuersitate diuersa præsidia requiruntur. Si spiritus non generentur ob nutrimenti defectum, corpus quamprimum nutrimento reficiendum: si non generentur ob cordis aliquem morbum, ei quantum possibile; occurrendum: si spiritus corrumpantur, vel causâ maligna alterentur, illæ causæ per contraria tollendæ: si dissipentur, & resoluantur, non solum per odoramenta & alimenta spiritus instaurandi & fouendi, sed & causæ illæ, quæ spiritus resoluunt, tollendæ, pori corporis ne nimia fiat resolutio, claudendi, euacuationes immodicæ sistendæ, dolores leniendi, & reliquis etiam causis occurrendum: si à spirituum suffocatione fiat syncope materia ad cor affluens reuellenda; si copiosa sit, euacuanda; si cruda, & crassa, alteranda.

Primum ergo quod attinet, spiritus conferuentur, roborentur, foueantur, & ad naturalem statum reducantur cum internis, tum externis auxiliis. Nimirum aqua rosea, vinum, acetum, aqua cinamomi, carfunkuli, moschus, ambra & similia alia cordialia admouenda; hisque facies irroranda & tempora illinenda. In paroxysmo tamen obseruandum



seruandum, 1. vt in morbis calidis frigida vsurpentur rosæ, & earum aqua, violæ, flores citri, santalum, acetum. In frigidis autem morbis calida. Licet tamen in frigidis aliquid de calidis admiscere ob spiritus subito reficiendos.

2. In foeminis odoraamenta suauiâ naribus non admoueantur, sed potius graueolentia, vt castoreum, ruta, ne vteri suffocatio concitetur, atque ita periculosius malum reddatur. Cordis quoque regioni epithemata, fomenta, sacculi, inunctiones ex cordialibus, theriaca, Mithridatio, oleo citri, spiritu aliquo, vel aqua cordiali admouenda. Atque hic etiam valde utilis est melissa vino odorato, vel maluatico conspersa, & in latere calente calefacta, atque cordis regioni imposita. Exhibendum simul vinum generosum vetus, aut panis eo madidus. Vix enim aliquid magis & citius vires, quam vinum reficit. Quanquam verè aliàs & extra paroxysmum iis, qui inflammatione viscerum aliqua laborant, aut capite dolent, vel simili malo infestantur, vinum non conueniat: tamen in ipsa syncope; in qua vniuersum corpus refrigeratur, plus vrgent spiritus reficiendi, quam illæ causæ prohibere possint. De delectu autem vini in syncope videatur Galenus, 12. meth. med. c.

4. Si verò sit causâ frigida, non solum vinum conuenit, sed & moschus, ambra & aromata, confectio Alkermes, syrupui de corticibus citri, confectio diambrae, diamoschi vsurpari potest, & in primis ad spiritus subito reficiendos plurimum possunt aquæ & spiritus cordiales passim descripti, quales etiam suprâ, & cap. preced. fuerunt propositæ. Inter eas autem facillè primum locum obtinet aqua vitæ alba Dresdensis, quæ quia nimis operosa visa fuit, ad istum modum à D. Andrea Donnero correctâ, & contractâ est.

*Aqua  
vitæ al-  
ba Dro-  
densis.*

℞. Spirituum bonorum seqq. lento igne seorsim paratorum ex vino. Spirit. vini moschatellini, Maluatici, rub. maturi & veteris, an. Canth. vj. beton. meliss. rosismar. veron. card. bened. menth. crisp. absinth. vulg. hyssop. saluie minor. artemisia rub. è ligno tamarisci, è cerasis, fruct. prunor. syluestr. vuarum passerarum, flor. sambuci, è baccis inniperi, cortic. aurant. citri, an. Canth. iij. euphrasie, scolop. rut. an. Canth. j.

Hicce

Hisce spiritibus commistis adde radic. enulæ, pimpinell. polypodij, an. 3. iv. meu, valerianæ, an. 3. j. B. fol. saluæ min. 3. j. scolopendr. menth. crisp. pulegij, matricariæ, an. 3. vj. nuc. persic. f. a. præp. 3. ij.

Relinque in infusione per triduum. Colat. adde panes triticeos, perfectè coctos, & è farina optima paratos, N. x. ita, vt singuli pugnum æquent humanum, frangantur è clibano extracti feruentes adhuc minutim, relinquantur iterum in infusione per triduum. Fiat postea destillatio in arena, moderato igne, ita vt tantum, quod spirituosum est separetur & colligatur. Referuetur diligentissimè hoc destillatum ne exhalet.

¶ Præterea caponem annosum, corpulentum, ac suspendio enecatam N. j. cum perdicibus duabus bonis, aut phasianis bono, N. j. deplumentur sine aqua, exenterentur, in frustra diuidantur, remota pinguedine, omni ac vino Rhenano bono abluantur. Præparatis hoc modo adde

Cinamom. elect. caryophyllor. galangæ, zingiber. macis, an. 3. vj. nuc. moschat. N. v. gran. parad. piper. long. cardamom. cubebæ. an. 3. iij. croci 3. ij. sem. & rad. pæon. an. 3. vj. fol. maior. 3. ij. amygd. dulc. excoct. 3. ij. passul. Corinth. 3. iij. xybebar. 3. j. B. sacch. cand. 3. ij. zedoar. 3. B. manna, 3. x.

Affunde postea vini maluat. & Alacanth. opt. q. s. ad perfectam coctionem in duplici vase instituendam. Vbi spontè post coctionem sufficientem refrixerit decoctum, incidantur minutissimæ carnes caponis & phasianis, & contundantur probè. Fiat deinde destillatio lenta in arena.

Cui destillationi porrò commisce destillatum de panibus triticeis, adde insuper spirit. Vini moschatellin. opt. Canth. iij. Adde præterea sequentes species in duplo: caryophyll. 3. j. nuc. mosch. macis, piper. long. nigr. an. 3. vj. rad. aristol. long. calam. aromat. diptam. alb. caryoph. tormentil. angelic. bisorte, leuistici, ybabarbar. per noctem prius seorsim infus. in vini Rhen. q. s. zingib. an. 3. B. styrac. calam. in gran. 3. vj. sant. alb. rub. citrin. an. 3. vj. croci, 3. ij. sem. anisi, fenic. coriandr. præp. aquileg. carui, an. 3. B. ligni aloës, carpobals. an. 3. j. B. cinam. 3. ij. ligni rosac. 3. x. off. de cord. ceru. N. vj. pomum. citrium recens, N. j. mat. perlar. præp. 3. j. B. fl. stæc. Arab. 3. x. primul. veris 3. ij. borrag. bugl.

an. 3. vj. lil. conu. recent. 3. j. s. pæonia, anthos, tunic. plen. violar. ros. rubr. incarn. spic. fl. lauend. nymph. alb. cent. minor. an. 3. j.

Adde porrò spec. arom. caryoph. Mesue, diarrhodon. abb. cum mosch. & campb. diamarg. frig. calid. letit. Gal. dianthos diacynamom. an. 3. ij.

Stent in infusione per 9. dies. Fiat deinde per organa vitrea destillatio accurata, & postrema in M. B. ita, ut tantum, quod spirituosum est, colligatur.

Tertia pars sine moscho & ambra conficienda & reseruanda.

Reliquis duabus partibus adde mosch. opt. aq. ros. bonaprius solut. 3. s. amb. pari modo prius solut. 3. vj.

Et sic perfectum est hoc opus, reseruetur & custodiatur diligentissime in organis vitreis bene munitis.

Secundo, spiritus excitantur & ad exteriora renocantur extremorum frictionibus, corporis concussionem, acclamationem, nomine ægri inprimis expresso, frictionibus linguæ, & palati ore diducto cum theriaca & aqua cinamomi & similibus. Si tamen à spirituum dissipatione, sit syncope, frictiones & ligaturæ non conueniunt, sed æger quiescat.

Tertiò, quod caussarum diuersitatem attinet, de qua Gal. 1. ad. Glauco, c. 14. Si spiritus non generentur ob nutrimenti defectum, corpus quamprimum reficiendum; quod commodissime fit vino & pane vino madido exhibito, quo simul spiritus reficiantur, ut diximus.

Si syncope accadat, quod humores tenues adsint, qui facile exhalant, corporisque habitus rarus sit, odoramentis & cibis boni succi fiat instauratio corporis. Corporis præterea summa cutis densanda est oleo rosaceo, myrtino, mastichino, cydoniorum; aërq; corpus ambiens refrigerandus. Cibi sint qui non facile dissipantur, ut sorbitiones ex alica & similibus, de quo videatur Gal. 4. meth. med. c. 16.

Si ob morbum aliquem cordis accadat syncope, morbo contraria, ut supra dictum, & cordi amica medicamenta exhibenda.

Si ex spirituum alteratione & corruptione fiat syncope, & quidem qualitas vel aura venenata ab utero communicetur, inferiora fricentur, cucurbitæ ad coxas, & pubem ponant

ponantur, pessi subdantur, & alia, quæ in suffocatione vteri fieri solent, peragantur. Si fiat à materia maligna, & venenata, vt in vomitu æruginoso ea exhibeantur, quæ materiam illam eluant, & humores temperent, postea cordialia medicamenta hætenus proposita exhibeantur. Si venenum haustum sit, alexipharmaca conuenientia exhibeantur. Si à morfu animalis venenati accidat, itidem alexiteria vsurpentur, & parti læsæ cucurbitulæ scarificatæ, atque alia venenum euocantia apponantur. Eodem modo & aliis causis malignis resistendum.

Si à spirituum resolutione syncope fiat, cum id rursus variis de causis, vt dictum, accidere possit, singularum habenda ratio, & modus, quo causa agit, considerandus, atque aduersus illum pugnandum. Etsi enim omnes euacuationes nimie spiritus dissipant: alio tamen modo compescenda euacuatio, si per sudorem nimium fiat; alio, si ab alui fluxu; alio, si à vomitu; alio, si è sanguinis profusione. Calor ergo si sit nimius, per contraria temperandus & alterandus. Si ab immodica euacuatione accidat syncope, euacuatio sistenda, ægerque odoribus, cibo, potu, somnoque ac quiete reficiendus: Cohibetur euacuatio frictionibus, ligaturis; cucurbitulis in aduersum administratis; vt in hæmorrhagia narium fricentur, & ligentur inferiora cucurbitulæ sine scarificatione apponantur, suris & hypochondrio dextro, si à nare dextra, in sinistro, si in sinistra fluat sanguis, & administrentur alia, quæ hæmorrhagiam narium sistere solent. Ita mensium profluuium debito modo sistatur. In hypercatharsi dentur cibi & medicamenta adstringentia, theriacæ non admodum vetustæ, ʒ. ss. vel ʒ. j. cum aqua plantaginis. Concilietur somnus, qui omnes euacuationes sistit, excepto sudore. In syncope autem, quæ fit euacuationibus nimis, corpus frigidis non conspergendum; neque alia frigida & cutim adstringentia adhibenda, cum talia humores intro pellendo fluxiones augeant.

In sudore largo neque frictiones, neque ligaturæ locum habent, sed ea, quæ cutim adstringunt. Facies igitur irroretur aqua rosarum; collum, thorax, axillæ, inguina inungan

inungantur oleo rosaceo, myrtino, cydoniorum: æger quiescat, olfaciat frigida, assumatur syrupus granatorum, citri, limonum, ribes, acetosellæ. In ruptione subita apostematis instauratio fiat cibis, odoribus, quiete. Si à vehementi dolore syncope accidat, qui & per se spiritus resoluit, & per accidens vigiliis immixtis, remoueat ille anodynus, & causa doloris tollatur; quod nausea indicat, atque æger faciliè natura sua vomat, vomitus proderit. De quibus Gal. 12. *meth. med. c. 4. 5. 7. & 8.*

Si tandem ex suffocatione spirituum fiat syncope ad ambitum corporis spiritus reuocandi, frictionibus, ligaturis, cucurbitulis & aliis externis partibus adhibitis. Et quidem si ex plenitudine fiat syncope, venæsectio primùm instituenda, vt suffocationis periculum auertatur, cum sanguinem euacuando, tum reuellendo, præsertim si sanguis cum impetu ad vitales partes feratur. Quando enim in hoc casu mittitur sanguis, perinde fit, ac si quis exiguo igni, qui sub strue lignorum suffocatur, aliquid de lignis subtrahat, vt ignis reuiuiscat; qua similitudine Gal. vitur, 4. *de rat. vict. in acut. aph. 121.* Aperiat autem basilica, vt à fonte sanguis educatur; nisi à mensibus suppressis morbus sit, vbi vena tali aperienda, modò malum det inducias. Sanguis autem iteratis vicibus mittatur, ne vires vna vice nimium labefactentur.

Ex crudorum succorum copia genita syncope, vbi os ventriculi simul affectum est, & habitus ac color, qualis ferè hydropicorum est, apparet, nec phlebotomiam, nec purgationem sustinet æger, sed vacuatio conuenit per frictiones deorsum factas: primò crurum, deinde brachiorum & spinæ dorsi, quotidie aliquoties iteratas, quæ & calefaciunt & discutiunt. Post frictiones inunctio fiat cum oleo aliquo laxante, quale est chamæmelinum & anethinum. Mulsæ primis diebus detur aut oxymel cum decocto hyssopi, origani, & similium. A cibo alio abstineat æger, si vires ferant, vt per inediam humores crudi coquantur. Quia tamen pulsus subitò ad imbecillitatem mutatur, panis ex vino exhibeatur ad vitandum præsens periculum: postea ad abstinentioniam redeat æger. Aër neque calidus

nimum sit, ne liquati humores ad cor confluant, neque nimis frigidus, ne concoctio, & discussio materiæ impediatur, epithematis cordis non utendum, nisi materia prius concocta & discussa fuerit. Videatur etiam Gal. 13. *meth. med. c. 3.*

Si à repentinò terrore & metu syncope oriatur, ne ex affluxu sanguinis obstructio aliqua in vasis, aut inflammatio excitetur, euacuatio debita instituatür ad periculum illud prohibendum.

Extra paroxysmum curam quod attinet, danda opera, ut auferantur illæ causæ, quæ iterum possent syncopen excitare, virēsque debilitatæ reficiantur, & cor roboretur. Ideoque in syncope, quæ ex veneno, nimis euacuationibus, aëre calido, sudore provenit: illa ipsa, quæ in paroxysmo requiruntur, etiam extra illum locum habent, neque aliquid noui ferè agendum. Si autem ex dolore sit syncope, dolores leniendi, & causæ dolorem excitantes tollendæ. Stupefacientibus tamen cautius & parcius utendum; eodem modo etiam purgantibus, si ea ob causæ rationem necessaria sunt, virium semper habenda ratio, & in omnibus medicamentis quamcunque etiam causam respiciant, admiscenda sunt cordialia. Si ex inflammatione oriatur, extra paroxysmum seu syncopen ipsam, vinum non est dandum. Si acris, tenuisque materia ventriculum laceßat, aloë & pilulis alephanginis euacuari potest, vel decocto tamarindorum cum manna & syrupo rosarum laxatiuo. Sic enim & causæ morbi tollitur, & ventriculus roboratur. Ita & aliis causis omnibus debito modo occurrendum per conuenientiâ medicamenta,

#### *Dieta.*

Aër ab omnibus inquinamentis purus sit, atque alteratus cordialibus pro causarum diuersitate. In paroxysmo, vel imminente hoc, aër frigidus sit, vbi malum est à causa resolvente: moderatè sit etiam frigidus, vbi à causa suffocante, ob refrigerandi corpus necessitatem, ne calor extinguatur. Cibus quoque secundum causarum diuersitatem conueniens ordinandus. Vinum extra paroxysmum non conuenit, vbi plethora adest; aut calor vehementior,

& febris ardens, aut inflammatio interna alicuius visceris, aut delirium, aut dolor grauis. Galenus in syncope & crudorum humorum copia, vel ex flaua bile, vel ex succis tenuibus & facilè exhalantibus vinum concedit tenue, boni odoris, & quod celeriter mutatum in corpus distribuat, sed nec tum insigniter eum febricitare ægrum oportet, nec phlegmone interna affligi.

In syncope verò à resolutione probatur vinum odoratum, vt & iuscula carniū consummata, gelatinæ, & conculsa, qualia in *Institut. lib. 5. part. 3. sect. 3. cap. 2.* sunt proposita.

In syncope à spirituum corruptione & alteratione in feбри pestilenti, aut à causâ aliqua venenata vinum vel iuscula condiantur succo citri, acetosæ, melissæ, terrâ sigillatâ, margaritis & similibus.

Somnus in syncope ex resolutione & euacuatione periculofus est; quia debilis calor intrò reuocatus syncopen auget. Et proinde per somnum æger ab assidentibus diligenter obseruandus est, nec statim post syncopes solutionem ad somnum est admittendus. Nocet quoque vbi syncope est ex materia venenata rapiendo venenum ad cor. Vtilis est in syncope ex materia cruda, eam coquendo, quam vigiliæ temperatæ postea discutunt.

*F I N I S.*



# INDEX RERVM ET VERBORVM.

|          |                                                                 |            |
|----------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| <b>A</b> | NGINA.                                                          | III        |
|          | Angina exquisita, 113. eius caussa, 114. differenti.            |            |
|          | 117. signa, 119. prognostica, 122. Indicationes,                |            |
|          | 127. curatio, ibid. Dieta.                                      | 147        |
|          | Angina notha 148. eius signa & curatio.                         | 149        |
|          | Anginæ epidemiæ.                                                | 115        |
|          | Anginæ ex vertebrarum colli luxatione curatio.                  | 148        |
|          | Angina à melancholia.                                           | 150        |
|          | Aphthæ, vide oris ulcera.                                       |            |
|          | Aqua catarrhalis.                                               | 458        |
|          | Aquæ cordiales, compositæ variæ.                                | 515. & 516 |
|          | Aqua D. Donringij ad hydropem pectoris.                         | 363        |
|          | Aquæ pectorales 209. 434. in illarum compositione quid ob-      |            |
|          | servandum.                                                      | ibid.      |
|          | Aqua pectoralis calida Dorncreilij.                             | 461        |
|          | Aqua vitæ alba Dresdensis.                                      | 172        |
|          | Arteriaca medicamenta.                                          | 172        |
|          | Asperæ arteriæ angustia, 173. eius caussa, signa, prognostica,  |            |
|          | 145. curatio.                                                   | 174        |
|          | Asperæ arteriæ asperitas 172. eius signa, curatio.              | ibid.      |
|          | Asperæ arteriæ intemperies.                                     | 170        |
|          | Asperæ arteriæ vulnera & ulcera, 175. caussa, signa, prognos-   |            |
|          | tica, curatio.                                                  | 185. 176   |
|          | Asperarum arteriarum angustia 201. caussa, signa, 201. &        |            |
|          | 202. prognostica 203. indicationes 204. curatio secundum        |            |
|          | causarum diuersitatem varia, ibid. & seqq. Dieta.               | 210        |
|          | Asthma 394. eius caussa ibid. differentiæ 395. signa 404. caus- |            |
|          | sarum signa 406. prognost. 407. indicationes 408. curatio       |            |
|          | tempore paroxysmi 409. extra paroxysmum 412. diæta.             | 421        |
|          | Asthmatis à tuberculo, calculo vel grandine curatio.            | 420        |
|          | Balbu                                                           |            |



B.

**B**Albuties.  
Bronchocele 166. 167. eius curatio.

443. 444  
ibid.

C.

**C**Alculi in pulmone geniti 230. eorum caussæ, ibid. Signa, prognostica & curatio. 131  
Calculi in corde reperti. 495  
Carunculæ in pulmonibus genitæ 234. earundem curatio. ibid.  
Catarrhorum septem differentiæ. 373  
Catarrhi cum sputo sanguinis curatio. 352  
Cordis intemperies calida 486. 487. eius caussæ, signa, prognostica, & curatio ibid. diætâ. 488  
Cordis intemperies frigida 489. eius caussæ, ibid. signa & curatio. 490  
Cordis intemperies humida 493. eius caussæ, signa, & curatio. ibid.  
Cordis intemperies sicca 198. 198. eius caussæ, signa & curatio. ibid.  
Cordis motus an pendeat à facultate animali. 522  
Cordis palpitatio 497. eius definitio 500. caussæ, differentiæ, signa 502. 503. prognostica, indicationes 504. 505. diætâ. 511  
Cordis palpitationis à flatu & vapore curatio. ibid.  
Cordis palpitationis ab humore curatio. 508  
Cordis palpitationis ab humoribus aliunde transmissis curatio. 509  
Cordis palpitatio à vermibus 511. à spirituum defectu, ibid. calore nimio febrili. 512  
Cordis substantiæ morbi. 494  
Cordis tabes. 496  
     situs mutatus. ibid.  
    vulnera. ibid.  
    apostemata & vlcera. ibid.  
Cordis ventriculi sinistri defectus. 495  
Cor hirsutum. ibid.  
Cor molestantes caussæ. 500

# INDEX R E R V M

|                                                                                                                                               |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Cor calefacientia medicamenta. 489. 490. interna , simplicia. <i>ibid.</i> composita, 490. & seqq. externa simplicia, <i>ibid.</i> composita. | 402          |
| Cor refrigerantia medicamenta , 487. interna <i>ibid.</i> externa. 488                                                                        |              |
| Cornua in dorso.                                                                                                                              | 378          |
| Costarum luxatio , <i>ibid.</i> eius symptomata , & curatio. <i>ibid.</i>                                                                     |              |
| Costarum fractura , eius signa, <i>ibid.</i> prognostica, curatio. 380. <i>dieta.</i>                                                         | 381          |
| Costarum numerus vitiatus. <i>ibid.</i> tumor.                                                                                                | <i>ibid.</i> |

## D.

|                                                                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>D</b> ens aureus pueri Silesij.                                                                                  | 60           |
| Dens quomodo ad extractionem preparandus.                                                                           | 52           |
| Dentes canini elapsi non renascuntur 32. molares nunquam ex-<br>cidunt.                                             | <i>ibid.</i> |
| Dentes in palato enati.                                                                                             | 39           |
| Dentes non extrahendi nisi vacillent.                                                                               | 33           |
| Dentes sine violentiâ euellendi ratio, <i>ibid.</i> in extractione den-<br>tium quedam obseruanda.                  | <i>ibid.</i> |
| Dentes sordidi, 46. causa, <i>ibid.</i> curatio.                                                                    | 58           |
| Dentes soli ex ossibus extra alueolos prominent.                                                                    | <i>ibid.</i> |
| Dentium casus 31. eius causæ, signa , prognostica , curatio.<br>40. 41                                              |              |
| Dentium connexio inter se, 42. cum maxilla.                                                                         | <i>ibid.</i> |
| Dentium corrosio & caries, 30. eius causæ, <i>ibid.</i> curatio.                                                    | 31           |
| Dentium dolor, 43. eius causæ, signa , prognostica 544. indica-<br>tiones & curatio 45. 46. <i>dieta.</i>           | 52           |
| Dentium dolorem à proprietate sistentia.                                                                            | <i>ibid.</i> |
| Dentium elongatio.                                                                                                  | 35           |
| Dentium fistulæ.                                                                                                    | 31           |
| Dentium imminutio.                                                                                                  | 35           |
| Dentium mobilitas & vacillatio , <i>ibid.</i> eius causæ interna,<br>36. externa & violenta , <i>ibid.</i> curatio. | <i>ibid.</i> |
| Dentium numerus auctus.                                                                                             | 44           |
| Dentium situs vitiatus.                                                                                             | <i>ibid.</i> |

# ET VERBORVM.

|                                                                                           |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Dentium <i>sordes ac tophi.</i>                                                           | 41           |
| Dentium <i>stridor</i> , 56. <i>eius causſæ, prognostica, curatio.</i>                    | <i>ibid.</i> |
| Dentium <i>structura fucata.</i>                                                          | 39           |
| Dentium <i>stupor</i> 54. <i>eius causſæ, 55. curatio.</i>                                | <i>ibid.</i> |
| Dentium <i>usus.</i>                                                                      | 29           |
| Dentium <i>ultra</i> 63. <i>annum ætatis renatorum historia.</i>                          | <i>ibid.</i> |
| Diabutyrum <i>Bened. Viſtor. Fauentini.</i>                                               | 417          |
| Diaphragmatis <i>conuulſio.</i>                                                           | 467          |
| Diaphragmatis <i>inflammatio</i> 272. <i>eius signa, prognostica, &amp; curatio.</i>      | 273          |
| Diaphragmatis <i>tumores frigidi, ibid. signa, prognostica &amp; curatio, 294. diætæ.</i> | 295          |
| Diaphragmatis <i>vulnera</i> , 295. <i>an sint sanabilia.</i>                             | 296          |
| Diaphragmatis <i>vulnerati in studioſo Liuno Vvitebergæ historia.</i>                     | 298          |
| Diuretica <i>in hydrope pectoris utilia sunt.</i>                                         | 363          |
| Dolor <i>infantium dentientium.</i>                                                       | 53           |
| Dracunculi, 305. <i>eorum causſa, 376. signa, curatio.</i>                                | 377          |

## E.

|                                                                                               |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>E</b> κλυσις <i>differt à λείποδομίᾳ &amp; λειποψυχίᾳ.</i>                                 | 416 |
| Electuarium <i>Bertrucij confortans cor in omni causſa.</i>                                   | 494 |
| Empyema, 347. <i>eius causſæ 348. differ. signa, 349. prognost. 350. curatio, 352. diætæ.</i> | 355 |
| Excrescentiæ <i>carnosæ in corde repertæ.</i>                                                 | 496 |

## F.

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| <b>F</b> ucus <i>ex hydrargyro corrumpit dentes.</i> | 30 |
|------------------------------------------------------|----|

## G.

|                                                         |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| <b>G</b> ibbositas 365. <i>eius species.</i>            | <i>ibid.</i> |
| Gingiæ <i>carne denudatæ.</i>                           | 65           |
| Gingiæ <i>excreſcentes &amp; laxæ.</i>                  | 63           |
| Ginguiarum <i>epulis.</i>                               | 69           |
| Ginguiarum <i>imminutio mobilitatis dentium causſa.</i> | 38           |
| Ll 4                                                    | Gingiæ       |

# INDEX RERVM

|                                                                                                 |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Gingiuarum inflammatio 66. eius signa, prognostica. ibid. curatio.                              | 67  |
| Grandines in pulmone geniti 130. illorum causse ibid. signa, prognostica, curatio.              | 231 |
| Grumos sanguinis in pectore resoluentia medicamenta 222. quo tempore sint exhibenda.            | 223 |
| Gurgulionis inflammatio & exulceratio 93. eius causse, signa prognostica 94. curatio 95. dieta. | 99  |
| Gurgulionis laxatio 89. eius curatio.                                                           | 91  |
| Gutturi illapsa ut eximenda.                                                                    | 107 |

## H.

|                                                                                             |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>H</b> Asenschart.                                                                        | 11  |
| Hirundinum puluis contra anginam.                                                           | 150 |
| Humorum pleuritidem parientium signa.                                                       | 279 |
| Hydrops pectoris 359. eius causse. ibid. differentie, signa, prognost. curatio. 362. dieta. | 364 |
| Hydrops pulmonis.                                                                           | 236 |

## I.

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| <b>I</b> Vs galli decrepiti purgans. | 205. 257. 415. 427 |
| Iuuenibus cur phthisis familiaris.   | 217                |

## K.

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| <b>K</b> Ar' igitur quid? | 300 |
|---------------------------|-----|

## L.

|                                                                                                         |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>L</b> Abia curta 11. curandi ratio duplex.                                                           | ibid. |
| Labia leporina, ibid. illorum curatio.                                                                  | ibid. |
| Labia liuida.                                                                                           | 13    |
| Labiorum fissuræ 5. eorum causse, ibid. differentie 6. signa, prognostica, indicationes, ibid. curatio. | 7     |
| Labiorum inflammatio 4. cancer, ibid. & eius curandi ratio peculiaris.                                  | 10    |
| Labiorum peruersio 13. eius caussa.                                                                     | ibid. |
| Labiorum tremor.                                                                                        | 12    |

Labio

# ET VERBORVM.

|                                                                  |          |
|------------------------------------------------------------------|----------|
| Labiorum tumor 3. natiuus, ibid. à venenis, ibid. durus.         | 4        |
| Labiorum tumores aridi.                                          | 5        |
| Labiorum ulcera 8. causſa, ſigna, prognostica & curatio, ibid.   |          |
| Dieta.                                                           | 9        |
| Labiorum vſus.                                                   | 3        |
| Labiorum vulnera.                                                | 10       |
| Læuium pulmonis arteriarum anguſtia 211. eius cauſſa, ſigna      |          |
| 213. prognostica, indicationes & curatio                         | 214. 215 |
| Asphyſia.                                                        | 147      |
| Linguae vitia.                                                   | 28       |
| Lipothymia, vide Syncope.                                        |          |
| Lipothymia & ſyncope quomodo differant.                          | 519      |
| Lipothymia an ſit affectus cerebri, ibid. an in ea ſpiritus ani- |          |
| males potiſſimum afficiantur?                                    | ibid.    |
| Lumbago 374. eius curatio.                                       | 375      |
| Lunatica paſſio ex vermibus in pericardio orta.                  | 484      |
| Lupi conſpectus vitiatæ vocis cauſſa.                            | 442      |

## M

|                                                                 |        |
|-----------------------------------------------------------------|--------|
| Maxilla inferior capiti adnata.                                 | 11     |
| Maxillæ cum capite connexio.                                    | 70     |
| Maxillæ fractura.                                               | 73     |
| Maxillæ fractura oris torturæ cauſſa.                           | 19     |
| Maxillæ inferioris immobilitas 73. ſigna & curatio eius. 20. 21 |        |
| Maxillæ inferioris iunctura ſoluta 70. eius prognostica & cura- |        |
| tio.                                                            | 71. 72 |
| Maxillarum fungi.                                               | 70     |
| Maxillarum laxatio 71. eius ſigna, prognostica & curatio. 71.   |        |
| 72.                                                             |        |
| Maxillarum ſyderatio.                                           | 70     |
| Mediaſtini inflammatio 290. eius cauſſa, ſigna, ibid. prognost. |        |
| & curatio 291. dieta.                                           | 272    |
| Miteſſer.                                                       | 377    |
| Mucronatæ cartilaginis prolapsus 382. eius cauſſa manifeſta     |        |
| 385. obſcura, ibid. ſymptomata ac ſigna 387. prognostica & cu-  |        |
| ratio.                                                          | 288    |
| Mucronatæ cartilaginis prolapsus an ſit morbus fictitiuſ?       |        |

# INDEX RERVM

382. qualis sit morbus? 385. huius morbi nomen & natura  
382. quæ partes in hoc morbo afficiantur? 386

## N.

**N**igellæ radix fluxum sanguinis sistit. 479  
Nutricum incuria in infantibus fasciis constringendus. 366.

## O.

**O** *Δονατορῆς* seu forceps dentarius plumbeus in templo  
Apollinis suspensus. 34  
Odorata spiritus reficiunt. 514  
Oleum citri in palpitacione cordis valdè utile. 506  
Oleum lini in pleuritide epidemia aluum mouit. 305  
Oris apertio læsa 14. eius causæ, signa & curatio. ibid.  
Oris distortio 17. causæ ibid. remotæ 19. signa 20. prognosti-  
ca & curatio 21. Dieta. 23  
Oris foetor 86. eius causæ ibid. signa, prognostica curatio. 87  
Oris hiatus 15. eius causæ, prognostica & curatio. ibid.  
Oris inflammatio 74. eius signa & curatio. ibid.  
Oris peruersio ex resolutione neruorum. 19  
Oris vlcera & *ἄφθαι*. 75. 83. 68  
eorum causæ ibid. differentiæ 77. signa, prognostica 78. in-  
dicationes 79. curatio in infantibus 80. in adultis 81. Die-  
ta. 84  
Orthopnoea. 394  
Oscitatio 15. eius signa, prognostica 16. curatio. ibid.  
Ossa in pulmonibus genita. 230  
Ossis palati corruptio. 85  
Oua in dorso. 378  
Oxymel belleboratum Gesnèri. 413

## P.

**P**astinacæ marinæ radius dentes excidere facit. 52  
Paralysis & conuulsio in tortura oris interdum iunguntur. 19  
Paralysis in inflammatione pulmonis. 191  
Pectoris.

# ET VERBORVM.

|                                                                  |       |
|------------------------------------------------------------------|-------|
| Pectoris dolor 467. eius signa 468. prognost. & curatio.         | 469   |
| Pediculi in dorso.                                               | 378   |
| Pericardij aqua aucta vel deficiens.                             | 484   |
| Pericardij corruptio.                                            | 486   |
| Pericardij defectus.                                             | 485   |
| Pericardij putredo, 486. tumores 485. vulnera.                   | 486   |
| Phthisis definitio 246. eius subiectum, causa ibid. differentia  |       |
| 250. signa incipientis ibid. perfectæ 251. prognostica 253. in-  |       |
| dicationes 255. curatio 256. Dieta.                              | 283   |
| Pleuritis 297. eius causa proxima 278. remotæ 279. differen-     |       |
| tia 282. signa ibid. tempora 285. signa differentiarum 283.      |       |
| prognost. 287. indicat. 292. curatio. ibid. Dieta.               | 314   |
| Pleuritis vera 267. notha.                                       | ibid. |
| Pleuritidis veræ & nothæ differentia.                            | 284   |
| Pleuritidis & peripneumoniæ differentia.                         | 284   |
| Pleuritidis à diaphragmatis inflammatione discrimen.             | ibid. |
| Pleuritidis ab epatis inflammatione differentia.                 | 285   |
| Pleuritidis salutaris terminatio 289. signa salutis in pleuriti- |       |
| de 291. signa mortis.                                            | ibid. |
| in Pleuritide ante annum 14. vena non secanda.                   | 295   |
| Pleuriticorum victus à veteribus accuratè præscriptus.           | 315   |
| Ptyalismus 24. eius causæ 20. signa, prognost. 26. curatio.      | 27    |
| Pulmonis vasorum apertio quot modis fiat 216. eius signa,        |       |
| prognostica 218. indicationes 220. curatio. ibidem dieta.        |       |
| 228                                                              |       |
| Pulmo quomodo euacuetur?                                         | 181   |
| Pulmo repletus.                                                  | 202   |
| Pulmonis cancer.                                                 | 267   |
| Pulmonis hydatides.                                              | 287   |
| Pulmonis inflammatio 184. eius causæ, ibid. differentia 187.     |       |
| signa 188. prognost. 192. indic. & curatio 196. dieta.           | 199   |
| Pulmonis intemperies 178. eius causæ, signa 179. prognostica     |       |
| 182. indicationes & curatio 181. dieta.                          | 184   |
| Pulmonis morbi in numero deficiente.                             | 232   |
| Pulmonis sphacelus.                                              | 266   |
| Pulmonis tubercula 232. cruda & suppurata ibid. causa ibid.      |       |
| signa ibid. prognostica & curatio.                               | 235   |
| Pulmonis ulceris causæ proxima 246. mediata 248. signa 251.      |       |
| Pro                                                              |       |

# INDEX RERVM

|                                                                                                                                                                                              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <i>prognostica</i> 253. <i>curatio</i> 256. <i>Dieta</i> .                                                                                                                                   | 283          |
| <i>Pulmonum ulcera peculiaria.</i>                                                                                                                                                           | 286          |
| <i>Pulmonum cum latere coalitus</i> 237. <i>eius causæ, signa</i> 238. <i>prognostica, curatio.</i>                                                                                          | 239          |
| <i>Pulmones refrigerantia</i> 182. <i>calefacientia</i> 183. <i>siccantia</i> <i>ibid.</i><br><i>humectantia.</i>                                                                            | <i>ibid.</i> |
| <i>Pulmonum vulnera</i> 240. <i>signa vasorum pulmonis vulnerat.</i><br><i>ibid. signa carnis pulmon. vulnerata, ibid. prognost.</i> 241. <i>indicatio &amp; curatio.</i> 242. <i>dieta.</i> | 244.         |
| <i>Pulmonis vulnerati historia.</i>                                                                                                                                                          | 240          |
| <i>Pulmonis planè consumpti historia.</i>                                                                                                                                                    | 486          |
| <i>Pulsus &amp; respirationis differentia.</i>                                                                                                                                               | 293          |
| <i>Purgantia si diutius continuantur, mutanda sunt.</i>                                                                                                                                      | 414          |
| <i>Pus in empyemate sensim euacuandum.</i>                                                                                                                                                   | 355          |

## R

|                                                                                                      |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>P</b> <i>Raucedo, vide vocis vitia.</i>                                                           | 4       |
| <i>Raucedinis è catarrho curatio</i> 444. <i>pure</i> 446. <i>à causis externis.</i><br><i>ibid.</i> |         |
| <i>Rectitudo quid.</i>                                                                               | 300     |
| <i>Regum Galliæ in curandis strumis vis.</i>                                                         | 165     |
| <i>Respiratio quomodo lædatur?</i>                                                                   | 384     |
| <i>Respiratio læsa in genere</i> 393. <i>causæ.</i>                                                  | 395-398 |

## S

|                                                                             |              |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>S</b> <i>Aliuæ defectus</i> 26. <i>signa, prognostica &amp; curatio.</i> | 27           |
| <i>Salinæ &amp; sputi differentia.</i>                                      | 24           |
| <i>Salinæ generatio</i> 24. <i>usus.</i>                                    | <i>ibid.</i> |
| <i>Sanguinis fluxus è dentibus.</i>                                         | 60           |
| <i>Labiis.</i> 13. <i>Gingivis.</i>                                         | 64           |
| <i>Schwachheit qualis sit morbus.</i>                                       | 512          |
| <i>Sermonis vitia, vide vocis vitia, an. omnis sermo vox sit?</i><br>435.   |              |
| <i>Sermonis vitii causæ.</i>                                                | 442          |
| <i>Spasmus Cynicus.</i>                                                     | 17           |
| <i>Spasmus Cynicus ex abscisso furunculo ortus.</i>                         | 19           |
|                                                                             | Signæ        |



# ET VERBORVM.

|                                                                                                                                                           |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Spinæ dorsi <i>contusio.</i>                                                                                                                              | 371          |
| <i>fractura.</i>                                                                                                                                          | <i>ibid.</i> |
| <i>vulnera.</i>                                                                                                                                           | <i>ibid.</i> |
| Sputum sanguinis 472. <i>caussæ, ibid. differentiæ</i> 473. <i>signa</i> 474. <i>prognostica, indicationes &amp; curatio</i> 476. 477. <i>dieta.</i> 480. |              |
| Sputi sanguinis <i>in muliere à Galeno curati historia.</i>                                                                                               | 479          |
| Strangulatio 432. <i>eius caussæ, ibid. prognostica, curatio.</i>                                                                                         | 434          |
| Strangulati laqueo <i>quomodo curandi.</i>                                                                                                                | <i>ibid.</i> |
| Strumæ in gutture 137. <i>caussæ</i> 138. <i>signa, prognostica, curatio.</i> 140.                                                                        |              |
| Suffocatio <i>vide strangulatio.</i>                                                                                                                      |              |
| Suffocatio spontanea <i>serui Barbari.</i>                                                                                                                | 393          |
| Suffocati ex vaporibus seu fumis <i>ut curandi</i> 434. <i>ex submersione in aquam, ibid. à fungis venenatis.</i>                                         | 435          |
| Syncopes <i>væx an Hippocrati in usu fuerit?</i>                                                                                                          | 518          |
| Syncopes definitio 519. <i>caussæ, ibidem, differentiæ, 522. signa</i> 523. <i>prognostica</i> 525. <i>indicationes &amp; curatio.</i>                    | 526          |
| Syncopes <i>à cognatis affectibus differentia,</i>                                                                                                        | 524          |
| Syrupus de <i>helenio Angeny.</i>                                                                                                                         | 416          |
| Syrupus de <i>erysimo Lobelli.</i>                                                                                                                        | 445          |
| Syrupus <i>catarrhalis Kegleri.</i>                                                                                                                       | 457          |

## T.

|                                                                                                                                                   |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| T Abes dorfalis.                                                                                                                                  | 372          |
| <i>eius differentiæ.</i>                                                                                                                          | <i>ibid.</i> |
| Thoracis fistulæ 346. <i>illarum differentiæ, ibid. signa, prognostica &amp; curatio.</i>                                                         | <i>ibid.</i> |
| Thoracis vulnera 340. <i>duplicia,</i>                                                                                                            | <i>ibid.</i> |
| Thoracis vulnerum penetrantium <i>signa, ibid. prognostica, ibid. curatio</i> 343. <i>dieta.</i>                                                  | 345          |
| Tonsillarum inflammatio & <i>ulcera</i> 100. <i>caussæ, signa, prognostica</i> 102. <i>curatio</i> 103. <i>dieta.</i>                             | 107          |
| Tussis definitio 447. <i>caussæ</i> 448. <i>differentiæ</i> 451. <i>signa</i> 452. <i>prognostica</i> 453. <i>indicationes</i> 455. <i>dieta.</i> | 463          |
| Tussis <i>quatenus talis curatio.</i>                                                                                                             | 456          |
| Tussis <i>ab intemperie curatio.</i>                                                                                                              | 457          |
| Tussis                                                                                                                                            |              |

# INDEX RERVM.

Tussis à catarrho curatio *ibid.* à materia calida tenui & acry  
458. ab humore pituitoso 460. à reliquis caussis. 463

## V.

|                                                                                                                                               |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>V</b> Enæ cauæ ramulus à Nicolao Sanmichelio observatus.                                                                                   | 338          |
| Venæsectio tutissimum pleuritidis auxilium.                                                                                                   | 294          |
| an purgationi in pleuritide sit præferenda?                                                                                                   | 293          |
| Vermes in pulmonibus geniti 230. causse <i>ibid.</i> curatio.                                                                                 | 232          |
| Vermes dorsi.                                                                                                                                 | 376          |
| Vermes in pericardio 484. signa & curatio.                                                                                                    | 485          |
| Vermes in ipso corde reperti.                                                                                                                 | 495          |
| Verrucæ in gutture & lingua.                                                                                                                  | 85           |
| Vertebræ primæ luxatio.                                                                                                                       | 364          |
| Vertebrarum cervicis luxatio <i>ibid.</i> earundem subluxatio. <i>ibid.</i>                                                                   |              |
| Vertebrarum dorsi luxatio 364. eius differentie 366. causse<br>externæ <i>ibid.</i> internæ 367. signa <i>ibid.</i> prognostica 368. curatio. |              |
| 370                                                                                                                                           |              |
| Vertebrarum quassatio.                                                                                                                        | 365          |
| eius curatio.                                                                                                                                 | <i>ibid.</i> |
| Vesiculæ in pulmonibus genitæ 230. earum curatio.                                                                                             | 232          |
| Virium imbecillitas 511. eius caussa 512. signa, prognostica,<br>indicationes & curatio 513. diætâ.                                           | 517          |
| Vocis organa.                                                                                                                                 | 436          |
| Vocis vitia 435. differentie illorum, 437. causse <i>ibid.</i> signa 443.<br>prognostica <i>ibid.</i> curatio.                                | 444          |
| Vox animalibus cur data.                                                                                                                      | 435          |
| Vox articulata <i>ibid.</i> an etiam sit brutorum.                                                                                            | <i>ibid.</i> |
| Vox obtusa.                                                                                                                                   | 441          |
| VOX rauca. 440. eius causse 441. curatio vide raucedo.                                                                                        |              |
| VOX tremula 441. abrupta <i>ibid.</i> clangosa 442. tarda.                                                                                    | <i>ibid.</i> |

# F I N I S.